

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書


子部
第五〇冊



魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0



9 787533 304782 >

EB64/02

四庫全書存目叢書·子部五〇

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 42.375 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

子部第五〇冊目次

子部·醫家類

馬師津梁三卷

〔清〕馬元儀撰
湖南師範大學圖書館藏清鈔本

.....一

張氏醫通十六卷

〔清〕張璐撰
中國科學院圖書館藏日本文化元年思得堂刻本

.....五一

馬師津梁三卷

〔清〕馬元儀撰

湖南師範大學圖書館藏清鈔本

附《四庫全書總目·馬師津梁

八卷》提要

馬師津梁卷之上

眩暈證

夫眩暈之候當分虛實二症。內証曰：諸風掉眩皆屬肝木。河間曰：暈眩者由風木旺而木復生火，風火皆屬陽，主乎動，兩動相搏則為旋轉。丹溪曰：痰在上，火在下，火炎上而動其痰也。此眩暈之屬實者也。內証曰：上氣不足，頭為之苦傾，目為之眩。曰：上虛則眩。曰：髓海不足，則腦轉耳鳴而眩冒。此眩暈之屬虛者也。至於治法，風則分其扶寒扶火而解之，火則彈其或微或甚而清之，痰則審其屬寒屬熱而消之。若所謂上虛者，陽中之陽虛也。凡飢飽勞倦，火吐大下，汗多亡陽者，多有之。此宜補脾肺之氣，所謂髓海不足者，陰中之陰虛也。凡房室過度，婦人產後，金瘡失血過多者，多有之。此宜補肝腎之陰。又有大醉之後，濕熱上蒸而暈者，傷其陰也。有大怒之後，木肆其強而暈者，傷其氣也。有痰飲留中，治節不行而暈者，脾之

弱也。此又有餘中之不足也。當各因其證治而求之也。

附方十枚

芎朮湯

治冒雨。中濕。眩暈。嘔逆。頭重。不食。

川芎 半夏 白朮 炙草

加姜煎服

升溪方

治眩暈不可當者

大黃 三次酒炒。昆為末

每服一錢。至二錢。茶調下

子和芎黃湯

治上焦風熱。頭目眩運

大黃 荆芥 黃仲 防風

為末水煎服。以利為度

防風通聖散

表裡之劑

防風 川芎 當歸 芍藥

大黃 薄荷 麻黃

芒硝 石焦 黃芩

滑石 甘草 荆芥

梔子 為末加姜煎服

放覆花湯

治中脘伏痰。嘔逆眩暈

旋覆花 半夏 橘紅

枳殼 人參 甘草

白茯苓 加姜煎服

益氣補腎湯

補氣之劑

人參 黃芪 白朮 白茯苓

炙草 山藥 山萸

加姜煎服

半夏白朮天麻湯

治氣虛。扶痰。眩暈

天麻 半夏 白朮 人參
 蒼朮 陳皮 黃芪 澤瀉
 石茯苓 神曲 麦芽 乾薑

補肝養榮湯
 水煎服

補血之劑
 當歸 川芎 芍藥 熟地
 陳皮 甘草

沉香 水煎服

治上盛下虛。頭目眩暈。耳鳴耳聾。

沉香 蔓荊子 青蘘 甘菊
 巴戟 胡蘆 山藥 川椒
 磁石 山茱萸 陽起石 附子

為細末。酒煮米糊和丸。梧子大。每服五十丸。加至七十丸。空心鹽湯送下。

青蘘散

搖鼻取涎。治眩神病。

牙皂 玄胡索 青蘘
 為末。水調。豆許。鼻內灌之。其涎自出。

汗證

夫汗者。陰氣之所化也。肌表者。衛氣之所居也。汗生于陰。而出于陽。故汗之有無。由營氣以為之變化。而汗之出入。由衛氣以為之啓閉也。然有自汗。有盜汗。有汗者。藏。然汗出無時。而動作則益甚。盜汗者。寐中通身汗出。覺來便收者也。臟氣法時論曰。肺病者。肩背痛。汗自出。腎病者。寢汗出。憎風。故有汗者。其病在肺。衛氣不固。腠理不密。而汗隨氣散也。盜汗者。其病在腎。陰虛者。陽必蒸之。故陽蒸陰分。而汗隨火泄也。此其大法如此。然非參之以脈。合之以症。亦何從辨其陰陽乎。提之脈。數者多陽。脈遲而微者多陰。汗出而熱者多陽。汗出而寒者多陰。煩躁身熱。自汗者多陽。厥逆身寒。汗出者多陰。盛者陽必衰。宜以參附。芪附之屬。寔表固陽。盛者陰必弱。宜以當歸。六黃。湯。或六味地黃湯之屬。治火補陰。又有自汗不止。不

禁外風者。勝理之不寒。亦陽虛之屬也。治宜實表散邪。玉屏風散主之。有汗身重。脈緩而大者。此濕氣之乘脾。亦陰盛之屬也。治宜實表去濕。防己黃芪湯主之。若汗出而喘。脈脫神昏者。此其六陽氣絕。陰與陽相離絕。汗乃出不可為也。

附方十二枚

周衛湯

治濕勝有汗。補衛氣虛弱。表虛不任外寒。
黃芪 麻黃根 生甘草 當歸梢

生黃芪 半夏 猪苓 羌活
羌活 生地 五味 紅花

羌活勝濕湯

羌活 黃芪 生甘草 生黃芪
酒黃芪 人參 川芎 藁本
防風 獨活 升麻 紫胡

細辛 蔓荊子 薄荷
水煎熱服

治真陽不足。上氣喘急。自汗盜汗。氣短頭暈之等症。

人參 熟附

加薑煎服

正元散

治下元氣虛。臍腹脹滿。心脇刺痛。泄利自汗之等症。

紅豆

白朮 炮姜 補紅
川芎 附子 茯苓 人參
高麗 乾姜 葛 山藥 肉桂

當歸六黃湯

治盜汗

當歸 生地 熟地 黃柏

黃芩	黃連	黃芩	山萸肉	當歸
水煎服				
正氣湯				
益陰之劑				
黃柏	知母	炙草		
水煎卧時服				
大補黃芪湯				
補氣益血之劑				
黃芪	防風			
白朮	白朮	川芎	炙草	
五味	人參	白朮	炙地	
白朮				
玉屏風散				
固表之劑				
防風	黃芪	白朮		
加集煎服				
治盜汗方				

麻黃根	牡蠣	黃芪	人參
龍骨	枸杞根	炙草	
一水煎服			
黃芪六一湯			
治男婦氣虛不足。俗傳痿黃。有汗盜汗。			
黃芪	炙草		
加刺煎服			
白朮散			
牡蠣	白朮	防風	
為末。溫水調服			
黃芪建中湯			
治表虛自汗			
芍藥	官桂	炙草	黃芪
每劑煎服			
健忘證			

夫健忘之症。古人方論皆以為心腎不交所致。然究不詳其所以交不交之故。今試言之。夫心之與腎。自水火已自壯也。心以陽藏而居乎南。得卦之離。

為陽也。而奇中有偶。則陽中有陰也。故心屬火。而火中有至陰之精。以降流乎腎者也。腎以陰藏而位乎北。得卦之坎。為陰也。而偶中有奇。則陰中有陽也。故腎雖屬水。而水中有真陽之氣。以上溯乎心者也。所以至人淡薄無求。以寧其心。恬靜寡慾。以安其腎。但使離之陰靜。則心可交腎。坎之陽寂。則腎可通心。此交之道也。若其煩勞太過。則心陽亢而上炎。嗜慾無窮。則腎陰弱而下趨。陽亢者。陰不生。而心中無陰。將何以下通于腎。精去則氣亦去。而腎中無陽。將何

以上交于心。此不交之道也。人知心之火。腎之水。而不知水中之火。中之水也。人知心之火。降。水之火升。而不知心中之陰。始能降于腎。中陽始能交於心也。不然。心火下流。腎且為其所侮。腎水上凌。心且受其賊邪。又何交之足云。至于治法。古人用天王補心以抑心火。而使之下。六味地黃丸以滋腎水。而使之上。愚又以為不然。夫欲心之交。須養其血。欲腎之交。必固其氣。宜抑心火。滋腎水之謂哉。況乎心居于上。腎居于下。其間心腎而居者為脾。道家以心為嬰

心。腎為姤。皆脾為黃婆。黃婆者媒妁也。所以交引水火使之相見者。實黃婆之力居多。故雖治其心腎。又必調養中州。始得以勝通上澈下之任也。余因世之治健忘者。動稱心腎不交。及觀其論方。罕有能盡乎此者。故為辨之如此。其他又有因痰因火因鬱之不同。當各因其症而治之。

附方七枚

歸脾湯

補養之劑

人參

茯神

龍眼肉

黃芪

酸枣仁

白朮

當歸

遠志

木香

炙甘草

加姜紅煎服

寧志膏

人參

酸枣仁

辰砂

乳香

為末。蜜丸。薄荷湯下。

二丹丸

天冬

熟地

丹麥

參九珠砂為末

菖蒲益智丸

菖蒲

遠志

牛膝

桔梗

人參

桂心

茯苓

附子

參九桐子大每服三十丸。食前用溫酒米飲任下。

補心丹

寧心保神

益血固精。強力益志。令人不忘。

人參

當歸

五味子

炙甘草

天冬

杏仁

柏仁

白茯苓

玄參

丹參

桔梗

遠志

生地

黃連

蜜丸。珠砂為衣。燈心湯下。

孔子大聖枕中丹

常服令人聰明

龜甲

龍骨

遠志

菖蒲

為末。酒服方寸匕。日三服。

治多忘方

菖蒲

茯苓

茯神

人參

遠志

為末。酒服方寸匕。日三夜一。五日効。

癰狂證

難經云。重陽者狂。重陰者癰。故癰狂之病。其本不同。狂病之發。妄行妄言。不避親疏。癰病之發。或歌或哭。喜常獨處。狂病成于大驚大怒。故其候多躁而常醒。癰病成于積憂積鬱。故其候多靜而常昏。此其陰陽之別。自有冰炭之異。故狂病多火。而病通肝膽。非寒下之藥。不足以殺其木火之邪。癰病多痰。而病涉心脾。非溫燥之劑。不足以破其沉滯之氣。然此特其大法耳。終當以脈之遲速。症之寒熱。辨其屬陰屬陽。為痰為火。而分治之。庶無失矣。

附方三枚

三聖散

湧痰之劑

瓜蒂

附風

藜蘆

為粗末。每服五錢。以薑汁三茶盞。先用二盞煎。

三五沸去蓋。汁次入水一。煮煎至三沸。却將先
二蓋同一處煎。三沸去查澄清。放溫。徐服之。
以吐為度。不必盡劑。

控涎丹

次下之劑

甘遂 紫大戟 白芥子

為末。煮糊丸。梧子大。曬乾。臨卧淡姜湯下。

夢心丸

清心安神之劑

好殊砂 一兩

右將熟絹包裹綠瑤。猪心一枚。竹刀切開。抵
去血。入殊砂也于內。再縛合。外用甜茅殼重裹。
麻皮繫定。無灰酒二升。入砂礮內煮。酒盡取出。
朱砂另研。以猪心細切。砂並內研爛。却入後藥。
末。并朱砂末。調為丸。留少許。朱砂為末。藥末酒
隔日研下。煮兩午。煮猪心日乾。早煮。煮去皮核。
取兩四兩用。

人參 茯苓 當歸 石菖蒲

為末。和丸。桐子大。以留下來砂為末。每服五十

癩瘡

夫癩之為病。發作無時。卒然昏仆。口中作聲。筋脉痠
痠。冷汗吐沫。或一二時。或半日。許乃醒。其發也。或數
月一發。或數日一發。或一日二三發。病愈深者。發愈
頻也。原其受病之由。或以大驚卒恐。或以飲食不節。

以致藏氣不平。鬱而成涎。留積結絡。乃成此病。其後
一遇驚恐。奔走勞力之事。觸動藏氣。則其所積痰涎
一時暴逆。如風之發。如火之熾。莫有能止之者。所以
卒然昏仆。隨其五藏所傷。發為五證。錢氏方論言之
詳矣。至于治法。丹溪所云。尋痰尋火。分多少治。雖為
合論。但其所用。或連括。或連括。或連括。或連括。或連括。
重之品。恐不足以迅掃毒邪。而驅除痼疾。當用礞石
滾痰丸為主。審其何藏受病。即以何色為衣。以為引
經。如心病用殊砂。肝病用青黛。之使。之直達病所。驅

除痰熱後以清心安神之藥調治百月自可取愈甚
者如子和所云三聖散于暖室中使汗吐下三法並
行。次服通聖散百餘日。若不先去其舊痰積熱而惟
以姑息為事。雖多服湯液。吾未見有能愈者也。

附方六枚

琥珀膏星丸

天南星

掘坑用火煨。燒坑紅出炭淨。入好酒一升。添火
炙中。放入南星。盛火勿令洩氣。過一宿取出焙

末用

琥珀膏 硃砂二兩一牛為末

右以猪心血。每汁糊丸。如桐子大。每服五十丸
人參湯送下。

五生丸

治癰脈弦細緩者

南星

半夏

川烏

白附子

大豆

為細末滴水為丸。每服三丸至五丸。不過七丸。

姜湯下

安神丸

黃連

硃砂

生地

歸身

炙甘草

為末蒸餅和丸。如黍米大。硃砂為衣。津液下五
十丸。

清神湯

茯苓

黃連

杏仁

石菖蒲

柏仁

遠志

甘草

水煎服

龍腦安神丸

治男女五般癰癩。無問遠近發作無時

茯苓

人參

地骨皮

硃砂

炙甘草

犀角

馬牙硝

龍骨

射香

牛黃

桑皮

甘草

金箔

察丸如彈子大。金箔為衣。冬月溫水下。夏月涼
水下。

犀角丸

治風癰發作有時。揚手擲足。口吐涎沫。不省人事。等病。

犀角

薄荷葉

赤石脂

朴硝

烏梅

為末。麴糊丸。桐子大。每服二三十丸。溫水下。日三服。

厚朴丸

治癰瘡。病久成核。

厚朴

蜀椒

川烏頭

紫苑

吳茱萸

菖蒲

紫胡

桔梗

茯苓

官桂

皂角

炮姜

人參

黃連

巴豆霜

右為末。入巴豆霜研勻。煉蜜丸。如桐子大。每服二九。漸加五七丸。以利為度。

驚恐證

夫驚症有二。有因病而驚者。有因驚而病者。內証云。二陽一陰。發病主驚駭。又東方青色。入通于肝。其病

發驚駭。又陽氣與陰氣相搏。水火相惡。故惕然而驚。此因病而驚者也。經云。驚則氣亂。而心無所倚。神無所歸。慮無所定。此因驚而病者也。因病而驚者。藏氣先傷。當審其火盛則清之。痰凝則消之。中虛則補之。因驚而病者。神氣暴奪。當以安神養心為主。然神去則舍空。舍空則液聚。恐非魚理。痰氣不可也。而恐亦有二。內証曰。肝氣虛則恐。血不足則恐。又心忪惕。思慮則傷神。一傷則恐懼自失。此因病而恐者也。曰恐則氣下。恐懼者。神蕩憚而不收。恐懼而不解。則傷精。此因恐而病者也。因病而恐者。精神內弱。當養心血。魚補肝腎之精。因恐而病者。神氣多驚。當調養心脾。魚微和其痰氣。然而治驚頗易。治恐實難。治外來之驚。恐猶易。治內生之驚。恐實難。蓋驚則傷于氣。一虛可以卒致。恐則傷于精。一傷難以驟復。外來之驚。恐病出于暴。但使氣平即已。內生之驚。恐損成乎漸。使非恢復精神不已。此驚恐二症。病原之異。治法之分。不可不詳辨也。

附方十枚

溫膽湯

治心胆虛怯。觸事易驚。氣鬱生涎。短氣自汗。

半夏

枳實

竹茹

橘紅

甘草

白茯苓

姜枣煎服

黃連安神丸

治心亂煩熱。胸中氣亂。元欲吐。膈上伏熱。

礞砂

黃連

吳草

生地

歸頭

為末。蒸餅丸。黃米大。每十九津下。

寒水石散

清熱之劑

寒水石

滑石

生甘草

為末。姜枣湯下。

鎮心丸

治心血不足。怔忡多夢。如墮虛谷。

酸棗仁

車前

白茯苓

麥冬

五味子

茯神

肉桂

熟地

龍齒

天冬

遠志

山藥

人參

礞砂

蜜丸米飲下

琥珀養心丹

琥珀

龍齒

遠志肉

石菖蒲

茯神

人參

酸棗仁

當歸

生地

黃連

柏子仁

礞砂

牛黃

為末。猪心血為丸。黍米大。金箔為衣。燈心湯

送下五錢

定志丸

菖蒲

遠志

茯神

人參

為末。蜜丸。桐子大。朱砂為衣。米飲下。

人參散

治肝腎虛而多恐。不能獨用。

人參

枳殼

五味子

桂心

菊花

茯神

山藥

柏子仁

柏子仁

熟地

為末溫酒調下

升漢方

治周本心年六十。形氣俱實。因大恐。正月間。非病。心不自安。如人將捕之狀。夜卧亦不安。兩耳後亦見火光炎上。食飲雖進而不知味。口乾而不欲飲。

人參

白朮

歸身

陳皮

黃柏

炙玄參

水煎服

茯神散

治胆胃不足。心神恐慌。

茯神

遠志

防風

細辛

白朮

前胡

人參

桂心

熟地

菊花

枳壳

為末加姜煎服

補膽防風湯

治胆虛目暗眩冒。夢見闕訟。恐懼而色變。

防風

人參

細辛

川芎

甘草

茯神

獨活

前胡

為末。每服四錢。加姜煎服。

怔忡證

夫怔忡者。心中振動不安。即心悸也。考之內經。無有言怔忡者。金匱獨出二條云。食少飲多。水停心下。甚者則悸。半夏麻黃丸主之。朕結戾心動悸者。炙甘草湯主之。故古人云心悸之由。不越心虛與飲二者是也。蓋心者藏神之地。心虛則神去。神去則心無所主。而振恐不寧。故用炙甘草湯。以益虛而養神也。又心為火藏。而水能勝之。若水停心下。則賊邪逼處。而心君焉能泰然。故用半夏麻黃丸以行水蠲飲也。然此特其一端耳。愚謂虛而悸者。則有氣虛血虛之異。水而悸者。則有中焦下焦之分。氣虛者中虛也。宜補其胃。血虛者心虛也。宜養其心中焦之水。胃府之所積也。治宜分利而兼補胃。陽下焦之水。腎藏之所積也。治宜溫補而兼逐水邪。此其二者之中。又有不同如此。醫理深。豈一說所可殫哉。

附方八枚

茯苓飲子

治痰飲伏于心胃。悸動不已

赤茯苓

半夏

茯苓

炙甘草

橘紅

枳殼

沉香

炙甘草

姜煎服

濟生益榮湯

當歸

黃芪

小蘗

杏仁

柏子仁

茯苓

木香

白芍

人參

炙甘草

紫石英

炙甘草

姜煎服

酸棗仁湯

酸棗仁

遠志

黃芪

白茯苓

蓮子

當歸

人參

茯苓

陳皮

炙甘草

姜煎服

辰砂寧志丸

辰砂

白朮

鹿茸

黃芪

茯神

人參

當歸

為末入辰砂研勻。蜜肉和丸如桐子大。每三十丸。溫酒米飲任下。

天王補心丹

遠志

菖蒲

香附

麥冬

熟地

茯苓

骨皮

目甘

當歸

牛膝

黃芪

人參

木通

蜜丸服

滋陰抑火湯

當歸

芍藥

生地

川芎

黃連

知母

熟地

肉桂

甘草

水煎服

龍齒丹

治心火虛寒。怔忡不已。或痰多恍惚者

龍齒

遠志

杏仁

官桂

當歸

琥珀

附子

南星

木香

沉香

熟地

紫石英

寒丸朱砂為衣冬湯下

辰砂遠志丸

安心神化風痰

石菖蒲

遠志

人參

茯神

辰砂

川芎

山藥

錢粉

麥冬

細辛

天麻

半夏曲

南星

白附子

為末。生薑汁入水。煮糊丸如茱豆大。朱砂為衣。

臨卧每湯下。

卧證

夫不寐之病。蓋有多端。若傷寒傷風瘧疾而然者。邪氣內擾也。飲食過度而然者。胃不和則卧不安也。憂勞憤鬱而然者。痰火內亂也。曲運成神機而然者。心血耗損也。大病新瘳。年高而然者。氣血交傷也。然雖有雖種不同。總之虛實二字。足以盡之。若體氣素盛。偶為風寒所客。痰火所擾。飲食所滯。而致不眠者。此為有餘。但去其邪而正自寧。若體氣素弱。或因過勞。或因病後。或以憂思。而致不寐者。此為不足。但宜調

養心脾氣血而已。縱有微痰微火所不計也。若夫不

得寐者。非脾濕有餘。即精神內弱。蓋衛氣行陽則寤。

行陰則寐。故寐屬陰而寤屬陽也。不寐由陰氣之虛。

不寤由陽氣之困。故不寐當養陰而不寤當養陽也。

若年高之人。晝反多卧。而夜反不寐者。此其陰陽而

敗。營衛之行失其常經。不可治也。

附方四枚

酸枣仁湯

治虛勞虛煩不得眠。

酸枣仁

甘草

知母

茯苓

芎藭

水煎服

驚風丸

治四肢無力。瞻虛不眠。

驚風

酸枣仁

羌活

牛膝

黃芪

人參

五味子

蜜丸酒送下

治膽涎沃心虛煩不眠

半夏

枳實

竹茹

橘皮

炙甘草

白茯苓

每服煎服

治多卧方

酸枣仁

臘茶

為末水煎服

馬師津梁卷之中

明人姜思吾校

新安汪廉夫閱

痺證

夫痺者閉而不通之義。由風寒濕三氣雜至則經絡
壅閉血氣不行而病為痺也。其症有三曰痛痺者經
脉挛痛即痛風之屬曰行痺者流走不定即走注歷
節風之屬曰著痺者重着不仁即麻木之屬蓋寒主
收引濕主沉滯風善行而數變故其為病不同如此
夫風也寒也濕也合而言之則風者寒之帥寒者風
之威濕與寒又同陰氣分而言之風則為陽邪寒則
為陰邪濕則為從寒從熱之化痺論云其寒者陽氣
少陰氣多與病相益故寒也其熱者陽氣多陰氣少
病氣勝陽陽遭陰故為痺熱由此觀之其症有熱痺寒
痺之分治法有從陰從陽之異熱痺者或以肥甘酒
濕素蘊之熱或以五志厥陽所動之火加以陽邪外
入與內熱相合則有口乾煩躁便閉之候治宜清熱
清風者也寒痺者或以房室損傷陽氣或久坐卧

寒濕之地以致陰邪外入與內氣相搏必有喜熱惡
 冷或厥逆便泄之候治宜溫經散寒者也獨是今之
 治此者皆用辛散燥烈之劑此惟寒濕成痹得熱藥
 開通之力可以獲愈若遇陽邪之候必反增其病矣
 余每用生地紅花當歸丹皮酒炒黃芩連秦羌防風
 製何首烏之屬以治熱痺獲効甚速蓋風無所滋必
 傷其血生地丹皮酒炒秦連所以清血中之熱製首
 烏秦羌防風所以平血分之風當歸紅花所以通血
 中之滯風散熱退血氣通和而痺自已此余獨得之
 秘以傳學者採擇焉

附方廿二枚

河間防風湯

治行痺之劑

防風 當歸

黃芩 秦羌

桂枝

赤茯苓

葛根 杏仁

羌活

子生丹

姜煎入好酒半盞服

治風走注疼痛

天麻 防風

川芎 草烏

海桐皮

蜜丸每丸重一錢每服一丸細嚼冷茶清送下

忌食熱物一日

小烏犀丸

治一切風走注肢節疼痛不可忍

烏犀屑 乾蝎 蜈蚣 地龍

朱砂 天麻 羌活 川芎

防風 甘菊 蔓刺子 乾姜

射香 牛黃 虎腔骨 敗龜

石花蛇 天南星 肉桂 附子

海桐皮 木香 人參 當歸

蜜丸彈子大每服一丸用溫酒或薄荷湯細嚼

下

沒藥散

治通身百節風虛勞冷麻痺困弱走注疼痛日夜

不告

沒藥 虎骨

為末溫酒調下

烏藥順氣散

治風氣走注四肢骨節疼痛過身頑麻及癰瘰步

履艱難脚膝痿弱

麻黃 陳皮 烏藥 羌活

炮姜 川芎 枳殼 桔梗

白芷 甘草

每服煎服

控涎丹

治痰飲攻注疼痛過身走注無定

甘遂 紫大戟 白芥子

為末煮糊丸如桐子大晒乾卧時淡姜湯或白

湯下五七丸加至十丸

控涎散

治身及脇走痛痰扶元血加桃仁泥丸治走注疼痛

威靈仙

川芎

枳子

當歸

肉桂

蒼朮

桃仁

甘草

起難

活血應痛丸

狗脊

蒼朮

香附

陳皮

沒藥

草烏

威靈仙

為細末酒煮起糊為丸如桐子大每服十五丸

溫酒送下

已戰天湯

治冷痺脚膝疼痛行步艱難

巴戟

附子

五加皮

牛膝

石斛

炙草

萆薢

白茯苓

防風

防己

每煎服

人參益氣湯

治五六月間兩手麻木四肢困倦怠惰嗜卧乃濕熱傷元氣也

黃芪 人參 生甘草 炙甘草
五味子 升麻 柴胡 芍藥

水煎服、後少卧于麻痺處按摩屈伸以時于飯前又一服日二服

第二次方

黃芪 紅花 陳皮 澤瀉

煎服如前

第三次方

黃芪 黃柏 陳皮 澤瀉

升麻 白芍 生甘草 五味子

生黃芪 炙甘草

煎服如前

秋涼時去五味子

冬月去黃芪

續斷丸

治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺

川續斷 當歸 草薢 附子

防風 天麻 乳香 沒藥

川芎

蜜丸溫酒或米飲下

防風湯

治血痺麻木不仁

防風 赤茯苓 獨活

秦艽 赤芍 杏仁 桂心

甘草 當歸

姜煎服

羌活散

治風痺手足不仁

羌活 漢防己 防風 酸枣仁

道人頭 川芎 附子 麻黃

天麻 黃松節 杏仁 荊芥

為末溫酒調下

黃芪酒

治血痺諸痛甚者四肢不遂風濕寒痺舉體腫滿

黃芪 獨活 防風 細辛

疼痛不仁

牛膝

川芎

附子

炙草

蜀椒

川烏

山茱萸

秦艽

葛根

官桂

當歸

大黃

白朮

炮姜

右剉如麻豆大用夾絹囊盛貯以清酒一斗浸春夏五日秋冬七月初服一合日二夜一漸增之以知為度

犀角散

治心膈神恍惚恐畏悶亂不得睡志氣不安語言

錯亂

犀角

羚羊角

人參

沙參

防風

天麻

天竺黃

茯神

升麻

獨活

遠志

炙甘草

甘草

龍齒

丹參

牛黃

射香

龍腦

為末和諸藥重研令極細每服錢半不拘時麥冬湯調下

溫中法麴丸

治脾痺發欬嘔涎

法麴

麦芽

白茯苓

陳皮

厚朴

枳實

人參

附子

炮姜

當歸

炙草

細辛

枳梗

吳茱萸

白朮

細辛

紫蘇湯

治肺脾心膈塞上氣不下

蘇子

半夏

橘紅

杜心

人參

白朮

甘草

姜枣煎服

牛膝酒

治腎痺虛後感寒濕為痺

牛膝

秦艽

川芎

白茯苓

防己

官桂

獨活

五加皮

丹參

米仁

火麻仁

麥冬

石斛

杜仲

附子

地骨皮

右別用生絹袋盛之好酒一斗浸春秋五日夏
三日冬十日每服半盞空心食前服每一日二
次

烏頭湯

治寒冷濕痺筋脈挛縮

大烏頭

細辛

川椒

甘草

秦艽

附子

官桂

白芍

乾姜

白茯苓

防風

當歸

獨活

炙水煎服

養血地黃丸

熟地

蔓荊子

山茱萸

黑狗脊

地膚子

石楠

乾漆

蟾蜍

天雄

車前子

草薢

山藥

澤瀉

牛膝

煉蜜丸如桐子大每服五十九溫酒下空心臨

卧服之

右丸治諸掌服之

痿證

夫痿者痿弱無力舉動不能也其病有五內應五藏
曰痿躄者肺熱所生曰脉痿者心熱所生曰筋痿者
肝熱所生曰肉痿者脾熱所生曰骨痿者腎熱所生
凡此五症皆因五藏有熱陽盛陰衰以致血脉乾槁
津精涸竭不能榮養經脈滲灌諸谷故大病年衰婦
人產後全瘡失血過多之人後多成此疾自非大補
陰氣以敵陽熱且持之以久主之以靜未有或愈者
也然痿雖五藏各有而其端則在於肺其治則在於
胃蓋肺居五藏之上而主氣化行榮衛治陰陽故肺
氣熱則五藏之陰皆不足而諸痿生焉此痿之所以
生於肺也經曰治痿獨取陽明蓋陽明多氣多血凡
所以和調五藏洒陳六府滲灌諸谷榮養衛任者皆
此氣血之用故陽明盛則宗筋潤而機關利陽明虛
則諸肢涸而筋骨痿此治痿之所以獨取陽明也故
痿症毋論何藏所生當以峻補陽明氣血為主然後
察其所受之經而兼治之脉痿者養其心筋痿者調
其肝肉痿者益其脾骨痿者益其精痿躄者滋其燥

治無失者乃古人治痿多用蒼朮黃柏為主夫蒼朮燥能除濕黃柏寒能除熱此惟濕熱壅滯者為宜若施之血液枯槁筋脈失養者非徒無益已也

附方八枚

霍香養胃湯

治胃虛不食四肢痿弱行立不能皆由陽明虛宗

筋無所養遂成痿痹

藿香 白朮 神曲 白茯苓

傷藥 縮砂 牛夏曲 米仁

人參 華澄茄 甘草

每服

清燥湯

治濕熱成痿以燥金受濕熱之邪是絕寒水生化之源絕則腎虧痿厥之病大作腰以下痿軟癱瘓不能動

黃芪 蒼朮 白朮 橘皮

澤瀉 五味子 人參 白茯苓

升麻 麥冬 歸身 生地

神曲 橘皮 黃柏 紫胡

黃連 炙草

健步丸

治膝中無力屈伸不得腰背腿脚沉重行步艱難

羌活 紫胡 滑石 炙草

瓜蒌根 防風

川烏 苦參 肉桂 防己

虎潛丸 酒九服

治痿厥如神

虎潛丸

龜板 黃柏 知母 熟地

牛膝 芍藥 琥珀 虎骨

當歸 陳皮 乾姜 附子

酒糊丸服

上丹

養五臟補不足秘固真元均勻二氣和暢榮衛保

神守中。久服輕身耐老健力能食明目降心火。益
腎水。益精氣。男子絕陽事無嗣。女子絕陰乃不能
妊。以至腰膝重痛。筋骨衰敗。面色黧黑。神志昏惰。
寤寐恍惚。煩勞多倦。餘瀝夢遺。膀胱邪熱。五勞七
傷。肌肉羸瘦。上熱下冷。服之半月。陰陽自和。肌肉
光潤。悅澤容色。開心意。安魂魄。消飲食。養胃氣等
症。

五味子 百部 免然子 肉蓯蓉
杜仲 遠志 枸杞子 防風

白茯苓 巴戟 蛇床子 柏子仁
山藥

為末煉蜜丸桐子大每服五十九。食前溫酒鹽
湯任下。

春煎乾枣湯下
夏加五味子
四季月加茯苓
秋加枸杞子
冬加遠志

食後魚服衛生湯

衛生湯

補虛勞強五藏。除虛煩。養真氣。退邪熱。順血脈。安
和神志。潤澤容色。常服通暢血脈。不生癰瘍。養胃
益精。自汗盜汗並服之。
當歸 白芍 黃芪 炙草

水煎服 年老加酒半盞煎

中丹

補百損。體劣。少氣。善驚。昏憒。上焦客熱。中脘冷痰。

不能多食。心腹痞滿。脾胃氣衰。精血妄行。

黃芪 白芍 當歸 白茯苓
人參 杜心 川椒 大附子
黃苓

為末米飲搜和搗千餘下。丸如桐子大。每五十
九。溫酒送下。

小丹

補勞益血。去風冷百病。諸虛不足。老人精枯神耗。
女子絕傷。斷產。久服益壽延年。安神定志。視魄滋

氣血脈終開益智慧釋散風濕耳目聰明筋力強壯肌膚悅澤添精補髓活血壯顏

熟地

肉蓯蓉

五味子

元氣子

柏子仁

天冬

蛇床子

覆盆

巴戟

石斛

續斷

淫瀉

人參

山藥

遠志

山萸

葛蒲

桂心

白茯苓

杜仲

天雄

藥丸桐子大酒送下

虛人加地黃

多忘加遠志茯苓

少氣神虛加覆盆子

風虛加天雄

虛寒加桂心

少便赤濁加茯苓澤瀉

吐逆加人參

脚氣證

經云身半已上者邪中之也身半已下者濕中之也

又曰傷於濕者下先受之又曰清濕襲虛則病起于下。觀乎此而脚氣之病為水濕所生無疑。而濕亦有二一者外受之濕雨露陰濕之氣是也一者内生之濕酒酪肥甘之所釀也。外受之濕止腫于下或發熱惡寒或自汗轉筋凡作勞辛苦之輩多有之內生之濕或至手節頭面微腫或煩渴便閉脈滑凡肌体充肥膏粱太過者多有之東垣所謂南方地下水寒病多外感北人漣乳無節病多內發亦有理也。治外感之病以疏散為主。魚風則解之。魚寒則溫之。魚暑則清之。病以分利為主。熱則魚清其寒則必溫其中。寒則宜行其氣虛則宜益其脾而此症又有緩急之分。緩者其來漸或二三月而日甚急者其來速或一二日而即起治之若緩恐其氣上衝心亦能殺人故脚氣之甚者非外行砭刺內服湯藥厥疾不瘳也

附方五枚

敗毒散

治足三陽經流注脚氣

人參

赤苓

吳草

川芎

前胡 紫胡 羌活 獨活
枳壳 桔梗

為水 姜煎服

若自汗惡風加桂

無汗惡寒加麻黃

若風濕發熱喉腫加蒼朮 桑白皮 柳大黃 微利之自

愈

紫蘇散

治脚氣上氣心胸壅悶不得眠卧

紫蘇葉 桑白皮 赤茯苓 枳殼

木通 炙草 紫苑 前胡

百合 杏仁

姜水煎服

柳柳湯

治一切脚氣順氣防壅

枳殼 香附 陳皮 茯苓

木瓜 五加皮 炙草

姜水煎服

續斷丸

治肝腎風虛脚弱脚腰脊疼痛風毒流注行止艱

難小便餘瀝

杜仲 五加皮 防風 苡仁

羌活 續斷 草薢 生地

牛膝

為末好酒三升化青鹽三兩用木瓜半斤去皮

子以鹽酒煮成膏和丸桐子大每服三五十丸

溫酒鹽湯任下

酒浸牛膝丸

牛黃 川椒 附子 虎骨

用生絹袋入藥繫口用煮酒一斗春秋浸十日

冬十四日夏七日每日空心飲一大盞酒盡出

藥為末醋糊丸每二十丸空心溫酒淡鹽湯任

下

取證

夫取證之始手足逆冷甚則卒倒暴厥忽不知人輕
則漸醒重則即死最為危候而其病亦不一詳考內

經有言寒厥者以秋冬奪於所用而陽氣衰也。有言熱厥者以數醉飽入房而陰氣損也。有言煎厥者陰虧陽擾煎迫為厥即熱厥之屬也。有言薄厥者氣血俱亂相搏成厥即氣厥血厥之屬也。有言尸厥者以邪客五絡而陰陽離厥也。近世又有痰厥食厥酒厥等症。痰厥者一時痰涎壅塞氣閉昏愦。食厥者酒過也。食厥者飽食太甚胃氣不行而上下痞塞也。酒厥者縱飲無節濕熱內壅卒然暈眩甚則昏不知人也。凡此雜病之厥有此數種不同至若傷寒厥症則惟陽厥陰厥而已。仲景云凡厥者陰陽氣不相順接便為厥。若手足逆冷者是也。故傷寒母問陽厥陰厥。一皆手足逆冷但辨其從陽經傳入者其厥多熱從陰經直入者其厥多寒。脈症多陽者多熱脈症多陰者多寒。至于治法亦自不同。雜病之厥重在元氣故熱厥當補陰寒厥當補陽。傷寒之厥重在邪氣故寒厥當溫而熱厥可攻二者不可不知也。至如氣厥血厥痰厥食厥酒厥雖所因不同然一皆以治氣為本。蓋血隨氣行痰隨氣升。因于酒食必傷其氣但使

氣降則血亦降氣清則痰亦清氣和則飲食自如若尸厥一法以其手足少陰太陰足陽明五絡俱絕宜刺五絡之井腧詳備素問經刺論中刺而不已以竹管吹其兩耳者以五絡皆會于耳中吹之所以溫助其五絡氣可復通也。又五絡上絡左角故製其左角之髮飲以美酒者補以其類且助藥力行血氣也此理特妙但世罕能行之耳

附方七枚

四逆湯

治陰症脈沉身痛而厥
炙甘草 附子

水煎服

加減白通湯

治形寒飲冷大便自利完穀不化膈腹冷痛足跗

附子 乾姜 官桂 炙甘草
草薢 半夏 人參 白朮
姜葱煎服

白虎湯

治熱厥。腹滿身重。難以轉側。面垢。諸遺尿。手足

厥冷。自汗。脈沉滑。

知母

石膏

甘草

粳米

水煎服

升陽湯

治熱厥

羌活

黃芩

炙甘草

蒼朮

人參

黃芩

紫胡

黃連

升麻

石膏

水煎服

參芪益氣湯

治氣虛發厥。脈伏。手足厥冷。

人參

黃芪

白朮

五味子

麥冬

陳皮

炙甘草

陽虛加附子

姜枣煎服

腎陽養榮湯

治血虛陰厥。脈伏。虛細。四肢厥冷。

當歸

川芎

白芍

熟地

黃柏

知母

枸杞子

麥冬

甘草

水煎。入竹瀝。姜汁服。

返魂丹

治尸厥不語。

朱砂

雄黃

射香

生玳瑁屑

白芥子

右研如粉。於磁器中。煨。安。息。香。和。丸。如。菜。豆。大。

或。衝。惡。不。語。用。童。便。下。五。丸。

瘧證

夫瘧之為病。頭搖口噤。脊反張。頭項。四肢。強。急。或。身。熱。足。寒。惡。寒。而。赤。之。類。皆。是。也。仲。景。曰。太。陽。之。病。發。熱。無。汗。反。惡。寒。者。名。曰。剛。瘧。太。陽。病。發。熱。汗。出。而。不。惡。寒。者。名。曰。柔。瘧。是。雖。有。剛。柔。之。異。而。皆。屬。于。太。陽。一。經。然。余。嘗。考。內。經。有。曰。子。陽。明。少。陽。厥。逆。發。喉。痺。盛。腫。瘧。又。曰。瘧。疾。為。病。瘧。強。反。折。又。曰。足。少。陰。之。

筋病主痲痺及癰是瘕之為病凡少陽、明、少陰、太陽、督脈皆有之。仲景但言外感而不及內傷，故但及項強。皆屬于濕。又曰：諸暴強直皆屬于風。又曰：經筋之病寒則反折筋急，又曰：肺移熱于腎，傳為柔瘕。是風濕寒熱能使人皆成瘕也。而陳無擇云：瘕病多由亡血。筋無所養，故邪得以襲之。所以傷寒汗下過多，與夫病瘕人及產後致斯疾者，藥可見矣。蓋此症有內傷、有外感，不可不辨。外感者如內經所言：風寒熱濕之所為也。內傷者如無擇所言：血虛不能養筋者是也。治外感之瘕以去邪為主，故仲景有括萎根桂枝湯、葛根湯以解外邪之注，故有大承氣湯以除內陷熱邪。治內傷之瘕以氣血為主，故薛新甫虞天民輩俱用逍遙歸脾十全大補之屬以治氣血虛弱，不能榮養筋脈者，用加味四物舉步古拜散。防風當歸散之屬以治血虛而風入者，蓋瘕有虛實，治有補瀉。倘表邪未盡，誤補則躁煩立至。若陰血已虧，誤攻而竭絕，何堪令人且不知瘕病為何病而欲其分別表

集補瀉得宜不可得矣

附方六枚

葛根湯

解表之劑

葛桂

麻黃

桂

芍藥

炙草

生姜

大棗

水煎服。取微汗，不須啜粥。

神術湯

治剛瘕無汗

蒼朮

防風

甘草

羌活

麻黃

蔥白 姜煎服

白朮湯

治柔瘕有汗

白朮

防風

炙草

桂心

黃芪

姜煎服

柴胡加防風湯

治汗後不解。乍靜乍躁。目直視。口噤。往來寒熱。脈

弦。此少陽風症。

柴胡

防風

生夏

人參

黃芩

生薑

甘草

大棗

水煎服

大承氣湯

疏下之劑

大黃

枳實

厚朴

芒硝

水煎服

附子防風散

治傷寒陰證。閉目合面。手足厥逆。筋脈拘急。汗出

不止。

白朮

防風

甘草

茯苓

附子

乾姜

柴胡

五味

桂心

加姜煎服

癰風證

夫癰風者。即世俗所謂大麻風也。蓋受天地惡厲之

氣最深最重者。故其為瘡。骨節重痛。皮膚癢。癢肌肉
不仁。肩落。甚則指節脫。鼻柱壞。聲啞。目盲。而元矣。緣
風毒之氣。既已內傷五臟。然後發見於外。非若傷風
小疾。但皮毛經絡受病。而藏氣無傷者也。夫表裡受
邪。即須表裡通治。內經論大風刺肌肉。汗出百日。刺
骨髓。汗出百日。凡二百日。鬚眉生而止鍼。蓋此症邪
氣所客。營衛之氣。腐而不清。故刺肌肉。以清其營。刺
骨髓。以清其營。深而衛淺。故也。汗出則邪熱除。而
營衛清矣。張子和治十餘年癰病。置病人于燄室中。

先以三聖散吐之。次以舟車丸瀉川散。大下之。使吐
汗下三法並行。取出臭汗。腥涎惡物。如此數次。而愈。
蓋毒氣深入。蘊結于藏府者。非蕩滌其內。則毒決不
能除。毒氣外溢。凝滯于肌表經絡者。非刺刺遍身。患
處及兩臂腿腕。兩手足指縫。各出血。其毒必不能散。
獨薛立齋云。癰症不可概施攻毒之藥。當先助胃壯
氣。雖為王道之治。寧毋養氣。大患乎。要之初受之疾。
乘其勢弱。可圖即行汗下鍼刺之法。以迅掃惡濁之
邪。若病久年。莫不任攻伐者。但當補養氣血。雖不去

疾亦可延年。但此症古稱惡疾。若非謹慎。口腹屏絕。聲色雖調得宜。未有或免者。也。

附方四方

元戎方

治風痰癰病。通身生瘡。

天麻

荆芥

薄荷

白花蛇

右為末。好酒二升。窰四兩。石器中熬成膏。每服一盞。溫服。日三煎。餅壓下。急于暖處令汗出。十日効。

子和方

治風疥癬及癰

浮萍

荆芥

川芎

甘草

麻黃

為末。入葱白豆豉煎。汗出為度。

或加歸芥

換肌散

治大風疾。年深久不愈。以至眉毛脫落。鼻梁崩壞。不至踰月。取効如神。

白花蛇

黑花蛇

地龍

當歸

細辛

白芷

天麻

蔓荊子

威靈仙

荊芥穗

甘菊花

苦參

紫參

沙參

木賊

茯苓

不灰木

炙草

天冬

赤芍

定風草

何首烏

九節菖蒲

胡麻子

草烏頭

川芎

蒼朮

木鱉子

為末酒調下

東坡四神丹

久服可愈大風疾

羌活

白芍

當歸

熟地

或丸或煎服

破傷風證

夫破傷風者。肌肉傷損。或瘡口不合。而為風邪所襲。也。其症惡寒發熱。筋脈拘急。或胸腹滿塞。二便閉結。或時汗出。蓋其風邪亦能傳播。絡狀類傷寒。故病机分表裏中三法。而治在表宜汗。在裏宜下。在牛表

半裡之間宜和解。但此症最為難治。人之壯盛者。隨其外症。用表裡中三法。以驅逐風邪。此無難也。人之素弱。及老人小兒。或因跌仆。去血過多。或因瘡口。膿水淋漓。未合。風邪乘虛深入。血分者。宜補養榮血。無散虛風。如四物湯中。加去風藥可也。其元氣大虛。不禁外風。反逆厥逆。症屬危急者。先進獨參湯。峻補元氣。隨進星附湯。驅治虛風可也。又有絕無外感風邪。而忽為搐搦。口喎。目邪。角弓反張者。正病机所謂瘧口閉。瘧氣難通。泄瀉。熱生風者也。一切辛熱發散之劑。即在所禁止。以甘草滑石蔥豉寒藥。以退風熱。而開結滯可也。

附方四枚

羌活防風湯
治表邪初發。若用此解之。
羌活 防風 甘草
當歸 白芍 地榆
細辛 水煎服

江餘丸

治破傷風驚。而發搐。臟腑秘澀。知病在裡。可用此下之。

江餘 野鴿 桑葉 雄黃
蜈蚣 天麻

為末。分作三分。將二分。晚飯。為丸。桐子大。朱砂為衣。每服。珠砂為衣者。二十丸。入已霜者。一丸。第一服。二丸。加至利。為度。再服。珠砂為衣者。病愈即止。

白朮防風湯

治破傷風。服風藥過多。自汗出者。
白朮 黃芪 防風

當歸地黃散

治病日久。氣血漸虛。邪氣入內者。
當歸 地黃 芍藥 川芎
防風 白芷 細辛

右水煎服

黃疸證

大黃疸之症多由脾胃不和濕熱相合。黃鬱成黃。正與合類相似。內經云。溺黃赤。安卧者。黃疸。夫溺黃赤者。熱之微也。安卧者。濕之微也。仲景云。陽明病。無汗。小便不利。心中懊憹者。身必發黃。蓋陽明濕熱之邪。既不能從汗而越之。于表。又不能從小便而泄之。于下。而至心中懊憹。則其濕熱不能外達。而反內結。不能下行。而反上逆。可知。故仲景有茵陳蒿湯。用茵陳。

梔子清解其熱。微加大黃下之。千金方有麻黃醇酒湯。用麻黃一味。開結散邪。且加醇酒助之外達。如此表裡分消。濕退熱除。而黃自愈矣。然此特言外感發黃。而未及乎內傷也。仲景云。男子發黃。小便自利。小便建中。湯主之。夫小便自利。則濕邪去而發黃當愈。而不愈者。裏無濕熱。特以中氣不足。而虛陽外泛耳。故用小建中湯。以建立中氣。而收拾虛陽。為合治也。若本無熱邪。清之必傷其陽。本無濕邪。利之必損其陰。嗚呼。可不慎歟。又有穀疸。酒疸。女勞疸。陰疸之不同。

此或以飲食傷其脾。或以女色傷其腎。或以真陽之素弱。或以寒藥之太過。凡此皆屬內傷之病。若不揣其病本。而概以清濕利熱為事者。操刃之事也。學者宜詳究焉。

附方七散

梔子大黃湯

酒疸。心中懊憹。或熱痛。

梔子 大黃 枳實

水煎服

效

茵陳蒿湯

治身熱。鼻乾。汗出。陽上。并小便赤。而不利。濕熱發黃。

黃

茵陳蒿

梔子

大黃

水煎服

滲濕湯

治黃疸。小便不利。

茯苓

澤瀉

豬苓

生黃芩

黃連

梔子

茵陳

白朮 蒼朮 陳皮 青皮

枳實

水煎服

參米健脾湯

治發黃日久脾胃虛弱飲食少思

人參 白朮 茯苓 陳皮

白芍 當歸 炙草

加棗煎服

色疸加炙黃芪白扁豆

加味四君子湯

治色疸

人參 白朮 茯苓 白芍

黃芪 扁豆 炙草

等分煎服

八味丸

治女勞瘵

熟地 山萸 澤瀉

茯苓 丹皮 肉桂 附子

煉蜜丸酒下

當歸秦朮散

治五癆口淡咽乾倦怠發熱微寒

白朮 茯苓 秦朮 當歸

川芎 芍藥 熟地 陳皮

子夏油 炙草

姜水煎服

馬師津梁卷之下

泄瀉證

門人姜思吾校
新安汪廉夫閱

夫泄瀉之候有因溫勝者以水土相氣併歸大腸也
有因寒勝者以命門火衰氣化無權也有因脾虛者
以土不制水清濁不分也有因腎虛者以火不生土
寒濕内生也有因食滯者以運化不及中氣受困也
有因風勝者以風邪干胃木能勝土也大法溫則利
之寒則溫之風則平之虛則補之食則和之所因不
同故其治亦不一乃丹溪云瀉多由濕惟分利小便
最為上策此惟酒濕肥甘之輩而為暴泄之病小腹
脹滿水道痛急者為宜若病久陰虛脈虛氣弱口乾
水渴而不喜冷者不可利也蓋本非水有餘實因火
不足本非水不利實因氣不行夫病不因水而利則
亡陰瀉因火虛而利復傷氣倘不察其所病之本則
未有不愈利愈虛而速其危者矣

附方十散

蒼米防風湯

治泄利脈弦頭微痛

蒼米 防風

加等煎服

白朮湯

溫中之劑

白朮 芍藥

水煎服

炙草

乾姜

升陽除濕湯

自下而上者引而竭之

升麻 柴胡

澤瀉 猪苓

炙草 天麥芽曲

蒼朮

神曲 陳皮

水煎服

白朮散

治小兒泄瀉胃熱煩渴不問陰陽並宜服之

人參 茯苓

甘草 薑黃

白朮

木香

水煎服

黃芪補胃湯

治一日大便三四次溏而不多有時泄腹中鳴

症

黃芪

當歸

柴胡

陳皮

吳草

升麻

紅花

水煎服

肉豆蔻丸

治時泄久不愈狀沉細無力者

破故紙

肉豆蔻

為末車肉為丸飲湯下

四神丸

溫腎之劑

肉豆蔻

破故紙

茴香

木香

為末車煎湯下和丸鹽湯下

肥腎雙補丸

治腎濕

人參

蓮肉

龜板

五味子

山萸肉

山藥

補骨脂

車前

已熟肉

肉豆蔻

橘紅

砂仁

煉蜜丸服

桃花丸

治腸胃虛冷滑泄不禁膝腹絞痛

赤石脂

乾姜

起餅丸米飲下

訶散如前

訶散

附子

肉豆蔻

木香

吳茱萸

生龍骨

白茯苓

草薢

為汗煎和丸米飲下

滯下證

論黃連丸之功用
黃連丸之功用
治痢疾之聖藥
也世人不識其
其苦而甘也
有連丸乃古之
聖藥也今人不
識其苦而甘不

夫痢疾一症即內經所謂腸澼也古人又謂之滯下
其實皆一症也至于病本從來議論亦紛紜不一河
間丹溪則以為熱為實東泉景岳則以為寒為虛要
之皆非也內經云食飲不節起居不時者陰受之陰
受之則入五臟入五臟則脹滿閉塞下為飧泄久為

明辨其因之論
 而香連丸之中
 能潤大腸以寒
 攻冷下之聖藥
 手雖有不和
 無所用其力也
 是故使之便子
 凡者每多不少
 然痢疾之病有
 因食積而致者
 因食積而致者
 因食積而致者
 因食積而致者

腸瀉是痢疾之候無非邪氣外搏飲食內微藏氣受
 傷所致然至其病成則有寒有熱或實或虛不可一
 概而論何也人之藏氣有陰有陽元氣有強有弱藏
 寒則熱亦生寒氣弱則實亦成虛必須審察病者氣
 之強弱體之厚薄病之新久脈之虛實曾無通瀉及
 用攻擊苦寒之藥以知其正氣和氣孰多孰少陰邪
 陽邪或偏或駁然後對症用藥斯為萬全凡痢症初
 起形氣尚強脈實堅痛者可速去其積去則痢自
 止此通因通用痛隨利減之法也若煩熱喜冷脈實
 腹滿或下多純紅鮮血者此為濕熱內盛而宜清利
 者也若痢症經久未有不傷其正者但有傷陰傷陽
 之兩途傷陰者精血脂膏悉從利去多有煩躁熱渴
 之候此宜亟行清潤以養其陰傷陽者脾腎元神志
 從利散多有滑脫厥逆之候此宜亟行溫補以回其
 陽按之暴病則多寃久病則多虛滑脫者久寒瀉滑
 者久熱參之脈症合之新久百無一失矣
 附方十六枚
 潔古大黃湯

治瀉痢久不愈膿血稠粘兼急後重日夜無度等
 症
 大黃二兩
 右細剉好酒二大盞同浸半日許煎至一盞半
 去渣分作二服頓服之病止勿服如未止再服
 取利為度後服芍藥湯和之
 芍藥湯
 行血調氣經曰沒而便膿血知氣行而血止也
 血則便膿自愈調氣則後重自除
 白芍 當歸 黃連 木香
 甘草 肉桂 大黃 黃芩
 水煎服
 治熱痢赤黃膿血心腹困悶
 犀角 黃連 地榆 黃芩
 常歸 木香
 水煎服

赤石脂 乾姜 粳米
 水煎服
 十全大補湯
 治一切婦人病。崩四十日。諸藥不愈。去瘀沉。陽大
 凡痢脈宜沉。宜。服此藥而愈。
 人參 白朮 茯苓 炙甘草
 熟地 川芎 芍藥 當歸
 黃芪 肉桂
 每冬煎成。加白蜜。再煎。數沸服。
 白芍 甘草
 青皮 紅花
 山查 水煎服
 參苓白朮散
 治久瀉及大病後。崩。調理。消渴。若元氣
 人參 山藥 蓮肉 白扁豆
 白朮 枳殼 砂仁 白茯苓
 茯苓 澤瀉
 薏苡仁 炙甘草
 為末。米飲調下。
 當歸補血湯
 治妊娠下痢。腹痛。小便澀。
 糯米 當歸 黃芪
 此方貼肚。神效。

乳香 五寶
 浸藥 五寶
 木別子 五寶
 桃仁 五寶
 桃枝 五寶
 柳枝 五寶
 右用香油。二兩
 將木別子。以下
 四味。入油。燻浮
 好。黃丹。煎過
 三兩。將成膏
 用。槐。便。不。住
 手。攪。滿。水。成
 珠。連。必。再。入。乳
 香。一。分。攪。勻。
 必。要。以。槐。便。攪
 貼。肚。即。止。

葛根湯
 專治酒痢。
 葛根 枳殼 牛夏 生地
 杏仁 茯苓 黃芪 炙甘草
 加黑豆。生薑。白梅。煎服。
 百一選方
 治噤口痢。
 石蓮去殼。留心。分肉。碾為細末。每二錢。陳米飲調
 下。此是毒氣上衝心。肺。借此以通心氣。便覺思食
 矣。凡痢無不。便。以。其。內。有。定。氣。故。也。得。用。水。從。前。去。故。不。便。短。少。津。液。亡。陰。小
 便。必。用。黃。赤。香。痛。治。法。宜。利。小。便。從。通。而。至。消。積。止。之。
 陳米湯
 治吐痢後。大渴。飲水不止
 用陳米。二合。水淘淨。以水二盞。煎至一盞。去渣
 服。
 開結證
 夫開結之病。東垣有風燥熱燥陽結。陰結。實。秘。虛。秘
 之分。且各立方。處治。可謂詳矣。楊子虛秘一端。則猶

有未盡其曰胃虛而秘者不能飲食小便清厚朴湯主之是言胃虛而氣秘也夫胃主氣化氣虛固可以成秘而藏胃津液津枯腸弱不能成秘乎胃為腸腑之司胃虛固能令便秘而腎開於二陰腎虛弱不能令便秘乎故余曰有未盡也試觀年光虛人多有便秘之病蓋人年四十而食氣自半起居衰矣愈老愈衰精血日耗腸胃乾涸故成此疾當滋補精血如益虛潤燥丸從容潤腸丸之類投而用之此症惟傷寒陽明實熱可行攻下之法其他非陰氣血之虧即津

液之耗不可概用硝黃等藥以取速效而重傷根本或愈通而愈結或一通而不止貽患無窮悔何及矣附方九枚

麻仁丸

治腸胃熱燥大便乾結

厚朴

芍藥

枳實

大黃

麻仁

杏仁

煉蜜和丸桐子大每服二十丸溫開水吞下之便通利即止

厚朴湯

治胃虛秘結

厚朴

陳皮

甘草

白朮

半夏曲

枳實

大承氣湯

治實之瀉

大黃

芒硝

厚朴

枳實

加蜜煎服

潤腸丸

治風結血秘胃中伏火

羌活

歸尾

大黃

麻仁

桃仁

蜜丸白湯下

木香檳榔丸

疏導三焦快氣化痰消食寬中

木香

檳榔

枳殼

杏仁

青皮

半夏曲

皂角

郁李仁

為末別以皂角四兩用漿水一碗搗碎熬膏更入煉蜜少許和丸姜湯下

益血潤腸丸

治燥之劑

熟地

杏仁

麻仁

枳壳

橘紅

阿膠

蘇子

肉蓯蓉

荆芥

當歸

煉蜜丸白湯下

導滯通幽湯

治幽門不通噎塞便難以辛潤之

歸身

升麻梢

枳仁

炙草

紅花

熟地

生地

水煎去渣調換枳末五分服

涼血清腸散

治脫肛

生地

當歸

白芍

防風

升麻

荆芥

黃芩

黃連

香附

川芎

甘草

水煎服

癰閉證

夫癰閉之候小便不通也詳考內經有曰三焦並太陽之正入絡膀胱約下焦實則閉癰又足少陰實則閉癰是言癰閉為寔也又曰胞移熱于膀胱則癰是言癰閉為熱也寔則宜利熱則清病自已矣然有利之而水不行清之而閉益甚者其義何居蓋常讀內經而得其旨誠為言之內經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣又曰飲入于胃游溢精氣上輸于脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行夫所謂氣化者肺金之氣化也所謂通調水道者肺氣通調而能使水道下行也是水雖出于膀胱而寔閉乎肺氣暗雖主水之藏而肺寔生水之源古云水出高原又云黃河之水天上來者非耶而癰閉之閉乎肺者亦有二端有肺腎而閉者有肺燥而閉者肺腎則氣不下行膀胱之水無氣以化肺燥則金不清肅腎藏之水失其化源若此者雖清之而不能清利之而不能利者也蓋源既塞矣而

強責其下流其能行乎泉之竭矣而猶不云有中虛
何益乎惟宣通肺氣則鬱解而泉源自達滋養肺金
則燥釋而腎水自生然云病在上取之下此之謂也
嗟乎此中玄妙豈可與淺學者語哉

附方七散

清肺散

治渴而小便閉或黃或澀

茯苓

猪苓

燈心

木通

通草

車前

瞿麥

扁蓄

澤瀉

琥珀

為末水煎服

黃芩清肺飲

治肺燥而小便不通

黃芩

梔子

長流水煎服不利加鹽豉

滋腎丸

治下焦陰虛脚膝無力陰汗陰痿足熱不履地不
渴而小便閉

黃柏

知母

肉桂

為末水丸白湯下

八正散

治心經邪熱小便閉癃

瞿麥

扁蓄

車前

滑石

吳草

木通

梔子仁

大黃

加燈心煎服

已戰丸

治胞痺臍腹痛小便不利

已戰

桑螵蛸

遠志

山芋

生地

附子

續斷

肉蓯蓉

杜仲

石斛

鹿茸

龍骨

兔然子

五味子

山萸

肉桂

蜜丸酒下

紫胡勝濕湯

澤瀉

升麻

生甘草

黃柏

龍胆草

當歸梢

羌活

紫胡

麻黃根

漢防己

茯苓

紅花

五味子

水煎服

龍膽瀉肝湯

紫胡梢

澤瀉

當歸梢

龍胆草

車前

木通

水煎服

補腎飲

治產時傷脾小便漏出

生黃熟絹一尺剪碎

白牡丹根皮用干紫者

白芩各一錢

為末水一碗煮去絹爛如飴空心頓服時不
得作聲作聲即不效

淋證

內經云脾受積濕之氣小便黃赤甚則淋又曰風火
鬱于上而熱其病淋夫積濕則能生熱而熱鬱又能
成濕熱交蒸氣道不清而淋病生焉治法溫精則
利之熱甚則清之火鬱則發之風勝則平之乃今人

之治淋者專以苦寒通利為主不知通利太過則中

州氣弱而脾濕愈以不行苦寒太甚則風邪內鬱而

大熱為之益熾是何肯予醫耶况乎勞倦傷中而氣

虛下陷者有之嗜慾縱恣而時陰不固者有之二者

皆能令人小便淋漓不快時一窘迫此則似淋而實

非淋也若再行通利則氣愈陷而陰益傷貽患非淺

矣醫者最宜識此不可概以治淋之法治之也

沉香散

附方九枚

理氣之劑

沉香

石葦

滑石

王不留行

當歸

葵子

白芍

甘草

橘皮

為末大麥湯調下

石葦散

理氣之劑

石葦

赤芍

白茅根

木通

瞿麥

川芎

葵子

木香

滑石

水煎服

牛膝膏

治死血作淋

桃仁

歸尾

牛膝

赤芍

生地

川芎

用甜水十鍾炭火慢煎至二鍾入射香少許分作四次空心服如夏月時以涼水換此膏不壞

五淋散

治膀胱有熱水道淋瀝不出或尿如豆汁或成砂

石或如膏或熱沸便血

赤茯苓

赤芍

小梔子

當歸

甘草

加燈心水煎服

大府丹

治小便赤少及五淋症痛
木通 黃芩 生地

家丸不通湯下

小薊飲子

治下焦結熱尿血成淋

生地

小薊根

通草

滑石

山梔仁

蒲黃

淡竹葉

當歸

藕節

甘草

水煎服

海金沙散

治小便淋瀝及下焦濕熱氣不施化或五積淋瘕

癃閉不通

海金沙

木通

瞿麥穗

滑石

通草

杏仁

鹿角霜丸

加燈心煎服

治膏淋

鹿角霜

白茯苓

秋石

為末糊丸米飲下

兔絲子丸

免然寸 桑螺蛸 淫瀉

家丸清米飲送下

赤白濁證

經云田想無窮所求不得意淫于外入房太甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫噫此即白濁之謂耶夫意淫於外則精離其位宗筋弛縱則陰挺不收以離位之精不當不收之挺有不時自下者耶故古人謂為敗精傷而收者良有以也其濁亦有赤者血之屬也心火熾盛血從內動古云濁去太多精化不及赤上變白乃虛甚也又有溫熱為濁者此因肥甘酒濕太過釀成溫熱亦隨水穀之氣暗輸于腎使精氣濁而不清則淫溢而下丹溪謂濁主溫熱又云濁症皆以溫痰為病宜燥中宮之溫是也大都赤者多熱白者多濕淋痛者多火滑脫者多虛腥穢者多濕熱若兩症初起而無淋痛之甚者宜先清其火有濕者先去其濕然後再安精氣及其稍久痛淋俱去性淋瀉不止則有脾氣下陷土不制濕而水道不清者有相火已殺心腎不交而精滑不固者脾虛者宜

其氣腎虛者宜固其精治濁之法無出此矣夫精之主宰在心精之藏制在腎凡人酒色無度思慮太過心腎氣虛不能管攝漏濁之所由生也因小便而出者名曰尿精因見聞妄羨而出者名曰漏精心不足而挾熱者名曰赤濁心不足而挾冷者名曰白濁陰不升陽不降上下乖睽是有清濁不分之症又有脾精不潔者小便便濁帶精淋瀝不止手足乏力腰背酸疼常用蒼朮等藥以斂脾精脾精者精生于穀也必要依認之真而後發之當耳

附方九枚

清心蓮子飲

治心虛有熱小便赤濁

黃芩

麥冬

地骨皮

車前子

炙甘草

石蓮肉

白茯苓

黃芩

人參

遠志

石菖蒲

水煎服

和味清心飲

治心中煩熱赤濁肥脂

白茯苓	石蓮肉	益智仁	麥冬
人參	遠志肉	石菖蒲	車前子
白朮	澤瀉	炙草	
加燈心煎服			
玄兔丹			
益腎之劑			
兔絲子	五味子	白茯苓	蓮肉
酒浸山藥	煮糊丸	米飲下	
內補鹿茸丸			
補益精氣	售止白濁		
鹿茸	兔絲子	茯苓	沙苑蒺藜
肉蓯蓉	紫苑	蛇床子	黃芪
桑螵蛸	陽起石	附子	官桂
蜜丸酒送下			
四苓散			
治濕之劑			
茯苓	猪苓	白朮	澤瀉
為末長流水調服			

蒼白二陳湯			
治濕痰下注為白濁			
蒼朮	白朮	橘紅	半夏
茯苓	甘草		
水姜煎服			
獨精丸			
固澀之劑			
補骨脂	青鹽	茯苓	五倍子
酒煮糊丸	鹽湯下		
水陸二仙丹			
固澀之劑			
金櫻子	去子及毛淨	煮乾	慢火熬成膏
芡實	研為細粉		
右以前膏同酒糊為丸	桐子大	每服三十丸	溫酒下
瑞蓮丸			
治思慮傷心赤白二濁			
白茯苓	石蓮肉	龍骨	天冬

麥冬 柏子仁 紫石英 遠志
當歸 酸棗仁 龍齒 乳香

蜜丸 桐子大 硃砂為衣 每服七十丸 溫酒或茶湯下

遺精證

夫人之生也。非精無以立其基。非神無以善其用。神者。精之度也。故精之藏。受雖在腎。而精之主。宰則在心。子每見少年多慾之人。日有所親。心有所慕。志亂于中。神遊于外。隨有夢遺精滑之症者。此無他。心動而神搖。神搖而精自走也。故治此當以清心安神為主。而固精次之。意此者。尤以恬靜寡慾為亟。庶無虛損。疝蠱之慮也。外此。又有勞傷即遺者。此筋力有不足。肝脾之氣弱也。有因思慮過度即遺者。此中氣有不足。心脾之虛陷也。有無故滑而不禁者。此下元之虛。腎臟之不同也。而總以有夢無夢為別。有夢者。沉思妄想之所成也。其病多在肝。無夢者。作勞縱慾之所致也。其病多在腎。肝此二者。為辨症之大綱。而

二者之治。則又有辨大抵。沉思者。氣鬱于內。妄想者。神游于外。鬱則宜揚。而散則宜收也。作勞者。肝熱而傷陰。縱慾者。腎虛而脫陽。陰傷宜補。而兼滋。陽脫宜溫。而兼瀉也。夫既審其心脾肝腎。何藏所傷。滋補固溫。何法所宜。治斯善矣。然非病者。惜命全形。清心寡慾。亦未能取効。眉睫也。

附方三枚

茯苓湯

治穩心太熾。夢遺心悸。

茯神 遠志 酸棗仁 石菖蒲

人參 茯苓 黃連 生地

當歸 甘草

加蓮子煎服

鹿茸益精丸

治心腎虛冷。漏精白濁。

鹿茸 桑螵蛸 肉苁蓉 巴戟肉

元熱子 杜仲 益智仁 禹餘糧

川棟子 當歸 韭子 補骨脂

山茱肉 赤石脂 龍骨 滴乳香
為末酒煮糯米糊為丸桐子大每七十九粒茯苓
湯下

正元散

治下元虛冷。臍腹脹痛。泄利嘔吐。陽虛自汗夢遺。
精滑。手足厥冷。一切虛寒。

紅豆

炮姜

陳皮

茯苓

人參

白朮

炙草

肉桂

川芎

附子

山藥

川芎

烏藥

乾姜

黃芪

加等末。鹽煎服。

氣證

夫病症內經有云。任脈為病。男子內結七疝。又云。督
脉生病。從少腹上衝心而痛。不得前後為衝疝。曰衝
疝者。蓋衝任而為病者也。嘗考任衝督三脉。皆起
于胞宮。而出于會陰。任由會陰而行于腹。督由會陰
而行于背。衝由會陰出並少陰而散于胸中。故其為
病如此。又曰邪客于足厥陰之絡。令人卒疝暴痛。又

肝所生病為狐疝。又足厥陰病丈夫瘡疝。又厥陰所
謂癰疝者。婦人少腹腫也。又足厥陰氣逆。則羣腫卒
疝。以足厥陰之脉。循股陰入毛中。過陰器抵小腹。其
別者。循脛上臑結于莖。故亦為此病。又足陽明之筋
病瘡。亦腹筋急。蓋足陽明之筋。其直者上循伏兔結
于髀聚于陰器。上腹而布也。然則疝症。凡督衝任及
足厥陰陽明皆有之。而張子和云。凡疝者。非肝木受
邪。即肝木自甚。皆屬肝經。豈以疝病皆屬於筋。而諸
筋皆屬肝乎。然謂其病多在筋。而皆挾肝邪。則可謂
其必在厥陰。而不及他經。則不可也。至于七疝之名。
內經已有衝疝。癰疝。狐疝。瘡疝。癰疝。卒疝。一疝之別。
而巢氏又立厥陰寒氣。盤疝。狼疝。七名。子和又立寒水
筋。血氣。狐疝。七症。皆與內經不同。巢氏怪而不經。又
無論矣。即子和之所謂水疝。亦即經之癰疝。血疝。即
經之瘡疝。氣疝。即經之厥疝。筋疝。即經之瘡疝。子和
特更立名目。以欺世盜名。雖為近代所宗。然學者當
以內經為主也。至其受病之因。巢氏深得其旨。曰諸
疝者。陰氣積于內。復為寒氣所加。使營衛不調。氣血

虛弱。故風攻入其腹內而成。痼也。蓋痼病多在于筋。筋熱則弛縱。寒則緊急。痼病之拉引畢九。裏急腹痛。皆筋急之候。其為陰寒無疑。故治此者。當以溫藥為主。但不宜驟進補劑。以絀絡得寒。其血氣必多鬱滯。且肝木之性。喜條達而惡屈抑。故尤以平肝行氣為要。許學士云。此症雖因虛得之。不可以虛而驟補。皆哉斯言。可謂先得我心矣。辨疑錄云。治痼者。每用五苓散內加行氣之藥。如茴香。川練子。橘核。木通之類。益白朮。甘溫善調脾氣。而去邪濕。茯苓。淡滲以利膀胱。豬苓。滲瀉分理陰陽。以和心。與小腸之氣。則桂能伐肝邪。茴香。善驅寒濕。川練子。橘核。去膀胱之氣。少加木通。以導引小腸之邪。余常用之。獲効甚多。俟邪退病衰。然以溫補腎肝之藥治之。何患乎痼之不已也。

附方十五枚
奪命丹

治連年近日小腸疝氣偏墜。痛。膝下振痛。以致悶亂。及外腎腫硬。日漸滋長。陰間溫癢成癰。

吳茱萸淨一斤。切四分。用酒醋鹽湯重便各浸一

為細末。酒煮。麴糊丸。如桐子大。每五十丸。空心鹽湯送下。

芫花內消丸

治腎經虛弱。膀胱為邪氣所搏。結成寒症。陰癰腫大。

山茱萸 陳皮 吳茱萸 馬蘭花

木香 肉桂 山藥 川練子

青皮 茴香

右為末。酒糊丸。如桐子大。每五十丸。空心溫酒送下。

丁香煉寒丸

當歸 附子 川練子 茴香

右用好酒三升同煮。酒盡焙乾。作細末。每藥末一兩。再入下項藥。

丁香 木香 全蝎 延胡

為細末。入前項藥末拌勻。酒糊丸。如桐子大。每

服三十丸至百丸溫酒下

控引畢丸

治小腸病結上而不下痛引心臍

茴香 棟實 石茱萸 陳皮

馬蘭花 羌活

醋糊丸桐子大每十九至二十九空心溫酒送下

沉香桂附丸

治脾胃虛寒藏府積冷七亦引痛

沉香 附子 川烏 乾姜

良姜 官桂 吳茱萸 茴香

好醋煮糊丸桐子大每五十九至七十九米

飲下

十補丸

治小腸寒症

附子 巴戟肉 葫蘆巴 木香

川棟肉 舶上茴香 玄胡索

草澄茄 官桂 破故紙

糯米粉酒打糊為丸桐子大珠砂為衣每五十丸酒下

倉卒散

治外寒內熱

山梔四十枚炮牛過

附子一枚

剉散每服二錢水一盞酒半盞煎七分入鹽一匙溫服

薤白湯

治陰疝疼痛

薤白 附子 梔子

水煎服

升漢方

治內鬱濕熱亦氣厥痛

枳殼 山梔子 山查 吳茱萸

荔枝核

為末長流水調下

又煎方

枳實

桃仁

梳子

吳茱萸

山查

生薑

右入搗盆槽細取順流水一鍾入瓶內煎至微沸帶查服

如濕勝癰疽者加荔枝核

如痛甚者加鹽炒大茴香

如痛處可按者加薄荷許

又方

山梳

山查

枳實

茴香

柴胡

升麻

八角茴香

桃仁

吳茱萸

酒丸藍湯下

又方

治陽明受濕熱傳入太陽發熱惡寒小腹連毛際

間悶痛不可忍

梳子

桃仁

枳實

山查

姜汁水煎服

川苦棟方

理氣之劑

廣木香 茴香

大川椒子

為末溫酒調下

桃仁當歸湯

治瘀血作痛

桃仁 歸尾

生地 赤芍

丹皮

玄胡 吳茱萸

川芎 青皮

水姜煎服

當歸羊肉湯

當歸 生薑

右以水八升煮取三升溫服七合

生薑啜者加陳皮二兩白朮一兩

日三若寒多

馬師津梁八卷

浙江巡撫
孫遜本

國朝馬元儀撰元儀蘇州人是編前有雍正壬子汪
濂夫序稱元儀受學於雲間李士材西昌喻嘉言
士材李中梓之字嘉言喻昌之字二人皆

國初人則元儀著書當在康熙初矣其曰馬師津梁
者蓋元儀門人姜思吾傳其抄本濂夫追題此名
非其本目也所論多原本舊文大抵謹守繩尺不
敢放言高論亦不能有所發明所載諸方或與所
論不甚符如中風一門既知病本內虛不屬外邪
而附方仍多驅風滌痰一切峻利之藥知其亦見
寒醫寒見熱醫熱隨時補救之技非神明其意運
用自如者矣

張氏醫通十六卷

〔清〕張璐撰

中國科學院圖書館藏日本文化元年思得

堂刻本

附《四庫全書總目·張氏醫通

十六卷》提要

序



張氏之所撰。醫通十六卷。
本經逢原四卷。診宗三昧
一卷。傷寒續論二卷。傷寒
緒論二卷。傷寒舌鑑一卷。

醫通

子

思得堂藏

兼證析義一卷。集而大成。
可謂金聲而玉振矣。蓋自
非得得於心。應於手之妙。
孰能占此哉。雖然人心
如面。好尚各異。若指其微

瑕而獲照乘者。世未必無之。如此之人。固不足與論也。張氏玄鑒遠識。朗徹之。本原。心手相應之妙。欲傳諸後世。故至書始設十

醫通

序

思得堂藏

戒。攻。醫。流。腹。心。之。痼。病。中。舉。治。術。之。方。論。終。述。藥。物。之。性。能。精。審。該。備。無。復。餘。蘊。至。其。診。脉。之。教。外。別。傳。與。用。藥。之。不拘泥舊套。即

是其人自得之妙。非筆端之所能盡。所謂書不盡言。言不盡意者乎。凡讀此書者。須著一隻眼。覃思研精。則有所自得矣。玄門要先

醫通

序

思得堂藏

窮人身小天地之理。然後選擇古今妙論奇方。臨機應變。處置得宜。則庶幾乎無誤人命矣。張氏之說。先獲予心者也。其論覈切。試

之實用。多有奏効。故常置
坐右。而便于考索。且為受
業者。資以示矩矱。此予之
所以眷之於此書也。但舛
差之書。古本既難得。新本

則多磨滅。恐永屬湮晦。未
由取正焉。於是再加訂正。
以付于剞劂。後之學者。據
此施治。以起沈疴。以救天
札。則是張氏之所以惠於

天下後世。予亦預有幸焉。

出羽 前田安室撰



醫書通者。長洲張君路玉所撰。古之言醫者。或論病體。或論藥性。或論治法。各有所主。又其爲說。諸家各殊。互相辯擊。雖歷代所稱名家聖手。恒不能一也。至於近世不學之徒。恒思著述。以

醫通

序

一 思得堂藏

眩一時欺後世。醫書愈多。醫學愈晦矣。君於是考之古。驗之今。凡古人不能相一者。皆薈萃折衷之。使讀者犁然有會於中。可謂用心切而爲力勤也。君之書既行於世十餘年矣。歲在乙酉。

天子南巡。至吳君家。以其書獻。深當

上意。尋

命醫院校勘。置之

南薰殿。君雖沒。而書之流布日

遠。述國史藝文志者。庶列之名

醫通

序

二 思得堂藏

家聖手之間乎。昔余先少保實以醫起家。太醫院使。而太傅文恪公始大其門。醫故吾家故業也。先少保撰立命元圭一編。兵後遺失。序君之書。於是乎有感。康熙四十八年春王正月。南書

房舊史官。秀水朱彝尊序



醫通

序

三

思得堂藏

醫通序

醫何昉乎。古之聖人如神農黃帝。首先創制。爲功萬世下。逮三代秦漢唐宋金元。莫不代有名醫照耀紀載。周禮一書。周公所以治天下者。無一事之不備。至於醫師。特令士爲之。不輕命人。以是知百家技藝。皆聖人之所創立。民生之不可一日無者。而醫尤甚。其參贊化育之功。幾欲中分吾儒之權。蓋本以精於藝。而因以達於德。所謂由委而遡源也。昔孔子有味南人之言。而嘆醫之不可無恆也。夫此心惺惺常存。無時不然。無時不恆矣。雖然雷風天下之至變。聖人以之象恆者何故。蓋萬古此雷風。卽萬古此恆。觀恆者自萬古觀。非自一

醫通

序

一

思得堂藏

日觀聖人之久於道也。豈其膠固而靡所變通哉。神而化之。使民宜之。此聖人之恆也。噫。知此斯知醫矣。丹溪不云乎。古方新病。安有能相值者。泥是且殺人。余謂醫之有譜。猶奕之有譜。師心者廢譜。拘方者泥譜。其失則均。假令劉張李朱同處一堂之上。其論不能皆合。其方不無小異。要其有

序

思得堂藏

濟於人則一也。家昆路玉氏。崑之望族。故明廉憲少峯公之孫。光祿烈愍公嫡姪。賦性磊落。不事章句。勵志岐黃。遂擅一時。六十年來。專心性命之學。不可謂之無恆矣。歷年博採古人方論。汰粗存精。歛繁歸約。不忍獨秘。梓而行之。將以教天下者。教萬世焉。世之師心者。讀是書可以不煩思索。

而坐得其標本緩急之理。世之拘方者。讀是書。且將樂乎其新。忘乎其故。漸漬其中。而不自覺也。豈不爲有功於後學與。昔應劭采典藝以正風俗之非。今家昆體經論以正通俗之異。非謂道在是。而通俗可正也。言久於其道。而天下化成也。醫之道在乎達權通變。變通之象。恆顯見於雷風。吾

序

思得堂藏

故以是昉之。通之之義。得無有取於是耶。康熙癸酉端午後三日。晉江弟汝瑚拜書。

叙

嘗讀周禮。疾醫掌萬民之疾。以五穀五藥養其病。以五色五氣五聲視其生死。而之以九竅之變。參之以五藏之動。而識醫之職。隸

叙

思得堂藏

諸天官。故其學于是乎端。後世國無耑職。家無耑學。岐伯巫彭之教。久失其真。其書雖傳。皆為後人附托。惟漢張仲景傷寒論一書。為千百年不祧之祖。特其

叙

思得堂藏

章句篇帙。不無散紊。自王氏成氏相起。而漫次其文。曰文作註。其間顛倒傳會。而仲景之意一晦。迨奉議作活人書。雖微編百證歌。糗糲櫟括。而仲景之意耳晦。即全生蘊要準繩等書。學者咸奉為指南。究未能推衍其奧。而仲景之意終晦于天下。近吾友喻嘉言氏。慨衆喙之支離。憫正傳之榛蕪。取方中行條辨重

加辨釋作為尚論。庶幾仲景之意較著列眉。始幸晦者之不終晦也。甲辰秋余年家。張子路玉過婁東。携所著續緒二論示余。大要本仲景之書。別為次第。合

叙

三

思得堂藏

古今百家之言。精嚴採擇。出其心裁。辨以證治。非獨章句篇帙之有倫。而仲景千百年終晦之意。益彰明較著。無毫髮遺憾矣。余初讀之。躍然喜。輾轉讀之。忽

戚然而悲。悲嘉言遽歿。不得一見其書。而與張子上下其論。相說以解也。昔許胤宗善醫。或勸其著書。胤宗曰。醫者意也。吾意所解。口不能宣也。今張子以三

叙

四


思得堂藏

十年之學力。著書數十萬言。雖曠世而相感。殆如岐伯巫彭群聚有態之庭。共開濟世生民之統。而豈周官疾醫之端守一職也耶。張子將付剞劂。嘉惠後學。

余漫書數言。弁其首。

康熙乙巳春五婁東年家

弟胡周鼎題



思得堂藏

醫通自序

齊一變至於魯。魯一變至於道。道之興廢。靡不由風俗之變通。非達道人。不能達權通變。以挽風俗之隳弊也。今夫醫道之變。至再至三。豈特一而已哉。余生萬曆丁巳。於時風俗雖漓。古道未泯。業是道者。各擅專科。未嘗混廁而治也。甲申世變。黎庶奔

醫通

序

思得堂藏

亡。流離困苦。中病不擇醫。醫隨應請。道之一變自此而始。當是時也。笑笑子遺。託跡靈威丈人之故墟。賴有醫藥種樹之書。消磨歲月。因循十有餘載。身同匏繫。聊以著書自娛。歲已亥賦歸故園。篋中輯得方書一通。因名醫歸。大都脗合準繩。其間彙集往古傳習諸篇。多有不能暢發其義者。次

第以近代名言易之。草創甫成。同人速予授梓。自揣多所未愜。難以示人。僅以傷寒續緒二論先行問世。頗蒙宇內領之。壬寅已來。儒林上達每多降志於醫。醫林好尚之士。日漸聲氣交通。便得名譟一時。於是醫風大振。比戶皆醫。此道之再變也。嗟予固陋。不能與世推移。應機接物。而外時與

醫通

序

二

思得堂藏

先聖晤對一堂。無異手提面命。遞年已來。顏禿半牀。稿凡十易。惜乎數奇不偶。曩因趨赴孝伯耿公之招。攜至雪川公署。失去目科一門。先是內姪顧惠吉。持去痘疹一冊。久假不歸。竟成烏有。知機不偶。已將殘編置之高閣。無復行世之心矣。近聞懸壺之士。與垂簾之侶。互參恆德之術。聖門之

教無違。炎黃之德不顯。道之三變匪特自今。吾於志學之年。留心是道。迄今桑榆入望。歷世頗多。每思物壯則老。時盛必衰。欲挽風俗之隕弊。寧辭筆削之罪。知因是。仍將宿昔所述之言。從頭檢點。爰命倬兒補輯目科治例。柔兒參入痘疹心傳。足成全編。易以通名。標諸籤額。書未竟。適逢客至。

醫通

序

三

思得堂藏

隨手開函而語予曰。在昔韓氏醫通名世已久。今子亦以是名。得無名實相混之慮乎。予謂不然。吾聞元氏集名長慶。白氏之集亦名長慶。二集並驅。後世未嘗因名混實。奚必拘拘於是耶。客莞爾而退。遂以醫通定名。迨夫三變之術。法外之法。非可言語形容也。

康熙乙亥季夏石頑張璐時年七十有九

醫通

序

四

思得堂藏

醫通卷之一

序

一

思得堂藏

凡人之生根本極合陰陽。錯綜五行。十十二支之用。窮通強弱。死生壽夭。萬有千變。不可數紀。有聖人焉。爲之醫藥。以調其血氣。而和其性。不致疾病災厲。以耗其天年。其德與天地參。要非通乎闕闕晝夜寒暑。富貴貧賤出入。喜怒哀樂之節。沉潛貫徹。伺生殺之機於呼吸。而默爲轉移。不能行其仁術也。史所稱扁鵲淳于意。華佗之屬。診治奇妙。要皆辨色察脉。隨事觸物。肌理骨髓。動中數縈。不拘一方。不執一說。惟其旁通而已矣。先伯父石頑先生。少而穎悟。博貫儒業。棄絕科舉。息居名山。專心醫藥之書。自黃岐訖近代方法。無不搜覽。金石鳥獸草木。一切必辨其宜。豈思忘言。終日不寢食。求析其終始。及其得心應手。起如發機。可以旋坤乾而効仁。和診一病。投一藥。參酌古今。斷以己意。靡不奇驗。居輒藉記。年既老。或而刻之。名曰醫通。大受伏讀。深惟知其功深效多。而非小道以爲泥也。聖人治天下。內聖主璧。弁冕車府。弓矢刀劍。皆有所利用。偏而不當。其禍忽焉。醫者陳百藥。將以生人。而取舍損益。先後毫釐。俄頃機若轉圜。譬如操舟行江河。遇風濤。聞頭振舵。存亡眉睫之間。變而通之。其神也哉。其聖也已。古人之方宜。編習而有時。旁參反觀。以制用也。萬物之味。由天成。而有時。生剋互用。水火間行。其利溥也。一身之病。而朝暮變易。不可拘也。兩人病同。而肥瘠躁緩。乘其形性。乃有濟也。或急攻之。則時除。而或勿藥亦愈也。或信宿而瘳。或經久服之有益也。遠或千里。重以千金。必致其物以救也。或一草木之滋。而骨自遂。也。天生人。不能無疾病。投其權於醫藥。自非察於形色之表。灼知三才萬物之情。其何以施舉手。

之力。扶其危。拯其顛。仆各熙熙。於出作入息之間。德與天地參。而恩與父母均乎。去疾如剋敵。骨壘旗幟。戈矛火石。無不整暇。尙敵之隙。而乘之。鼓聲所向。輒如冰消。運川之妙。一心主之。泥其成法。鮮有不敗。奉是書者。以口誦。以指畫。以神解。通其通。是爲能通醫。豈小道也哉。

康熙三十八年歲次己卯仲冬月朔姪大受百拜序

思得堂藏

進醫通疏

江南蘇州府長洲縣監生。臣張以柔。謹

奏爲恭進。臣父遺書事。伏見

皇上文教覃敷。

六龍南幸。山陬海濱之人。所獻家藏書籍。蓋蒙

宸鑒。臣故父。臣服。自幼讀書。旁通醫術。年逾八十。纂述成

書。所有醫通一十六卷。本經逢原四卷。診宗三昧一卷。

續論緒論四卷。俱經刊版行世。伏念

聖朝采訪遺書。自天文地理。下逮百家雜伎。無不悉備。臣父

著書四種。殫精竭力。久而獲成。幸遇

皇仁廣育。壽域同登。臣以素拜舞道旁。恭

呈

醫通

疏

思得堂藏

聖覽乞

勅史館采擇。或行醫院重勘。臣父子銜

恩錢骨。臣無任激切之至

康熙四十四年四月 日進

呈奉

旨。交與御前儒醫張殿查看。於四十七年閏三月二十六日。

具摺覆

奏云。此書各卷。全是原于內經。可比證治準繩。奉

旨。是即發裕德堂。另爲裝釘。備覽欽此。

張氏醫通參閱姓字

童又唯 淮安
李瑀臣 杭州
董載臣 石門
胡晨數 徽州
黃德侯 徽州
程心沼 京口
麗友嚴 吳江
趙子聲 同川
鄭月山
鞠御侯
邵三山
蔣公坦 高郵
徐上扶 杭州
吳世臣 京口
程右文 徽州
李修之 上海
丁大年 吳江
孫來年 同川
吳殿英 上元
陳三農
俞廷玖
沈玉機

醫通

姓字

思得堂藏

尤生洲
周渭文
鄭仁山
吳雨公
汪琴友
吳允成
俞紳公
汪續功
潘爾因
吳口調
鄭學山
張倫高
吳亦先
周令聞
馬元儀
汪泰初
吳息圃
黃永澄
吳修能
侯文璧
盛景坦
范毓春
楊喬成
王德士

李次九
從學

郭友三
鄒恆友
黃采芝
黃二乾
袁觀宸
丁振公 門人
王禹九 門人

伍公詒

施元備
鄒鶴坡
王舜年
汪楚文
朱丹臣
丁緒原 門人

醫通

姓字

二

思得堂藏

石頭老人醫門十戒

軒轅氏以治兵之餘治病於是醫字下筆從醫。國語之兵不解醫本此中藏失矣。內攻藏用之疾與用兵不異。其下從西。迺古酒字。從古服藥多以酒助也。後世不解從西之故。易之曰巫。緣十三科中原有祝由之說。所以鄉村之病。輒從事於禱。即或不靈。可無毒藥傷生之咎。因推醫字之義。及述醫戒數端。敢祈同志。逐一投諸。

薰病時習戒

館師無坐板氣。地師無流藝氣。禪師無杖拂氣。煉師無丹汞氣。醫師無方術氣。方是白描畫手。本分師家。但負青囊之術者。非廣通聲氣。無以邀舉世之重名。非交通吏胥。無以履當事之戶庭。非心通口者。無以占利藪之要津。非門通車馬。無

醫通

醫戒

思得堂藏

以致里巷之服膺。非堂通旌額。無以表品望之日新。苟非五通神應。不足以越行道之捷徑也。惟端直自矢之士。不能適俗。隨宜聽諸自然而已。

恃才妄作戒

崇古存心醫道者。非聖賢士師。即神仙高隱。未嘗一一垂之國史。太史公特取扁鵲倉公。錄之列傳。非無深意存焉。因思扁鵲術隨時尚。以伎見矜。倉公匿跡自隱。以怨受侮。斯非恃才妄作之過歟。况無扁倉之才。而自負非常。得無前車之鑒乎。

任性偏執戒

人之病病於輕藥。醫之病病於偏執。良由世人不悟未達不放嘗之旨。而不安於命者多矣。夫醫之任在乎補偏救弊。而

專取偏性之藥以治偏旺之氣。而時下各執一己之見。亦謂火信手安施。是則偏之為害。而道之所以不齊也。且願大地羣生。確守有為。不洽當得中醫之戒。雖偏執之醫。何所施其伎倆哉。

同流合污戒

醫貴流俗而惡執者。其得心應手之機。用與手談無異。故精於奕者。稱為國手。而醫亦有國手之稱也。奕具戰守之道。一子之得失。全局攸關。醫乘安危之機。一藥之亂投。救活所係。雖曰親時輩。自務以為難羣之鶴者。猶夫奕師之隨方應。緘其口。而心手日早索索無深思。昏昏有俗情。亦何取於其而甘隨碌碌耶。

因名悞實戒

醫師臨病必先定名。而後議治。庶無自欺欺人之弊。今之方家。一見發熱。便以傷寒目之。一藥禁其飲食。而與通套發散消導之藥。曷知傷寒之有礙於食者。惟寒傷營。營衛俱傷。二證其風傷衛中。絕無禁食之例。反有暖熱稀粥以助藥力之說。而寒傷營之尺中微遲。不勝噴汗者。假取膠飴稼穡之甘。入於桂枝湯內。小建其中。而和其外。此即熱稀粥之變法。迺太陽病下手工夫。正傷寒分經辨治之的旨。嚴冬亦不多見。近來諸家。泛指難病為四時傷寒。不辨伏氣時氣。混以風寒。投之是洪爐之鼓。以寒箴也。况乎內傷兼挾虛風。津氣多由汗奪。不得藥粥入胃。將何收攝虛陽。且有客邪收藥成邪。例行清肺止血。不至劫盡虛陽。悉從火化。不已。醫之誤人。莫此為甚。收不力。陳以破山之迷。而不悟者。

師事異端戒

邪說流行。端人所恥。然文人筆機所至。時或及之。嘗觀藝林所載。幻術醫類居多。如視音盲而知疾。不可為。飲上池而見五藏。癢結。縱涉誕妄。無非播揚若人術業之神。非若縛為入以療鬼。懸壺示術以惑人。種種狐媚。雖家味之流。莫不知其為詭也。況有冬月檢衣而受暑氣之說。無乃惑入太甚乎。暑本無形之氣。既能伏藏衣篋。經冬不散。服之禦寒。不必復被重裘矣。而好竊唾餘者。每常效尤。以為默契古人心印。適足為明道者捧腹耳。

貴賤混治戒

醫有膏梁黎霍之不同。原其傳派多門。趨尚不類。難與並為優劣。擅膏梁之術者。專一附挂名世。得黎霍之情者。無非枳

醫成

思得堂藏

橘兄長。第膏梁之治多難愈。以其養榮柔脆。痰涎膠固。手上精神凋喪。手下即有客邪。非參無以助諸藥之力。黎霍之患都易除。以其具體堅韌。表邪可以恣發。裏邪可以峻攻。縱有勞傷。一木足以資百補之功。設貴介而延未達之醫。醫氣先饒。貧薄而邀貴遊之治。治必轉危。總由平昔習氣使然。諒不能曲突徙薪以圖僥倖也。

貪富易心戒

常思趙人六不治中。有輕身重財一說。此病者自忽其軀耳。吾何為不治哉。夫人之鄙衛天性也。若以其鄙衛而損棄之。則貧賤之疾。痛緊可置之不問耶。司軒岐之業者。既以利濟為任。豈且貨利為心。即食力之輩。孰敢雖微。然須念其措置之艱。當為極力圖治。切不可因其非而不納之。是拒其後來

之念也。惟素封之家。故示非禮。可不為之自慎歟。

乘危苟取戒

苟取已屬非義。乘危尤為禍。縱具補天浴日之功。一有此疵。則併其善而為不善矣。每見事非意料。莫不由此。以其信口隨手。非功即過也。然功之所在。取亦無傷。取之而病者。悅則取之。取之而病者。不悅。則勿取。取與勿取。固有定分。而乘機苟且。恐非仁人所宜。即使千箱盈積。一旦非常。後世能守其業而振其衰者。未之聞也。以是古諺有名醫無後之說。信夫。

詆毀同道戒

遊於藝者。咸賴聲氣之交通。停於道者。尤為醫林之切務。有互資相長之功。切磨相向之益。但今之道中。多放利而行。是

醫通卷之一

醫戒

思得堂藏

不得不假借吹噓之力。蓋錄官室之疾。未必專任一醫。多有諸治罔効。下及其餘。然須察其勢不可為者。緩言以辭之。其生氣未艾。可與挽回者。慎勿先看從前之方。議其所用之藥。未免妨此。礙彼。反多一番顧慮之心矣。當此危疑之際。切須明喻死中求活之理。庶幾前後諸醫。各無怨尤。且有彙集諸方。議治。且隨眾處方。不可特出己見。而為擔當。苟非惑其貪餌。得脫且脫。世未有日歷數醫。而可保全者。於是無稽之口。隨處交傳。同人相向。往往論及。雖曰出之無心。安得謂之無過。多言多敗。金人首戒。慎之慎之。

凡例六則

一醫學自軒岐仲景一脈相承而近世名家視素問爲迂遠不切。傷寒論謂古法不可以治今病。至於靈樞金匱并其書而未聞也是編首列靈素病機次則金匱治例以冠諸論。第文辭質奧非庸淺輩可知故詳加釋義以明其旨。獨不及傷寒論者以傷寒續緒二論先梓行世故也。

一藝術之學惟醫林最繁。汗牛充棟莫可名喻。然靈素金匱而外求其理明辭暢如王安道趙嗣真趙養葵張景岳喻嘉言者指不多屈。即歷代名醫造藝各有所長文理不能兼善。故選擇方論如披沙揀金。況多支辭複義彼此互引不得不稍爲筆削其文氣有不續處畧加片語以貫之辭義有不達處聊易數字以暢之一切晦滯難明者雖出名

醫通

凡例

一 思得堂藏

賢藥置不錄

一各證治例類次系諸論之後皆從古相承未能逐一辨其出自某某有例雖明確而治未允當者或經治驗或加體會易以對證方藥非故爲舉措變亂成則也然亦不遇如匠氏之繩墨又必臨病審察隨其所稟之偏勝形志之苦樂而爲處方所以一例後有主二三方者如金匱例云短氣有微飲當從小便去之苓桂朮甘湯主之腎氣丸亦主之病溢飲者當發其汗大青龍湯主之小青龍湯亦主之小便不利蒲灰散主之滑石白魚散茯苓戎鹽湯並主之所謂醫不執方合宜而用者其斯之謂歟

一古今治按如儒者之歷科程文而諸家所輯方書都未之及且從今立言止就一端而論入之所爲都兼并不一非

詳究古人治驗不能識治法之奧故於諸按中擇其可以爲法者附列論例之末非若類按之泛引釋官野史以混耳目

論中所用諸方祖方各歸其源專方各隸本門更有不專一門不歸一源之方曾採用於前者已後但著見於某門不復疊載祖方則循序貫列令知某湯中加某藥即爲某方治某病究其出入增減之意便獲古人用藥心法蓋臨病製方原非作意師古即如善於奕者下手輒成譜勢與醫者之投劑不殊然古方中有極峻厲極迅烈難於輕試者有順逆反正配合寒熱補瀉互用深奧難明其理者有故用相反之性激其成功者有奇兵暫用隨手轉關者各於方後發明其義則極峻厲極奇奧諸方皆爲常勝之師

醫通卷之一

凡例

二

思得堂藏

庶學者胸中不膠執古方不可治今病之說斯不愧乎大方洵非專守藥性用藥者可同日而語也間有古方因病雜合而製難於取法者稍爲更易以合本條治例方下標名改定不敢混廁以混先哲也

一編證類次第悉如準繩而所輯方論更迭出入肇是甲申迄今癸酉歲逾五甲稿凡十易勒成二十六卷而所選不欲太繁繁則邱書燕說讀者愈滋其惑又不能太簡簡則井蛙麗鼠臨證罔知所措務在廣搜歷覽由博反約千古名賢至論統叙一堂八方風氣之疾彙通一脈俾後世修性命之學者昭然共由而趨世舊名者歧路攸分請毋事此

張氏醫通引用書目

靈樞經
黃帝素問
難經
古今錄驗方
近效方
金匱要略
王氏脈經
肘後方
徐之才方
陶氏本草經義
全氏內經訓解
千金翼
千金方
日華本草經方
巢氏病源
深師方
甲乙經
中藏經
傷寒論
崔氏方
倉公醫按
尹伊湯液
靈樞經

醫通

引用書目

思得堂藏

王太僕內經註
瘟疫論
錢氏小兒方論
朱奉議活人書
許弘內臺方
和劑局方
孫兆口訣
仁齋直指
問人規痘疹論
明理論
潔古家珍
雲岐家秘
儒門事親
外臺秘要
聖惠方
許叔微本事方
聖濟總錄
劉河間六書
易簡方
三因方論
陳氏小兒方論
東垣十書
潔古要畧
雲岐家秘
儒門事親

衛生寶鑑

格致餘論

脈因正治

黃安道讀宣明論說

丹溪或問

原機啟微

戴起宗脈訣刊誤

醫學會編

滑伯仁內經註

診家樞要

金匱勾玄

劉宗厚玉機微義

丹溪心法

局方發揮

脈訣指掌

趙以德金匱衍義

倪維德龍木論

銀海精微

醫宗統旨

邵元偉醫學綱目

難經本義

戴元禮證治要訣

盛啟東醫林黃治

趙氏醫貫

醫通

引用書目

思得堂藏

孫一奎赤水玄珠
薛氏十六種
醫方考
明醫二註
李瀕湖本草綱目
廣筆記
方約之心法附餘
痘治理辨
朱濟川傳心錄
痘疹青囊
痘疹心法
痘疹玉髓
馬玄臺素問註
吳錫皋素問註
王節齋明醫雜註
王肯堂證治準繩
繆仲淳本草經疏
虞天民醫學正傳
汪石山醫按
魏桂岩博愛心鑑
翁仲仁金匱錄
痘疹玄機
痘疹心要
黃五芝痘疹正傳

唐恕齋原病集

張介賓類經

景岳全書

八陣圖

雲笈七箋

修行人集經

鄭虛庵萬金方

明醫類按

董養晦五法

吳又可溫疫論

張三錫醫學六要

陳實功外科正宗

周慎齋三書

慎齋五書

喻嘉言醫門法律

寓意草

仲景脈法解

李士材願生微論

醫宗必讀

病機沙象

診家正眼

士材醫按

施笠澤祖劑

梁仁甫國醫宗旨

醫通

引用書目

二

思得堂藏

劉默生治驗

周季芝女科方論

沈則仲醫按

盧不遠醫種

盧子由疏鈔金鉞

張隱庵金匱註

程雲來金匱直解

陸麗京醫林新論

李珥臣金匱註

王東皋握靈本草

李修之證治彙補

周禹載金匱三註

張氏醫通目錄

卷之一

中門

與中風類中集入

卷之二

諸傷門

傷寒

淫瀝熱

火

勞倦

卷之三

寒熱門

發熱

潮熱

振寒

寒熱

瘧

諸氣門上

氣

痞滿

水腫

積聚

卷之四

諸氣門下

熱

惡寒 背惡寒

戰慄

厥

鬱

腹滿

鼓脹

暑

燥

傷飲食

虛損

醫通

目錄

一

思得堂藏

大

卷之八

七竅門上

目疾統論

點服藥說

金鍼開內障論

小便不通開淋

小便不禁遺溺

遺精

前陰諸疾陰結 陰痿 陰中瘻 陰疝

疝

腸鳴

兌工農雜書

淋

小便黃赤

赤濁白濁白濁 赤濁

交腸

腸癰

開導說

鉤割鍼烙說

造金鍼法

目痛

目青

目癢

內障

瞳神緊小

目昏

青盲

真精膏損

神水將枯

神珠將反

青黃凸出

倒睫拳毛

目赤

目腫脹

外障

瞳神散大

瞳神散側

暴盲

雀盲

膏傷珠脂

靴襠轉關

瞳神反背

珠中氣動

脾急緊小

卷之九

七竅門下

時復證

因毒證

痘疹餘毒證

妊娠日病

傷寒愈後之病

目閉不開

不能遠視

漏睛

原滑爛眼

目瘡斑

目淚不止

五疳證

不能近視

目妄見

目為物所傷

經逆赤腫

產後目病

因風證

因他證

耳耳鳴

耳聾

鼻鼻衄

口口

舌舌

咽喉更

瘡瘍門

癰疽

潰瘍

作嘔不止

肌肉不生

大便不通

耳耳鳴

耳聾

鼻鼻衄

口口

舌舌

咽喉更

瘡瘍門

癰疽

潰瘍

作嘔不止

肌肉不生

大便不通

耳耳鳴

耳聾

鼻鼻衄

口口

舌舌

咽喉更

瘡瘍門

癰疽

潰瘍

作嘔不止

肌肉不生

大便不通

耳耳鳴

耳聾

鼻鼻衄

口口

舌舌

咽喉更

瘡瘍門

癰疽

潰瘍

作嘔不止

肌肉不生

大便不通

思得堂藏

卷十一

收

婦人門下

產後

血暈

三急

嘔吐

飽悶

如見鬼神

發瘧

寒熱

欬嗽

諸禁

三衝

三審

呃逆

譫語

不語

發熱

中風

發喘

瘦瘠

傷風

瘧

瘵勞

驚悸

麻木

諸痛

浮腫

血崩

諸淋

瘡瘍

結核

顫振

傷寒

痢

虛煩

多汗

大小便諸證

泄瀉

諸血

月水不通

乳汁

瘰癧

流注

乳癰乳巖

嬰兒門上

脈法

五藏虛實寒熱

胎證

紫風撮口臍風

弄舌

胎驚

唇口蠕動

癰痢

目動咬牙

偏風口禁

陰瘡

面目證

變蒸

胎毒

急欲乳

遊風猴疳

目睛翳動

發搐

睡中驚動

搖頭便血

角弓反張

急驚

天鈞內釣

傷風

傷寒夾驚夾食

喘

驚病

痢

便血

小便不通

疳

食積

煩渴

慢驚

盤腸氣痛

諸經發熱潮熱

欬嗽

吐瀉

瘡

脫肛

大便不通

遺尿

二便色白

腹痛股脹

汗

醫通

目錄

九

思得堂藏

卷十二

嬰兒門下

錢氏痘疹論

薛立齋痘疹大要

丹溪參補陳氏痘疹論
魏桂岩逆順險三法論

目錄

十

思得堂藏

黃痺

疳

耳

解頤

虛羸

失音

夜啼驚啼

循衣撮空

瘡

目

鼻塞鼻衄

龜胸背

五遲五硬五軟

咬牙

喜笑不休

壽夭

翁仲仁痘疹論

辨證六則

氣血虛實論

虛證變實論

實證似虛論

毒盛變虛論

汗下論

死而復蘇

發熱

部位

起服

收醫

痘疹握機論

表裏虛實論

虛證防變論

虛證似實論

熱證變虛論

氣虛血熱毒盛治例

所感輕重論

原委

見點

形色

灌漿

脫痂

目錄

十一

思得堂藏

陷伏

夾斑

炊赤

飲食

腹痛

腰痛

大便秘

痢

欬喘

咽喉

失音

發泡

倒靨

板黃

斑爛

吐瀉

腹脹

二便秘瀉

溺瀉

驚搐

涕唾

哈水

寒顫咬牙

發瘡

發渴

昏沉

失血

頭面

手足

眼目

婦人

異痘

諸證

禁忌

例治四十則

用藥

煩躁

汗出

身痛

正額

唇舌

餘毒

痘形

逆證

看法

麻疹總論

水痘

附種痘法

卷十三

中風門方

侯氏黑散

千金三黃湯

地黃飲子

牛黃清心丸

至寶丹

稀涎散

參歸三聖散

解語湯

甄權防風湯

升麻胃風湯

風引湯

千金竹瀝飲子

天麻丸

清心牛黃丸

蘇合香丸

舒筋三聖散

正舌散

祛風定志湯

慧政仁湯

犀角升麻湯

醫通

目錄

主

思得堂藏

烏藥順氣散

傷寒門方

香蘇散

參蘇飲

大陷胸丸

小陷胸湯

加減葱白香豉湯

犀角地黃湯

黃連阿膠湯

人中黃散

暑門方

金匱一物瓜蒂湯

解風散

芎蘇散

十神湯

大陷胸湯

葱白香豉湯

藏麩湯

豬膚湯

葛根黃芩黃連湯

導赤瀉心湯

消暑十全散

局方香薷飲

導赤散

六和湯

淫門方

羌活勝濕湯

神木湯

茵陳蒿湯

當歸拈痛湯

燥門方

千金五味子湯

千金地黃煎

通幽湯

黃連香薷飲

十味香薷飲

除風溼羌活湯

升陽除溼防風湯

清熱滲溼湯

千金麥門冬湯

生地黃煎

潤燥湯

清涼飲

麻仁丸

豬膽導

火門方

紫雪

千金朴硝煎

傷飲食門方

枳實導滯湯

保和丸

葛化解醒湯

塌氣丸

酒癰丸

四順清涼飲

潤腸丸

蜜煎導

碧雪

木香化滯湯

紅丸子

麴蘖丸

神保丸

醫通

目錄

主

思得堂藏

傷勞倦門方

殊砂安神丸

虛損門方

薯蕷丸

大黃廬蟲丸

瓊玉膏

濟生鹿茸丸

四烏鯢骨一鹿茸丸

十灰散

童真丸

聚精丸

吳順丸

酸棗湯

百勞丸

四味鹿茸丸

安腎丸

花藥石散

瑞金丹

龜鹿二仙膏

大補黃庭丸

烏骨雞丸

醫通

目錄

古

思得堂藏

逍遙散

芎歸血餘散

傳尸丸

瘧門方

金匱蜀漆散

何首烏散

常山飲

瘧母丸

氣門方

烏沉湯

木香調氣散

六磨湯

加味逍遙散

龍甲生犀散

達原飲

七寶飲

龍甲煎丸

沉香降氣散

四磨湯

沉香化氣丸

鬱門方

越鞠丸

痞滿門方

五膈寬中散

增損流氣飲

腹滿門方

中滿分消湯

附子粳米湯

水腫門方

疏鑿飲

沉香琥珀丸

實脾散

丁沉透膈湯

寶鑑木香檳榔丸

中滿分消丸

千金溫胃湯

禹功散

三白散

復元丹

醫通

目錄

古

思得堂藏

五皮散

椒仁丸

人參丸

鼓脹門方

雞矢醴

散血消脹湯

積聚門方

金匱奔豚湯

喬氏陰陽攻積丸

木香通氣散

和血通經湯

阿魏麝香散

五子五皮湯

葶蘆丸

啓峻湯

琥珀人參丸

赤丸

千金者嬰萬病丸

四味阿魏丸

見胆丸

三因化氣散

阿魏膏	馳繞丸
阿魏化痞散	
痰飲門方	
甘遂半夏湯	木防已湯
木防已去石脂加茯苓芒硝湯	已椒瀝黃丸
葶藶大棗瀉肺湯	青礞石丸
倍末丸	沉香化痰丸
滾痰丸	消痰餅子
運痰丸	瓜蒂散
欬嗽門方	
桂苓五味甘草湯	桂苓五苓甘草去桂加薑辛
湯	射干麻黃湯
厚朴麻黃湯	澤漆湯
麥門冬湯	金沸草散
消風散	瀉白散
葶藶散	千金補肺湯
紫菀草湯 咳定	紫菀散
紫菀膏	
肺痿肺脹門方	
千金溫中生薑湯	千金生薑甘草湯
人參蛤蚧散	
肺癰門方	
皂莢丸	千金葶藶湯

痞門方	千金酥蜜膏
千金酥蜜膏	
喘門方	
麻黃杏仁湯	麻黃定喘湯
局方人參定喘湯	
哮喘門方	
鍾乳丸	冷哮丸
三建膏	
噎膈門方	
開關利膈丸	五噎丸
五膈丸	旋復代赭石湯
反胃門方	
藿香安胃散	
嘔吐噦門方	
金匱甘草粉蜜湯	吳茱萸湯
千金通草橘皮湯	千金麥門冬理中湯
澤瀉湯	人參湯
安眠散	
關格門方	
人參散	柏子仁湯
既濟丸	
呃逆門方	
丁香煮散	
胃脘癰門方	

卷十四

射干湯

太乙膏

請見血門方

柏葉湯

黃土湯

赤小豆當歸散

衄血門方

止衄散

小烏沉湯

黑神散

千金當歸湯

小安腎丸

清胃散

加味清胃散

吐血門方

柴胡疎肝散

渡血門方

神砂妙香散

下血門方

瀉青丸

藏連丸

升陽除溼和血湯

斷紅丸

畜血門方

香殼散

復元通氣散

復元活血湯

當歸活血湯

滑血丸

頭痛門方

茸珠丹

羌活附子湯

選奇湯

川芎茶調散

醫通

目錄

大

思得堂藏

山牛湯

半夏蒼木湯

消空膏

芎辛湯

三因芍藥湯

大追風散

千金大三五七散

頭風摩散

半夏白朮天麻湯

寶鑑石膏散

透頂散

草薢貼法

一字散

一滴金

火筒散

清震湯

心痛胃脘痛門方

金匱九痛丸

金鈴子散

煮黃丸

水煎金花丸

千金高良薑湯

崔氏烏頭丸

清中蠲痛湯

清中湯

手拈散

胸痺門方

枳實薤白白酒湯

枳實薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

茯苓杏仁甘草湯

薤白枳實生薑湯

薤白附子散

桂枝生薑枳實湯

烏頭赤石脂丸

千金細辛散

前胡湯

下氣湯

熨背法

腹痛門方

調肝散

腸痛門方

醫通

目錄

九

思得堂藏

龍膽瀉肝湯	推氣散
腰痛門方	摩腰膏
燒羊腎	虎骨散
脊痛脊強門方	椒附丸
臂痛門方	蠲痺湯
腿痛門方	虎骨四筋丸
川芎肉桂湯	鹿茸四筋丸
膝痛門方	附子丸
錢彈丸	史國公藥酒
身體痛門方	麻黃復煎湯
痺門方	金匱烏頭湯
除淫瀉痛湯	千金犀角散
羚羊角散	吳茱萸散
千金附子湯	摩風膏
通痺散	人參丸
腎源湯	活絡丹
換骨丹	

伏苓丸	巴戟丸
巴戟天湯	痿門方
金剛丸 改定	百合門方
百合知母湯	百合雞子湯
百合洗方	百合滑石散
脚氣門方	千金竹瀝湯
千金風引湯	千金八風散
千金犀角旋復花湯	酒浸牛膝丸
千金烏頭湯	沉香導氣湯
犀角散	癰風門方
樺皮散	醉仙散
九龍丸	蒼朮丸
鵝翎散	萬靈丹
補血榮筋丸	滑石代赭湯
百合地黃湯	枯葉牡蠣散
千金麻黃湯	千金半夏湯
千金獨活湯	木通散
千金半夏湯	千金草麻葉暴法
檀榔湯	再造散
必勝散	漆黃丸
白花蛇丸	蜈蚣散
蠅蚘散	萬靈散

<p>局方續斷丸 眩暈門方 秘旨正元散 癲門方 定志丸 半夏茯神散 狂門方 生鐵落飲 戴人三聖散 勝金丹 煩躁門方 葶藶苦酒湯</p>	<p>醫通 目錄 三 思得堂藏</p>	<p>破傷風門方 九味羌活湯 大芎黃湯 護心散 跌撲門方 千金桃仁湯 常歸導氣散 乳香定痛散 顫振門方 平補正心丹 攀門方 黃耆丸 芎黃湯 左龍丸 葱熨法 調營活絡飲 自然銅散 紫金丹 龍齒清寬散 木瓜散</p>
---	---------------------------------	--

<p>四柱飲 二神丸 痢門方 桃花湯 紫參湯 養藏湯 千金羊脂煎 白頭翁加甘草阿膠湯 千金桃花圓 千金厚朴湯 三奇散 外臺黃芩湯</p>	<p>新丸 目錄 三 思得堂藏</p>	<p>虛煩門方 千金竹葉湯 悲門方 金匱甘麥大棗湯 驚門方 銅活湯 遠志丸 悸門方 金匱半夏麻黃圓 養生門方 靈飛散 泄瀉門方 麋角丸 珍珠母丸 補膽防風湯 千金茯神湯</p>
--	---------------------------------	--

伏龍肝湯丸

貴連犀角散

淋門方

括遺瞿麥丸

加味葵子茯苓散

生附子散

參苓琥珀散

小便不禁門方

固脬丸

加減桑螺蛸散

縮泉丸

草薢分清飲

遺精門方

豬苓丸

威喜丸

還少丹

金鎖玉關丸

九龍丹

經進萃仙丸

前陰諸疾門方

柴胡勝溼湯

疝門方

大烏頭煎

當歸生薑羊肉湯

抵當烏頭桂枝湯

烏頭梔子湯

酒煮當歸丸

天台烏藥散

金匱蜘蛛散

寶鑑當歸四逆湯

香橘散

木香棟子散

喝起丸

加味通心散

立効散

九味蟠葱散

腸癰門方

薏苡附子敗醬散

薏苡敗醬湯

薤白瓜瓣湯

痔漏門方

喚痔散

湯痔膏

枯痔散

落痔湯

生肌散

洗痔消腫痛方

胡連追毒丸

黃連閉管丸

煮綠方

卷十五

目門方

千金磁硃丸

皂莢丸

生熟地黃丸

夏枯草散

洗肝散

酒煎散

大黃常歸散

瀉肺湯

蜜蒙花散

還睛圓

石膏散

通肝散

絳雪膏

石燕丹

助陽和血湯

白蒺藜散

羌活勝風湯

瀉肝散

春雲膏

養仁膏

碧雲散

宣明丸

羌活除臂湯

龍膽散

清涼膏

四生散

萬應蟬花散

保命羚羊角散

阿魏搗鼻法

撥雲退翳丸

熊膽膏

照水丹

思得堂藏

目錄

思得堂藏

<p>欒附散 爐甘石散 羚羊角散 羚羊角湯 黃連羊肝丸 羚羊補肝散 夜光椒紅丸 煮肝散 防風飲子 止淚補肝散 人參漏蘆散 加減地芝丸</p>	<p>神消夢 防風瀉肝散 補腎丸 羚羊角飲子 補腎磁石丸 除風湯 蛤粉丸 決明夜靈散 柴胡飲子 菊花散 竹葉瀉經湯 加味定志丸</p>	<p>加減駐景丸 蜜蒙散 神功散 決明雞肝散 耳門方 桂辛散 蓮蠟散 燒腎散 草蘇丸 鼻門方 屈澤通氣湯 辛夷散</p>	<p>決明散 穀精散 羚羊散 黃腎丸 犀角飲子 通神散 梔子清肝散 腎精散 千金通草辛夷摘鼻法</p>	<p>醫通 目錄 共 思得堂藏</p>
--	---	--	---	---------------------------------

<p>千金摘鼻法 齒門方 茵陳散 還少丹 烏金散 髭髮門方 七寶美髯丹 赤金散 面門方 鼠粘子散 咽喉門方 硼砂丹</p>	<p>千金發石藜蘆散 雷歸龍膽散 五倍子散 長春半牙散 烏金丹 磁黃膏 小車利腸湯</p>	<p>烏龍膏 癰疽門方 活命飲 豆豉餅 烏金丹 三白丹 五寶丹 汗門方 素問澤木藥對散 不得卧門方 半夏湯 消瘰門方</p>	<p>清熱解毒湯 竹葉黃耆湯 珍珠散 加味三白丹 歸香飲</p>	<p>醫通 目錄 共 思得堂藏</p>
---	---	--	--	---------------------------------

文蛤散	痰火門方	玉竹飲子	黃連門方	硝石礬石散	豬骨髮煎	臭毒門方	玉樞丹	嶺南瘴毒門方	蒼朮芥連湯	蒼朮柴胡湯	蟲門方
				大黃礬石湯		點眼膏			蒼朮羌活湯		

防風丸	千金茯苓補心湯	千金伏龍肝湯	千金七子散	慶雲散	白薇丸	千金種子丹	鎖貝丸	秦桂丸 <small>仰益 增丸</small>	千金大黃丸	當歸貝母苦參丸	白朮散
子苓丸	千金小牛角膠散	失笑散	紫石門冬丸	朴硝滋胞湯	葆真丸	五子衍宗丸	抑氣散	皺血丸	桂心茯苓丸	葵子茯苓散	千金半夏茯苓湯
千金茯苓丸	香桂散	千金竹瀝湯	千金石膏大青湯	千金鍾乳湯	千金白薇散	金生白朮散	瘦胎飲	二味參蘇飲	婦人門下方	枳實芍藥散	竹皮大丸
乾薑地黃散	千金鯉魚湯	加味竹葉湯	千金膠艾榴皮湯	千金麥門冬散	千金芥朮芍藥湯	兔腦丸	琥珀黑龍丹	千金牛膝湯	竹葉湯	金匱千金三物黃芩湯	
思得堂藏											

抵聖散

嚴氏清寬散

局方調經散

琥珀地黃圓

千金知母湯

千金人參當歸湯

千金人參丸

千金太岩蜜湯

鹿茸散

嬰兒門上方

千金紫丸

大連翹湯

千金遠志湯

辰砂七珍散

千金當歸芍藥湯

千金甘竹茹湯

千金淡竹茹湯

千金茯苓湯

千金蜀椒湯

千金羊肉生地黃湯

狼牙湯

千金黑散

連翹防風湯

目錄

子

思得堂藏

鈎藤散

辰砂膏

貼臍法

大青膏

抱龍丸

羌活散

千金龍膽湯

肥兒丸

蟾蜍丸

蘭香散

如聖丸

止汗散

柳華散

胡黃連丸

秘旨安神丸

鈎藤飲

利驚丸

千金射干湯

益黃散

加味陷胸丸

馬鳴散

白粉散

木香丸

石南散

龜胸丸

嬰兒門下方

百祥丸

紫草飲

化毒湯

紫草木通湯

鼠粘子湯

獨聖散

陳氏異功散

白螺散

生肌散

大黃甘草湯

菖蒲丸

宣風散

消毒飲

加味四聖散

快斑湯

如聖飲

陳氏木香散

參耆四聖散

金華散

白虎化斑湯

椒梅丸

目錄

子

思得堂藏

豬尾膏

犀角清毒飲

珍珠散

升均湯

化斑湯

荆防解毒飲

紫草快斑湯

大鼠補子湯

奪命丹

羌中救苦湯

豆蔻丸

加味清毒飲

柴胡飲

羌活湯

三仙散

羚羊解毒湯

解毒飲子

透肌散

二寶散

四聖散

托裏快斑湯

攻毒湯

當歸丸

解毒防風湯

神應奪命丹	神授散
至寶丹	無價散
人牙散	珍珠人牙散
桑蟲漿	地龍酒
雞冠血	牛李膏
東變百祥丸	周天散
水楊浴法	白花蛇散
薰穢散	辟穢香
芍藥湯	橘皮柴連散
前胡枳殼湯	補肺湯
黃芩瀉肺湯	射干鼠粘子湯
紫草消毒飲	生津葛根湯
人參煖瘧湯	梔子仁湯
移痘丹	排毒散
解毒內托散	真人解毒湯
清咽滋肺湯	清熱透肌湯
葛根解肌湯	涼血飲子
甘桔湯	石斛清胃散
門冬甘露飲	除熱清肺湯
射干消毒飲	當歸散
無比散	燒鹽散
綠袍散	雙和湯
卷十六	
祖方	

醫通

目錄

三

思得堂藏

桂枝湯	黃耆建中湯	陰旦湯	常歸四逆湯	桂枝龍骨牡蠣湯	桂枝葛根湯	桂枝加附子湯	耆芍桂酒湯	茯苓甘草湯	桂枝去芍藥加皂莢湯	桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯	小青龍湯	桂枝麻黃各半湯	桂枝芍藥知母湯	芍藥甘草湯	黃芩湯	麻黃湯	古今錄驗橘皮湯	麻黃杏仁薏苡甘草湯	杏子湯	葛根湯	麻黃附子細辛湯	倉公當歸湯	千金大棗湯
小建中湯	陽旦湯	千金獨活湯	內補當歸建中湯	桂枝大黃湯	枯薑桂枝湯	桂枝加黃耆湯	黃耆桂枝五物湯	苓桂朮甘湯	桂枝加石膏湯	小青龍加石膏湯	桂枝二越婢一湯	炙甘草湯	芍藥甘草附子湯	黃芩加半夏湯	麻黃加朮湯	麻杏甘石湯	甘草麻黃湯	三拗湯	千金附子散	麻黃附子甘草湯	麻黃升麻湯		

思得堂校

華蓋散	九寶湯
麻黃連翹赤小豆湯	越脾湯
越脾加木湯	越脾加木附湯
越脾加半夏湯	大青龍湯
文蛤湯	小續命湯
續命湯	西州續命湯
千金大續命湯	排風湯
千金八風續命湯	秦艽升麻湯
升麻湯	火鬱湯
升陽散火湯	升陽神氣湯
升和順氣湯	連翹升麻湯
和解湯	
小柴胡湯	柴胡加龍骨牡蠣湯
柴胡加芒硝湯	大柴胡湯
四逆散	柴胡去半夏加枯蘆湯
柴胡桂枝乾薑湯	柴胡桂枝湯
柴胡四物湯	柴胡枳桔湯
增損柴胡湯	柴胡清肝散
人參敗毒散	荆防敗毒散
倉原湯	清脾飲
犀角湯	省風湯
大有風湯	三生飲
木附湯	參附湯
蒼附湯	桂枝附子湯

白朮附子湯	甘草附子湯
附子湯	真附湯
附子散	四逆加人參湯
四逆湯	通脈四逆湯
茯苓四逆湯	白通加豬膽汁湯
通脈四逆加豬膽汁湯	回陽返本湯
白通湯	木香散
乾薑附子湯	漿水散
羌活附子散	茵陳附子乾薑湯
冷香飲子	附子理中湯
茵陳四逆湯	
理中丸	枳實理中湯
桂枝人參湯	連理湯
治中湯	金匱乾薑人參半夏丸
理苓湯	金匱三物大建中湯
甘草乾薑湯	滲漉湯
腎著湯	烏梅丸
大順散	生薑瀉心湯
半夏瀉心湯	黃連湯
甘草瀉心湯	深師七氣湯
乾薑黃芩黃連人參湯	指迷七氣湯
局方七氣湯	橘皮乾薑湯
三因七氣湯	
大七氣湯	

蘇子降氣湯	溫肺湯
半夏溫肺湯	參蘇溫肺湯
〔霍氏八味丸〕	金匱腎氣丸
錢氏六味丸	加減六味丸
河車六味丸	都氣丸
七味丸	加減八味丸
濟生腎氣丸	清金壯水丸
納氣丸	香茸八味丸
十補丸	枳木丸
〔金匱枳朮湯〕	橘半枳朮丸
香砂枳朮丸	
源師消飲丸	
〔平胃散〕	香連平胃散
不換金正氣散	藿香正氣散
人參養胃湯	參苓平胃散
白鳳膏	厚朴湯
除淫湯	升陽除淫湯
五積散	調中飲
胃苓湯	集驗丸
枳殼湯	
〔二陳湯〕	千金半夏湯
小半夏湯	小半夏加茯苓湯
大半夏湯	半夏乾薑湯
橘皮湯	橘皮半夏湯

橘皮枳實生薑湯	橘皮竹茹湯
四七湯	加味四七湯
指迷茯苓丸	厚朴生薑甘草半夏人參湯
分氣紫蘇飲	寧嗽化痰湯
導痰湯	加味導痰湯
十味導痰湯	祛風導痰湯
滌痰湯	溫膽湯
參胡溫膽湯	十味溫膽湯
消暑丸	千縉湯
溫中湯	
〔四君子湯〕	異功散
六君子湯	香砂六君子湯
烏雞六君子湯	溫脾散
外臺茯苓飲	惺惺散
四歌飲	八味順氣散
參苓白朮散	錢氏白朮散 <small>即七朮散</small>
八珍散	九味資生丸
八珍湯	八物湯
人參胃風湯	益氣養營湯
大防風湯	
〔四物湯〕	增損四物湯
加減四物湯	四烏湯
四神散	金匱當歸芍藥散
常痛散	千金芍藥湯

<p>醫通</p> <p>三黃補血湯 大秦丸湯 十味到散 膠艾湯 加味香附丸 金匱溫經湯 佛手散 紫蘇飲 芎歸龍甲飲 生地黃黃連湯 大補地黃丸 加味四物湯</p> <p>四物二道湯 獨活寄生湯 玉燭散 丁香膠艾丸 艾煎丸 芎歸湯 加味佛手散 達生散 續命煮散 滋燥養管湯 切勞散 解毒湯</p> <p>共</p> <p>思得堂藏</p>	<p>寬中散 保元湯 歸脾湯 聖愈湯 人參養營湯 人參安胃散 黃耆六一湯 玉屏風散 神効黃耆湯 參耆內托散 托裏消毒散 人參固肌湯</p> <p>麥門冬湯 獨參湯 加味歸脾湯 十全大補湯 大建中湯 人參實衛湯 當歸補血湯 益氣聰明湯 千金托裏散 十宣散 內補黃耆湯 補中益氣湯</p>
--	--

<p>醫通</p> <p>調中益氣湯 升陽順氣湯 中和養胃湯 清暑益氣湯 節菴升陽散火湯 生脈散 宜明門冬飲 天王補心丹 二冬膏 集靈膏 甘露飲 桔梗湯</p> <p>升陽益胃湯 瀉陰火升陽湯 通氣防風湯 清燥湯 托裏散 門冬清肺飲 易老門冬飲 清心蓮子飲 固本丸 三才丸 利金湯</p> <p>日錄</p> <p>共</p> <p>思得堂藏</p>	<p>清咽寧肺湯 清肺湯 生聖散 葶藶薤白瀉肺湯 金匱排膿散 防己黃耆湯 千金防己湯 梔子豉湯 梔子生薑豉湯 梔子乾薑湯 枳實梔子豉湯 黃芩清肺飲</p> <p>枳殼煮散 生地黃散 十六味桔梗湯 金匱排膿湯 防己茯苓湯 梔子甘草豉湯 梔子厚朴湯 梔子棗皮湯 梔子大黃湯 梔子仁湯</p>
---	---

小承氣湯	調胃承氣湯
大承氣湯	桃核承氣湯
厚朴大黃湯	厚朴三物湯
厚朴七物湯	大黃甘遂湯
大黃甘草湯	大黃牡丹湯
大黃附子湯	黃龍湯
三化湯	羌活導滯湯
紫草承氣湯	
抵當湯	抵當丸
變通抵當丸	下瘀血湯
代抵當湯丸	
涼膈散	清心散
轉舌膏	潤燥湯
通聖散	銀解散
備急丸	白散
雷氏千金丸	白餅子
消積丸	
伊尹三黃丸	金匱名瀉心湯
三黃丸	金花湯
三補丸	黃連解毒湯
金花丸	大金花丸
大黃黃連瀉心湯	附子瀉心湯
三黃梔子散湯	當歸六黃湯
清心丸	既濟解毒湯

人中黃丸	三黃石膏湯
普濟消毒飲	常啼龍膏丸
神芎丸	犀川散
十棗湯	神祐丸
控涎丹	
五苓散	豬苓湯
豬苓散	澤瀉湯
茯苓澤瀉湯	茯苓戎鹽湯
桂苓丸	桂苓甘露飲
四苓散	茵陳五苓散
春澤湯	葶蘆木香散
益元散	辰砂六一散
蒲灰散	滑石白魚散
白虎湯	人參白虎湯
桂枝白虎湯	蒼木白虎湯
竹葉石膏湯	既濟湯
清熱解毒湯	括蘆葛根湯
大青湯	玉露散
蘭香飲子	生津甘露飲
駐車丸	阿膠丸
歸連丸	阿膠梅連丸
千金黃連湯	
佐金丸	抑青丸
酒煮黃連丸	香連丸

及已丸

大補丸

大補陰丸

虎潛丸

二妙散

金液丹

二氣丹

半硫丸

來復丹

三和丹

附張介賓八畧總論

張氏醫通目錄終

醫通

目錄

卷一

思得堂藏

潛行散

滋腎丸

加味虎潛丸

靈砂丹

玉真丸

養正丹

黑錫丹

張氏醫通卷之一

清

長洲石頑張

璐路玉

中國醫藥

男

登誕

俾飛騰

日本

大泉長菴前田安宅子仁

再訂

男

典子守

中風門

中風

類中彙八

靈樞云。身半以上者。邪中之也。身半以下者。淫中之也。邪之中於人也。無有常。中於陰則濡於府。中於陽則濡於經。中於面則下陽明。中於項則下太陽。中於頸則下少陽。其中而肩背兩脇。亦下其經。中於陰者。常從臂腋始。其陰皮膚。其肉淖澤。故俱受於風。獨傷其陰。足陽明之筋病。卒口僻。急者目不合。熱則筋縱目不開。頰筋有寒則急。引頰移口。有熱則筋弛縱緩不勝收。故僻。治之以馬膏膏其急者。以白酒和桂以塗其緩者。以桑鈎鈎之。卽以生桑灰置之坎中。高下以坐等。以膏敷急頰。且飲美酒。噉炙肉。不飲酒者自強也。爲之三拍而已。

醫通卷之一

中風

思得堂藏

口頰喎僻。乃風中血脈也。手足陽明之經絡於口。會太陽之經絡於目。寒則筋急而僻。熱則筋弛而縱。故左中寒則通熱於右。右中寒則通熱於左。寒者急而熱者緩也。急者皮膚頑痺。管衛凝滯。故用馬膏之甘平柔緩。以摩其急。以潤其痺。以通其血脈。用桂酒之辛熱急束。以望其緩。以和其管衛。以通其經絡。桑能治風痺。通節竅也。病在上者酒

以行之。甘以助之。故飲美酒。啖炙肉。若不飲者。自兒弱飲之。爲之三指者。再三指其急處。使氣血流動。其病自已也。素問云。風中五臟六府之命。亦爲藏府之風。各入其門戶所中。則爲偏風。故風者百病之長也。至其變化。乃爲他病也。三陽三陰發病。爲偏枯痿易。四肢不舉。汗出偏沮。使人偏枯。偏枯痿厥。肥貴人高粱之疾也。廕有大小。髀節大痠。易偏枯。內奪而厥。則爲瘖瘖。虛邪客於身半。其入深。骨節衰則真氣去。邪氣內留。發爲偏枯。胃脈沉鼓澀。胃外鼓大。心脈小堅急。皆偏枯。男子發左。女子發右。不瘖。舌轉可治。三十日起。其從者瘖。三歲起。年不滿二十者。三歲死。趙以德曰。胃與脾爲表裏。胃之陽虛。則內從於脾。從於脾。則脾之陰盛。故胃脈沉鼓澀。瘖者。少血多氣之診也。胃之

醫通卷之一

中風

二 惡得堂藏

陽盛。則脾之陰虛。虛則不得與陽主內。反從其胃。越出部分。而鼓大於臂之外。大者。多氣少血之候也。心者。元陽君主之宅。生血生脈。今因元陽不足。陰寒乘之。故心脈小堅急。小者。陽不足。堅急者。陰寒之象也。夫心胃之三等脈。見一卽爲偏枯。心乃天真神機開發之本。胃乃穀氣充天真之原。一有相失。則不能制其氣。而宗氣散。故分布不周。不周於經脈。則偏枯。不周於五臟。則瘖。瘖者。腎與包絡內絕也。張景岳曰。胃脈沉鼓澀。陽不足也。胃外鼓大。陰受傷也。心脈小堅急。陰邪勝也。胃氣既傷。血脈又病。故心下否。半身偏枯也。金匱云。夫風之爲病。當半身不遂。或但臂不遂者。此爲痺。脈微而數。中風使然。

半身不遂者。偏風所中也。但臂不遂者。風遂上受也。風之所客。氣滯營衛。經脈不行。分肉筋骨俱不利。故曰此爲瘖。今因風者爲瘖。營衛收微。衛逐收微。故服見微數。蓋微者陽之微。數者風之熾也。此卽內經風論所謂各入其門戶。所中者之一證也。千金補金匱之不逮。立附子散。治中風。手臂不仁。口面喎僻。專以開痹舒筋爲務也。

寸口脈浮而緊。緊則爲寒。浮則爲虛。寒虛相搏。邪在皮膚。浮者血虛。絡脈空虛。賊邪不消。或左或右。邪氣反緩。正氣卽急。正氣引邪。邪僻不遂。邪在於絡。肌膚不仁。邪在於經。卽重不勝。邪入於府。卽不識人。邪入於藏。舌卽難言。口吐涎。

寒邪之脈緊束。故浮緊並見於寸口。絡脈從經脈左右雙行。當邪入之時。不治。至邪隨絡脈流行。緩急牽引。故口眼

醫通卷之一

中風

三 惡得堂藏

喎斜不遂。邪在於絡。則不營於肌膚。故不仁。邪在於經。則外不滋於肉。故身重而不勝。所謂入府入藏者。以胃爲六府之總司。心爲五臟之君主。諸府經絡受邪。變極則歸於胃。胃得之則熱甚。津液壅滯。爲痰涎。閉塞其神氣出入之竅。故不識人也。諸藏受邪。極而變者。亦必歸於心。心得邪。則神散而機息。舌者心之竅。機息則舌縱。廉泉開。舌縱則難以言。廉泉開則口流涎也。上以候氏黑散。祛之從外而散。取菊花之甘寒。杜風氣。牡蠣礬石之溫。使藥積腹中。以助祛風之力也。寸口脈遲而緩。遲則爲寒。緩則爲虛。管緩則爲亡血。衛緩則爲中風。邪氣中經。則身癢而癢癢。心氣不足。邪氣入中。則胸滿而短氣。

寸口脈遲知營氣不及而為亡血寸口脈緩知衛虛邪人而為中風衛不外布於經則為癰腫身痛營不內榮於心則客邪混鬱於胸中害其宗氣之布息故胸滿而短氣治以風引湯引之從內而泄故用大黃引續甘寒諸藥鎮攝虛風即以石脂牡蠣填塞復入之路靈樞所謂久塞其空謂之良工是也

中風非身體不能自收持口不能言冒昧不知痛處或拘急不得轉側古今錄驗續命湯

痲病者營衛氣血不養於內外故身體不用機關不利精神不治然是證有虛有實虛者自飲食房勞七情得之內經所謂內奪而厥則為痲非是也實者是風寒暑濕感之虛者不可以實治治則愈散其氣血此方明言治中風痲

諸通卷之一

中風

四

思得堂藏

乃營衛之實邪故用續命即麻黃湯之變方加乾薑開血受寒痲石膏解肌受風痲當歸和血人參益氣芎藭行血散風其并治欬逆上氣面浮者亦為風寒而致也

中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂惡寒經日不欲飲食千金三黃湯

此六氣欬束筋經陽氣不布內薄於心則神亂而煩熱以熱鬱於內不得達表所以惡寒經日而不發熱以邪氣內賊故不欲飲食耳方以千金取各寶之至也觀千金方引用明註仲景三黃湯其為金匱原各可知用麻黃為君者以其能通陽氣而開痺也痲非得汗不開然內虛當慮故以大劑黃耆佐之而虛復有寒熱不同虛熱則用黃耆虛寒則加附子不易之定法也

風虛頭重眩苦極不知食味暖肌補中益精氣近知白朮附子湯

腎氣虛乏之人外風直入無禁而挾腎中濁陰之氣厥逆上攻其頭則重眩之苦至極難耐兼以胃氣亦虛不知食味故處方全不用風藥但用附子暖其水藏白朮甘草暖其土藏水土一暖則濁陰之氣盡趨於下而頭苦重眩食不知味之證除矣

千金云岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痲三曰風懿四曰風痺夫諸般卒病多是風初得輕微人所不覺此速與續命湯依輪灸灸之夫風者百病之長岐伯所言四者說其最重也

偏枯者身半不隨肌肉偏不用而痛言不變志不亂病在分

諸通卷之一

中風

五

思得堂藏

勝之間溫胃取汗益其不足損其有餘乃可復也

則巨針

風痲者身無痛四肢不收志亂不甚言微知則可治甚則不能言不可治

風懿者奄忽不知人咽中塞窒然

風痺者風寒淫諸痺類風狀風勝則周身走注疼痛寒勝則

病在藏府先入陰後入陽治之先補於陰後寫於陽發其汗

身轉軟者生汗不出身直者七日死

石頑曰千金述岐伯中風大法有四方治頗繁今每例採

一專方為逐證之綱旨如偏枯用八風續命湯風痲用竹

骨節掣痛淫勝則麻木不仁

此言風風諸痺

風風之大概也

濕飲手。風慙用獨活湯。風痺用附子散。此大畧宗兆餘方不能具載。千金所謂變動枝葉。各依端緒以取之。端緒愈紛。則探求愈惑。圖機之士。諒不能固守成則也。

趙養葵云。河間所謂中風癱瘓者。非謂肝木之風實甚而卒中之。亦非外中於風。良由平日飲食起居動靜失宜。心火暴甚。腎水虛衰。不能制之。則陰虛陽實。而熱氣拂鬱。心神昏冒。筋骨不用。而卒倒無知也。亦有因五志有所過極。而卒中者。大五志過極。皆為熱甚。俗云風者。言末而忘其本也。觀河間之論。則以風為末。而以火為本。世之尊劉氏者。專守主火之說。殊不知火之有餘。水之不足也。劉氏原以補腎為本。觀其地黃飲子之方。可見矣。故中風又當以真陰虛為本。但陰虛有二。有陰中之水虛。有陰中之火虛。火虛者。專以地黃飲子

醫通卷之一

中風

六

思得堂藏

為主。水虛者。又當以六味丸為主。果是水虛。辛熱之藥。與夫參善之品。俱不可加。

東垣云。有中風者。卒然昏愢。不省人事。痰涎壅盛。語言蹇澀。六脈沉伏。此非外來風邪。乃本氣自病也。凡人年踰四旬。氣衰之際。或憂喜忿怒。傷其氣者。多有此證。壯歲之時。無有也。若肥盛者。亦間有之。形盛氣衰故也。觀東垣之論。當以氣虛為主。縱有風邪。亦是乘虛而襲。當此之時。豈尋常藥餌能通達於上下哉。急以三生飲一兩。加入參兩許煎服。夫三生飲乃行經活痰之劑。斷無奪熱之將。必多用入參。駕取其邪。而補助真氣。否則不惟無益。適足取敗。觀先哲用參附。其義可見矣。若遺尿手撒。口開眼合。鼻鼾為不治證。然用前藥。多有

奇生者。

丹溪云。人有氣虛。有血虛。有濕痰。左手脈不足。及左半身不遂者。四物加薑汁竹瀝。右手脈不足。及右半身不遂者。四君子加薑汁竹瀝。如氣血兩虛。而挾痰盛者。二陳加星半竹瀝。薑汁之類。觀丹溪之論。平正通達。入盛宗之。但持此以治多不效。或少延而久必斃者。何也。蓋半身風癱。須察脈辨證。兼痰兼熱為是。乃指左為血病。右為氣病。教人如此。認證內經。則無此說也。左半雖血為主。非氣以統之。則不流。右半雖氣為主。非血以麗之。則易散。故肝膽居左。其氣常行於右。脾藏居右。其氣常行於左。往來灌注。周流不息。豈可執著哉。凡此一偏之病。法宜從陰引陽。從陽引陰。從左引右。從右引左。盡觀樹木之偏枯者。將澆枯者乎。抑灌其未枯者。使之榮茂。而因以條暢其枯者乎。至若一味攻擊其風痰死血。是相引喪

醫通卷之一

中風

七

思得堂藏

亡而已。

喻嘉言曰。河間指火為訓。是火召風入。火為本。風為標矣。東垣指氣為訓。是氣召風入。氣為本。風為標矣。丹溪指痰為訓。是痰召風入。痰為本。風為標矣。然一人之身。每多兼三者而有之。苟不曰陽虛邪害空竅為本。而風從外入者。必挾身素素之邪。或火或氣或痰。而為標耶。治法。風邪從外入。驅之使外出。然扶虛者。非神虛則風不出。扶火者。非清風不出。挾氣者。非開鬱則風不出。挾痰者。非導滯則風挾痰者。非豁痰則風不出。王安道謂審其為風。則從內其為火為氣為痰。則從三子。從較量於彼此之間。得非而執一耶。

王簡齋曰。古人論中風。偏枯麻木酸痛。不舉諸證。以血

血痰飲爲言。是論其致病之根源。至於得病。則必有所感觸。或因六淫七情。遂成此病。此血與痰爲本。而外邪爲標。其病中於皮膚。脈絡。肌肉。筋骨之間。而未入藏府。故邪在皮膚。肌肉。則不知痛癢。麻木不仁。如有物一重貼於其上。或如蟲蟻遊行。或酒洒振寒。或腫脹。或自汗遇熱則或癢。遇陰寒則沉重痠痛。邪入血脈。筋絡。則手足指掌肩背腰膝重硬不遂。難於屈伸舉動。或走注疼痛。皆外自皮毛以至筋骨之病。凡此所經所絡。筋所會所結。血氣津液所行之處。皆凝滯鬱遏。不得流通而致然也。亦何必一一強度某病屬某經。某病屬某藏而雜治之哉。

薛立齋云。邪在氣。氣爲是動。邪在血。血爲所生病。經云陽之氣。以天地之疾風名之。此非外來風邪。乃本氣自病也。故諸

醫通卷之一

中風

八

思得堂藏

方多言皆由氣虛體弱。營衛失調。腠理不密。邪氣乘虛而入。然左半體者。肝腎所居之地。肝主筋。腎主骨。肝藏血。腎藏精。精血枯槁。不能滋養。故筋骨偏廢而不用也。風病多因熱甚。惟其血熱。故風寒之氣一襲之。則外寒束內熱而爲痛。故有治風先治血。血行風自滅之語。其真中風者。當辨其中藏中府而治之。眼昏者中於肝經。舌不能言者中於心經。唇緩使秘者中於脾經。鼻塞者中於肺經。耳聾者中於腎經。此五者病深。多爲難治。然五藏雖中風邪。皆其經絡受病。若傷其真藏百無一生矣。中血脈者外無六經之形證。內無便溺之阻。隔肢不能舉口不能言。中府者多兼中藏。如左關脈浮弦而目青。左關偏痛。筋脈拘急。目瞶頭眩。手足不收。坐踞不得。此中膈兼中肝也。如左寸脈浮洪。面赤汗多惡風。心神顛倒。語

言寒澀。舌強口乾。忪悸恍惚。此中小腸兼中心也。如右關脈浮緩或浮大。而唇黃。汗多惡風。口噤語澀。身重怠惰。此脾膚不仁。皮肉瞶動。腹脹不食。此中胃兼中脾也。如右寸脈浮滑而短。鼻流清涕。多喘胸中悶短氣。自汗聲嘶。四肢痿弱。此中大腸兼中肺也。如左尺脈浮滑。而目瞶黑。腰脊痛引小腹。不能俯仰。兩耳虛鳴。骨節疼痛。足痿善恐。此中膀胱兼中腎也。識其藏府經脈之病。可因人證證而施。不必拘其方藥也。

繆仲淳曰。凡言中風。有真假內外之別。西北土地高寒。風氣剛猛。真氣空虛之人。卒爲所中。中藏者死。中府者。飲食便溺艱澀。中經絡者。重則成廢人。輕可調理而移。治之之法。先以解散風邪爲急。次則補養氣血。此真中外來風邪之候也。若

醫通卷之一

中風

九

思得堂藏

大江已南。天地之風氣既殊。人之所染亦異。其地絕無剛猛之風。而多溼熱之氣。質多柔脆。往往多熱多痰。真陰既虧。內熱彌甚。煎熬津液凝結爲痰。壅塞氣道。不得通利。熱甚生風。亦致卒然倒仆。類中風證。或不省人事。或語言蹇澀。或口眼喎斜。或半身不遂。其將發也。外必先顯內熱之候。或口乾舌苦。或大便閉澀。小便短赤。此其驗也。河間所謂。此證全是將息失宜。水不制火。丹溪所謂。溼熱相火中痰。中氣是也。此即內虛暗風。確係陰陽兩虛。而陰虛者爲多。與外來風邪迥別。法當清熱順氣開痰以治標。次當補養氣血以治本。設若誤用真中風風燥之劑。則輕者變重。重則必死。故凡內燥生風。及痰中之證。治痰先清火。清火先養陰。最忌燥劑。張介賓曰。風之爲病最多。誤治者在不明其表裏耳。蓋外風

者八方之所中也。內風者五藏之本病也。八風自外而入。必先有發熱惡寒。頭身熱等證。顯然可察也。五風由內而病。則絕無外證。而忽病如風。其由內傷可知也。然既非外感。而經曰諸暴強直。皆屬於風。諸風掉眩。皆屬於肝。何也。蓋肝主風。而藏血。血病則無以養筋。筋病掉眩。強直。皆變自出。此皆肝木之化。故云皆屬於風。後世不明此義。不惟類風證為真。中而且以內傷暴厥等證。俱認為風。誤亦甚矣。夫外感者邪襲肌表。故多陽實。內傷者由於七情。故多陰虛。凡藏氣受傷。脾病者。病在肢體。或多痰飲。腎病者。或在骨髓。或在二陰。心病者。或在血脈。或在神志。肺病者。或在骨節。或在聲音。肝病者。或在筋脈。或在血脈。此五藏之類風。未有不由陰虛而然者。惟東垣獨得其義。曰有中風者。卒然昏愦。不省人事。此非

思得堂藏

外來風邪。乃本氣自病也。人年四十而陰氣自半。起居衰矣。故多犯之。豈非陰虛之病乎。夫人生於陽。而根於陰。根本衰則人必病。根本敗則人必危。所謂根本者。真陰也。人知陰虛惟一。而不知陰虛有二。如陰中之水虛。則病在精血。陰中之火虛。則病在神氣。蓋陽衰則氣去。故神志為之昏亂。非火虛乎。陰虧則形壞。故肢體為之廢弛。非水虛乎。今以神離形壞之證。乃不求水火之源。而猶以風治。鮮不危矣。試以天道言之。其象亦然。凡旱則多燥。燥則生風。是風木之化從乎燥。燥則陰虛之候也。故凡治類風者。專宜培補真陰。以救根本。則風燥自除矣。然外感者。非曰絕無虛證。氣虛則虛也。內傷者。非曰必無實證。有滯則實也。治虛者。當察其在陰在陽。而直補之。治實者。但察其因痰因氣。而暫開之。此於內傷外感。及

虛實攻補之間。最當審其有無微甚。而酌其治也。甚至有元氣素虧。卒然仆倒。上無痰。下失禁。眼目昏沉。此厥竭之證。尤與風邪無涉。設非大劑參附。安望其復。真氣於將絕之頃。識尚不能察其表裏。又不能辨其虛實。但以風之為名。多用風藥。不知風藥皆燥。燥復傷陰。風藥皆散。散復招風。以內傷作外感。以不足為有餘。是促人之死也。

景岳全書曰。凡類中風之多痰者。悉由中虛而然。夫痰即水也。其本在腎。其標在脾。在腎者。以水不歸源。水泛為痰。也在脾者。以飲食不化。土不制水也。故治痰而不知實脾。堤決非其治也。余嘗聞之俗傳云。痰在周身。為病莫測。凡癱瘓痰痰半身不遂等證。皆伏痰留滯而然。若此痰飲。豈非邪類。不痰痰邪。病何由愈。余曰。汝知痰之所自乎。凡經絡之痰。蓋即

中風

思得堂藏

津血之所化也。使果營衛和調。則津自津。血自血。何痰之有。唯是元陽虧損。神機耗敗。則水中無氣。而津凝血敗。皆化為痰耳。此果痰也。果津血也。豈以津血之外。而別有所謂痰者耶。若謂痰在經絡。非攻不去。則必并津血而盡去之。庶乎可也。否則安有獨攻其痰。而津血自可無動乎。津血復傷。元氣愈竭。隨去隨化。痰必愈甚。此所以治痰者不能盡。而所盡者。唯元氣也。別復有本無痰氣。而妄指為痰。以誤攻之者。又何其昧之甚也。故凡治痰之藥。在元氣無傷。而有壅滯者。乃可暫用分消。豈云無効。若病及元氣。而但知治標。則未有日用而不日敗者矣。

李士材曰。凡中風須辨血脈府藏。中血脈則口眼喎斜。中府則肢節痠。中藏則性命危。三者之治。各不同。中血脈。外有六

經之形證。則從小續命加減。中府內有便溺之阻隔。宜三化湯通利之。若表裏證俱見。先與解表。而後攻裏。若外邪已解。內邪已除。而語言蹇澀。半身不遂。未能即愈。以六君子加黃耆桂心歸芍。久久服之。營衛自和。即所謂大藥也。因脾胃虛而四肢不舉者。慎不可雜以風藥。風熱痰盛者。但加薑汁竹瀝。肥人多淫痰。少加製附子。行經病在半表半裏。外無六經之形證。內無便溺之阻隔。知為血弱不能養筋。故手足不能運動。舌強不能語言。古法用大秦朮湯。然不若十全大補大建中入參養營選用。皆藏虛而生風。天麻丸。大抵治風之法。初得之。便當順氣。及其久也。即當活血。若先不順氣。遽用烏附。又不活血。徒用羌防天麻。吾未見其能治也。然順氣之藥則可。破氣降氣之藥則不可。若老人虛人。治須少汗。

中風

思得堂藏

亦宜少下。多汗則虛其衛。多下則損其營。宜治在經。當以大藥養之。凡治風須分陰陽。陰中者。面色青。或白或黑。痰喘昏亂。眩暈多汗。甚者手足厥冷。陽中者。面色赤。唇焦。牙關緊急。上視強直。掉眩煩渴。陰中危者。多見脫證。宜三生飲倍加人參及竹瀝薑汁灌之。陽中劇者。多見閉證。若初中痰涎壅盛。昏愢不省。語言蹇澀。痰涎不送。一切痰氣閉塞。牛黃清心丸。若熱中。神昏不語。痰塞心包。口角涎流。煩熱氣急。一切痰熱閉遏。清心牛黃丸。寒熱互結。痰氣壅塞。局方至寶丹。然中氣之證。亦多卒倒昏迷。不省人事。不可誤用牛黃丸。且蘇合香丸。薑湯調化灌之。執口不開。不可進藥。以細辛牙皂為末吹鼻取嚏。即蘇。無嚏不治。痰涎壅盛者。且吐之。用稀涎散三四錢。溫水調灌。不大嘔吐。但微微令涎自口角流出。即蘇。或

稀涎一味。大劑煎湯灌之。即吐。凡中風或未蘇。或已蘇。而初病。或久病。忽然吐紫紅色者。死。卒然中倒。輕者即時蘇。重者不省人事。慎不可以滴水入喉。入則其涎永繫於心。終不去。即成廢人。俟稍蘇。察其有表證。小續命湯加減。痰涎壅盛而脈數者。有熱。省風湯。痰逆嘔泄。而脈沉厥冷。大省風湯。不効。頑痰愈盛。或轉增困重。三生飲。肥人多有。中病。以其氣溢於外。而軟於內也。元氣素弱。或遇勞役嗜慾。而卒然肝仆。眾類中風。手必撒。口必開。非大劑參耆。豈能回元氣於無何有之鄉哉。亦有不仆。而但舌強語澀。痰壅口眼喎斜。肢體不遂者。作中風治。必給六君子湯加天麻薑汁竹瀝治之。中使體虛有痰。亦用上法。中而口眼喎斜。先燒牙皂烟薰之。以逐外邪。次燒乳香薰之。以順血脈。若前證多悉。此風動

中風

思得堂藏

肝氣宜小續命加羚羊角。熱渴去附子加秦艽。恍惚錯語加茯神遠志。不得睡加熟棗仁。不能言加竹瀝。脈虛無力。去麻黃加茯苓。口眼喎斜。耳鼻常靜。故風息焉。口目常動。故風生焉。風淫則血液衰耗。無以榮筋。故筋脈拘急。口目為得。靈樞云。足陽明之筋病。類筋有寒則急。引頸發口。有熱則筋弛縱。緩不勝收。故僻。按左寒右熱。則左急而右緩。右寒左熱。則右急而左緩。蓋左中寒。則逼熱於右。右中寒。則逼熱於左。陽氣不得直行故也。又金匱云。極寒傷經。極熱傷絡。則知經受寒而急。則絡必熱而緩。則素問。大筋慳短。小筋弛長之謂也。凡口之喎。灸地倉。目之斜。灸承泣。苟不効。當灸人中。夫氣虛風入。則為偏。上不得出。下不得泄。真氣為風邪所陷。故宜灸。經曰。陷下

中風

思得堂藏

者灸之。至於用藥。宜潤燥則風自息。古法用大秦茂湯。今改用十全大補尤妥。又曰。足之陽明。手之太陽經急。則口目為僻。皆急不能卒視。又口眼喎斜。須分左右。蓋邪盛則急。正虛則緩。左急者。屬血中有邪。舒筋三聖散加薑黃。病久氣虛者。去延胡索加入參。各參歸三聖散。易入參者。以正虛不勝耗血之品。故借陽生陰長之力。流動經脈。勿疑左半屬血。不當用參以助其氣。右急者。屬氣分受邪。八味順氣散去青皮加羌活。又法。桂枝三兩。酒煎濃液。以布漬之。左喎搭右。右喎搭左。若口眼喎斜。而一臂不仁者。千金附子散。

口噤不開。千金謂之風熱。經云。足陽明領頰之脈。急則口噤不能開。肝風乘胃故也。皂莢乳香黃耆防風煎湯煎之。然須大作湯液。如蒸如霧。乃得力耳。風邪乘虛入其筋則攣。故

陰通卷之一 口噤不開 痰涎壅盛 十四 四得堂藏

今日眼喎斜。牙關急而口噤也。秦升升麻湯。風寒客於會厭。卒然無音。虛則地黃飲子。痰則游痰湯。實則涼膈散加犀角黃連。一法。南星半夏為末。按其牙關。鬱金麝香搗鼻。

痰涎壅盛。此證宜先吐之以稀涎散。後用星香二陳導痰。條痰之類。蓋治痰以順氣為先也。挾虛者必用參耆竹瀝。挾寒者加桂附薑汁。上盛下虛。痰涎壅盛者。六君子加星香送黑錫丹。

語言蹇澀。經曰。足太陰之脈。連舌本。散舌下。是動則病舌本強。又心之別脈。係舌本。又曰。足少陰之脈。其直者循喉嚨。挾舌本。又曰。所謂人中為諸者。陽盛已衰。故為諸也。內奪而厥。則為諸。此皆虛也。少陰不至者。厥也。千金云。心脾二藏受風邪。音強不得語者。獨活湯專治風。然不能言。四肢不收。

手足痺曳。腎虛而腎絡與胞絡內絕不通於上。則瘖。腎脈不上循喉嚨。挾舌本。則不能言。二絡不通於下。則癱厥矣。急宜地黃飲子。庶可挽回一二。如脾上不足。痰涎壅盛而蹇澀者。是痰火壅塞上竅。氣虛不能上營。則舌機不轉。宜六君子加星香。甚遠挾實竹茹。若口眼喎斜不能言。遇風寒則四肢拘急。脈浮而緊。此手足陽明經虛風所乘。秦升升麻湯。若口瘖不能言。足痿不能行。屬腎氣虛弱。名曰非證也。地黃飲子。卒然暈倒。口眼喎斜。口角流涎者。氣虛挾痰也。六君子加秦升升麻薑汁竹瀝。血弱舌痿不能言。手足不能舉。十全大補湯。風熱上壅。痰盛不能言。涼膈散加葛根遠志辰砂。驚痰壅塞。舌本強硬。語言不正。正舌散加薄荷。舌麻語澀不能言。省風湯加沈香。脾緩舌強不能言。半身不遂。解語湯。厥虛無力加

陰通卷之一 語言蹇澀 五 思得堂藏

麥冬白朮。心血衰少。驚悸不能言。得之於暴者。祛風定志湯。血衰心失滋養。語言不出。叩之不應。十全大補加葛根遠志。痰迷心竅。昏憤口噤不能言。游痰湯。有熱加秦連薑汁竹瀝。舌瘖脉洪。口角流涎。喜笑不休者。導痰加白朮。秦連竹瀝薑汁。肥人舌根強硬。作淫痰治。瘦人舌根強硬。作心火治。雖病久正虛。不可純用神藥。壅滯經絡中之痰火。若飲食如常。但失音不語。俗呼啞風。小續命去桂附加葛根。與中心經。啞不能言。口開面赤者。必死勿治。

左癱右瘓。左半身不遂。或傷血。致目昏耳聾。頭眩乏力。四物加羌防肉桂紅花。執仁生薑。病久氣虛不應。宜參耆三聖散。右半身不遂。四肢無力。痰涎壅盛。或一臂不遂。時復轉移。一臂千金附子散。下半體寒重。與弱。既攔防風湯。并

醫通卷之一

四肢不舉

六

思得堂藏

公當峭湯更恭癉證治之

加鈔賄秦凡防厠肥豷色白痰多者六君子加秦艽天麻竹

泥鳅汁

卷之一

遺尿不禁

思得堂藏

利小便

腎虛不能舞者地黃傾子若卒中有此兼證更治者爲肩凝

不治

不治諸證。髮直吐沫。推頭上視。魚口氣粗。直視。取小日。眩。喉聲如錐。面赤如赭。汗出如珠。循衣摸床。神昏不語。頭面手足爪甲青黑。大吐大瀉。吐血下血。其脈緊急躁疾短澀者。皆不治。

石頑曰。中風一門。爲雜證開卷首義。其分經絡。定府藏。與傷寒無異。非精達兩陽至理。難以語此。如西北爲真中風。東南爲類中風。又爲諸病開一。辨別方宜大綱。而傷寒主治。雖無一不具。未嘗增揭其旨也。夫水土之剛柔。非特指中風而言。當知西北爲真中風。一語。原是因東南水土孱弱。雖有卒倒昏迷。皆是元氣疎豁。爲虛風所襲。不可峻用祛風猛烈。而設其西比爲真中風。一語。原是對代東南類中而言。以其風氣

醫通卷之一

不治諸證

六

思得堂藏

剛暴得以直犯無禁。則有卒然倒仆之患。未嘗言西北之人。絕無真氣之虛而中之者。內經明言。陽之氣。以天地之疾風。名之。卽此一語。可證風從內發。但以西北資稟剛暴。風火素盛。加以外風猛厲。易襲。所以西北中風。較之東南。倍劇也。余嘗究心斯道。五十年來。歷診西北之人。中風不少。驗其寤寐。道脈。詎非下元之愆。而從事地黃飲三生飲等治乎。嗚呼。不遂。詎非血脈之虛。而從事建中十全等治乎。東南類中。豈無六經形證見於外。復濁阻隔見於內。卽從事續命三化等治乎。若通聖愈風。卽西北真中。曾未一試也。讀古人書。須要究其綱目。以意逆之。是謂得之。若膠執其語。反成窒礙。豈先哲立言之遺歟。諸病各有經脈府藏之分。而卒然倒仆。猶須審諦。當必先哲論中風。首云中血脈。則口眼喎斜。中府則肢

節廢。夫肢節廢。與口眼喎斜。皆屬六經形證。若中府則有。濁阻隔之患矣。中藏則性命危。此亦不過論其大綱。中藏宜絕無可治。而一舉委之。不救手。

診。石頑曰。中風之脈。皆真氣內虧。風邪得以斬關直入。卽南方類中卒倒。雖皆分屬虛風火屬痰。總由腎氣衰微。不能主持。是以脈不能沉。隨虛風鼓激。而見浮緩之象。昔人有云。中風之脈。每見沉伏。亦有脈隨氣奔。指下洪盛者。當知中風之人。皆體肥痰盛。外似有餘。中實不足。加以房室內賊。遂致卒倒昏迷。其初中之時。周身之氣。閉滯不行。故多沉伏。少頃氣還微省。則脈隨氣奔。而見洪盛。皆風火痰淫用事也。大都中風之脈。浮小緩弱者生。堅大急疾者危。蓋浮緩爲中風之本脈。兼緊則多表邪。兼大則多氣虛。兼遲則多虛寒。兼數則

醫通卷之一

中風

六

思得堂藏

多虛熱。兼滑則多痰淫。皆爲可治之脈。惟兼濡者。爲脈不應病。多爲危兆。以痰證脈濡。爲正氣虛衰。經絡閉滯。難於搜滌也。所以中風之脈。最忌伏濡不調。尤忌堅大急疾。素問云。胃脈沉鼓濇。胃外鼓大。心脈小堅急。皆鬲偏枯。男子發左。女子發右。不瘳。舌轉可治。則知堅急濇伏。皆難治之脈。况見證瘳。舌機不轉。腎氣內衰之證乎。

羅謙甫治太尉忠武史公。年近七旬。十月初。侍國師於聖安寺支室。中有煤炭火一爐。在左側。遂覺左頰微有汗。因左頰疎緩。破風寒客之。左頰急而口喎於右。脈得浮緊。按之洪緩。先於左頰上灸地倉一七壯。次灸頰車二七壯。後於左頰上熱手熨之。以秦艽升麻湯。發散風寒。數服而愈。起以德治陳學士敬初。因難事晚拜間。就倒仆。汗注如雨。

診之脈大而空虛。年當五十。新娶少婦。今又從拜晚之勞。役。故陽氣暴散。急煎獨參湯。連飲半日而汗止。神氣稍定。手足俱癢。瘡而無聲。遂於獨參湯中加竹瀝。開上湧之痰。次早悲哭一日不已。因以言慰之。遂笑。復笑。五七日無已。時此哭笑。為陰火動其精神魂魄之機。相併故耳。正內經所謂五精相併者。心火併於肺則喜。肺火併於肝則悲是也。稍加連藥之屬。瀉其火。八日笑止。手動。一月能步矣。李士材治徽商汪華泉。忽然昏仆。遺尿撒手。汗出如珠。口不能言。法在不治。然大進參附。或救萬一。用人參三兩。熟附五錢。濃煎灌之。至晚而汗減。再劑身體轉動。更用參附白朮加薑汁竹瀝。數日漸爽。調補半年而康。

石頑治春榜趙明遠。平時六脈微弱。已酉九月。患類中風。

經歲不痊。邀石頑診之。其左手三部放大而堅。知為腎藏陰傷。壯火食氣之候。且人迎對內向寸。又為三陽經滿。溢入陽維之脈。是不能無顛仆不仁之虞。右手三部浮緩。而氣口以上微滑。乃痰痰湧塞於膈之象。以清陽之位。而為痰氣占據。未免侵瀆心主。是以神識不清。語言錯誤也。或者以其神識不清。語言錯誤。口角常有微涎。目睛恆不易轉。以為邪滯經絡。而用祛風導痰之藥。殊不知此本腎氣不能上通於心。心藏虛熱生風之證。良非風燥藥所宜。或者以其小便清利倍常。以為腎虛。而用八味壯火之劑。殊不知此證雖虛。而虛陽伏於肝藏。所以陽事易舉。飲食易饑。又非益火消陰藥所宜。或者以其向患休息久病。大便秘後常有淡紅漬沫。而用補中益氣。殊不知脾氣陷於下焦。

者可用升舉之法。此陰虛久病之餘疾。有何清氣在下可升發乎。若用升舉。升動肝腎虛陽。鼓激膈上痰飲。能保其不為喘服逆滿之患乎。是升舉藥不宜輕服也。今舉河間地黃飲子。助其腎。通其心。一舉而兩得之。但不得薄滋味。遠房室。則藥雖應病。終無益於治療也。惟智者善為調攝。為第一義。

又治御前侍衛金漢先如夫人。中風四肢不能舉動。喘鳴。息聲如拽鋸。不能著枕。寢食俱廢者。半月餘。方邀治於石頑。診其脈。右手寸關數大。按久無力。尺內愈虛。左手關尺弦數。按之漸小。惟寸口數盛。或時昏眩。或時煩亂。詢其先前所用諸藥。皆二陳導痰。雜以秦艽天麻之類。不應。又與牛黃丸。痰涎愈過。危殆益甚。因疏六君子或加膽星竹

瀝。或加黃連當歸。甫四劑而喘息頓除。再二劑而飲食漸進。稍堪就枕。再四劑而手足運動。十餘劑後。屏幃之內。目可徐行矣。因思從前所用之藥。未嘗不合於治。但以痰涎壅盛。不能暢當。咬用參朮。開提胃氣。徒與痰涎。中氣轉傷。是以不能奏效耳。

又治汝川令顧我在夫人。高年氣虛痰盛。通因乃郎翰公遠任廣西府。以遠遠抑鬱。仲春十四夜。忽然下體墜床。便舌強不語。肢體不遂。以是日曾食溼麵。諸醫奉議消導。消導不應。轉增困憊。人事不省。頭項腫脹。事在危急。急邀石頑診之。六脈皆虛濡無力。諸醫尚謂大便秘六七日不通。擬用攻下。余謂之曰。脈無實結。何可妄攻。我在否梓。皆言素

飲以流動腸胃之樞機。日進六君子湯。每服用參二錢。煎成頓熱。分三次服。四劑後。自能轉側。大便自通。再四劑。手足便利。自能起坐。數日之間。倩人扶掖徐行。因切囑其左右。謂陽。毋使步履有失。以其氣虛痰盛。不得不防杜將來耳。

又治松陵沈雲步先生。解組歸林。以素稟多痰。恒有麻木之患。防微杜漸。不無類中之虞。乃謀治於石頑。為疏六君子湯服之。頗驗。而性不喜藥。入秋已來。漸覺肢體不遂。復邀診切。脈得柔滑中有微結之象。仍以前方。除去橘皮。加歸者巴戟。平調半月而安。然此證首在節慎起居。方能孔保貞固。殊非藥力可圖萬全也。

張氏醫通卷之一終

醫通卷之一 中風按 思得堂校

張氏醫通卷之二

清

長洲石頑張

璚路王

男

登誕生

再訂

日本

大泉長菴前田安宅子仁

男

典子守

諸傷門

傷寒

傷寒雜病。世分兩途。傷寒以攻邪為務。雜病以調養為先。則知工傷寒者。胸中執「汗下和解之法。別無顧慮正氣之念矣。雜病家寧不有攻邪之證耶。祇緣膠執已見。不能圓通。以致傷寒一切虛證。壞證。不敢用補。雜病一切表證。實證。不敢用攻。舉俗所見。皆然。病家亦寧死無怨。良由聖教久湮。邪說橫行之故。是不得以傷寒入門。見證定名。真試一句。喝破令雜病家粗知。分經辨府。不致妄為舉措。寧無小補於世哉。姑以陰陽傳中冬溫溫熱時行大綱。辨述如左。

陰陽傳中。如交霜降節後。有病發熱頭痛。自汗。脈浮緩者。風傷衛證也。以風為陽邪。故只傷於衛分。衛傷所以腠理疎。汗自出。身不疼。氣不喘。脈亦不緊。如見惡寒發熱。頭疼。骨節痛。無汗而喘。脈浮緊者。寒傷營證也。以寒為陰邪。故直傷於營分。營傷所以腠理固閉。無汗而喘。身疼骨節痛。而脈不柔。和如見惡寒發熱。頭痛身疼。汗不得出。而煩躁脈浮緊者。風寒併傷營衛也。以風為陽邪。無微不入。風性善動。法當有汗。寒為陰邪。萬類固閉。寒氣斂束。鬱遏腠理。所以不得外泄。熱

勢反蒸於裏而發煩躁也。上皆太陽經初病見證。有桂枝麻黃青龍湯時三法。若交陽明之經。則惡寒皆除。但壯熱自汗而脈浮數。以陽明內達於胃。多氣多血。邪入其經。蒸動水穀之氣。故皆有汗。但以能食為陽邪屬胃。不能食為陰邪屬脾。寒辨之。若交少陽之經。則往來寒熱。口苦咽痛。以其經居表裏之半。邪欲入則寒。正與爭則熱。所以只宜和解。而有汗下利小便三禁。至其傳變。雖有次第。本無定矩。有循經而傳者。有越經而傳者。有傳遍六經者。有傳至二三經而止者。有犯本者。有入府者。有邪在太陽。不得陽明之經。即入陽明之府者。有陽明經府相傳者。有從少陽經傳入陽明府者。所以仲景有太陽陽明正陽陽明少陽陽明之異。或云少陽無逆傳陽明之理。殊不知胃為十二經之總司。經經交貫。且少

醫通卷之二

傷寒

二

思得堂藏

陽之經在外。而陽明之府在內。何逆之有。至若傳入陰經。亦有轉入胃府而成下證者。太陰藏府相連。移寒移熱最易。少陰亦有下利清水色純青。心下痛。口乾燥者。厥陰亦有下利。謾語者。此皆陰經入府之證。少陰更有移熱膀胱之府。一身手足盡熱。小便血者。厥陰亦有轉出少陽。嘔而發熱者。二經交接故也。又有轉出太陽表證者。如下利後。清便自調。身疼痛。此陰盡復陽也。夫所謂犯本者。太陽經邪入膀胱之本。如煩渴引飲。水入即吐。小便不利者。風傷衛之犯本也。如熱結膀胱。其人如狂。或下血者。此寒傷營之犯本也。所以仲景有五苓桃核承氣之分。邪熱入胃。則當詳三陽明之原。而與三承氣緩急分治。蓋陽明居中。萬物所歸。無所復傳。至此悉宜攻下。但須俟結定。則熱邪盡歸於胃。然後下之。若結未

定而下早。則有結胸痞滿。斬熱利等證。以邪熱歸併中土。未盡乘機內入。而為變矣。故傷寒家有汗不厭早。下不厭遲。發表不開。不可攻裏之戒。邪在少陽。入犯膽府。則胸滿驚煩。小便不利。一身盡重。不可轉側。或入血室。則晝日明了。夜則譫語。如見鬼狀。皆宜按證求治。但此經之要。全重在於胃氣。所以小柴胡中必用人參。仲景云。胃和則愈。胃不和則煩而悸之語。乃一經之要旨也。至傳三陰。太陰則腹滿時痛。少陰則腹痛自利下重。小便不利。甚則口燥心下痛。厥陰則寒熱交錯。寒多熱少。則病進。熱多寒少。則病退。大抵少陰傳經熱邪。必從太陰而入。厥陰必從少陰而入。非若陰證有一入太陽。不作鬱熱。便入少陰之理。當知傷寒傳經之證。皆是熱邪。經中邪盛而溢入奇經。故其傳皆從陽維而傳布三陽。陰

醫通卷之二

傷寒

三

思得堂藏

維而傳布三陰。與十二經藏府相貫之次第無預也。其邪必從太陽經始。以冬時寒水司令。故無先犯他經之理。但有他經本虛。或為合病。或為越經。或陷此經。不復他傳。非若感冒非時寒疫之三陽混雜也。大抵寒疫多發於春時。春則少陽司令。風木之邪必先少陽。而太陽陽明在外。病則三經俱受。以是治感冒之方。若香薷芎藭蘇麻正氣十神之類。皆三經雜用不分耳。試觀夏暑必傷心包。秋燥必傷肺絡。總不離於司運之主令也。其有誤治而成壞證者。證類多端。未能悉舉。即如結胸痞滿。良由誤下。表邪內陷。故脈必有一部見浮。蓋寒傷營。營屬血。而輒痛者為結胸。風傷衛。衛屬氣。而不痛者為痞滿。然痞滿之基。多由其人痰涎內蘊。非若結胸之必因下早而陽邪內陷。此大小陷胸五種瀉心。分司結胸痞滿

諸治也。至於懷懷諸證。無結可攻。無痞可散。惟梔子鼓湯。可以開發虛人內陷之表邪。一湧而迅掃無餘。即勞復食復。但於方中加枳實一味。其溫熱時行。亦可取法乎此也。○至於陰證。既無熱邪氣蒸。萬無傳經之理。即有陰邪。陰主靜。斷不能傳。原其受病。必先少陰。或形寒飲冷傷脾。則入太陰。有之其厥陰之證。無不由少陰而病。所以少陰溫經之藥。峻用薑附。四逆厥陰風木之藏。內伏真火。雖有陰寒。不過莖桂之屬。若當歸四逆加吳茱萸換肉桂足矣。不必薑附也。然仲景厥陰例中。非無四逆等治也。當知厥陰之寒。皆是由少陰虛寒而來。故用薑附。令少陰而溫之。所謂腎肝同治也。即太陰未嘗不用四逆也。亦是命門火衰。不能生土致病。故必兼溫少陰。所謂治病必求其本也。○夫治傷寒之法。全在得其綱領。

思得堂藏

邪在三陽。則當辨其經府。病入三陰。則當分其傳中。蓋經屬表。宜從外解。府屬裏。必須攻下。而除傳屬熱。雖有陽極似陰。厥逆自利等證。但須審其前曾發熱頭痛。至四五日或數日。而見厥利者。皆陽邪亢極。厥深熱深之證。急當清理其內。誤與溫藥。必死。但清之有方。須知陽極似陰之證。其人根氣必虛。即與救熱存陰。須防熱去寒起。間有發汗太過。而成亡陽之候。亦有攻下太過。而陰陽俱脫者。不妨稍用溫補。然脫止陽回。即當易職。不可過劑。以耗其津。況此證與真陰受病不同。○中屬寒。雖有陰極似陽。發熱躁悶等證。但須審初病不發熱。無頭痛。便嘔吐清水。踰臥足冷。自利腹痛。脈來小弱。至四五日或六七日。反見大熱躁亂。欲坐卧泥水中。渴欲飲水。而不能下咽。脈虛大不能鼓。激者。此陰盛格陽之假熱。陽欲

脫亡之兆。峻用參附無疑。○有卒暴中寒。厥冷不省者。此真陽大虛。寒邪斬關直入之候。丹溪所謂一身受邪。難分經絡是也。非頻進白通通脈。不能挽回。○更有少陰中風。雖不發熱。亦無自汗厥冷嘔吐下利等證。但覺胸中痞滿不安。不時心懸若飢。自言腹滿。他人按之不滿。手足自溫。六脈小弱而微浮者。此為陰經陽邪入罕能散。惟宜黃耆建中。稍加入參熟附。溫散其邪。若挾飲食。則氣口滑。亦有機糊不清者。當與枳實理中。手足微冷。加附子。若誤與發散。必死。破氣寬中。亦死。消灶攻下亦死。若峻用四逆。傷犯真陰。多有救逆血溢之虞。此證初時。不以為意。每每委之庸師。所以犯之。百無一生也。

冬溫。○冬時天氣大燠。而見發熱咳嗽者。此為冬溫。以伏藏

傷寒

五

思得堂藏

之令。而反陽氣大泄。少陰不藏。非時不正之氣。得以入傷少陰之經。陽氣發外。所以發熱。熱邪傷氣。所以咳嗽。其經上循喉嚨。所以喉腫。下循腹裏。所以感之深者。則自利也。冬溫本秋燥之餘氣。故咽乾痰結。甚則見血。與傷風之一款。其痰即應不同。秋則顯服者。火氣上逆也。秋甚則藏府引痛者。火氣內鬱也。其脈或虛緩。或虛大無力。亦有小弱者。熱邪傷氣。故也。若腎氣本虛。則尺中微弦。暮則微寒。發熱。常氣虛。則氣口虛大。身熱手足微冷。或有先傷冬溫。更加暴寒。寒鬱熱邪。則壯熱頭痛。自汗喘欬。脈來浮。舉則微弦。中候則軟滑。重按則少力。雖有風寒。切不可妄用風藥。升舉其邪。輕則熱愈甚。而欬愈劇。重則變風溫。灼熱而死。亦不可用辛散。多致咽喉不利。唾膿血。痰中見血。甚則血溢而泄。發斑。狐惑。往往不救。

又不可用耗氣藥多至數劑痛引周身而熱足冷而致危候
惟宜加減葱白香豉湯調之兼有風寒外襲則加羌活紫蘇
寒邪盛極而發煩躁者但於前藥中稍加麻黃五分石膏
錢許或麻黃湯本方主之緣此證見於冬時舉世醫流莫不
以傷寒目之而與發散致天枉者不可枚舉曷知西北二方
也真中風傷寒者最多也冬溫者絕少間有傷於火炕者亦
有傷於火而復傷於寒者可與越脾湯桂枝二越脾一湯以
其地厚質卑可勝攻伐非若東南之稟氣孱弱也至如大嶺
以南陽氣常泄之地但有瘧瘧之毒絕無傷寒之患即使客
遊他處感風寒僅可藪香正氣之類若麻黃青龍絕不可
犯誤用而發動身中素蘊之瘴淫則壯熱不止每致殞命不
可不慎

傷寒

六 思得堂藏

溫病○有冬時觸犯邪氣伏於經中至春分前後乘陽氣發
動而為溫病素問所謂冬傷於寒春必病溫是也其證不惡
寒但惡熱而大渴其脈多數盛而渾渾不清越人所謂溫病
之脈行在諸經不知何經之動抱不似傷寒浮緊之狀且右
大與氣口必倍於人迎信非入迎緊盛之比此證大忌發汗
若誤與表散必躁熱無汗悶亂不寧而死以其邪伏經中日
久皆從火化而發其熱自內達外必用辛涼以化在表之熱
苦寒以泄在裏之熱內氣一通自能作汗有服承氣大汗淋
漓而愈者有大渴飲水通身汗出而熱頓除者有渾身壯熱
服黃芩湯葱白香豉湯得汗而解者有發熱自利服葛根黃
芩黃連湯而愈者有舌乾便秘服涼膈散而安者故古語有
溫熱病誤下不為大害誤汗為害

有非時寒疫間雜其間不可不審諦明白而為治庶幾感
風寒之證初時畏寒不渴至二三日熱邪傷耗津液方渴與
溫病熱病之一病便昏昏不與大熱煩渴不同其脈多浮盛
而見於左手與溫病之右脈數盛亦異若兼右脈滑盛或滿
部脈弱者必停飲食之故故治寒疫當先發散為主即有宿
濕兼與搖半和朴不得濫用裏藥倘邪未入裏而誤與攻下
不無引賊破家之虞故其治與伏氣迥乎不類也
陰熱傷胃汁火迫心包不殊故可異病同治而熱邪皆得洩
散也若熱毒亢極不解腹滿氣盛者涼膈雙解承氣解毒兼
苦燥而攻之或三黃石膏梔子豉湯汗之用法不峻投劑不
猛必不應手非如傷寒待陽明胃實而後可攻下也
時行○時行疫癘非常有之病或數年一發或數十年一發
多發於饑饉兵荒之後發則一方之內沿門闔境老幼皆然
此大疫也亦有一隅偶見數家或一家止一二人或三五人
病證皆同者此常疫也即如痘疹癩斑之類或越一二年或
三五年一見非若大疫之盛行所以人不加察耳即如軟脚
瘟證醫者皆以脚氣目之捻頸瘟證醫者皆以喉痺目之絞
腸瘟證醫者皆以臭毒目之楊梅瘟證醫者皆以丹腫目之
黑骨瘟證醫者皆以中毒目之瓜瓢瘟證醫者皆以畜血得

傷寒

七 思得堂藏

寒目之。惟充瘠瘧之。閤門暴發暴死。大頭瘧之。瘰癧熱。瘰癧。氣通充。不敢妄加名目也。其常疫之氣。皆是濕土之邪。鬱發。治宜表裏分解。隨邪氣所在而攻之。孫真人云。疫氣傷寒。三日以前不解。葱白香豉湯加童便。熱服汗之。不汗少頃更服。以汗出熱除為度。三服不解而脈浮。尚屬表證。則用白虎。見裏證則宜承氣解毒。表裏不分。則宜涼膈雙解。汗下後復見表證。再與白虎。復見裏證。更與承氣。表裏勢熱。則宜三黃石膏。三黃梔子豉湯汗之。有汗下三四次而熱除者。有熱除後忽復壯熱。不妨再汗再下。若見脈證皆虛。法無更攻之理。惟與清熱解毒湯。人中黃。九人中黃散之。屬調之。非如傷寒有下早變證之處。亦非溫熱不可。下之。此大率以熱除邪盡為度。不當牽制其虛也。惟下元虛人。非生料六味補其真陰。醫通卷之二

醫通卷之二

八

恩得堂藏

則不能化其餘熱。又不可拘於上說也。至於大疫。則一時詳一時之證。一方用一方之法。難可預為擬議也。以上所述。不過為雜病家開一辨證法門。其間肯綮不遑繁述。

湖廣禮部主事范求先詳克誠寓金閨之石窩菴。患寒傷營證。惡寒三日不止。先曾用過發散藥二劑。第七日躁擾不寧。六脈不至。手足厥逆。其同寓目科方耀珍。邀石頑診之。獨左寸脈厥動。知是欲作戰汗之候。令勿服藥。但與熱薑湯助其作汗。若誤服藥。必熱不止。後數日狂罵謝別。詢之果如所言。不藥而愈。

一童姓者。伏氣發於盛暑。其子跪請求治。診時大發躁擾。脈皆洪盛而躁。其婦云。大渴索水二日。不敢與飲。故發狂。亂因令速與進。進二盞。稍寧。少頃復索。又與一大盞。放盞。

通身大汗。安睡熱除。不煩湯藥而愈。同時有西客二人寓毛家。亦患此證。皆與水而安。

文學范鉉。甫孫振麟。於大暑中患厥冷自利。六脈弦細。乳遲而按之欲絕。舌色淡白。中心黑潤無胎。口鼻氣息微冷。陽縮入腹。而精滑如冰。問其所起之由。因臥地晝夜受寒。是夜連走精二度。忽覺顛腹如山。坐起暈倒。便四肢厥逆。腹痛自利。胸中兀兀欲吐。口中喃喃妄言。與淫溫之證不殊。醫者誤為停食感冒。而與發散消導藥一劑。服後胸前頭項汗出如流。背上愈加畏寒。而下體如冰。一日昏憤數次。此陰寒挾暑。入中手足少陰之候。緣腎中真陽虛極。所以不能發熱。遂擬四逆加入參湯。方用人參一兩。熟附三錢。炮薑二錢。炙甘草二錢。晝夜兼進。三日中進六劑。決定。

醫通卷之二

傷寒按

九

恩得堂藏

第四日寅刻回陽。是日悉屏薑附。改用保元方。用人參五錢。黃耆三錢。炙甘草二錢。加麥門冬二錢。五味子一錢。清肅膈上之虛陽。四劑食進。改用生料六味加麥冬五味。每服用熱地八錢。以救下焦將竭之水。使陰平陽秘。精神乃治。

徐君育素稟陰虛多火。且有脾約便血證。十月間患冬溫發熱咽痛。里醫用麻黃杏仁半夏枳橘之屬。遂喘逆倚息不得卧。聲嘶如啞。頭面赤熱。手足逆冷。右手寸關虛大微數。此熱傷手太陰氣分也。與萎蕤甘草等藥不應。為製猪膚湯一甌。令隔湯頓熱。不時挑服。三日聲清。終劑而痛如失。

同學鄭堅林夫人。素有便紅。懷妊七月。正肺氣養胎時。而

思冬溫效嗽咽痛如刺下血如崩服較平時反覺小弱而數此熱傷手太陰血分也與黃連阿膠湯二劑血止後去黃連加萎雞桔梗入中黃四劑而安

太倉州尊陳鹿屏夫人素患虛癯骨蒸經閉少食偶感風熱效嗽向來調治之醫誤進滋陰清肺藥二劑遂昏熱痞悶異常邀石頑診之脈見人迎虛數而氣口濡細寸口管管而兩尺搏指此肝血與胃氣皆虛復感風熱之象與加減葱白香豉湯一服熱除痞止但效則頭面微汗更與小劑保元湯調之而安

同道王公峻子於四月間患感冒昏熱喘脹便秘腹中雷鳴服硝黃不應始圖治於石頑其脈氣口弦滑而按之則其腹脹滿而按之則濡此痰溼扶瘀濁陰固閉之候與

醫通卷之二

醫考按

十一 思得堂藏

黃龍湯去芒硝易桂苓半夏木香下瘀垢甚多因宿有五更效嗽更以小劑異功加細辛調之大抵腹中奔響之證雖有內實當下必無燥結所以不用芒硝而用木香苓半夏用人參者借以資助胃氣行其藥力則大黃輩得以振破敵之功非謂虛而兼補也當知黃龍湯中用參則硝黃之力愈銳用者不可不慎

戴尹閔介眉甥媳素稟氣虛多痰懷妊三月因臘月舉夏受寒遂惡寒不食嘔逆清血腹痛下墜脈得弦細如絲按之欲絕與生料乾薑人參半夏九二服不應更與附子理中加苓半肉桂調理而康門人問曰嘗聞桂附半夏孕婦禁服而此並行無礙何也曰舉世皆以黃芩白朮為安胎聖藥桂附為墮胎峻劑孰知反有安胎妙用哉蓋子氣之

安危係乎母氣之偏勝若母氣多火得苓連則安得桂附則危母氣多痰得苓半則安得歸地則危母氣多寒得桂附則安得苓連則危務在調其偏勝適其寒溫世未有母氣逆而胎得安者亦未有母氣安而胎反墮者所以全匱有懷妊六七月胎脹腹痛惡寒少腹如扇用附子湯溫其藏者然證證不果不得妄行是法一有差誤禍不旋踵非比苓木之誤猶可延引時日也

館師吳百川子年二十餘素有夢交之疾十月間患傷寒頭寒足冷醫用發散消導屢汗而昏熱不除反加喘逆更一醫用麻黃重劑頭面大汗喘促愈甚或者以為邪熱入裏主用苓連或者以為元氣大虛議用冬地爭持未決始求治於石頑診之六脈皆管按之欲絕正陽欲脫亡之兆

醫通卷之二

醫考按

十一 思得堂藏

急須參附庶可望其回陽遂疏回陽反本湯加童便以飲陽一劑稍寧三啜安臥改用大劑獨參湯加重便調理數日類與稀糜而安

洪德敷女於壬子初冬發熱頭痛胸滿不食已服過發散消導藥四劑至第六日周身痛楚腹中疼痛不時奔響屢欲圓而不可得口鼻上唇忽起黑色成片光亮如漆與珞瑯無異醫者大駭辭去邀石頑診之喘汗脈促而神氣昏憤雖證脈俱危喜其黑色四圍有紅暈鮮澤若痘瘡之根脚緊附如線他處肉色不變許以可治先與葛根黃芩黃連湯加厚角連翹荆防紫荊人中黃解其肌表毒邪俟其黑色發透乃以涼膈散加入中黃紫荊烏犀微下二次又與犀角地黃湯加入中黃之類調理半月而安此證書所

不裁惟麗安常有玳瑁瘰之名。而治法未備。人罕能識。先是牙行徐順溪患此。誤用發散消剋藥過多。胃氣告匱。辭以不治。又綱舖王允吉姪患此。瀕危。始邀予往。其口目鼻孔皆流鮮血。亦不能救。一月間。親歷此證十餘人。大抵黑色枯焦不澤。四圍無紅暈。而灰白色黯者。皆不可救。其黑必先從口鼻。至權頰目胞兩耳。及手背足脛。甚則胸腹俱黑。從未見於額上肩背陽位也。有武員隨任家丁黃姓者。患傷寒半月。道經吳門。泊舟求治。詢其同伴云。自渡淮露臥受寒。恣飲燒酒發熱。在京口服藥行過兩次。熱勢畧減。而神昏不語。不時煩擾。見其脣舌亦腫燥裂。以開水與之。則嚙不與。則不思。察其兩寸管皆虛大。關寸小弱。按入六脉皆虛。曰。此熱傳手少陰心經也。與導赤瀉心湯一服。神

識稍寧。泊舟一日夜。又進二貼。便溺自知。次早解維復延往診。而脉靜神安。但與小劑五苓去桂。易門冬二貼。囑其頻與稀糜。可許收功也。
錢順所素有內傷。因勞力感寒。發熱頭痛。醫用表散藥數服。胸膈痞悶不安。以大黃下之。痞悶益甚。更一醫用消剋破氣藥。過傷胃氣。遂厥逆昏憤。勢漸瀕危。邀石頑診之。六脉紫紫如蜘蛛絲。視其舌上焦黑燥潤異常。此熱傷陰血。不急下之。真陰立槁。救無及矣。因以生地黃黃連湯去黃芩防風。加入中黃麥門冬酒大黃。另以生地黃一兩酒浸搗汁和服。夜半下燥矢六七枚。天明復下一次。乃與生脉散二貼。以後竟不服藥。日進糜粥調養。而大便數日不行。魄門迸迫如火。令用導法通之。更與異功散調理而安。

陳瑞之七月間。患時疫似癰。初發獨熱無寒。或連熱二三日。或暫可一日半。日發熱時煩渴無汗。熱止後則汗出如瀉。自言房勞後乘涼所致。脈過十味香薷九味羌活柴胡枳桔等十餘劑。煩渴壯熱愈甚。因邀石頑診之。六脉皆洪盛搏指。舌胎焦枯。脣口剝裂。大便五六日不通。病家雖言病起於陰。而實熱邪亢極。胃府剝腐之象。急與涼膈加黃連石膏人中黃。得下三次。熱勢頓減。明晚復發熱煩渴。與白虎加入中黃黃連。熱渴俱止。兩日後左頰發願。一時時即平。而氣急神昏。此元氣下陷之故。仍與白虎加入參犀角連翹。順復煥發。與犀角連翹升柴桔鼠粘馬勃二服。右頰又發一毒。高腫赤亮。另延瘍醫治其外。調理四十日而痊。同時患此者頗多。良由時師不明此為溼土之邪。初

起失於攻下。藥用發散和解。引邪泛濫而發。腫毒多有腫發綿延。以及膈胸肘臂數處。如流注潰腐者。縱用攻下解毒。皆不可救。不可以為發願小證而忽諸。
山陰令景昭侯弟介侯。遠東人。患時疫。寒熱不止。舌胎黃潤。用大柴胡下之。煩悶神昏。雜進人參白虎補中益氣。熱勢轉劇。頻與茶連知母不應。因遣使兼程過吳。相邀石頑到署。診之。左脉弦數而勁。右脉再倍於左。而過身俱發紅斑。惟中腕斑色皎白。時湖紹諸醫羣集。莫審胸前斑子獨白之由。因詢之曰。良由過服苦寒之劑。中焦陽氣失職。所以色白。法當透達其斑。兼通氣化。無慮斑色不轉也。遂用犀角連翹山梔人中黃。晝夜兼進二服。二便齊行。而斑化熱退。神清食進。起坐徐行矣。昭侯嘆侯。同時俱染其氣。竝

進葱白香豉入中黃連翹薄荷之類皆隨手而安。
吳介臣傷寒餘熱未盡曲池雍腫不潰不消日發寒熱湯
醫禁止飲食兩月餘日服清火消毒藥上氣形脫倚息不
得卧渴飲開水一二口則腹脹滿急大便燥結不通兩月
中用蜜導四五次所去甚難勢大瀕危邀石頑診之其脉
初按綿綿按之絕無此中氣盡盡之兆豈能復勝藥力耶
乃令續進稀糜湯前以鴨炙之香氣透達徐以汁暖之是
夕大便去結糞甚多喘脹頓止飲食漸進數日後腫亦漸
消此際雖可進保元獨參之類然力不能支僅惟穀肉調
理而安近松陵一人過餌消導胃氣告匱聞穀氣則欲嘔
亦用上法不藥而痊

徽商黃以寬風溫十餘日壯熱神昏語言難出自利溏黑

舌胎黑燥唇焦鼻燥先前誤用發散消導藥數劑煩渴彌
甚恣飲不徹乃求治於石頑因論之曰此本伏氣鬱發更
遇於風遂成風溫風溫脉氣本浮以熱邪久伏少陰從火
化發出太陽即是兩感變患最速今幸年壯質強已逾三
日六日之期證雖危殆良由風藥性升鼓激週身元氣皆
化為火傷耗真陰少陰之脉不能內藏所以反浮攷諸南
陽先師元無治法而少陰例中則有救熱存陰承氣下之
一證可借此以迅掃久伏之邪審其鼻息不軒知腎水之
上源未絕無慮其直視失渡也時欲醫胡晨敷在坐相與
酌用涼膈散加入中黃生地黃急救垂絕之陰服後下瀉
黑三次舌胎未潤煩渴不減此杯水不能救車薪之火也
更與大劑涼膈大黃加至二兩兼黃連犀角三下方得熱

除於是專用生津止渴大劑投之舌胎方去而津回渴止
此證之得愈者全在同人契合無分彼此得以挽回設異
論紛紛徒滋眩惑安保其有今日哉

上仁淵祖道臺時疫大義○謹按時疫之邪皆從溼土鬱
蒸而發土為受盛之區平時污穢之物無所不受適當歲
氣併臨則從分野疎豁之隅蒸騰鬱發不異瘴霧之毒或
發於山川原陸或發於河井溝渠人觸之者皆從口鼻流
入募原而至陽明之經脉必右盛於左蓋溼土之邪以類
相從而犯於胃所以右手脉盛也陽明居太陽之裏少陽
之外為三陽經之中道故初感一二日間邪犯募原但覺
皆微畏寒頭額暈脹胸膈痞滿手指痠麻此為時疫之報
使與傷寒一感便發熱頭痛不同至三日已後邪乘表虛

而外發則有昏熱頭汗或咽腫發斑之患邪乘裏虛而內
陷或挾飲食則有嘔逆痞滿嘈雜失血自利吐衄之患若
其入平素津枯兼有停滯則有譫語發狂舌胎黃黑大便
不通之患平素陰虛則有頭面赤熱足膝逆冷至夜發熱
之患至於發呃發噦冷汗喘乏煩擾癰癤等證皆因誤治
所致也大抵傷寒之邪自表傳裏溫熱之邪自裏達表疫
癘之邪自陽明中道隨表裏虛實而發不循經絡傳次也
以邪既伏於中道不能一發便盡故有得汗熱除二三日
復熱如前者有得下裏和二三日得見表熱者有表和復
見裏證者總由邪氣內伏故屢奪屢發不可歸咎於調理
失宜復傷風寒飲食也外解無如香豉葱白連翹薄荷之
屬內清無如滑石苓連山梔人中黃之屬下奪無如硝黃

之屬。如見發熱自利。則宜葛根。芩連。胸膈痞滿。則宜枳桔。香附。嘔吐呃逆。則宜藿香。芩連。衄血下血。則宜犀角。丹皮。發斑咽痛。則宜犀角。牛旁。煩渴多汗。則宜知母。石膏。愈後食復勞復。則宜枳實。梔殼。隨證加減。梔殼。茯苓。丹皮。芍藥之類。皆為合劑。而香散。人中黃。又為時疫之專藥。致乃黑豆。所愈。得淫熱之氣。釀成敗壞之質。故能引領內邪。從巨陽。蒸汗而解。人中黃。本甘草所製。漬以薄荷。專解藏府惡毒。從下而泄。同氣相求之妙。莫過於此。以其總解溫熱時行。外內熱毒也。當知其證。雖有內外之殊。一皆火毒為患。絕無辛溫發散之例。每見窮鄉無醫無藥之處。熱極恣飲凉水。多有決然汗出而解者。此非宜寒涼不宜辛熱之明驗。乎。况當庚申金運。比政少陽相火司天之歲。目今又在三。

氣之中。主令客氣俱屬相火。一切風燥辛熱。皆不可犯。每見時師用羌獨柴前蒼芷芎防之類。引邪上逆。亢熱彌甚。者。以風燥之藥。性皆上升橫散。如爐冶得鼓鑄之力也。用朴半橫榔。青皮。木香等耗氣之藥。胸膈愈加痞滿者。掘苗助長之道也。有下證已具。而遲疑不敢攻下。屢用芩連不應者。此與揚湯止沸不殊也。至於發狂譫語。舌胎焦黑而大便自利。證實脈虛。不可攻者。及煩熱痞悶。冷汗喘乏。四肢逆冷。六脈虛微不受補者。皆難圖治也。時疫變證多端。未能一一曲盡。謹陳大畧數則。庶不負惠恩之澤。及黎庶垂問。芻蕘也。

飛時治鄭月山女。寡居二十載。五月間忽壯熱多汗。煩渴耳聾。脇痛。月山為女科名宿。謂證屬傷寒。委之他醫。用柴

葛桂枝等劑。其熱彌甚。汗出不止。胸滿昏沉。時時噫氣。逆氣。診之。右脈數大。左脈少神。舌胎微黑。此伏氣自內少陽發出。故耳聾脇痛。法當用白虎清解。反行發表。升越其邪。是以熱渴轉甚。汗出多。故左脈無神。胃液耗。故昏沉胸滿。其噫氣者。平素多鬱之故。今元氣已虛。伏邪未解。與涼隔去補黃。易枯蔓根。丹皮。竹葉。一服熱減得睡。但汗不止。倦難轉側。或時欲嘔。此虛也。以生脈加棗仁。茯神。白芍。扶元飲。陰兼進粥飲。以扶胃氣。渴止汗斂。而脈轉虛微。欲絕。此正氣得補。而虛火潛息之真脈也。復與四君歸地。調補而痊。

暑熱論者證看

素問云。因於暑。汗則喘。靜則多言。

暑氣內擾於營則汗。上迫於肺則煩喘。內干於心則多言。

總不離乎熱傷心胞而蒸肺經之證也。

金匱云。太陽中暈。發熱惡寒。身重而疼痛。其脈弦細。孔遲。小便已。洒然毛聳。手足逆冷。小有勞。身即熱。口開。板齒燥。若

發其汗則惡寒甚。加溫鍼則發熱甚。數下之則淋甚。

太陽中暈。發熱惡寒。身重而疼痛。此因暑而傷風露之邪。

手太陽標證也。太陽小腸屬火。上應心胞。二經皆能創金

燥肺。肺受火刑。所以發熱惡寒。似乎足太陽證。其脈或見

弦細。或見孔遲。小便已。洒然毛聳。此熱傷肺胃之氣。陽明

本證也。發汗則惡寒甚。氣虛重奪其津也。溫鍼則發熱

醫通卷之二

九 思得堂藏

甚者。重傷經中之液。轉助時火肆虐於外也。數下之則淋

甚者。劫其在裏之陰。熱勢乘機內陷也。此段經文本無方

治。東垣特立清暑益氣湯。足補仲景之未逮。

太陽中熱者。暈是也。汗出惡寒。身熱而渴。白虎加人參湯主

之。

此無形之熱。傷脾胃之氣。所以多汗惡寒而渴。故用白虎

以化熱。人參以益氣也。

太陽中暈。身熱疼重而脈微弱。此以夏月傷冷水。水行皮中

所致也。一物瓜蒂湯主之。

此因冷水灌汗。有形之水。鬱遏皮毛。閉其汗滲。所以身熱

疼重。故用一物瓜蒂湯湧吐。則陽氣發越。汗大泄而熱愈

矣。後人不識效用。每以五苓散加葱豉。或梔子散湯。竝用

探吐皆効

王節齋曰。夫暑者。相火行令也。夏月人感之。自口齒而入。傷

心胞絡之經。其脈多虛。或浮大而散。或弦細孔遲。蓋熱傷氣

則氣消而脈虛弱。其證身熱汗出而喘。煩渴多言。倦怠少氣。

或下血發黃生斑。甚者火熱燔金。致金不能平木。搖搖不省

人事。治暑之法。以去溼熱。清心利小便為主。氣傷宜補。真氣

為要。又有惡寒。或四肢逆冷。甚者迷悶不省。而為霍亂吐利。

痰滯嘔逆。腹滿瀉利。此非暑傷。乃因暑而自致之病也。若行

人或農夫。於日中勞役得之。此熱傷陽證也。必苦頭痛發熱

汗泄。肌膚大熱而渴。乃天熱外傷元氣也。宜益元散白虎湯

竹葉石膏湯選用。若避暑於涼亭水閣得之。此暑傷陰證

也。必頭痛惡寒。身形拘急。肢節疼痛而煩心。肌膚大熱無汗

醫通卷之二

九 思得堂藏

此為陰寒所遏。使周身陽氣不得伸越。宜消暑十全散。或腹

痛水瀉者。胃與大腸受之。局方香薷飲。惡心者。胃中有痰飲

也。香薷飲下消暑丸。伏暑大熱水瀉脈數。可用黃連香薷飲

若外既受寒。內復傷水。生冷腹痛泄瀉。霍亂吐逆。藿香正

氣散養胃湯選用。若飲食過多。吐瀉腹痛。脈沉微者。大順散

若真陽虛人。房室不慎。復傷生冷。腹痛極瀉。利脈沉弦者。冷

香飲子。甚則霍亂吐利。通身冷汗不止。脈伏或脫者。急用漿

水散救之。庶可十全一二。暑氣攻裏。腹內刺痛。小便不通。生

料五苓散加木香。小便血者。導赤散加辰砂。伏暑霍亂。腹痛

泄瀉如水。身熱足冷者。五苓散下來復丹。傷氣困倦。身有微

熱。頭重吐利。小便赤澀。十味香薷飲。傷暑欬嗽發熱。盜汗

不止。脈數者。熱在肺經。清暑益氣湯。冷水澡浴。致暑溼相持

白虎湯

喻嘉言曰。體中多濕之人。外暑蒸動內濕。二氣交通。最易中暑。所以肥人溼多。夏月百計避暑。反為暑所中者。不能避身之溼。即不能避天之暑也。益元散驅溼從小便出。夏月服之。解暑。體盛溼多。則宜之。清癯無溼之人。津液為時火所耗。當用生脉散充其津液。若用益元散安利小便。竭其下泉。枯槁立至。故凡汗多之人。即不可利其小便也。○小半夏茯苓湯治暑。治其溼也。少加甘草。即名消暑丸。見消暑在消其溼。理明辭正矣。又如益元散加辰砂。則并去其熱。五苓散加人參。則益虛。加辰砂減桂。則去熱。白虎湯加人參。則益虛。加蒼朮則勝溼也。中暑必顯躁煩熱悶。東垣做仲景竹葉石膏湯制方。名清燥湯。仍以去溼為首務。夫燥與溼相反者也。而清

燥亦務除溼。非東垣具過人之識。不及此矣。○古方治暑風。用蘇合香丸。大非。今人治暑。藥用香薷飲。大謬。按香薷辛淡。辛能發散。淡能滲泄。乃夏月解表利水之劑。果身熱煩躁嘔吐。小便不利者。合黃連以解暑。靡不應手獲效。若氣虛胃弱之人。食少體倦。自當多服參耆。豈能堪此滲泄。苟誤用之。是虛其虛也。至於奔走勞役而中熱者。用此溫散之劑。復傷其氣。如火益熱矣。今人不分虛實。當否。夏月少有不快。一藥用之。所謂習俗成訛也。夏月無故卒倒。皆不知人。面垢冷汗自出。手足微冷。搖擲。或吐瀉。或喘渴。此君相二火。內外相煽。兼之素有痰鬱。因火鼓動。窒礙心竅故也。宜先以熱土熨臍中。或研蒜水灌鼻中。皆取其通竅也。○石頑曰。按中暑卒然倒仆。如中風者。乃盛寒之氣。卒犯少陰。而厥逆無脈。此陽氣大虛。不勝陰寒。屬氣也。必口鼻氣冷。而無痰聲。雖盛暑中亦有之。以其人與陽素虛之故。不可拘於時月也。中暑卒然暈倒。如中風者。乃酷暑之氣。鼓運其痰。壅塞心胞。此腎水素虧。不勝時火燔灼也。必喘乏而無痰聲。若中風卒倒。則必手足搐引。痰聲湧塞於喉中。甚則聲如拽鋸。為中風之真候。以此辨之。萬無差誤也。或問。喝暑用白虎清暑香薷等法。何以為辨。石頑曰。中喝用白虎湯。熱傷形之治也。用人參白虎湯。兼傷無形之氣也。中暑用生脉散。暑傷無形之氣也。用清暑益氣。暑傷於氣。兼挾風熱乘虛而傷其經也。傷暑用十味香薷。風熱淫雜合而傷形氣也。偏於表則變香薷飲為治暑十全。偏於裏則變香薷飲為六和湯。此夏月鼎峙三法也。其用消暑丸者。上盛之溼。

泛溫而為痞滿也。用益元散者。下盛之熱阻滯而為滿。滿也。用大順散者。水果內傷於脾也。用冷香飲者。冷食內傷於胃也。用來復丹者。陰氣固結於下也。用五苓散者。陽氣遏絕於內也。近世醫人治夏月諸病。不論虛實寒熱。藥用香薷飲。既開汗孔。復利水道。且杜中氣。況於方中必除去人參。增入枳殼。檳榔。重耗其氣。而痞滿發熱煩躁愈劇。此除補之不可。瀉之不可。惟梔子豉湯。隨證加入甘草生薑等味。以和之。夜甚者。導亦散加丹皮白芍以調之。次以生料六味調之。虛甚躁渴者。合生脈以滋金水之源。此前賢未之及也。當知治暑。賜諸證。汗液大泄。中氣先傷。雖有脈滿潮熱。最忌攻下。以無形之熱不能隨藥下散也。即有頭額重痛。最忌發汗。凡表藥皆能升舉。痰食濁氣支撐膈上也。而肥人溼熱素盛。加以暑

醫通卷之二

思得堂藏

氣相搏。則為溼溫。證必自汗足冷。漉漉如從水中出。脈雖沈細而小便必赤。滿不可誤認陰寒。而與溫藥亦不可。因其頭重身疼。而與發汗。誤汗身青色變者。大劑竹葉石膏湯可救之。亦有因其痞滿喘脹。誤與下藥者。大劑桂苓丸可療之。惟誤用附子者。雖有合劑不能起矣。至於胸熱勞形卒然倒仆。方書用道途中熱土置當胸。更使聚瀾其腹。并搗生薑汁注鼻孔。其立法最精。惜乎未經闡發。世都不解。殊不知此雖酷烈為患。良由其人真元素虧。加以時火亢極。鼓激命門之虛陽。欬然離根。非藉道中之熱土往來人之熱瀉。不能護衛其陽。使之歸源。用蒜汁注鼻孔者。取蒜以開竅。溫散其鬱閉之熱。所謂熱因熱用。溫能除大熱也。若與冷水灌之。濕之漬之。則氣隨喘息而蒸絕不返矣。間有元氣不大虛人真

火原未離根。不勝亢熾而倒者。用水灌漬。亦有得甦者。因是思夫一見熱倒。便以水灌。既灌不蘇。雖虛扁不能復甦矣。診。經云。脈虛身熱。得之傷暑。此暑傷元氣也。仲景以弦細批遲為傷暑。以暑傷氣而不傷形。所以氣消而脈虛弱也。大抵脈來虛大無力。或小弱皆本氣虛。而為暑所中。不足之證也。若得洪盛數疾之脈。皆熱氣熾灼而為暑所傷。為有餘之邪。至若內傷寒冷。及中寒脈沉緊之類。雖當夏月。却與暑證無預。

羅謙甫治一人。夏月胸項多汗。兩足逆冷。譫語。關前濡關後急。當作溼溫治。經曰。溼溫之脈。陽濡而弱。陰小而急。濡弱見於陽部。溼氣持暑也。小急見於陰部。暑氣蒸溼也。蓋先傷溼而後傷暑。暑溼相搏。是名溼溫。先與白虎加參。次

醫通卷之二

暑

思得堂藏

換蒼朮。三日而愈。又治一蒙古。因食酒肉。羶乳得霍亂吐瀉。從朝至午。精神憤乏。脈皆浮數無力。知所傷之物已出。即於墻陰掘地約二尺。貯新汲水。攪動一時。澄定。用清者一杯。調蒼朮白朮散。徐徐服之。吐瀉遂止。翌日微煩渴。遂與錢氏白朮散。時時服之而愈。

滑伯仁治一人。病自汗如雨。目赤身熱。口燥心煩。盛暑中帷幕周匝。以至亡陽服。附數劑。脈虛而洪數。舌上胎黃。曰。前藥誤矣。令撤慢開窗。以黃連解毒入參白朮。三進而汗止。渴用冰水調益元散。七日而愈。

石頑治禮部員外申菽。施。頗熱過梁溪。歸而眩暈。脈督發熱。便閉。服黃連香薷。不應。用涼膈散便通。或時昏眩。不省。或時四肢清冷。而時時為甚。邀石頑診之。脈得弦細而沉。

此暑傷心包陽氣鬱伏所以有似陰寒也與生脈合保元清理肺胃則包絡自寧矣

溼 溼熱

經云諸溼腫滿皆屬於脾。○地之溼氣感則害入皮肉筋脈。○陽受風氣陰受溼氣。○身半已下者溼中之也。○傷於溼者下先受之。○聲如從室中言是中氣之溼也。○溼勝則濡。○因於溼者如裏。溼熱不攘大筋緩短小筋弛長。緩短為拘弛長為痿。因於氣為腫。四維相代陽氣乃竭。

首為諸陽之會其位高其氣清其體虛故聰明係焉却按溼土之濁氣薰蒸清道不通故沉重不利似乎有物蒙之失而不治溼鬱為熱熱留不去熱傷血不能養筋故為拘攣溼傷筋不能束骨故為弱痿。素嘗氣疾溼熱加之氣溼熱爭故為腫諸陽受氣於四肢也今人見膝間關節腫痛全以風治者誤矣。

風寒暑皆能中人惟溼氣積久留滯關節故能中非如中風寒暑之暴也。外中溼者或山嵐瘴氣或天雨溼蒸或遠行涉水或久卧溼地則溼從外中矣其證關節疼痛頭重體疼腹脹煩悶皆不知入或四肢倦怠腿膝腫痛身重浮腫大便泄瀉小便黃赤羌活勝溼湯若一身盡痛為風溼相搏除風溼羌活湯肢體煩疼頭重鼻塞或見泄利或下清血為風木之邪內于溼土神木湯溼毒下血大便泄瀉四肢沉重升陽除溼防風湯若腰已下重者為溼滯經絡滲溼湯。○然病有傷中之不同傷溼者足太陽膀胱經也中溼者足太陰脾經或足少陰腎經傷膀胱則煩渴引飲小便不利而腫脹五苓散著脾則四肢浮腫不能屈伸大便多滑此醇酒厚味水溼等物所傷溼從內中也除溼湯若腎則腰疼身重小便不利此

醉臥溼地或下體溼衣所傷溼從外中也。腎者陽溼盛身疼小便不利。體重發渴者五苓散加羌活。治溼在上在外者當微汗。羌活勝溼湯在下在內者當利小便。五苓散東垣云治溼不利小便非其治也。然亦不可過治。病去六七即當改用理脾之劑。如水去其地猶溼。若過用之。腎水受虧矣。

羅謙甫云。春夏之交。病如傷寒。其人汗自出。肢體重痛。轉側難。小便不利。此名風溼。非傷寒也。陰雨之後。卑溼。或引飲過多。有此證。但多服五苓散。小便通利。溼去則愈。切忌轉屬發汗。小誤必不可救。初虞世云。醫者不識妄作傷風治之。發汗死。下之死。已未京師大疫。正為此。羅得其說。救人甚多。大抵五苓散能分水去溼。胸中有停飲。及小兒吐乳。欲作痢。五苓散最妙。以中有桂。辛溫能散肝脾之結耳。戴復菴云。五苓

醫通卷二

濕

失一思得堂藏

散仲景本治太陽汗溼之邪。自經犯本。故取治風溼。自汗肢體重痛。渴而小便不利者最宜。若無煩渴。小便不利者。此邪猶在經。宜用羌活勝溼湯。或除風溼羌活湯選用。不必拘於前說也。

戴人曰。夏月人之腠理疎豁。元氣不閉。故易於傷風。傷風如汗出未拭而風閉之。則為風溼。素有熱而溼臨之。則為溼熱。溼久苑亦然也。元氣素虛而受溼。則為寒溼。或受於地。或受於天。或受於酒醪。雖乳治者宜分別之。如風溼小建中加黃耆白朮羌活防風。溼熱苓桂朮甘湯。寒溼小青龍加減陽虛者。去麻黃加熟附白朮。或麻黃加朮湯。○溼家無汗身煩寒者。麻黃加朮湯。○傷溼而兼感風。則眩暈嘔逆煩熱惡風不欲去衣被。或額上微汗。或身體微腫。汗漬衣溼。當風坐臥多

有此證。麻黃杏仁薏苡甘草湯。或羌活勝溼湯。令微發汗。若大發汗。則風去溼在。已得汗而發熱不去者。敗毒散加蒼朮防己。○傷溼又兼感寒。則牽掣痺痛。無汗慘慘煩痛。五積散。○風溼脈浮。身重汗出惡風者。防己黃耆湯緩服。○風溼相搏。身重煩疼。不能自轉側。不嘔不渴。脈浮虛而澀者。桂枝附子湯。若其人大便硬。小便自利者。白朮附子湯。骨節煩疼。痺痛。不得屈伸。近之則痛劇。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。或身微腫者。甘草附子湯。

喻嘉言曰。人身陽盛則輕。陰盛則重。著乃至身重如山。百脈痛楚。不能轉側。而此不用附子。回陽勝溼。更欲何待。在表之溼。其有可汗者。用附子合桂枝湯以驅之外出。在裏之溼。其有可下者。用附子合細辛大黃以驅之下出。在中之溼。則

醫通卷二

溼

失一思得堂藏

用附子合白朮以溫中而燥脾。今之用白朮。雜入羌活枳朴。拖橋等藥。且無濟於事。況用枳實滑石。舟車導水等法乎。○溼家不可發汗。以身本多汗。易至亡陽。故溼溫之說。誤發其汗。名曰重喝。故為深戒。若久冒風涼。以水灌汗。抑鬱其陽者。又不得不微汗之。○溼家當利小便。此大法也。而真陽素虛之人。汗出小便滿。正泉竭而陽欲出亡之象。若以為溼熱。恣膽利之。真陽無水維附。頃刻脫離而死矣。

溼熱。○賈真孫曰。溼為土氣。熱能生溼。故夏熱則萬物溼潤。秋涼則萬物乾燥。溼病本不自生。因熱而轉溼。不能宣行水迫。故停滯而生溼也。況形盛氣弱之人。易為感受。豈必水流而後為溼哉。人只知風寒之威嚴。不知暑溼之炎熾。感於真寒之中也。原病式曰。諸運項強。皆屬於溼。或附腫體寒而有

水氣必小便赤少或渴。是蓄熱又裏極深。非病寒也。治法宜
理脾清熱利小便。為上。治溼不利小便。非其治也。溼證有二。
溼熱證多。溼寒證少。當以脈證明辨之。如脈滑數。小便赤澀。
引飲自汗。為溼熱證。若小便自利清白。大便溇利。身疼無汗。
為寒溼也。溼熱身黃如橘子色。而小便不利。腹微滿者。茵陳
蒿湯。身黃小便不利而渴者。五苓散加茵陳。煩熱小便不利
而渴者。桂苓甘露飲。溼熱相搏者。清熱滲溼湯。肩背沉重疼
痛。上熱胸膈不利。及遍身疼痛者。屬外因之溼熱。當歸拈痛
湯。其人平素陰虛多火。加之走精者。溼熱精衰也。虎潛丸。或
拈痛加龜版白朮牡蠣。溼熱之屬於裏者。則水腫小便不利。
當與五苓神片輩。分輕重以泄之。後用實脾之劑調理。若夫
陰水腫脹。另詳水腫本門。

石頑曰。昔人有云。溼熱一證。古所未詳。至丹溪始大發其奧。
故後世得以宗之。殊不知其悉從東垣痺證諸方悟出。然其
所論。皆治標之法。絕無治本之方。及讀仲景書。至痞論中。則
溼熱治本之方具在。蓋傷寒誤下。則有痞滿之變。然亦有不
經攻下而痞者。皆由痰氣逆滿之故。故仲景特立瀉心湯諸
法。正以祛逆上之溼熱也。溼熱證類最多。如鼓脹水腫。嘔逆
吞酸。黃疸滯下。腰腿重痛。腳氣痺著等候。悉屬溼熱為患。然
皆別有所致而然。咸非溼熱之本病也。嘗見蒼黑肥盛之人。
及酒客輩。皆素多溼熱。其在無病之時。即宜常服調氣利溼
之劑。如六君子加黃連沉香澤瀉之類。夏秋則清燥湯。春夏
則春澤湯加薑汁竹瀝。使之日漸消弭。此謂不治已病治未
病也。及乎五旬內外氣血向衰。漸至食少體倦。或胸腹痞滿。

或肢體煩疼。或不時舉發。或偶有所觸而發。忽然胸高喘脹。
煩悶嘔逆。甚至上下不通者。須乘初起元氣未衰。急投控涎
丹十餘粒。不下。少頃再服。當此危急之時。下必死。下之庶
或可生。此係專攻溼熱痰涎之藥。不可與稍黃輩同視也。世
醫舍此。而用香燥之劑。未有不相引喪亡而已。以與身偕老
之固疾。因元氣衰憊而驟然惜發。已為九死之候。更兼誤治。
必無生理。慎勿復藥。自貽其咎也。又有素稟溼熱而挾陰虛
者。在青梁輩。每多患此。以其平時嬌養。未慣馳驅。稍有憂勞。
或縱慾酒色。或暑溼氣交。即虛火挾痰飲上升。輕則胸膈痞
滿。四肢乏力。重則周身疼痛。痰嗽喘逆。亦有血溢便秘。面赤
足寒者。甚則癱厥癱廢不起矣。大抵虛肥痰盛之人。則外盛
中空。加以陰虛。則上實下虛。所以少壯犯此最多。較之中年

已後觸發者更劇。而治又與尋常溼熱迥殊。若用風藥勝溼。
虛火易於僭上。淡滲利水。陰津易於脫亡。專於燥溼。必致真
陰耗竭。純用滋陰。反助痰溼。上壅。務使潤燥合宜。剛柔協濟。
始克有賴。如清燥湯虎潛丸等方。皆為合劑。復有陰陽兩虛。
真元下衰。溼熱上盛者。若乘於內。則不時喘滿眩暈。溢於外。
則肢體疼痛重麻。若見此即當從下。真寒上假熱。例治之。否則
防有類中之虞。即如痰厥昏仆。舌強語澀。或口角流涎。或口
眼喎斜。或半肢傾廢。非內熱招風之患乎。歷觀昔人治法。惟
守真地黃飲子多加竹瀝薑汁。送下黑錫丹。差堪對證。服後
半日許。乘其氣急稍平。急進大劑人參入竹瀝薑汁童便。時
時中分三次服之。喘滿多汗者。生脈散以收攝之。若過此時。
藥力不逮。火氣復升。補氣之藥。又難突入重圍矣。服後元氣

精充喘息稍定。更以濟生腎氣丸。雜以黑錫丹一分。緩圖收功。可也。至於但屬陽虛而陰不虧者。斷無是理。雖有邪淫干之。亦隨寒化。不能為熱也。即使更感客邪。自有仲景風濕寒淫治法。可推。不似陰虛濕熱之動輒扼腕也。其淫熱挾外感諸例。另詳緒論本條。

診。石頭曰。淫脈自緩。得風以播之。則兼浮緩。寒以束之。則兼沉細。此皆外傷於淫之診也。若淫中三陰。則脈有沉緩沉細微緩之分。治有戒附。蓋附桂附之異。蓋沉緩沉細為太少二陰寒淫之本。脈入所易明。獨厥陰脈見微緩。世所共昧。今特申之。夫厥陰為風木之藏。內藏生陽。雖有淫者。風氣內勝。鼓激其邪。流薄於經絡之中。所以脈不能沉。而見陽浮陰緩之象。是知微緩亦厥陰受邪之本脈。觀仲景厥陰例中。可以

醫通卷之二

淫精

三

思得堂藏

類推。至於淫襲經中。得人身濁氣。蘊釀而為淫熱。則脈多梗大。若浮取較大而按之滑者。淫并在胃之痰也。浮取較大而按之濡者。淫傷營經之血也。淫寒淫熱之辨。大畧不出乎此。羅謙甫治中山王知府子。年十三。六月中暴雨水泛。戲水淫衣。至精神昏憤。怠惰嗜臥。次日頭痛身熱。腿脚重。一醫用和解發散。重衾覆之。致苦熱不禁。遂發狂言。欲去其衾。而不得汗。至四更。淫透其衾。明日循衣撮空。又以承氣下之。語言不出。四肢不能收持。有時項強。手足癱瘓。指急而舉。目左視而白睛多。口唇肌肉蠕動。羅視之。具說前由。蓋傷淫盛暑之時。過發其汗。更復誤下。虛熱生風。發瘧也。與保元湯加升柴芍藥五味甘草。二日。語聲漸出。四肢柔和。飲食漸進而愈。

丹溪治一人患淫氣。背如負二百觔重。以腎著湯加桂心。猪苓。澤瀉。酒。茶。木通。蒼朮。服之而愈。又治一人腰似折。膝如冰。用除淫湯加附子。半夏。厚朴。蒼朮。而愈。石頭治沉汝。攪子。夏月雨。膝脛至脚痛極。僵挺不能屈者十餘日。或用敷治之法。不効。其脈較大而數。令拭去敷藥。與當歸拈痛湯二劑。汗出而愈。

原病式云。諸瀉枯涸。乾勁皺揭。皆屬於燥。乃陽明燥金。肺與大腸之氣也。蓋風熱火同陽也。寒燥溼同陰也。然燥金雖屬秋陰。而異乎寒溼。反同其風熱也。故火熱勝則金衰而風生。風熱勝則水竭而為燥也。燥之為病。皆屬燥金之化。然能令金燥者。火也。故繁辭曰。燥萬物者。莫熯乎火。夫金為陰之主。為水之源。而受燥氣。寒水生化之源。竭絕於上。而不能灌溉。周身榮養百骸。色乾而無潤澤皮膚者。有自來矣。或大病尅伐太過。或吐利津液內亡。或養生誤餌金石。或房勞致虛。補陽燥劑。辛熱太多。皆能偏助狂火。而損真陰。陰中伏火。日漸煎熬。血液衰耗。便燥熱轉甚。而為諸病。在外則皮膚皺揭。在上則咽鼻生乾。在中則水液衰少。而煩渴。在下則腸胃枯涸。

賢通卷之二

業

仇

思得堂藏

津不潤而便難。在手足則痿弱無力。在脈則細澹而微。此皆陰血爲火熱所傷。法當治以甘寒滋潤之劑。甘能生血。寒能勝熱。陰陽滋而火殺。液得潤而燥除。源泉下降。精血上榮。如是則陰液宣通。內神茂而外色澤矣。

盛啟東云。浚治之法。其理不出乎滋榮潤燥。流通血氣而已。且人身之中。水一火五。陽實陰虛。皆終嗜慾無節。以致腎水受傷。虛火爲患。燥渴之病生焉。或前後秘結。或痰在咽喉。乾路不出。此皆津液不足之故。而火動元傷。腎虛惡燥也。理宜補養水中金。使金水相生。出入升降。浚澤流通。何燥之有。喻嘉言曰。燥之與淫。有霄壤之殊。春月地氣動而淫勝。秋月天氣肅而燥勝。故春分以後之淫。秋分以後之燥。各司其正。奈何內經獨道燥氣。詳病機。諸氣贖鬱。皆屬於肺。諸痿喘呃。

皆屬於上。二條明指燥病而言。生氣通天論謂秋傷於燥。上逆而欬。發爲痿厥。燥病之要可一言而終。紙緣內經失却長夏傷於溼句。致誤傳秋傷於燥爲傷溼。而解者競指燥病爲溼病。宜乎經旨之不明也。戴人有云。休治風。今休治燥。治得火時風燥了。斯治燥之要。亦一言而終也。老人多有大便後寒熱。發作有時。頗似外感。實非外感也。大便努掙傷氣。故便出則乘於陽。而寒頃之稍定。則陽勝陰而熱。若果外感之寒熱。何必大便後始然耶。世醫遇此證。每謂溼熱內蘊。而用滑利之劑以驅之。不知瘦人。身中以溼爲寶。有溼則潤。無溼則燥。今指燥爲溼。是欲出而反閉其戶也。

石頑曰夫燥有藏府之燥有血脈之燥燥在上必乘肺經故上逆而欬宜千金五味子湯若外內合邪者千金麥門冬湯

歐陽通卷之一

—

機

思得堂藏

風熱心煩脾胃熱壅食不下者。千金地黃煎。積熱煩渴。日晡轉劇。喘欬面青。能食便秘者。生地黃煎主之。燥於下必乘大腸。故大便秘結。然須分邪實津耗血枯三者爲治。邪實則大煩渴躁悶腹脹通幽湯。潤燥湯。清涼飲。四順清涼飲。麻仁丸。大腸風秘血燥。潤腸丸。加郁李仁。防風。名潤燥丸。潤而下之。能食熱盛。可用猪膽導法。津耗者。屢欲便而不可得。圓欲了而不了。使出仍是大塊。異功散加二冬沉香。用麻仁。搗水煎服。兼嚼蘇子胡麻之類。外用蜜煎導。或削陳醬瓜導之。亦佳。血枯者。嘔逆食不下。大便日漸燥結如栗。生料六味丸。云山萸。加生何首烏當歸煎服。或生料六味丸加肉蓯蓉桃仁搗水煎服。兼食人乳酥蜜之類。但從蓉鹹腐。服之每令嘔吐。不可不知。老人氣血俱耗竭者。固本丸作膏服。若至嘔逆不食。

便如羊矢不可治矣。燥在血脈多見風證。木無所畏也。燥木火氣之餘。故以滋燥養營湯治外。大補地黃湯治內。潤燥養陰為第一義。火熱亢甚。津液耗竭。不能榮養百骸。手足痿弱。不能收持。反似痺淫之證。發陰藥中必加黃蘗以堅之。如虎潛丸之類。若誤作風治則殆矣。

診。凡物近火則潤。離火則燥。猶金之投入烈火而化為液也。故燥證多有反似痺弱之證者。熱傷陰血也。燥有內外諸證。不能盡述。其在皮膚則毛焦皺揭。在大腸則脾約便秘。在肺經則乾欬痰結。在肺臟則悲愁欲哭。證雖各異而脈之微細瀉小則一。間有虛大數疾浮扎等狀。以意察之。重按無有不瀉不細不微者。則知諸燥之證皆肺金之一氣亦不出肺金之一脈也。

火

經云。壯火之氣衰。少火之氣壯。壯火食氣。氣食少火。壯火散。少火生氣。亢則害。承乃制。制則生化。外列盛衰。害則敗。生化大病。

火在丹田之下者。是為少火。少火則生氣。離丹田而上者。是為壯火。壯火則食氣。食氣之火。是為邪火。生氣之火。是為真火。故少火亢極則為壯火。夫五行之道。亢極則承。亢而過甚。則害乎所勝。而承其下者。必從而制之。此天地自然之理也。六氣雖屬外因。而火氣鬱發。未有不因諸內者。內經除亢則害一說。屬諸六氣勝復。餘皆不離身中偏勝之機也。

丹溪云。火水木金土。各一其性。惟火有二。曰君火。曰人火。曰

相火。天火也。見於天者。出於龍雷。則木之氣出於蕤則水之氣也。具於人者。寄於肝腎。肝屬木而腎屬水也。膽者肝之府。膀胱者腎之府。心包絡者腎之配。三焦司肝腎之分。皆陰而屬火也。天非此火不能生物。人非此火不能有生。或曰。相火天火所同。何東垣謂為元氣之賊。蓋相火易起。五性厥陽之火相煽。則妄動矣。火起於妄。變化莫測。無時不有。煎熬真陰。陰虛則病。陰絕則死。故曰。相火元氣之賊。岐伯歷舉病機一十九條。而屬火者五。原病式曰。諸風掉眩。皆屬於肝。火之動也。諸氣喘鬱。皆屬於肺。火之升也。諸溼腫滿。皆屬於脾。火之勝也。諸痛癢瘡。皆屬於心。火之用也。是火皆出於藏府者然也。按心為君火。而又有相火寄於肝腎。即內經所謂一水不能勝二火也。五性之火。為物所感而動。即內經所謂一水不

能勝五火也。又凡動皆屬火。故氣鬱火起於肺。大怒火起於肝。醉飽火起於脾。思慮火起於心。房勞火起於腎。此五藏所動之火也。然而六府皆然。如牙痛齲宣。腮頰頰腫。此胃火之所傷也。目黃口苦。坐臥不寧。此膽火之所動也。舌胎喉痛。便秘不通。此大腸之火動也。癰閉淋瀝。赤白帶濁。此小腸之火動也。小腹作痛。小便不利。此膀胱之火動也。頭眩體倦。手足心熱。此三焦之火動也。○凡人一身。只陰陽二氣。陽氣生發。陰氣皆化為血。陽氣不足。陰氣皆化為火矣。陰虛火動者。難治。如八味九桂附之類。虛火可補。如保元湯參耆之類。實火可瀉。如解毒湯三黃之類。鬱火可發。如火鬱湯升柴之類。凡火盛者。不可驟用寒涼。必兼辛散。如瀉陰火升陽湯。升陽散火湯之類。氣壯脈實。火盛顛狂者。可用硝黃正治。如虛火盛而狂亂。以生薑湯從治之。若投以硝黃正治立危。一切壯火。狂陽痰氣。上衝膈膜。流入心包。諸藥不効。內外熱熾者。和劑紫雪可以平之。積熱咽腫。口舌生瘡。煩躁妨悶。水漿不下。碧雪主之。好餌丹石。藥毒迅發。壯熱不已者。千金朴硝煎主之。凡氣有餘便是火。氣從左邊起者。肝火也。佐金丸當歸龍薈丸。從臍下起者。陰火也。八味丸黑錫丹。五志過度。喜怒悲思不節。正氣亢鬱。變而為火者。於醫門求之。此治火之大畧也。趙養葵云。以火言之。有陽火。有陰火。有水中之火。有土中之火。有金中之火。有木中之火。陽火者。天上太陽之火。生於寅而死於酉。陰火者。燈燭之火。生於酉而死於寅。此對待之火也。水中火者。霹靂火也。即龍雷之火。無形而有聲。得雨而益熾。見於李春而伏於李夏。原夫龍雷之見也。以五月一陰生。

水底冷。上天熱。龍為陽物。故隨陽而上升。冬至一陽來復。故龍亦隨陽下伏。雷亦收聲。人身腎中相火。亦猶是也。以平日不能節慾。致命門火衰。腎中陰虛。龍火無藏身之位。故遊於上而不歸。是以上焦煩熱。欬嗽等證。善治者以溫腎之藥。從其性而引之歸源。行秋冬陽伏之令。而龍歸大海。此至理也。奈何今之治陰虛火者。以黃檗知母為君。而愈寒其腎。益速其斃。良可悲哉。若夫陰虛火旺者。此腎水乾枯。而火偏盛。宜補水以配火。亦不宜苦寒之品。以滅火。壯水之主。以制陽光。正此謂也。如燈燭火。亦陰火也。須以膏油養之。不得雜一滴寒水。得水則滅矣。獨有天上火入於人身。如六氣溫熱之病。及傷熱中喝之疾。可以涼水渥之。可以苦寒解之。其餘爐中火者。乃灰土中無焰之火。得木則烟。見溼則滅。須以灰培實。以溫燼人身。脾土中火。以甘溫養其火。而火自退。經曰。勞者溫之。損者溫之。甘能除大熱。溫能除大熱。此之謂也。又空中之火。附於木中。以常有坎水滋養。故火不外見。惟乾柴生火。燎原。可以止遏。力窮方止。人身肝火內熾。鬱悶煩躁。須以辛涼之品發達之。經曰。木鬱達之。火鬱發之。使之得遂。其炎上之性。若以寒藥下之。則愈鬱矣。熱藥投之。則愈熾矣。金中火者。凡山中金銀之鑛。或五金埋瘞之處。夜必有光。此金鑛土中。而不得發越。故有光輝於外。人身皮毛竅中。自覺鍼刺咬咬及癢。頂如火炎者。此肺金氣虛。火乘虛而現。肺主皮毛。故也。東方木實。因西方金虛也。補北方之水。即所以瀉南方之火。雖曰治金中之火。而通治五行之火。無餘蘊矣。○藏府雖皆有火。總不離於君相。蓋君火為陽火。可以直折。相火為龍。

火僅可溫順導之歸源。又何患乎。今人率以知藥治相火。殊不知相火寄在肝腎之間。乃水中之火。龍雷之火也。若用苦寒。則龍雷之火愈發矣。龍雷之火。每當濃陰驟雨之時。火焰愈熾。其勢誠不可遏。惟太陽一照。火自消滅。此得水則熾。得火則滅之一驗也。惟八味丸桂附與火同氣。直入腎中。據其窟宅而招之。同氣相求。相火安得不引之歸源耶。且人身豈可一刻無火。譬之元宵之鰲山走馬燈。拜者舞者。飛者走者。無一不具。其中間惟是一火耳。火旺則動。速火微則動。緩火熄則寂。然不動而拜舞飛走之軀殼。未嘗不存也。是以老人以火為用。而少年惟恐多火。老年惟恐無火。無火則運化艱而易衰。有火則精神健而難老。是火者。老人性命之根。未可以水輕折也。昔賢治喉乾。謂八味丸為聖藥。譬之釜底加薪。

則釜中津氣上騰。理則然矣。可見下虛者。不但真陰虛。究竟真陽亦虛耳。命門之火。乃水中之火。相依而永不相離也。火之有餘。緣真水之不足也。毫不敢去。火只補水以配火。壯水之主。以制陽光。火之不足。因見水之有餘也。亦不必瀉水。就於水中補火。益火之源。以消陰翳。診○石頑曰。按脈法云。浮而洪大為虛火。沉而實大為實火。其說似是而實紕繆。火性熾烈。抑之則空。雖有虛實之分。絕無沉實之脈。詳內經二火五火之說。無不本諸三焦。三焦配合心主。代心司化育之令。即謂之君。而命門獨操其權。故謂之相。若相火妄臨五位。則為五志之火。其實一氣之亢。初無彼此。但以洪盛滿指者為實火。或炎隔上。即為心肺之火。或迫中宮。即為脾胃之火。或結下焦。即為小腸膀胱之火。分其

部位以推之。隨其微甚而調之。若弦細而數。按之益堅。為少火氣衰。而見肝腎真脈。非火使然。夫下焦之火。龍火也。水盛則蟄藏不見。其脈自平。今弦細且數。乃冰雪陰凌之象。虛勞見此。最為劇候。或反虛大數。疾為食氣之火。耗竭真陰。虛陽飛越之兆。久病得此。百不一生。惟暴脫元氣者。猶可峻補以斂固之。大抵火證之脈。但有虛大。按之必空。斷無實大之理。其火鬱中焦。惡寒戰慄。則有六脈小匿者。此火氣鬱伏灰燼。不得發光舒焰。反兼寒水勝已之化也。熱結胃口。欬吐結痰。亦有寸口滑實者。熱遺下焦。淋濁溺痛。多有尺內洪滑者。皆胃中淫濁上逆下滲之候。終與火無預也。當知火盛之脈。淨取雖洪盛滑疾。中按則軟澀不堅。重按則豁然中空。尋之脈見指傍。舉指瀟瀟然如輕刀刮竹之狀。方是無形之火。象若

醫通卷之二

火

九

思得堂藏

中宮有物阻礙。則關上屈曲而出。鬲上有痰凝滯。則寸口屈曲而上。總謂之鈞。如無阻礙。則無屈曲之象矣。若洪盛而中按重。按益實。指下累累如循貫珠。意以子狀者。皆有形之淫熱。蘊積於經脈之中。不當於火門求治也。

東垣治一人。傷寒目赤而煩渴。脈息七八至。按之不鼓。擊經曰。脈至而從。按之不鼓。諸陽皆然。此陰盛格陽於外。非熱也。與薑附之劑。汗出而愈。按此與海藏治狂言發斑身熱。脈沉細陰證例同。

丹溪治一婦。患心中如火燒。一燒便入小腸。急去小便。大便隨時亦出。脈滑數。此相火送入小腸。以四物如茶連服。香木通四劑。三年之患頓愈。

石頑治太史張弘道。精氣下脫。虛火上逆。怔忡失血證。診

其右關氣口獨顯弦象左尺稍嫌微數餘皆微細搏指
係陰火內伏之象診後乃導唯一詳述病情云自去冬
心太過精氣滑脫加以怵惕恐懼怔忡驚悸不寧都門之
醫咬用人參桂附至歲底稍可交春復劇如前遂乞假歸
吳吳門諸醫咸效用參附導火歸源固欲精氣之藥暮無
一驗轉覺委頓異常稍稍用心則心系牽引掣痛痛連脊
骨對心處或時痛引膈脇或時巔頂如揪或時臂股手足
指甲皆隱隱作痛怔忡之狀如確杵如牽繩如縶物如綳
絹如以竹擊空控引頭中如失腦髓之狀夢中嘗自作交
覺時成篇可記達旦倦息睡去便欲失精精去則神魂如
飛越之狀觀其氣色鮮澤言談聲總屬真元下脫虛陽
上擾之候細推脈證始先雖屬陽氣虛脫而過餌辛溫峻
補之劑致陽暴亢而反耗真陰當此急宜轉關以救垂絕
之陰庶可挽回前過為疏二方前用保元合四君丸用六
味合生脈服及兩月後諸證稍平但倦怠力微因自檢方
書得補中益氣湯為夏月當用之劑於中加入桂附二味
一服即喉痛聲瘖復邀診候見其面頰精采而聲音忽瘖
莫解其故詢之乃導知為升柴桂附升動虛陽所致即以
前方倍生脈服之半月後聲音漸復日漸向安但起居調
攝殊費周折衣被過暖便咽乾痰結稍涼則背微畏寒或
畏熱飲則周身大汗怔忡走精此皆宿昔過用桂附餘熱
內伏而尋出路也適有石門董戴臣謂其伏火未清非苓
連不能解散時值嘉平不敢輕用苦寒仲春戴臣復至坐
俟進藥可保萬全服數劑形神爽朗是後堅心服之至初

夏反覺精神散亂氣不收攝乃盡出從前所服之方就正
於予予謂桂附陽藥火毒之性力能上升得參以濡之故
可久伏下焦與龍潛水底不異若究其源惟滋腎九一方
為之正治但既經參連折之於上豈堪復受知榮侵伐於
下乎從頭打筭自春徂夏不離苦寒苦先入心必從火化
何敢兼用肉桂引動虛陽發其潛伏之性哉端本澄源仍
不出六味合生脈經歲常服不特壯水制陽兼得金水相
生之妙用何憚桂附之餘毒不化耶

傷飲食

內經云五藏者藏精氣而不寫也。故滿而不實。六府者傳化物而不藏。故實而不滿也。○氣口何以獨為五藏主。胃者水穀之海。六府之大源也。五味入口。藏於胃。以養五藏。氣口亦太陰也。是以五藏六府之氣味。皆出於胃。變見於氣口。經言水穀之寒熱。感則害人六府。又曰陰氣者。靜則神藏。躁則消亡。飲食自倍。腸胃乃傷。此乃混言之也。分之為二。飲也。食也。飲者水也。因而大飲。則氣逆。形寒飲冷。則傷肺。肺病則為喘。欬為腫。滿為水瀉。輕則發汗利小便。上下分消其澤。如重而蓄積為滿者。利下之。食者物也。因而飽食。筋脈橫解。腸澼為痔。又飽食勞力。傷太陰厥陰。則氣口滑大於人迎兩倍三倍。或嘔吐痞滿。或下利腸澼。當分寒熱輕重治之。輕則內

醫通卷之二

傷飲食

思得堂藏

消重則除下。亦有宜吐者。所謂在上者因而越之也。然不可過劑。過則反傷脾胃。蓋先飲食自傷。加之藥過。脾胃復傷。而氣不能化。食愈難消矣。

趙養葵云。今方家治傷飲食者。以平胃散為主。出入增減。以為脾胃之準繩。平胃者。胃中有高阜。則使平之。一平即止。不可過劑。過劑則平地反成坎矣。而枳朮丸尤勝。今人以此丸為補脾藥。朝服暮餌。更有益之。橘半香砂者。則又甚矣。至若山查神麴麥芽三味。舉世所常用者。蓋山楂能化肉積。產婦兒枕痛者。用炒黑山楂砂糖水煎服。兒枕立化。其性消積破血。豈可輕用。麴蘖者。以米與水在甕缸中。必藉麴以釀成酒。必藉蘖以釀成糖。脾胃在人身。非甕缸比。原有化食之能。今食不化者。其所能者病也。只補助其能而食自化。何必用此。

消起之藥哉。大凡元氣完固之人。多食不傷。過時不微。若人先因本氣不足。致令飲食有傷。前藥一用。飲食雖消。但脾胃既已受傷。而復經此一番消化。愈虛其虛矣。明後日食復不化。猶謂前藥已効。藥力欠多。湯丸並進。展轉相害。羸瘦日增。良可悲哉。

東垣論飲食勞倦。為內傷不足之證。而王安道又分飲食傷為有餘。法當消導。東垣自有枳朮丸等方。勞倦傷為不足。專立補中益氣湯主治。其傷食之證。胸膈痞悶。吐逆噯酸。噯敗卵臭。畏食頭疼。發熱惡寒。病似傷寒。但氣口脈大於人迎。身不痛耳。宜裕痰運脾。二陳加枳朮麴蘖山楂香附之類。挾氣脈沉加木香青皮。○停食感冒。芍蘇散加消導一二味。食滯中宮。胸膈痞悶。噯氣發熱。頭痛。有類外感。藿香正氣散。苦七

醫通卷之二

傷飲食

思得堂藏

八日不大便。口乾煩躁。臍上硬痛。枳實導滯丸。○因憂氣食。溼麴結於中脘。發熱腹皮底微痛。心下痞滿。不思飲食。食之不化。常常痞氣。木香化滯湯。○食積痞滿。消瘦發熱。保和丸。虛加白朮二兩。名大安丸。調理之。○食滯心下。初起不可驟用苦寒。必兼辛散。二陳平胃消導之。及枳實白朮青皮陳皮。山楂麴蘖之類。以食得寒則凝。得熱則腐也。日久成積發熱者。加薑汁炒川連連翹之屬。清利之。若已成痞。日久生熱。燥結不行。方可用承氣輩攻下之。如冷物停滯作吐。二陳加炮薑白豆蔻茶朮厚朴神麴藿香之類。甚則廣茂巴豆之屬。若冷食停滯。心腹臍痛作脹。常用紅丸子備急丸。溫下之。痰飲結聚。穀不得入。冷痰宿食在上脘者。用白散湧吐之。痰食已消。中焦未和。不思飲食。或吐或瀉。倦怠而黃。按之心下輟。

脾胃受傷也。六君子加木香砂仁。燥渴用七味白朮散。老人虛人易於傷食。或膨脹痞悶。或腹滿泄瀉。常消補兼施。宜九味資生丸。常常服之。若口淡思食。而見食不甘。食過則厭。兼惡心胸膈不快。胃虛挾痰飲也。六君子加枳實香砂。若不思飲食。食不消化。食後反飽。脾虛不能健運也。枳實理中丸。病後飲食不調。中脘隱隱作痛。有時得食則已。有時得食。轉加。此胃中火燥作痛。得食以壓其勢。故痛少安。若飲食稍過。氣不能運轉其食。故痛轉加。連理湯加沉香。零根云。夫胃滿則腸虛。腸滿則胃虛。更實更虛。其氣乃居。若醉飽過度。或感風寒。或著氣膈。以致填塞胸中。胃氣不行。忽然厥逆昏迷。口不能言。肢不能舉。此名食厥。若誤作中風中氣治之。必死。宜煎薑鹽湯探吐之。風寒者。藿香正氣散。氣滯

者八味順氣散。吐後別無他證。只以蒼朮白朮陳皮厚朴。甘草之類調之。如遇此卒暴之病。必須審問明白。或方食醉飽。或飲食過傷。但覺胸膈痞悶。痰涎壅塞。氣口脈緊盛者。宜作食滯治之。傷諸肉食。用草菓山查。挾外感風寒。山查須用薑汁炒黑。則不酸寒收斂。兼能破血和傷。消導食積更速。傷麪食。炒萊菔子。傷麪筋。穀子等物。諸藥不能消化。俱用木物拌綠礬燒灰。砂糖酒下。二三服効。傷糯米粉食。炒酒藥。或酒麪。砂糖調。淡薑湯服。傷索粉。用杏仁炒黑。研如脂。砂糖拌。薑湯服。傷生冷菓菜。宜木香砂仁炮薑肉桂。傷蟹腹痛者。丁香紫蘇生薑。傷蛋滿悶。薑汁蒜泥。傷肉生魚鱸。必用生薑草果。炮黑山查。積久生熱。口乾噁氣。二陳加薑汁炒川連。及

消導藥

傷酒。經曰。因而大飲。則氣逆。酒入於胃。則絡脈滿而經脈虛。脾主為胃行其津液者也。若酒以入房。氣聚於脾中。不得散。酒氣與穀氣相薄。熱盛於中。故熱過於身。內熱而溺赤也。

東垣云。酒者大熱有毒。氣味俱陽。乃無形之物也。若傷之。止當發散。汗出則愈。其次莫如利小便。使上下分消其濕。今之病酒者。或以雄黃巴豆蠟相火熱之藥下之。或用牽牛大黃甘遂大寒之藥下之。是無形元氣受病。反下有形陰血。則真水愈弱。陽毒太旺。反增陰火。是以元氣消燦。折人長命。患此者。不得已用葛花解醒湯。或五苓散。加入參草豆蔻。傷酒食積發熱者。麪蘗丸。腹滿虛脹。合塌氣丸。不應神保丸。酒癰丸。

並加酒炒黃連。胃氣虛者。上法俱不可用。惟獨參湯助其胃氣。立飲神驗。喻嘉言曰。夫酒者。清冽之物。不隨濁液下行。惟喜滲入者也。滲入之區。先從胃入。膽膽為清淨之府。同氣相求。然膽之攝受無幾。其次從胃入。腸膀胱滲之。化溺為多。逮至化溺。則所存者。酒之餘質。其烈性惟膽獨當之。每見善飲者。必淺斟緩酌。以俟腹中之滲。若連飛數觥。則傾囊而出耳。靈樞云。怯士之得酒。怒不避勇士者。其氣悍悍入於胃中。則胃脹。氣上逆。滿於胸中。肝浮膽橫。當是之時。同此於勇士。氣衰則悔。名曰酒悍。蓋膽之府。原無輸瀉。善飲者。膽之熱恆移於脾。則為鼻淵。或頭面多汗。腰熱大泄。或注於腸。則大便秘。滯熱下泄。俱不為大患也。如膽之熱汁滿而溢出於外。以漸滲於經絡。

則身目皆黃。為酒痺之病。以滲而出也。轉運而納。諸勝脫從。溺道而消也。

診。氣口脈浮大。按之反滿者。有宿食也。脈數而滑者。有宿食也。脈遲而滑者。宿食作服也。氣口脈緊。寒食停滯胃中。溫消而下之。氣口脈沉緊而細。冷食傷脾。溫補兼消之。兩手脈皆模糊不清。此宿食結滯。胃氣不行。急下奪之。傷食脈有滑溢之異。脾虛不能鼓運。胃虛不能熟腐。故其脈不清而溢。溢甚則模糊不清矣。若人迎緊盛而氣口滑者。停食感冒也。

許叔微治一酒客。感冒風寒。倦怠不思飲食。已半月矣。睡後發熱。遍身疼如被杖。微惡寒。六脈浮大。按之豁然。作極虛受寒治之。用六君子加黃芩。當歸葛根。大劑與之。五服後遍身汗出。如雨。得睡。諸證悉平。

醫通卷之二

傷飲食按

思得堂藏

江南仲治一人。冬月覆舟。盡力救貨。忍饑行五十里。遇族入縱飲青樓。遂發熱四肢如火。左脇一點疼痛。小便赤滯。五日不更衣。醫作傷食治。不効。脈弦數無力。氣口倍於人迎。此醉飽竭力傷肝所致。內經所謂數脈飽以入房。氣聚於脾中。不得散。酒氣與穀氣相薄。熱盛於中。故熱遍於身。內熱故溺赤。酒氣標悍。腎氣日衰。陽氣勝。故手足為之熱也。與四君子加神麴枳殼白芥子。二服熱退。調理而愈。石頑治幼科汪五符。夏月傷食。嘔吐發熱。頗服自利。黃水遍體。肌肉捫之如刺。六脈模糊。指下尋之似有。如無。足脛不溫。自認陰寒。而服五積散一服。其熱愈熾。昏卧不省。第三日自利不止。而時常識語。至夜尤甚。乃舅葉陽生。以為傷暑。而與香薷飲。遂頭面汗出。如蒸。喘促不寧。足冷下逆。

飲醫程如倩。以其證大熱而脈息模糊。按之殊不可得。以為陽欲脫亡之候。欲猛進人參附子。雲間沈明生。以為陰證。斷無汗出如蒸之理。脈雖虛而證大熱。當用入參白虎。爭持未決。取證於石頑。診其六脈雖皆濡弱模糊。而心下按之大痛。舌上灰刺如芒。乃食填中宮。不能鼓運其脈。往往多此。當與涼膈散下之。謂醫正欲藉此脫手。聽余用藥。一下而神思大清。脈息頓起。當知傷食之脈。雖當氣口滑盛。若屢傷不已。每致濡數模糊。乃脾不消運之兆也。此證設非下奪。而與參附助其壯熱。頃刻立斃。可不詳慎而妄為施治乎。

又診葉新宇。停食感冒。而兩寸關皆濡數模糊。兩尺皆沉弦。而按之益堅。雖其人尚能行走。而脈少冲和。此必向有

醫通卷之二

傷飲食按

思得堂藏

陳氣在少腹。詢之果患寒疝數年。因緩辭。不便用藥。是夜即腹暴滿而逆。門人問曰。葉子偶抱小恙。何以知其必死而辭之。曰。凡人胃滿則腸虛。腸滿則胃虛。更實更虛。其氣乃居。今胸有微而腹有積。上下俱困。能保其不交攻為患乎。當知厥疝入腹。腳氣冲心等疾。皆是陰邪搏結。鬱積既久。則挾陰火之勢而上升。若胸中陽氣有據。則陰邪仍歸陰位。而止。今胸中先為宿食填塞。腹中陳氣不逆。則已逆。則上下俱滿。正氣無容身之地。往往有暴絕之虞。所以不便用藥。實未知其即死也。故凡診六部中病脈。有不相應處。即當審其有無宿病。不可輕忽。以招譏謗也。癸卯元夕。周徐二子。過石頑齋。頭縱飲。次日皆病。酒不能起。欲得葛花湯解。醒余曰。東垣葛花解醒湯。雖為傷酒專

劑然人稟氣各有不同。周子縱飲則而熱多渴。此酒氣皆行。陽明肌肉之分多渴。知熱傷胃氣。豈可重令開泄。以耗津液。與四君子湯去甘草。加藿香。木香。煨葛根。澤瀉。下咽。卽蘇。徐子久患稀滑。飲則面色愈青。此素常肝膽用事。腎氣并傷。酒氣皆行。筋骨所以不上潮於面。葛花胃藥。用之何益。與五苓散。加入參。倍肉桂。服後食頃。浚便如皂角汁而安。

勞倦

經曰。飲食不節。起居不時。陰受之。則入六府。身熱不時。上爲喘呼。陰虛生內熱者。有所勞倦。形氣衰少。穀氣不盛。上焦不行。下脘不通。而胃氣熱。熱氣薰胸中。故內熱。陽盛則外熱者。因上焦不通。則皮膚緻密。腠理閉塞。玄府不通。衛氣不得發泄。故外熱。勞則喘且汗出。內外皆越。故氣耗矣。

東垣云。夫喜怒不節。起居不時。有所勞倦。皆損其氣。氣衰則火旺。火旺則乘其脾土。脾主四肢。故困熱。無氣以動。懶於語言。動作喘乏。表熱自汗。心煩不安。經言。勞者溫之。夫勞之爲病。其脈浮大。手足煩熱。春夏劇。秋冬差。以黃耆建中湯治之。人受水穀之氣以生。所謂清氣。營氣。衛氣。春升之氣。皆

胃氣之別名也。夫胃爲水穀之海。脾胃氣虛。則下溜肝腎。陰火得以乘其土位。故脾病始得。則氣高而喘。身熱而煩。脈洪大而頭痛。或渴不止。其皮膚不任風寒而生寒熱。若陰火上衝。則氣高而喘。煩熱爲頭痛。爲渴。而脈洪。脾胃之氣下溜。使穀氣不得升浮。是春升之氣不行。而無陽以護其營衛。使不任風寒。乃生寒熱。此皆脾胃之氣不足所致也。然與外感風寒之證。頗同而實異。內傷脾胃。乃傷其氣。外感風寒。乃傷其形。傷其外則有餘。有餘者。傷之。傷其內則不足。不足者。補之。汗之下之。吐之。之類。皆瀉也。溫之。和之。調之。養之。之類。皆補也。內傷不足之病。苟誤認作有餘之證。而反瀉之。則虛其虛也。惟當以辛甘溫劑。補其中。而升其陽。甘寒以瀉其火。則愈矣。以陽氣下陷。故用味薄氣清之品。若升麻。柴胡。之類。

舉而揚之使地道左旋升於九天之上倘陰氣不降者用黃
黎澤瀉之類抑而降之使天道右運而入於九地之下此東
垣補中益氣為萬世無窮之利不必降也清升濁自降矣血
中伏火日漸煎熱如氣浮心亂殊安神丸鎮固之以手捫
之而肌表熱者表證也只服補中益氣湯一二服得微汗則
已非正發汗乃陰陽氣和自然汗出也如腹中痛惡寒而脈
弦者是木來剋土也小建中湯如脈沉結腹中痛理中湯如
脈緩體重節痛腹脹自利米穀不化是溼勝也平胃散燥剋
之陽下陷惡加柴胡脾下急加肉桂身體重者溼也合五
苓散如風溼相搏一身盡痛加羌防秦本升麻蒼朮勿用五
苓所以然者為風藥已能勝溼別作一服與之○內傷有虛
實之分如飲食失節勞役所傷發熱自汗倦怠乏力乃虛中

思得堂藏

之證應補益中和之劑調治無施解表若飲食過飽乃虛中
之實為其所傷飲食積滯不消以致心膈痞悶仍發寒熱惡
心惡食須用消導之劑俟其消心膈舒泰仍用益脾之藥
使無重虛元氣有宿食不消日哺熱氣實者下之亦要詳審
無過妄利故虛人飲食所傷及外感暴病新愈之後皆當用
六君子理胃為主內傷勞倦及久病之後用補中益氣理脾
為主理脾則百病不生不理脾則諸病續起久之仍入於胃
也

內外傷辨○人迎脈大於氣口為外感氣口脈大於人迎為
內傷外則寒熱俱作而無間內則寒熱間作而不齊外感惡
寒雖近火不除內傷惡寒得暖則解外感惡風乃不禁一切
風寒內傷惡風却惡門隙中賊風外感證顯在鼻故鼻息不

利而氣擁有力雖不能食而不惡食內傷證顯在口故口不
知味而腹中不和怯弱妨食惡聞食氣外感則邪氣有餘發
言壯厲先輕而後重內傷則元氣不足出言嬌怯先重而後
輕外感頭痛常痛而痛多見於腦後額上以及遍身肢體腰
脊筋骨變痛內傷頭痛時作時止不難兩太陽額顙多兼肩
背胸脇腰腿骨節痠疼外感則手背熱而手心不熱內傷則
手心熱而手背不熱外感小便赤澀而痛終日難得內傷小
便黃赤必短而頻外感燥結則發熱腹中硬痛內傷秘澀則
虛坐常見些少白膿外感胸腹結痛則痛不可按內傷有時
胃脘當心而痛上支兩脇外感則手足動搖煩擾不寧內傷
則四肢不收倦怠嗜臥東垣辨法如此然或二者兼病則其
脈必並見而難辨尤宜細心求之若內證多者則內傷重而

思得堂藏

思得堂藏

外感輕宜補養而兼散邪補中益氣加羌活若外感多者則
外感重而內傷輕宜和營而邪自解黃耆建中加當歸
內傷如為熱中病似外感陽證○頭痛大作氣高而喘身熱
而煩上氣鼻息不調四肢困倦不收無氣以動無氣以言或
煩躁悶亂心煩不安或渴或不渴心火上炎對肺經則渴血
脈中有溼則不渴或表虛不任風寒目不欲開口不知味氣
口脈大於人迎兩三倍但急大而時見一代此內顯脾氣不
續之脈也補中益氣湯若有宿食則右關獨沉而滑枳朮丸
內傷未傳寒中病似外感陰證○腹脹胃脘當臍痛四肢與
兩脇拘急膈噎不通或涎唾或清涕或多溺足下痛不能任
身履地骨之無力喜唾兩九多冷陰陰作痛或妄見鬼狀腰
背肩胛脊背皆痛不渴不瀉脈盛大以瀉名曰寒中宜枳實

理中加附子肉桂益智草豆蔻兼腎藏火衰面黑足寒小便不利者八味九加鹿茸五味子

內傷似外感陽明中熱證。有天氣大熱時。勞役得病。與陽明傷熱白虎湯證相似。此脾胃大虛。元氣不足之證。因饑困勞役之後。肌熱躁悶。煩渴引飲。口鼻氣促。目赤面紅。惡熱晝夜不怠。脈大而虛。重按全無。經曰。脈虛則血虛。血虛則發熱。誤服白虎必危。當歸補血湯。

內傷似外感惡風寒證。有因勞役辛苦。腎中陰火沸騰。後因脫衣或沐浴歇息於陰涼處。其陰火不行。還歸皮膚。腠理極虛。無陽被風與陰涼所遏。以此表虛不任風寒。與外感惡風相似。其證少氣短促。懶於言語。困弱無力。不可同外感治。補中益氣加紫蘇羌活。甚者加桂枝最當。

醫通卷之二

勞倦

至

思得堂藏

勞倦所傷虛中有寒。○脾胃虛弱。不能運化。致寒物冷痰膠固於中焦。時時痞悶。不覺饑飽。其脈雖弦而按之不鼓。當溫暖以助脾健運。清理中宮。理中丸。若脾下築者。腎氣動也。去朮加桂。吐多者。氣上壅也。去朮加生薑。下多者。氣泄而不收也。還用朮。悸者。飲聚也。加桂苓。渴欲飲水者。津液不足也。倍用朮。腹中痛者。倍人參。寒多倍乾薑。腹滿者。去朮加附子。勞倦所傷虛中有熱。○饑飽勞役。損傷脾胃。元氣不足之人。其脈多弦。或洪緩。按之無力。中時一瀉。其證身體沉重。四肢困倦。百節煩疼。胸滿短氣。膈咽不通。心煩不安。耳聾耳鳴。目熱如火。視物昏花。口中沫。飲食失味。忽肥忽瘦。怠惰嗜臥。溺色變赤。或清利而數。或上飲下便。或時餐泄。腹中虛痛。不思飲食。調中益氣湯。如時顯熱躁。是下元真火蒸蒸然發也。

加生地黃漿。如大便虛坐不得。或大便秘了而不了。腹中常逼迫。氣血虛滯也。倍歸身。如無已上證。只服黃耆人參甘草。橘皮柴胡升麻。蒼朮酒黃漿。○飲食不節。勞倦所傷。腹脇滿悶。短氣。遇春則口淡無味。遇夏雖熱猶有惡寒。饑則常如飽。不喜食冷物。升陽順氣湯。○勞倦所傷。寒溫不適。身熱而疼。自汗惡寒。脈微而弱。黃耆建中湯。○饑飽勞役。胃氣不足。脾氣下溜。氣短無力。不時寒熱。早飯後轉增昏悶。須要眠。怠惰嗜臥。四肢不收。懶倦動作。五心煩熱。先服升陽補氣湯。二三劑。後服補中益氣湯。脾胃虛弱。喘促少氣。衄血吐血。門冬清肺飲。

醫通卷二

勞倦

至

思得堂藏

飲食。食不消。大便不調。小便頻數。兼肺病。濕瀝惡寒。條條不樂。而色橘不和。乃陽氣不伸故也。升陽益胃湯。王安石曰。經云。陰虛生內熱。奈何。曰。有所勞倦。形氣衰少。穀氣不盛。上焦不行。下脘不通。胃氣熱。熱氣蒸胸中。故內熱。嗟夫。此內傷之說之原乎。夫人身之陰陽。有以表裏言者。有以上下之分言者。有以氣血言者。有以身前身後言者。有以藏府言者。有以升降呼吸之氣言者。餘如動靜語默。起居之類。甚多。不必悉舉。此所謂陰虛之陰。其所指與數者皆不同。蓋勞動太過。則陽氣皆亢極而化為火矣。況水穀之氣又少入。故陽愈甚而陰愈衰。此陰虛之陰。蓋指身中之陰氣。與水穀之味耳。或以下焦陰陽為言。或以腎水真陰為言。皆非也。夫有所勞役者。過動屬火也。形氣衰少者。壯火食氣也。穀氣不

盛者勞傷元氣則少食而氣衰也。上焦不行者清陽不升也。下脫不通者濁陰不降也。夫胃受水穀故清陽升而濁陰降。以傳化出入。滋榮一身也。今胃不能納而穀氣衰少。則清無升而濁無降矣。故曰上焦不行下脫不通。然非謂絕不行不通也。但比之平常無病時則謂之不行不通耳。上不行下不通則鬱矣。鬱則少火皆成壯火而胃居上焦下脫兩者之間。故胃氣熱則上炎薰胸中而為內熱也。東垣所言正與經旨相合。固宜引此段經文於內外傷辨以為之主。乃反不引此却謂火乘土位。此不能無疑者也。又經曰勞者溫之。溫者養也。東垣以為溫涼之溫。謂用溫藥以補元氣而瀉火邪。又改損者益之。為損者溫之。又以溫能除大熱為內經所云。而備考內經並無此語。亦不能無疑者也。然溫藥之補元氣瀉火邪者。亦惟氣溫而味甘者斯可矣。蓋溫能益氣甘能助脾而緩火。故元氣復而火邪息也。夫宜用溫藥以為內傷不足之治則可以為勞者溫之之註則不可苟以補之除之抑之舉之散之等說。比類而觀則其義自著矣。

陸履京曰內傷之原有三。曰勞役傷脾。曰饑飽傷胃。曰負重傷血。三者虛實懸殊。所謂勞役傷脾者。證必發熱頭痛惡風畏食。自汗喘乏。脈必氣口虛大。平昔未慣勞役人多此。東垣補中益氣證也。饑飽傷胃者。證必黃腫痞滿喘嗽惡食。發熱身疼。脈必氣口粗大。藜藿勞苦人多此。平胃散加棗蓼。負重傷血者。在胃口則欬嘔血腥。痞滿少食。臍間隱隱刺痛。脈必氣口見弦。飽食奔馳人多此。犀角地黃湯加酒大黃。稍奪其勢。即當因病制宜。餘積不攻而去矣。

周慎齋云內傷左脈常細而濡。右脈多浮而大。陽氣下陷不能生陰。故血枯而左脈細濡。脾胃虧損不能生金。故氣虛而右脈浮大。○內傷寸口大於尺內。此陽盛脈也。保元加歸芍引下。則大脈去而陽氣亦內收也。此從陽引陰之法。○肝脈細餘脈和緩。補中加拘杞以拘杞補肝血故也。○脈氣不足用四君子。脈氣有餘用平胃散。有餘則瀉。不足則補。五臟皆然。○病重藥宜輕緩。劑宜減小。只以固中劑三四味。以俟胃氣之復。○脾氣虛而脈弦者。服補中益氣湯後必發瘧。脾氣虛而淫勝。服補中益氣湯後必患痢。此邪尋出路。仍服前湯自愈。○清陽下陷。陰火上升。若用寒藥則陽愈陷。火愈熾。火尋出路。虛者受之。或目痛或耳聾或齒痛。從其虛而散也。○脾脈盛大須防作瀉。虛陽作瀉。遇此脈必難愈。○凡胸前作脹痛者。皆陽氣不達於胸。陰氣壅塞故也。蓋陽則氣化通達。陰則痰凝氣滯。○清陽下陷。陰火上升。則為氣逆。濁氣凝滯。則為痰厥。所謂脾氣下陷。乘於腎肝而或痰厥氣逆之漸也。○脾氣上升則為清陽。下行則為邪氣。○內傷中虛表熱。或潮熱自汗。補中正方。表熱加羌防。腹中滿加附子。中氣不和加青皮神麴。間用八珍調理。氣血俱虛。十全大補。陰虛火動。脈洪大而不作瀉。六味丸。惡寒八味丸。腹痛少食理中丸。作瀉六味去熟地。加遠志沉香砂仁。不應加補骨脂肉豆蔻。倘病顛倒難辨。必從脾胃調理。○凡用補中。病熱已退。升柴不可用也。若大便秘結。小便不利。或平常見此證。此清氣下陷。補中難敷。貼無效。如熱甚不去者。甘草少故也。○如用補中。汗少肺氣不開。加用黃耆。汗多裏氣不守。加用人參。熱不退。

加用甘草。肺以下無汗。加酒黃蘗三分。渾身拘急作脹。係風寒。宜加羌防。但作脹不拘急。為內寒。宜加附子。○內傷大便閉者。補中加蘇子。枳殼杏仁。小便不利。加牛膝。汗多加白芍。減升麻。口乾加煨葛根五味子。無汗加用升麻。久病而熱不退。氣短促。用保元桂附。煩躁加當歸白芍麥冬五味。○大便欲去而不去。或者而不出。為氣虛。了而不了。為血虛。俱宜補中。氣虛加用人參。血虛加用當歸。裏急後重。初起者。屬於熱。日久作陽氣虛。陷治之。前湯加用升柴。○內傷久而不愈。潮熱微汗咳嗽。不思飲食。補中加乾薑五味。自愈。不必理痰治嗽。正氣足。則痰嗽自除矣。○凡用補中。下體痿軟。或虛弱者。不可用。當與八味丸。○凡內傷作渴。藏附子於白朮中。令其守中。以止渴也。表熱藏附子於黃耆中。欲其走表。以助陽也。

醫通卷二

勞倦

思得堂藏

○凡內傷調理脾胃。必用羌活散其肝邪。此為正治。○內傷用補中。十餘劑而無汗。及汗不至足者。難治。然亦有服至二三十劑而汗出者。若服後遍身疼痛者。亦難治。○氣虛作脹而脈虛。用補中等和中藥。脈反有力者。不治。○內傷寒熱間作。氣血兩虛。一不宜頭痛。二不宜便秘。三不宜絕穀瀉利。三者皆難治。○凡內傷誤用竹葉石膏。須防失血。過二十日必有反覆。誤服黃蘗知母等藥。須防泄瀉嘔吐。二三日便見。○內傷身無大熱。頭不甚疼。胸膈飽悶。大便不通。庸醫下之而閉。閉而復下。下而不愈。陽已將去。或遍身疼痛。不能轉動。腹內有積血。雖神氣清爽。飲食可進。亦不能治。○或問素有病人。遇勞役動作。反覺精神強健何也。曰。此陰火沸騰。扶助於內。不覺元氣之不足也。若靜養調適。反覺神倦氣弱。此陰

火已退。陽無以復。本相透露故也。診。氣口脈大而虛者。為內傷於氣。氣口脈大而時頭一端者。為內傷於血。氣口脈大而滿人迎及尺弦者。為醉飽入房。肝脾氣血俱傷。人迎脈弦而數者。為瘀血。氣口脈滑而實者。為宿食也。

汪石山治一人形長而瘦。色白而脫。年三十餘。得奇疾。遍身溫溫如蟲行。從左脚腿起。漸次而上。至頭復下。至右脚。自覺蟲行有聲之狀。醫多不識。為何病。汪診其脈。浮小而滑。按之不足。兼察形視色。知其為虛。仲景云。身如蟲行。汗多亡陽也。遂用補中益氣倍參朮。加酒炒黃蘗五分。服至二十餘劑而愈。

醫通卷之二

勞倦

思得堂藏

虛損 仲辰

素問云邪之所湊其氣必虛陰虛者陽必湊之。邪氣盛則實精氣奪則虛。脈氣上虛尺虛是謂重虛氣虛者言無常也。尺虛者行步惛然脈虛者不象陰也。此滑則生瀉則死也。形不足者溫之以氣精不足者補之以味。

金匱云勞之為病其脈浮大手足煩春夏劇秋冬差陰寒精自出疲削不能行。

其脈大者勞傷陽氣也手足煩者脾主四肢也春夏陽氣升騰而陰火僭逆故劇秋冬陰氣收藏而虛陽斂遏故瘥皆勞傷元氣之證下言陰寒精自出疲削不能行此則勞傷精氣腎肝失職之候也。

夫失精家少腹弦急陰頭寒目眩髮落脈極虛芤遲為清穀

醫通卷之二

虛損

卷二

思得堂藏

亡血失精脈得諸芤動微緊男子失精女子夢交桂枝龍骨牡蠣湯主之。

脈虛芤遲者亡血失精本虛之脈也。芤動微緊者本虛中伏有微邪肝氣內動所以魂夢不寧也。夫亡血失精皆虛勞內因之證舉世皆用滋補血氣之藥而仲景獨舉桂枝湯其義何居蓋人身之氣血全賴後天水穀以資生水穀入胃其清者為營濁者為衛營氣不營則上熱而血溢衛氣不衛則下寒而精亡是以調和營衛為主營衛和則三焦各司其職而火自歸根熱者不熱寒者不寒水穀之精微輸化而精血之源有賴矣以其亡脫既慣恐下焦虛滑不禁乃加龍骨牡蠣以固斂之蓋龍骨入肝斂魂牡蠣入腎固精皆收斂精魂之品後世鮮有用之者每每疑其止

瀉而非之殊不知二味入於石脂鍾乳已載從容金櫻益智之類則為切劑入於桂枝湯中則為固壅封藏之本藥也。至於虛勞失精悸衄腹痛煩熱口燥則於本方加膠飴為小建中虛勞裏急為營衛枯槁更加黃耆為黃耆建中此皆後天不足所致故以調和營衛為主治也。後人專用滋陰降火誤治遺害未至於劇者用此悉能挽回若夫先天腎虛致病者又當八味腎氣丸其虛煩不得眠主以酸棗湯內有乳血主以大黃蠱蟲丸已上諸治除酸棗湯外後世皆所切禁非特不敢効用亦無齒及之者良可慨夫

虛勞裏急悸衄腹中痛夢失精四肢痠疼手足煩熱咽乾口燥小建中湯主之。

虛勞裏急諸不足黃耆建中湯主之。

醫通卷之二

虛損

卷二

思得堂藏

上條言虛勞失精而裏急腹痛煩熱悸衄明係陽氣內奪之候故用小建中以和之。下條言虛勞裏急諸不足較上條虛證更劇故於前方更加黃耆以大補衛中陽氣也。

按虛勞而至於亡血失精消耗津液枯槁四出難為力矣。內經於鍼藥莫制者調以甘藥金匱遵之而用小建中湯黃耆建中湯以急建其中氣俾飲食增而津液旺也。後人樂令建中並用前胡細辛以退表熱十四味建中兼用熟附從容以補下虛均失建中之義。

虛勞腰痛少腹拘急小便不利者八味腎氣丸主之。

治虛勞腰痛少腹拘急純屬腎肝虛寒無疑而小便不利一證又似虛中有熱豈桂附所宜用乎殊不知肝既失其疎泄之權腎亦傷其生發之氣水道自難流利故以八味

腎氣之桂附以導火歸源設非辛溫蒸其至極之陽則沉
汨有加無已乃於補陰藥中稍加陽藥使陰陽適均無偏
勝之虞斯其所以為至治也

虛勞諸不足風氣百疾著頭丸主之

按腎氣丸專主表邪不解誤用涼藥傷犯脾胃自上而下
之虛勞若房勞傷精鬱火傷神自下而上由中所發之證
咸非所宜其立方全以桂枝湯和營散邪合理中丸兼理
藥誤君以薯蕷大埋脾肺毫不及乎補益腎肝醫門法律
以為虛勞不足最易生風生氣殊失全匱立方本旨

虛勞虛煩不得眠酸棗湯主之

虛煩者肝虛而火氣乘之也故特取棗仁以安肝膽為主
畧加芍藥調血以養肝茯苓甘草培土以榮木知母降火

醫通卷之二

虛損

六十一 思得堂藏

以除煩此平調土木之劑也

五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷房室傷饑傷
勞傷經絡營衛氣傷內有乾血肌膚甲錯面目黯黑緩中補
虛大黃蟲丸主之

舉世皆以參耆歸地等為補虛仲景獨以大黃蟲蟲等補
虛苟非神聖不能行是法也夫五勞七傷多緣勞動不節
氣血凝滯鬱積生熱致傷其陰世俗所稱乾血勞是也所
以仲景乘其元氣未竭先用大黃蟲蟲水蛭蟲蟅蟲等
蠕動吸血之物佐以乾漆生地菴杏仁行去其血畧兼甘
草芍藥以緩中補虛黃芩以開通熱鬱酒服以行藥勢行
乾血行盡然後純行緩中補虛收功其投陳大夫百勞丸
一方亦以大黃蟲蟲水蛭蟲蟲為主於中除去乾漆蟅蟲

桃杏仁而加當歸乳香沒藥以散血結即用人參以緩中
補虛兼助藥力以攻乾血梔子以開通熱鬱服用勞水者
取其行而不滯也仲景按證用藥不慮其峻投入方術已
畧為降等猶恐誤施故方下註云治一切勞瘵積滯疾不
經藥壞者宜服可見慎重之至也

李士材病機沙篆云古稱五勞七傷六極二十三蒸謂狀繁
多令入眩惑但能明先天後天二種根本之證無不痊安夫
人之虛非氣即血五藏六府莫能外焉而血之源頭在乎腎
氣之源頭在乎脾脾為肺母肺為生氣之宮故肺氣受傷者
必求助於脾土腎為肝母肝為藏血之地故肝血受傷者必
借資於腎水補腎補脾法當並行然以甘寒補腎恐妨胃氣
以辛溫扶脾恐妨腎水須辨緩急而為之施治或補腎而助

醫通卷之二

虛損

六十二 思得堂藏

以沉香砂仁或扶脾而難以山藥五味機用不可不洽也

虛勞之證扶脾保肺多不可缺然脾性喜溫喜燥而溫燥之
劑不利於保肺肺性喜涼喜潤而涼潤之劑不利於扶脾兩
者並列而論脾有生肺之權肺無扶脾之力故曰土旺而生
金勿拘拘於保肺火之亢以全陰氣壯水之主以制陽
光法當並行然湯火之劑多寒而損陽氣壯水之劑多平而
養陰血兩者並列而論苦寒過投將有敗胃之憂甘平恒用
却無傷中之害故曰水盛而火自熄勿汲汲乎寒涼
治虛邪者當先顧正氣正氣存則不致於害且補中自有攻
意蓋補陰即所以攻熱補陽即所以攻寒世未有正氣復而
邪不退者亦未有正氣竭而命不顧者如必不得已亦當酌
量緩急暫從權宜從少從多寓戰於守斯可矣此治虛之道

也。治實證者當去其邪。邪去則身安。但法貴精專。便臻神効。此治實之道也。惟是假虛之證不多見。而假實之證最多也。假寒之證不難治。而假熱之治多誤也。然實者多熱。虛者多寒。如丹溪曰。氣有餘便是火。故實能受寒。而余積之曰。氣不足便是寒。故虛能受熱。世有不辨真假。本末而曰。知醫者則未敢許也。

凡陰虛多熱者。最嫌辛燥。恐助陽邪也。尤忌苦寒。恐伐生氣也。惟喜純甘壯水之劑。補陰以配陽。虛火自降。而陽歸於陰矣。陽虛多寒者。最嫌涼潤。恐助陰邪也。尤忌辛散。恐傷陰氣也。只宜甘溫益火之品。補陽以消陰。沉寒自飲。而陰從乎陽矣。不知者。惟知以熱治寒。以寒治熱。所以陰虛不宜降者。則服寒反熱。陽虛不宜耗者。則服熱反寒。此無他。皆以專治旺

醫通卷之二

虛損

空一思得堂藏

氣故其病反如此。

春夏之令主生長。秋冬之令主肅殺。人知之矣。殊不知藥之溫者。行天地發育之德。藥之寒者。象天地肅殺之刑。如四物湯加黃蘗。知母。名坎離丸。舉世奉之以為滋陰上劑。降火神丹。不知秋冬之氣。非所以生萬物者。涼血之藥。常膩膈。非痰多食少者所宜。涼血之藥。多滋潤。多用必致泄瀉。普見虛勞之死。多死於泄瀉。泄瀉之因。多因於清潤。况黃蘗苦寒。若先入心。久而增氣。反能助火。至其敗胃。所不待言。川芎上竅。非火炎上氣者所宜。知母滑腸。豈元氣下陷者可服。丹溪云。實火可瀉。虛火可補。試問虛勞之火。屬之虛乎。屬之實乎。瀉之可乎。昔人云。畏知藥如鴆毒。恐其伐我命根耳。雖然。病初起而相火正隆。若燥渴而右尺滑大。暫投亦是無妨。久用斷乎

不可。故用溫補病不殆。即是滅內已受補故也。用寒涼病不減。即是增內已受伐故也。蓋溫暖之藥。像陽明君子。苟有過人。皆見之。寒涼之藥。類陰柔小人。國祚已危。人猶莫覺。其非虛損之證。皆下寒上熱。所謂水火不交者也。其重感於寒者。則下焦作痛。不感寒者。則不痛。至於上焦燥熱。則一也。上焦方苦煩熱。得寒涼之藥。則暫快。遂以為藥有功。故喜服之。不知寒涼之藥。不久下注。則下元愈寒。火為寒逼上行。則上焦之熱愈甚。展轉反覆。遂至沉痾而不救。是以寒涼補陰。非徒無益。而且有害也。

氣有餘便是火。補虛而用益氣之藥。能無助火為害乎。夫火與元氣。勢不兩立。一勝則一負。正氣旺則邪無所容矣。即血虛而用血藥。亦必兼氣藥為主。經曰。無陽則陰無以生。血脫

醫通卷之二

虛損

空一思得堂藏

者益氣。為血不自生。須得陽和之藥。乃生。陽生則陰長也。若單用血藥。血無由而生。反有傷犯中州之患矣。東垣云。人參甘溫。補肺氣。肺氣旺。則四藏之氣皆旺。精自生而形自盛也。白朮霞云。人參多服。回元氣於無何有之鄉。凡病後氣虛。及肺虛喘嗽者。並宜用之。人參補氣。功載本草。人所共知。王好古謂肺熱傷肺。王節齋謂虛勞服參必死。以故天下皆稱有毒如蟻。殊不知肺家本有火。右寸大而有力。東垣所謂鬱熱在肺者。誠當勿用。若肺虛而虛火乘之。肺方被難。非入參何以救之。古方治肺寒。以溫肺湯。肺熱以清肺湯。中滿以分消湯。血虛以養營湯。皆用入參。自內經以至諸賢。諄諄言之。以氣藥有生血之功。血藥無益氣之理。可謂深切著明。入亦奈何不悟耶。

內經論風寒暑濕燥火六氣之變。皆能失血。各當求責。若不察其所因。與藥折之。變乃生矣。服寒涼後證雖大減。脈反加數者。陽鬱也。宜升宜補。大忌寒涼。而執迷不省。復用寒涼不徹者。必死而後已。○七情妄動。形體疲勞。陽火相迫。致血錯行。脈洪多熱。口乾便澀。宜行涼藥。若使氣虛。虛寒。陰陽不相為守。血亦妄動。必有虛冷之狀。蓋陽虛陰必走是也。更驗其血之色。必瘀晦不潤。非若火盛迫血妄行之血色濃厚紫赤也。宜理中加肉桂收攝之。因氣而發者。加木香烏藥。或飲食傷胃。逆上吐衄。加香砂查麝。○咳嗽有紅。用固本丸集靈膏。脾胃虛而大便不實者。瓊玉膏。○勞嗽吐血。紅上熱下寒。四味鹿茸丸。濟生鹿茸丸選用。○腎虛風襲下體痿弱。骨節疼痛。喘嗽失精。腰腿膝脛躁作。不能起立者。安腎丸。○

醫通卷之二

虛損

奇

思得堂藏

久病虛勞失血。血枯發熱。及女人經閉血枯者。宜素問四烏鰂骨一朮茹丸。或四物換生地加菟仁。蘇蟲作丸服。○吐血成升斗者。花藥石散。然必陽虛不能制陰。陰氣暴逆者為宜。若氣盛血隨火湧者。誤用必殆。宜十灰散。若胃脘畜血上溢。犀角地黃湯加大黃下逐之。○吐血初起。多宜大黃下之。失血以下行為順。上行為逆。又言亡血虛家禁下。何也。大抵宜行者。行之於畜妄之初。禁下者。禁之於亡脫之後。不可不明察也。○積勞吐血者。血病之餘。吐血者。吐血多而久不止者。並宜獨參湯主之。氣虛有熱。保元湯加量便藕汁。即有血亦無礙。○一切失血。或血虛煩渴。躁熱不寧。五心煩熱。聖愈湯。○血證既久。古人多以胃藥收功。異功散加丹皮山藥澤瀉。效嗽更加姜糖。此虛家神劑也。○凡失血。無論衄血出於經。

效血出於心。嗽血出於肺。吐血出於胃。咯血出於腎。嘔血出於肝。唾血出於脾。但以色紫黑者為瘀積久血。色鮮紅者為暴傷新血。色淡清者為氣虛痰痰。總屬炎火沸騰。故治血以降火下行為首務。不可驟用酸寒收斂。使瘀積發熱。轉增上炎之勢。先用瑞金丹。次用童真丸。引血與火下行最速。若血色正赤。吐出即凝。別起成片如柿皮者。此守藏之血。因真陰受損而脫。雖能食倍常。必驟脫而死。若吐淡紅如肉如肺者。謂之效白血。此肺胃並傷。雖淹歲月亦終不救。虛勞精滑無度。或交寅刻夢洩。氣少力微。日漸瘦削。目視不明者。因房勞太過。腎任不交。不能約制陰火也。陽虛者鹿茸丸。蠅鹿二仙膏。陰虛者六味丸加鯨膠五味。或六味丸雜聚精丸一分合服。飲食減少難於剋運者。納氣丸。陰陽俱虛者。

醫通卷之二

虛損

奎

思得堂藏

十補丸。脾胃陰陽俱虛者。香茸八味丸。皆兼補先後天藥也。男子精未充滿。色慾過度。泄出多有。半精半血者。此勞力傷肝。肝傷不能藏血也。蓋少陰常少血多氣。厥陰常多血少氣。少陰之精氣既竭。則厥陰之血氣亦傷。是以并血泄出。腎主閉藏。肝司疏泄。氣竭肝傷。中空無主。所以二臟俱關。其治總不出上法也。若夫思慾不遂。鬱火無制。精為火擾而亡脫者。又當清利瀉火為主。設與固斂。其消愈甚矣。沈明仲曰。陰虛多火。人偶感客邪。其蒸熱數嗽。雖異平時。然察其脈。不能便顯浮緊之象。但較平時必然稍旺。慎勿輕用疎風散表。以風藥性皆上升。嗽喘咸非所宜。亦不可妄與清肺止咳。轉傷胃氣。為害不淺。當此宜暫停補藥。靜以養陰。邪自退。聽內本多火。腠理必疎。或吸熱湯稀飲。汗氣隨通。邪即

解散先哲有云陰虛火旺人元氣傷損雖有客邪切忌羌防
柴葛等升發散表之劑設不知此誤用風藥則風乘火勢火
助風威以煽動其陰邪輕則虛陽擾亂不寧重則氣隨汗脫
而斃蓋邪氣方張如日之初升雖有合劑遏之愈逆不獲已
而用藥祇宜小劑慈白香豉以解散之若陰火原不太盛小
建中黃耆建中亦無妨礙誤用保肺藥必致嗽益甚即於建
中湯稍加荖蕤細辛以搜散之俟其勢衰脈虛確遠趨以德
甘寒杜風清熱之例庶無差誤如六味合生脈去黃肉倍地
黃人參加麥冬大劑作湯晨夕兼進合標本而為施治服後
效嗽稍減熱未除此虛陽不能飲制也加牛膝龍膽以滋
下源分先後而為處裁然龍甲非九助者必不能應手也
若因飲食過度者亦宜暫停補藥以觀其勢慎勿輕與消導

醫通卷之二
虛損
思得堂藏

戕伐其胃以招虛虛之謗惟其實理中甘草乾薑二湯分別
本元及所得多少而裁用可也○因勞役饑飽者補中益氣
去升麻加煨葛提挈脾胃之清陽則邪火自降若陰虛火炎
斷無升舉之理後人不審每以升柴治陰虛火旺無不愛其
害者○虛勞不足汗出而悶脈結心悸行動如常不出百日
危矣甘草湯主之千金翼法也○若少年稟氣不足因飲食
饑飽所傷致成虛損日晡潮熱形體羸弱腹脹氣急脈來弦
數者白鳳膏最當此葛可久法也
大約咳嗽發熱始先以泄氣為主若久嗽不止必然氣虛火
旺一切耗氣之藥俱不可用如桔梗杏仁橘紅蘇子皆主疎
泄非久嗽所宜若氣耗甚者又當以保元生脈收斂之此新
久虛實不同治也

有鬱證發熱喘嗽誤用寒折致心火淫肺肺被火淫勢不得
不奔迫大腸而成泄瀉慎不可用溫補脾胃藥惟逍遙散隨
證加減多服乃効○思慮不遂心神耗散日漸發熱肌肉瘦
削而成風消內經所謂二陽之病發心脾以風熱勝氣日益
消瘦也宜多服逍遙散後用歸脾湯調理婦人血既滿而失
合男子精未充而思慮多成是證婦人則經閉血溢男子則
亡血失精並宜與順九專調衛任兼散瘀血瘀血散後更與
烏骨雞丸調補之若誤用苦寒涼血藥致脾胃滑脫者不治
娶婦師尼所欲未遑陰陽離絕鬱火亢極不得發泄而成失
合證者較之房勞更甚如則肝木鬱熱則龍火上燭致心
肺受病而喘嗽煩熱甚則迫血驟亡者有之經閉不行而吐
衄者有之此證宜開鬱降火增損柴胡湯加味逍遙散選用

醫通卷之二
虛損
思得堂藏

陰火亢極者可用滋腎丸玉燭散先瀉鬱火後服滋養之藥
如烏骨雞丸之類若鬱火不泄血氣不榮而發癰疽者去生
遠矣劉默生云虛勞多起於鬱鬱則其熱內蒸內蒸則生蟲蟲
劉默生云虛勞多起於鬱鬱則其熱內蒸內蒸則生蟲蟲侵
蝕藏則初起早為杜絕不致蔓延若遷延日久咳嗽不止
痰如白沫聲啞喉痛不可治矣脾胃泄瀉六脈細數而堅意
久臥床褥煩躁血多者不治如六脈平緩重按有神飲食不
減大肉未消二便調適者可用貝母麥冬消痰寧嗽功多開
鬱蛤蚧透骨追蟲佐以百部殺蟲獨步兼地骨皮薄荷以清
內熱橘紅甘草調中和營為主如果熱不止加青蒿龍甲骨
蒸無汗加牡丹皮每夜發熱不已加酒浸白芍血虛有傷加
茜根氣虛少食加人參脾虛大便不實加茯苓燥結加杏仁

小便不利加茯苓澤瀉但覺香中熱痛不已或時淫淫作癢者皆是瘰癧爲患宜用向東南挑頭四五十個生艾一握雄黃豆大一塊麝香二分搗爛烘熱擦脊骨膏肓百勞肺俞等穴及四肢關節間七日一次亦有用挑葉助許同艾葉一二兩分二囊盛以陳酒三觔煮乘熱熨背膏肓百勞等處不過二三次蟲從魄門而下後以六味丸合生肌散調理傳屍勞瘵亦宜用之

凡骨蒸以多汗爲易治氣虛血尚未竭也若乾熱無汗爲難治氣血內涸不能外通也○骨蒸勞嗽而見脈弦細數疾面赤如裝面黃色枯目睛無神眼眶陷下汗出如珠天柱不正指瘦如蠹聲啞咽痛嗽而加汗嗽而上喘下泄嗽而左不得眠肝脈嗽而右不得眠肺脈肉脫骨瘦而熱甚泄瀉無度而

醫通卷之二

虛損

思得堂藏

畏寒失血發熱而脈數實欬吐血及嘔血聲散骨肉相失陽事不禁暮熱如焚身熱面赤天然白及下血衄寒熱脫形脈空搏者皆不可治如病久不愈忽得氣血冲和心腎交媾陽事必舉尤宜切戒房室犯之必復愈難調治也大抵虛勞起於精衰者肝腎過勞多致亡血失精強中陰竭而死起於鬱結者內火燥津多致血結乾欬嗜食發癰而死起於藥誤者脾肺受病居多多致飲食減少喘嗽泄瀉而死此證多患於高梁不但所食柔脆且性喜服藥小病必然變重展轉戕賊不至傷殘不已試觀貧居村野有病何嘗服藥所以得盡天年明哲保身胡不自省而甘委之庸術哉面色不榮肌膚日瘦外如無病內實虛傷俗名桃花症其證必熱熱欬嗽或多汗或無汗或多痰或無痰或遲閉或泄精

或吐血或衄血或善食或泄瀉須察其所現何證何藏受傷而治之然此皆爲陰火煎熬之證治多不効室女過時不嫁男子過時不娶及少寡者多犯此證以陰火離棄陽位非但不能消燐陽分之津液陰分之津液反竭力上供陽火之消燐故肢體日削而面色愈加鮮澤也輕者嫁娶後漸愈重者雖暫愈一兩月向後必死以其軀體柔脆精氣先枯不能勝其發泄也惟少寡再醮者每多自愈以其軀體堪任也鬱火既散津液既通可不藥而愈矣

傳尸○熱毒積久則生惡蟲蝕入藏府故沉沉嘿嘿不知所苦無處不苦經年累月漸就羸瘦其證蒸熱欬嗽不止胸背痛兩目不明四肢無力腰膝痠疼卧而不寐或面色脫白或兩頰時紅常懷忿怒夢與鬼交同氣連枝多遺傳染至於

醫通卷之二

虛損

思得堂藏

死亡又傳傍人至於滅門又傳他姓極毒之禍聞者駭心辨之之法燒真安息香病人吸煙嗽不止者乃傳尸也若嗽不甚者非也瘰癧最易傳人能謹戒七情嚴避六氣常遠房室慎節飲食蟲不得傳也惟縱慾恣情精血內耗邪祟外乘凡覺元氣稍虛或腹餓飽勿入勞瘵之家或女病思男男病思女一觀其面隨即染傷不可不知治瘵之法固本爲先祛蟲次之安息阿魏蘇合沉香冰片麝香犀角龍齒獼猴肝獼猴砂雄黃皆有祛邪伐惡之靈更以天靈蓋助之然各有所宜若能食便秘而赤者合用獼猴肝獼猴爪食少便滑面青者合用天靈蓋其夫死傳妻妻死傳夫毒邪深入腎肝二藏者用骨殖中水以生甘草末收曬九次丸服服後必大瀉數行則熱邪自大便而下也其蘇合香丸芎歸血餘散鼈甲生犀散傳

死九皆治瘵之專方。若病入膏肓，不能起枯骨也。

慎柔御訓云：嘗治虛損，脈和緩而五六至，但欲嗽發熱，無惡寒咽痛，喉嚨等證，以為可治。服保元四君之類十餘劑，咳嗽畧可，熱亦微退。至二十劑外，咳嗽反盛，熱復如前，而身反不能轉側，足漸無力，至不能行而踈此何也？緣下焦腎氣衰憊，無津液滋養，百骸陽氣不能四運，脾肺之氣不能下輸，故足無力而踈。藥雖有効，病雖暫減，終不可治。若初服四君保元十餘劑，而脈細如絲，其數不改，決不可治。如細而不數者，此猶有胃氣，無腹痛作瀉，而飲食如常，可用保元參朮調理，須二三年方愈。若服藥後，數脈漸減，和緩有神，雖曰可治，亦得三月見功。年半年方可全愈。又須看年力之衰壯，精神脾胃之強弱斷之。若服藥後，脈雖和緩，而腿漸無力，如前所述，且痰

醫通卷之二

虛損

年

思得堂藏

嗽不止，脈雖緩治之無益。又或如前證，足雖無力，而熱退嗽減，飲食如平人。此脾胃尚強，猶可遷延歲月。又有如前證，六脈俱和緩，服前劑熱退，而脈漸弦，反作瀉下血。此平時火熱煎熬，血留經絡，得補藥氣血流通，邪不能留而下。下後半月十日自愈。下血時能食者不死，不能飲食，精神倦怠者，死可立待。吐血後反驟能食者，亦不可治。若見腹痛，理中湯，惡心飲食少，六君子湯，無此二證，用四君保元服之。蓋下血者邪從下緩而出也。又有變作傷風狀者，邪從上緩而散也。當服補肺助脾之藥，亦須半月而愈。凡病求汗不得汗者，不治。虛損六脈俱數，服滋陰降火之劑，不及四五十劑者，猶可治之。如服至百劑，真元耗盡，脈洪數而無神，雖用補劑而洪數變為細數，必漸瘵困不起而斃矣。又或服寒涼未多用保元

四君加生薑一二十劑，求汗不出，而洪數之脈不退，亦難救治。或雖無汗而洪脈漸減，病亦漸去，且能飲食，此為可治。如

此之脈大抵秋冬易治，春夏難療。凡虛損脈六七至，若逢春夏火令，津液枯槁，腎水正行，死絕之期，肺絕脾燥，無有不死者。若秋冬火令已退，金水正旺，脈雖數可治也。設病者骨立聲啞，喉痛寒熱腹疼作瀉，而脈細數亦屬不治。凡病延至三四月服藥，其不効者，必過用寒涼，五臟愈虛，邪火愈熾。初用補藥數劑，邪火一退，反覺頭眩惡心，骨疼脚痠，神氣皆憊，不思飲食，倘脈不細數而帶和緩，急用保元四君大劑連服便安。寢半日，雖覺精神頓爽，再服再寢，飲食漸增，則為可治。倘脈細如絲，腹痛昏憤者難治。凡久病人脈大小浮沉弦滑而三部不勻，或寸浮尺沉，或尺浮寸沉，但見病脈

醫通卷之二

虛損

年

思得堂藏

反屬可治。如久病浮中沉俱和緩，細察無神，而體倦甚者必死。再看其面色光潤，此精神皆發於外，死期速矣。凡虛損見數脈為胃氣不足，若轉弱為胃氣生發之兆，乃少陽春升之氣也。凡虛損病久，脈雖和緩，未可決其必瘵。蓋久病之人，元氣虛弱，脈反和緩，假氣也。遇七八月間，服補劑，病得漸減，此生機也。或延至十一月一陽初動，陽氣漸升，內氣空虛，無以助生發之氣，則變憎寒壯熱，服補劑十餘貼，寒熱漸退，猶可延捱調理。至二三月不變，則生否則不治。緣春夏木旺，脾肺久虛，氣衰不能敵時令耳。凡醫新病初時有邪脈浮數，服按病藥數劑，數脈即退，病已向安。再數劑則倦脈反浮數，此時不可為尚有邪也。蓋邪退而神氣初轉，故浮。只宜保元湯調養元氣，浮數之脈得微汗而退，倘不識此，仍以祛

邪之藥治之。則變虛勞矣。久病服藥後。六脈俱和。偶一日診。或細或數。或虛弱。或變怪異常。即當細問起居之故。或因一夜不睡而變者。或因勞役憤怒。或因感冒風寒。各隨其感而治之。久病欬嗽氣喘。若脈數者。不可用補藥。加服之虛火一退。多令人疲倦不起。須先用獨參湯。稍加陳皮以接其氣。數日後。脈數漸退。方與調理。

診。石頑曰。金匱云。男子平人。脈大為勞。極虛亦為勞。脈浮者。裏虛也。脈虛浮弦為短氣。目眩。衄血。脈大者。春夏劇。秋冬瘳。男子脈浮弱而澀者。為無子。精氣清冷。虛弱微細者。善盜汗。出脈沉小遲者。泄瀉。食不化。脈虛孔遲。及諸孔動微緊。男子失精。女子夢交。緊數之脈。表裏俱虛。緊為寒傷。數為血不足。脈見短數。則無胃氣。細數緊數。俱非吉祥。脈洪大按

醫通卷之二

虛損

三思得堂藏

之虛者。須防作瀉。凡見數脈難治。病久脈數。尤非所宜。脈忽浮瀉而數。忽沉弱而緩。變易不常。虛火之故也。虛損轉潮熱泄瀉。脈短數者。不治。虛損脈得大者。屬陽虛。細數者。屬陰虛。乳為失血。若兩手俱乳。而中有一部獨弦者。為有瘀血。未盡當散。瘀為先。不可驟補。若見數大者。為火旺。必難治。若見清脈來至者。亦不可治也。弦數為骨蒸。自上而下者。必寸口浮數。自下而上者。必尺中弦急。若關尺俱弦細而急。如循弦。緩者。不治。又尺中弦強者。必因房室發熱。加之誤服寒涼。故脈如是。然虛損之人。雖遠房室。其尺脈之弦強。必不能便軟。若更犯房室。明日反和。此陰陽得交。故爾暫軟。後日診之。其弦強必愈甚。診察之際。不可不辨也。

一石頑治牙行陶廣涵子。傷勞欬嗽失血。勢如泉涌。服生地

汁。墨汁不止。余及門周子。用熱童便二升而止。邀石頑診之。脈得弦大而虛。自汗喘乏。至夜則煩擾不寧。與當歸補血湯。四貼而熱除。時覺左脇刺痛。按之漉漉有聲。此少年喜酒負氣。嘗與人鬪狠所致。與澤朮藥銜湯。加生藕汁。調服。大便即下。紫黑血塊數日乃盡。後與四烏鯁骨一蔥茹為末。分四服。入黃芩雞腹中煮。嗽。留藥渣丸。盡劑而血不復來矣。

又治顏汝玉女。病虛羸寒熱。腹痛裏急。自汗喘嗽者三月餘。屢更醫藥不愈。忽然吐血數口。前醫轉邀石頑。同往診候。其氣口虛瀉不調。左皆弦微。而尺微尤甚。令與黃耆建中。加當歸細辛。前醫曰。虛勞失血。身不用滋陰降火。反行辛燥乎。余曰。不然。虛勞之成。未必皆本虛也。大抵多由誤

醫通卷之二

虛損

三思得堂藏

藥所致。今病欲成勞。乘其根帶未固。急以辛溫之藥。提出陽分。庶幾挽回前失。若仍用陰藥。則陰愈亢而血愈逆上矣。從古治勞。莫若金匱諸法。如虛勞裏急。諸不足。用黃耆建中。原有所祖。即腹痛悸。亦不出此。更兼內補建中之制。加當歸以和營血。細辛以利肺氣。毋慮辛燥傷血也。遂與數貼。血止。次以桂枝人參湯數服。腹痛寒熱頓除。後用六味丸。以養仁易更肉。或時間進保元。異功當歸補血之類。隨語調理而安。余治虛勞。當屏絕一切虛勞之藥。使病氣不致陷入陰分。深得金匱之力也。

門人進問虛損之治。今人恆守肝只是有餘。腎只是不足。二語咸以清熱平肝為務。吾師每以扶脾益肝建功。其旨云何。石頑答曰。夫嗽雖言肺病。而實本之於胃。內經欬論

有云。其本在胃。頗關在肺。其義可見。至於平肝之說。關係匪輕。肝為生發之藏。主藏精血。精血內充。證脈俱無。即見也。凡虛勞裏急。亡血失精。煩熱脈弦。諸證。良由生氣內乏。失其柔和。而見乖戾。似乎邪熱有餘之象。是須甘溫調補。以扶生發之氣。審係陰虧。則壯水以制陽。陽虛則培土以厚載。使之榮茂。而保其貞固。詎可復加削伐。而損既病之胃氣乎。

復問虛損之宜於扶脾益肝。敬聞命矣。先哲治按中。多有三黃四物等方者。何也。答言。風土不同故也。西北之人。恆食煤火。煤為水土之精英。得水益熾。作食食之。能助真火。真火過極。則為壯火。壯火散氣。是以西北之人。患中風者多。虛羸者少。即或有之。惟以苦寒清火為務。雖有虛證。無

醫通卷之二

虛損

七言

思得堂藏

藉辛溫也。東南之人。惟食薪火。薪果水土之慄悍。得水即滅。作食食之。專助龍火。龍火飛騰。則為邪火。是以東南之人。患中風者少。虛羸者多。縱有肝邪。最忌苦寒傷中之劑。雖有木鬱。難於升發也。然西北之人。豈無真陽虛弱。宜用溫附者。東南之人。豈無邪熱亢極。宜用辛連者。當知北人稟賦雖強。以水為事。真陽耗竭。非峻投辛烈。烏能扶元氣於無何有之鄉。南人稟賦雖薄。恣情自恃。邪火暴逆。非暫用苦寒。何以救真陰於將竭之頃哉。庸師但知辛熱有助陽之功。易知有損陰之患。苦寒有傷中之慮。易知有救陰之力歟。

張氏醫通卷之二終

張氏醫通卷之三

清

長洲石頑張

璐路玉

男

以柔安世

日本

大泉長菴前田安宅子仁

男

典子守

寒熱門

發熱

東垣云。仲景論內外不足。發熱自汗之證。大禁發汗。若飲食勞倦。雜病發熱。自汗表虛之證。認作有餘。誤用表藥。發之汗大出。而表益虛也。○身盡熱。先太陽也。從外而之內者。為外傷。手足不和。兩脇俱熱如火。先少陽也。從內而之外者。為

醫通卷之三

發熱

思得堂藏

內傷。○傷食令人頭痛。脈數發熱。但左手脈平和。身不疼痛。是也。○人迎氣口俱緊盛。或舉按皆實大。發熱而惡寒。腹不和。而口液。此內外俱傷也。○夏月火乘土位。溼熱相合。病多煩躁。悶亂。四肢發熱。或身體沈重。走注疼痛。皆溼熱相搏。鬱而不伸。故致熱也。○發熱身疼。而身如薰黃者。溼熱也。○一身盡痛發熱。日晡所劇者。風溼也。○汗出而身熱者。風熱也。○身熱脈弦數。戰慄而不惡寒者。瘧瘧也。○中脘有痰。令人憎寒發熱。惡風自汗。寸口脈浮。胸膈痞滿。有類傷寒。但頭不疼。項不強。為異。○虛煩與傷寒相似。身熱脈不浮緊。不惡寒。但熱而煩。頭不痛。○腳氣為病。大便堅。腳膝兩脛腫痛。或枯細者。當其發時。亦發熱憎寒。嘔惡。有似傷寒也。○春夏之交。發熱而渴。或微惡寒。右手脈來數盛者。溫病也。○身熱頭疼。

李士材治夏癸仲太夫人。年屆八十。因韋仲遠任閩中。憂思成疾。忽發熱頭疼。醫以傷寒發散禁食。一劑而汗如浴。喘促神昏。其脉大無力。卽令進食。而投參耆白朮橘紅甘草煨薑一劑。而喘汗差減。倍用參朮至一兩。證愈七八。惟食未強。此火衰不能生土。加熟附乾薑服二月而痊。

經云熱至則身熱吐下霍亂癰疽瘡瘍脅鬱注下腸澼腫脹嘔衄頭痛骨節變肉痛血溢血泄淋閉之病生矣。○病機云諸風掉眩皆屬於肝諸寒收引皆屬於腎諸氣脹鬱皆屬於肺諸溼腫滿皆屬於脾諸痛癢瘡皆屬於心五臟諸厥固泄皆屬於下謂下焦肝胃之病諸痿喘嘔皆屬於上謂上焦心肺之病諸熱瞋瘕皆屬於火手少陰三焦經諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火手少陰心經諸痙項強皆屬於溼足太陽膀胱經諸逆衝上皆屬於火足少陰心經諸腹大皆屬於熱足太陰脾經諸躁狂越皆屬於火足少陰心經諸暴強直皆屬於風足厥陰肝經諸病有聲鼓之如鼓皆屬於熱手太陰肺經諸病附腫疼酸驚駭皆屬於火手陽明大腸經諸水液澄澈清冷皆屬於

寒足少陰諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱足少陽
腎經
按病機十九條邵元偉分屬經藏前五條各屬五藏之病
次二條兼該上下之病後十二條分隸十二經證而河間
原病式從未論及皆偏言盛氣實邪立言若此虛者何堪
故葉氏指其治法之偏誠非過也觀十九條中除五藏上
下外其間屬火者五屬熱者四其外惟風寒溼三氣而已
況五藏中之心藏豈非亦屬火乎今以全節類諸熱門使
學者比例而觀庶寒熱熱盛之機可了然無惑矣
盛啓東云治熱須辨真假夫真熱則發熱惡寒脈數有力按
之更實煩躁口渴大便秘小便赤濇或利臭穢發言壯厲不
欲近衣者是也親手表者宜發散親手裏者宜通泄假熱亦
發熱惡寒而足必不熱脈大而虛按之微弱身雖熾熱而不

躁不渴或見虛狂躁渴而不能引飲發過頃之即止終不及聲高冒焉者也經曰寒熱有真假治法有逆從此之謂也雜病發熱陰虛於下也經云陰虛則發熱大陽在外為陰之衛陰在內為陽之守精神外馳嗜慾無節陰氣耗散陽無所附遂致浮散於肌表間而發熱也實非有熱當作陰虛治而用補養之法可也

丹溪論晝夜發熱晝重夜輕口中無味為陽虛午後發熱夜半則止口中知味為陰虛陽全陰半陽得以兼陰陰不得以兼陽也至於或晝或夜或作或止不時而發者此脾胃氣血俱虛火氣不寧之證不可拘於晝夜之候也陽虛貴在胃陰虛貴在腎益饑飽傷胃勞投則兼傷脾胃氣虛矣房勞傷腎竭力則傷肝陰血虧矣

醫通卷之三

熱

四

思得堂藏

腎虛火不歸源遊行於外而發熱者煩渴引飲面目俱赤通舌生刺兩唇黑裂喉間如烟火上衝兩足心似烙痰涎壅盛喘急氣促脈洪大而數疾無倫按之微弱者是也法當導火歸源誤用寒涼必殆即或知其本虛而用補益不辨陰虛陽虛漫投參朮則陽愈盛而陰愈虛壯熱轉增八味桂附之屬愈不敢施不得已用知藥茶連折之必至燥渴咽痛腹痛泄瀉而死凡暴熱不止脈滑數或洪盛皆為實熱宜隨表裏執輕孰重而清之或脈沉而按之實堅者為裏實必用苦寒下奪之若熱久不止脈來虛數無力服調補藥不應飲食無味或至夜煩渴或反加乾欬者此必陰血受傷當以血藥調補其陰則陽熱自化陰陽虛盛之機不可不審而急為轉關也

診○脈數為熱浮數表熱沉數裏熱無力虛熱有力實熱滑數心下結熱緩而滑為熱中半為脾胃虛熱若發熱而脈反沉細或數疾無力者病脈相反也死病熱有火者生心脈洪是也浮而濡濡而身有熱者死熱而脈靜者難治脈盛汗出不解者死脈虛熱不止者死脈弱四肢厥不欲見入食不入利下不止者死

五

五

思得堂藏

潮熱

潮熱有作有止。若潮水之來不失其時。一日一發。若日三五發者。即是發熱。非潮熱也。有虛有實。惟傷寒日晡發熱。乃胃實。別無虛證。其餘有潮熱者。當審其虛實。若大便堅滿。喜冷畏熱。心下怫然。臥卧不著。此皆氣盛。所謂實而潮熱也。涼膈散。大柴胡。下之。若胃氣消乏。精神憔悴。飲食減少。日潮。疴。病。與。去。而。五。心。常。有。餘。熱。此。屬。虛。證。宜。通。運。散。小。柴。胡。等。加。減。有。每。遇。夜。身。發。微。熱。病。人。不。覺。早。起。動。作。無。事。飲。食。如。常。既。無。別。證。可。疑。只。是。血。虛。陰。不。濟。陽。朝。用。加。味。逍。遙。散。各。川。六。味。丸。不。應。用。當。歸。補。血。湯。加。減。八。味。丸。有。潮。熱。似。游。胸。膈。痞。塞。背。心。疼。痛。氣。弱。脈。弦。服。補。藥。不。効。者。此。屬。飲。證。隨。氣。而。潮。故。熱。亦。隨。飲。而。潮。於。痰。飲。門。求。之。○氣口脈滑。內

醫通卷之二

潮熱

六

思得堂藏

有宿食。常晝發熱。明日復止者。於傷飲食門求之。

惡寒

背惡寒

經云。陽虛則外寒。奈何。曰。陽受氣於上焦。以溫皮膚分肉之間。今寒氣在外。則上焦不通。而寒氣獨留於外。故寒慄。惡寒者。雖當夏月。若遇風霜。欲得重綿。時覺瘡涼。戰慄如喪神守。此熱伏於裏。而反覺自冷。實非寒也。或曰。往往見有服熱藥而愈者。何也。曰。病熱之人。其氣炎上。鬱為痰飲。抑遏清道。陰氣不升。病熱尤甚。積痰得熱。亦為暫退。熱勢助邪。其病益深。或曰。寒勢如此。誰敢以寒涼藥與之。非殺而何。曰。古人遇戰慄之證。有以大承氣湯下。燥屎而愈者。惡寒戰慄。明是熱證。但有虛實之分耳。

醫通卷之三

惡寒

七

思得堂藏

背惡寒是痰飲。仲景云。心下有留飲。其人背惡寒。冷如冰。指迷茯苓丸。身前寒屬胃。經云。胃足陽明之脈。氣虛則身以前皆寒慄。掌中寒者。腹中寒。魚上白肉有青血脉者。胃中有寒。理中丸。表虛惡風。上焦不通。陽氣抑遏。而皮膚分肉。無以溫之。故寒慄。升陽益胃湯。開發上焦。以升陽明。出外溫之也。○外感內傷。傷食。淫痰。火鬱。皆有惡寒。非獨陽虛也。若脈浮緊。頭痛拘急。身疼微惡寒。熱起。是外感。審時令輕重發散之。脈緩弱。或氣口虛大。按之無力。兼見倦怠。手心熱。是內傷。元氣證。補中益氣湯。加桂附二三。分。以行參耆之力。且益陽氣也。脈弦滑。惡心頭痛。飽悶溢酸。是內傷宿食。從傷食治。或脈來濇伏。腹滿煩熱。喘促者。是冷食結滯於內也。當與溫消。枳實理中湯。審係肉食。加炮黑山楂一二錢。脈滑或沈。周身疼

痛而惡寒者。屬淫痰乃痰在上焦。遏絕陽氣。而然。肥人多此。宜二陳加二朮。羌防少佐桂枝。甚者先吐之。惡寒非寒。不戰而慄。從火鬱治。火鬱湯。苦鬱遏陽氣於脾土。令人惡寒者。東垣升陽散火湯。內虛裏惡。惡寒少氣。手足厥冷。少腹墜。足脛疼。痠。此陽不足也。大建中湯。背惡寒。脈浮大而無力者。為氣虛。○脈弦緊。寒熱兼作。乃瘧腫之候。須問身中有無腫處。○大抵惡寒證。除陽虛外。屬表證者多。乃表中陽氣不得發越。而然。須辛散之。○惡寒家不可過覆近火。寒熱相搏。脈道沉伏。愈令病人寒。不可過。但去被撤火。兼以和營之藥。自然不惡寒矣。婦人惡寒。尤不可近火。寒氣入腹。血室結聚。鍼藥所不能治矣。

祝仲寧治一貴婦病惡寒。日夜以重裘覆其首。起躍入沸湯中。不覺醫以為寒。祝持之曰。此痰火上騰。所謂陽極似陰也。非大下之。則火不殺。下經宿而撤。嗚呼。永飲之。旬日氣平乃愈。

惡寒

八 思得堂藏

李士材治吳文達。眩暈三載。雖戰慄惡寒。而不喜飲熱湯。五月向火。數妾擁居帷帳。屢服薑桂不効。脈浮之細小。沉之搏堅。是鬱火內伏。不得宣越也。用金花湯加柴胡甘草。生薑乘熱飲之。移時而惡寒減。再劑而撤火。燭。踰月而起。更以人參湯進六味丸。兩月全安。

石頑曰。凡病但惡寒而不發熱者。多屬火鬱之證。舉世一以陽虛為治。誤人多矣。如聖關謝君宜之病。七月間寒熱如瘧。因服苓知石膏輩。稍間數日。後因小便精大泄。遂腦痛如破。惡寒振振欲擗地。醫用八味六君。三倍參附而寒

不除。繼用大建中。每服人參五錢。熟附二錢。其寒益甚。春王人日。始延治於余。診之。脈僅三至。弦小而兩寸俱伏。但舉指忽流。利。審其證。雖五襲重裘。大畏陰風如箭。而不害近火。惡寒雖劇。而忽重忽輕。口鼻氣息全冷。而胸中時覺上衝。小腹堅滿而塊壘如石。大便堅硬而欲了不了。小便短數而時白時黃。陽道雖痿。而緩縱不收。氣色雖憔悴而不晦暗。此證起先本屬陽虛。因加用參附陽藥過多。壯火不能化。陰遂鬱伏土中。反致真陰耗竭。是以二便數滴。所謂陰虛自致泉竭也。法當升發其陽。先與火鬱湯六服。繼進升陽散火。補中益氣。而惡寒微除。重裘漸解。肢體微汗。口鼻氣溫。脈復五至。二便調適。小便微和。陽亦漸舉。嗣後令服六味丸。生脈散。異攻散調理而康。

惡寒

惡寒

九

思得堂藏

背惡寒

背為陽位。背上惡寒。陽受病而陰邪亢逆也。其病有七。一者暴中陰寒。四肢厥冷而背惡寒。脈必沉細。附子湯溫散之。一者素稟陽衰。而背上常微畏寒。脈來微弱。八味丸溫補之。一者熱邪內伏。煩渴引飲而背惡寒。脈多沉滑。或伏匿。此火鬱於內也。熱病初發多此。白虎湯解散之。一者中暑喝熱。亦多有背惡寒。人參白虎。清暑益氣。按證清解之。一者淫痰內鬱。肢體疼痛。而痞悶頭汗。其人必肥盛。其脈或緩滑。或濡滑。滑則指迷。茯苓加膽星。滿則苓桂木甘加半夏。廣皮。分解之一者。瘀血內滯。而頭汗目黃。小便清利。大便澀黑。小腹偏左。或左脇中脘有疼痛。脈必關尺弦緊。或帶扎狀。桃枝承氣。犀角地黃。隨上下虛實清理之一者。無故脈數而背惡寒。疼重寒

然者爲發癰疽之兆。高粱多此不可疑似而遲延難療也。

振寒

經言。虛邪之中入也。灑灑動形。正邪之中入也。微見於色。不知其身。又曰。陽明所謂灑灑振寒。陽明者。午也。五月盛陽之陰也。陽盛而陰氣加乏。故灑灑振寒。當瀉陽者也。又云。陽氣客於皮膚。陰氣盛。陽氣虛。故振振寒慄。當補陽者也。如六脈弦細而澀。按之空虛。此大寒證。亦傷精氣。當溫補者也。瀉陽白虎加人參湯。竹葉石膏湯。補陽黃耆建中湯。若夫真陽虛證。但寒慄耳。不作振也。或兼風寒。則振。桂枝加附子湯。

戰慄

經云。腎之變動為慄。原病式曰。戰慄動搖。火之象也。陽動陰靜。而水火相及。故厥逆禁固。屈伸不便。為病寒也。慄者。寒冷也。或言寒戰為脾寒者。未明變化之逆也。此由心火熱甚。亢極而戰。反乘水化制之。故寒慄也。寒慄由火盛似水實非兼有寒氣也。以大承氣下之。多有燥屎。下後熱退。則寒慄愈矣。若陽虛則但畏寒。陽鬱則振寒。戰慄有火無火之分也。亦有暴感寒邪。惡寒脈伏而戰慄者。麻黃湯發散之。

醫通卷之三

戰慄

三

思得堂藏

寒熱

外熱內寒。外寒內熱。上熱下寒。止寒下熱。

經云。因於露風。乃生寒熱。陽勝則熱。陰勝則寒。重寒則熱。重熱則寒。風氣客於皮膚之間。內不得通。外不得泄。風者。善行而數變。腠理開則灑然寒。閉則熱而悶。其寒也。則衰飲食。其熱也。則消肌肉。故使人怵慄而不能食。名曰寒熱。寒熱如瘧。表裏不和者。小柴胡為主藥。至夜轉甚者。加丹皮山梔。日久虛勞寒熱不除者。柴胡四物湯。加味逍遙散。○脾病則血氣俱不寧。寒熱往來。無有休息。故脾病如瘧狀也。元氣虛人。遇勞即發寒熱。此元氣下陷之故。或勞力而發寒熱。腿縫中結核作痛。謂之勞發。俱宜補中益氣湯。○病寒熱間作。腕後有斑三五點。鼻中微血。兩脈沉澀。胸膈四肢按之殊無大熱。此脾胃氣虛而挾微邪。理中湯。去人參。加茯苓煨葛根。○鬱怒而發寒熱。逍遙散。○內傷瘧疾寒熱。各具本門。○傷寒寒熱。不在此例。

醫通卷之三

寒熱外熱內寒

三

思得堂藏

外熱內寒。外寒內熱。○皮寒而燥者。陽不足。皮熱而燥者。陰不足。皮寒而寒者。陰盛也。皮熱而熱者。陽盛也。仲景云。病人身大熱。反欲得近衣者。熱在皮膚。寒在骨髓也。黃蘗建中湯汗之。病人身大寒。反不欲近衣者。寒在皮膚。熱在骨髓也。越脾湯發之。若雜證外熱內寒者。理中湯飲之。外寒內熱者。火鬱湯散之。

上熱下寒。上寒下熱。○熱發於上。陽中之陽邪也。熱發於下。陰中之陽邪也。寒起於上。陽中之陰邪也。寒起於下。陰中之陰邪也。脈經云。陽乘陰者。腰已下至足熱。腰已上寒。梔子豉湯吐以升之。陰氣上爭。心腹滿者死。陰乘陽者。腰已上至頭

熱腰已下寒。桂苓九利以導之。陽氣上爭。得汗者生。若雜證。上熱下寒。既清湯。兼大便秘。既清解毒湯。火不歸源。八味丸。上寒下熱。五苓散。送滋腎丸。虛陽下陷者。加減八味丸。

瘧

經云。瘧先寒而後熱者。夏傷於大暑。其汗大出。腠理開發。因遇夏氣淒淒之小寒。藏於腠理皮膚之中。秋傷於風。則病成矣。夫寒者。陰氣也。風者。陽氣也。先傷於寒。而後傷於風。故先寒而後熱也。病以時作。名曰寒瘧。先熱而後寒者。此先傷於風。而後傷於寒。故先熱而後寒也。亦以時作。名曰溫瘧。其但熱而不寒者。陰氣先絕。陽氣獨發。則少氣煩冤。手足熱而欲嘔。名曰瘧。溫瘧者。得之冬。中於風。寒氣藏於骨髓之中。至春則陽氣大發。邪氣不能自出。因遇大暑。腦髓燄。肌肉消。腠理發泄。或有所用力。邪氣與汗皆出。此病藏於腎。其氣先從內出之於外也。如是者。陰虛而陽盛。陽盛則熱矣。衰則氣復反入。入則陽虛。陽虛則寒矣。故先熱而後寒。名曰溫瘧。瘧瘧者。肺素有熱。氣盛於身。厥逆上衝。中氣實而不外泄。因有所用力。腠理開。風寒舍於皮膚之內。分肉之間。而發。發則陽氣盛。陽氣盛而不衰。則病矣。其氣不及於陰。故但熱而不寒。氣內藏於心。而外舍於分肉之間。令入消燄肌肉。故命曰瘧瘧。○足太陽之瘧。令入腰痛頭重。寒從背起。先寒後熱。熇熇喝喝然。熱止汗出。○足少陽之瘧。令入身熱解。寒不甚。熱不甚。惡見人。見人心惕。然熱多汗出甚。○足陽明之瘧。令入先寒灑淅。灑淅寒甚。久乃熱。熱去汗出。喜見日月光火氣。乃快然。○足太陰之瘧。令入不樂。好太息。不嗜食。多寒熱汗出。病至則善。心噦已乃衰。○足少陰之瘧。令入嘔吐甚。多寒熱。熱多寒少。欲閉戶牖而處。其病難已。○足厥陰之瘧。令入腰痛。少腹滿。小便不利。如瘵狀。非瘵也。數便。意恐懼。氣不足。腹

中悒悒。凡治瘧先發時食頃乃可以治過之則失時也。金匱云師曰陰氣孤絕陽氣獨發則熱而少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘵若但熱不寒者邪氣內藏於心外舍分肉之間令人消燄肌肉。

瘧之寒熱更作因陰陽之氣互為爭併若陰衰離絕其陽而陽亦不併之陰故陽獨發但熱而已其少氣煩冤者肺主氣肺受火抑故也手足熱者陽主四肢陽盛則四肢熱也欲嘔者火邪上衝胃氣逆也內藏於心者陽盛則火氣內藏而外舍分肉之間也消燄肌肉者火盛則肌肉燄也此條合後條溫瘧觀之亦可以白虎湯治瘧瘵也白虎專於退熱其分肉四肢內屬脾胃非切於所舍者乎又瀉肺火非救其少氣煩冤者乎設其別有兼證豈不可推加桂

醫通卷之三

思得堂藏

之例而加別藥乎。

溫瘧者其脉如平身無寒但熱骨節煩疼時嘔白虎加桂枝湯主之。

內經言溫瘧先熱後寒仲景言溫瘧則但熱不寒有似瘧瘵而實不同也瘧瘵兩陽合邪上薰心肺所以少氣煩冤消燄肌肉溫瘧脉如平人則邪未合而津未傷陽受病而陰不病以其人素有痺氣營衛不通故瘧發於陽不入於陰所以骨節煩疼時嘔邪氣扞格之狀有如此者惟用白虎湯以治陽邪而加桂枝以通營衛斯陰陽和血脉通得汗而愈矣至於傷寒前熱未除而復感風寒脉陰陽俱盛之溫瘧與其脉如平者迥乎不同也。

瘧多寒者名曰牝瘧蜀漆散主之。

邪氣內藏於心則但熱而不寒是為瘧瘵邪氣伏藏於腎故多寒而少熱則為牝瘧以邪氣伏結則陽氣不行於外故外寒積聚津液以成痰是以多寒與素問少陰經證之多熱少寒不同方用蜀漆和漿水吐之以發越陽氣龍骨以固欬陰津雲母從至下而舉其陽取山川雲霧開霽之意蓋雲母即陽起石之根性溫而升最能祛濕運痰稍加蜀漆則可以治太陰之濕瘧方後有云濕瘧加蜀漆半分而坊本誤作溫瘧大謬此條本以邪伏龍海謂之牝瘧趙以德不辨亥豕註為邪在心而為牡喻嘉言亦仍其誤而述之非智者之一失歟。

瘧病發渴者柴胡去半夏加栝蒌湯亦治勞瘧。

渴者陽明津竭而所以致陽明津竭者本少陽木火之勢

醫通卷之三

思得堂藏

劫奪胃津而然故瘧邪進退於少陽則以小柴胡進退而施治也至於勞瘧之由亦木火盛而津液致渴故亦不外是方也。

瘧寒多微有熱或但寒不熱柴胡桂薑湯服一劑如神。

是證雖與牝瘧相類以方藥論之則殊牝瘧邪伏少陰氣分而此邪伏少陽營血之分夫邪氣入營既無外出之勢而營中之邪亦不出與陽爭所以多寒少熱或但寒無熱也小柴胡湯本陰陽兩停之方可隨瘧之進退加桂枝乾薑則進而從陽若加栝蒌石膏則退而從陰可類推矣丹溪治六經證悉以二陳為主各加引經藥可見無瘧不成瘧也大法先熱後寒者柴胡桂枝湯先寒後熱者小柴胡湯多熱但熱者白虎加桂枝湯多寒但寒者柴胡桂薑湯雖多

寒但來脈洪實者。當作實治。不得便用桂枝。雖多熱但熱。脈虛者。當作虛治。不得便用白虎。寒多熱少。或少食易噦。惡心吐痰。人參養胃湯。熱多寒少。口苦咽乾。小便赤澀。或傷食成瘧。消脾飲。勞役所傷。飲食失節成瘧。則虛弱自汗。補中益氣。加半夏。瘧疾自汗。日甚不能止。此表虛不能衛護也。人參實衛。加桂枝。風瘧。自感風而得。惡風自汗。煩躁頭痛。風陽邪也。故先熱後寒。宜半夏。柴胡。羌活。紫蘇。細辛。生薑。寒瘧。暑月乘涼沐浴。自感寒而得。無汗惡寒。癰疽面赤。寒陰邪也。故先寒後熱。宜羌活。紫蘇。桂枝。柴胡。草果。厚朴。暑瘧。亦名瘧。但熱不寒。裏實不泄。煩渴而嘔。肌肉消澀。小柴胡加香薷。黃連。竹葉。盛暑發者。白虎湯。虛者。加入人參。秋涼後發者。小柴胡湯。此肺素有熱。陰氣先絕。陽氣獨發。故但熱不寒也。

醫通卷之三

瘧

六

思得堂藏

溫瘧。由冬受非時之邪。伏藏骨髓之中。至春夏淫熱氣蒸而發。發則先熱後寒。或但熱不寒。春用小柴胡。夏用白虎。加桂枝。以邪熱勢盛。故不惡寒。而便發熱。熱發於表之後。正氣內虛。反微似畏寒之狀。非惡寒也。牝瘧。邪伏於腎。淫瘧。則久受陰淫。而邪伏太陰。皆但寒不熱。並宜蜀漆散。邪伏血分。而多寒少熱。憊憊振振。柴胡桂枝湯。勞瘧。大渴。柴胡去半夏。加栝蘆湯。汗出濕浴。身體重痛。肢節煩疼。寒熱而嘔逆者。亦屬淫瘧。胃苓湯加羌活。柴蘇。食瘧。因飲食不節。中脘生痰。加以風氣乘之。故善噦而不能食。食而支滿。腹大善嘔。實者。二陳加枳殼。早果。因饑飽勞役而發。日久不止。脈虛者。理中湯加枳實。青皮。素有陰虛勞嗽。或因癰成勞。但於調理本藥中。稍加桂枝。並棗可也。不可純用祛風豁痰藥。若表邪勢

盛。可用小建中。黃芩建中。為主。後與生料六味丸。加桂枝。龜甲。凡瘧發於午前。是陽分受病。易愈。發於午後。陰分受病。難愈。瘧發日。實為邪氣下陷於陰分。必用升柴。升發其邪。仍從陽分而發。補中益氣。加桂枝。瘧發日。蚤。為邪氣上趨於陽分。宜因勢利導之。小柴胡加枳桔。夜瘧。俗名鬼瘧。此邪入血分。宜升散血脈之邪。千金內補建中。加升柴。生首烏。脾胃素虛。人補中益氣。加首烏。桂枝。芍藥。瘧瘕。山嵐。溪澗之毒。須用祛瘧瘕之藥為主。疫瘧。夏秋之間。沿門闔境。皆是也。其證壯熱多汗而渴。宜達原飲。煩熱大渴。有表證。桂枝白虎湯。譫妄狂悶。涼膈散。加草果。寒熱便秘。大柴胡湯。虛人發散後。熱不止。人參敗毒散。有鬱證。似瘧者。寒熱與瘧無異。但口苦。嘔吐。清水。或苦水。面青。脇痛。耳鳴。脈澀。道過

醫通卷之三

瘧

元

思得堂藏

散倍柴胡。加吳茱萸。川連。痢後發瘧。邪從少陽。循經外泄也。小柴胡去黃芩。加桂枝。或補中益氣。倍升柴。升散則愈。大抵瘧初起。宜散邪消導。日久宜養正調中。所謂氣虛則惡寒。血虛則發熱也。日數雖多。飲食未節者。未可便斷為虛。須禁食消導。惡脈下手可也。形盛氣虛。人多濕痰。發則多惡寒。日久不愈。脈軟而沈。滑滑。用補中益氣。加蒼朮。兼用熟附子。二三分。瘧後不喜食。四肢倦怠。面色痿黃。六君子加山查。黃連。枳實。久瘧不止。元氣虛盛者。用人參。常山。各五錢。剉碎。微火同炒。去常山。只以人參煎湯。未發前服。屢驗。瘧發四五遍後。曾經發散者。何首烏散。壯實者。可用七寶飲。至夜熱不止。而脈實邪盛者。此邪干血分也。常山飲。截之。瘧發已久。遍治無功。度無外邪。亦無內滯。惟人參一兩。生薑一兩。加桂枝少

許冬月無汗。稍加麻黃。發前五更時服。溫覆取微汗。必止。甚
者連進三日。無不愈者。愈後亦易康復。如在貧家人參減半。
合白朮五錢代之。此方不特虛人久瘧。治三日瘧更宜。夜發
則加當歸首烏。無不應手取效。然發於嚴冬之時。有屢用此
方。及補中益氣不効者。必待仲春。仍用前藥。加桂枝汗之。即
愈。

丹溪云。瘧瘧者。三陰瘧也。三日一發。發於子午卯酉日者。少
陰瘧也。發於寅申巳亥日者。厥陰瘧也。發於辰戌丑未日者。
太陰瘧也。更須以脈證參之。然後決其經。而與治法。按內經
云。時有間二日。或至數日而發者。邪氣與衛氣客於六府。而
有時相失。不能相得。故休數日乃作也。李士材釋云。客猶會
也。邪在六府。則氣遠會希。故間二日。或休數日也。觀此。則丹

醫通卷之三

瘧

思得堂藏

溪辰戌丑未日。為太陰瘧。非矣。子午雖曰少陰。而卯酉則陽
明矣。已亥雖曰厥陰。而寅申則少陽矣。丑未雖曰太陰。而辰
戌則太陽矣。三日發者。猶可以此為言。數日發者。又將何以
辨之。大抵三日瘧。初起發於夏秋者。宜用二陳去濕。加生
朮。檳榔。常山。逐去痰癖。為先。稍加穿山甲。以透經絡。至於暑
結。苦分。又當以香薷。藿香。茯苓。半夏。甘草。當歸。生薑。大棗。桂
枝。為要。而前藥為無益也。若元氣大虛。祇用補正。宜六君加
草果。烏梅。名曰獸飲。兼本經引使藥。若元氣下陷。日發漸晏
者。補中益氣湯。大劑參朮。薑棗為治。如常山。檳榔。山甲。草果。
皆為戕賊矣。
瘧母者。頑痰挾血食。而結為癥瘕。隨甲煎丸。或小柴胡加龍
甲。達朮。桃仁。俱用醋製。其龍甲用栗灰湯煮。爛入藥。尤効。

此金匱法也。病氣俱實者。瘧母丸。瘧人久瘧。時止時發。芎歸
龍甲。飲不應。脾虛也。悉用補中益氣。加龍甲。少食。痞悶。胃虛
也。四獸飲。加龍甲。當歸。蓮朮。肉桂。瘧人瘧母。必用補益。蓋緣
治之失宜。邪伏肝經。而脇下有塊。仍寒熱時作。不可以瘧積
治之。每見急於攻塊者。多致不效。久瘧不愈。必有留滯。須
加龍甲。消之。如無留滯。只宜補益。

凡寒熱有常期者。瘧也。無常期者。雜證也。瘧證諸經。有邪。總
不離乎肝脾也。

石頑曰。經言。夏暑汗不出者。秋成瘧。瘧。此論固是。然其輕重
之殊。今昔迥異。良由天運使然。以北方風氣。運行於南。故也。
夫瘧疾一證。向來淮泗以北。最劇。大江以南。甚輕。康熙壬子。
吾吳患此者。比戶皆然。自夏徂秋。日盛一日。其勢不減。淮北

醫通卷之三

瘧

思得堂藏

證皆瘧滿。嘔逆。甚則昏熱。謔語。脈多渾渾。不顯弦象。亦有關
尺微弦者。但其熱至晨必減。不似熱病之晝夜不分也。時醫
不察。混以傷寒。目之。因而誤藥。致斃者。日以繼踵。原其寒熱
之機。又與往歲不同。有一日連發二三次者。有晨昏寒熱再
見者。有連發數日。中間二三日。復發如前者。有先熱後寒者。
有獨寒無熱者。有獨熱無寒者。有今日但寒。明日但熱者。證
雖變易無常。總不越和營散邪等法。但須分虛實寒熱輕重。
治之。歷觀用劫劑及祝由之法者。十無一驗。間有寒熱止而
昏熱不休者。又須隨所察形氣之偏勝。病氣之盛衰。而為調
適。全在機用靈活。不可專守成則。而舉世治瘧。必先禁止飲
食。藥用疎風發散。兼消穀瘦食。寬膈破氣之劑。消剋不已。繼
進硝黃。胃氣愈傷。濁邪愈逆。正氣何由得行。而振祛邪之力。

手余治久癰壞證。每令續進稠飲。繼與稀糜。使胃氣輸運。可行藥力。然後施治。如此挽回者。未遑枚舉。更有愈而復發。發而復愈。愈而又發者。又須推原所發之由。而為清理。若常山草果。檳榔。厚朴。枳殼。青皮。石膏。知母。等。傷犯中州之藥。咸非所宜。逮至仲秋已後。不特白虎當禁。縱不犯石膏。知母。邪氣聚於內陷。而變腸澼者甚多。有先瘡後痢者。有瘡痢齊發者。皆通致昔人治例。惟補中益氣一方。雖未能盡合肯綮。然一隅之舉。餘可類推。庸師不審。但守通因通用之法。致成天札者多矣。

醫通卷之三

醫按

三

思得堂藏

丹溪治一少年。冬月患瘧。自卯足寒。至酉方熱。寅初乃休。因思必為接內感寒所致。用人參大補。加附子。行經散寒。以取汗。數日不得汗。以足跣道遠。藥力難及。再以蒼朮。川芎。桃枝煎湯。盛以高桶。扶坐浸足。至膝食頃。以前藥服之。汗出通身而愈。

汪石山治一少年。六月因勞病瘧。取涼夢遺。遂覺惡寒。連日慘慄不寒。三日後頭痛躁悶。家人診之。驚曰。脈絕矣。議作陰證。欲進附子湯未決。汪曰。陰證無頭痛。今病如是。恐風暑乘虛入於陰分。故脈伏耳。非絕也。若進附子湯。是以火消火。安能復生。姑待以觀其變。次晚果寒熱頭痛。躁渴痞悶。嘔食自汗。脈皆濡小。而數。脾部兼弦。遂用清暑益氣湯。減蒼朮升麻。二十餘劑而愈。

醫通卷之三

醫按

三

思得堂藏

李士材治陳眉公三日瘧。決歲未瘳。素畏藥餌。尤不喜入參。其脈浮之則濡。沉之則弱。營衛俱衰。故延不已。因固請曰。素不服參者。天界之豐也。今不可缺者。病魔之久也。先服人參錢許。口有津生。腹無煩滿。遂以人參一兩。何首烏一兩。煎成入薑汁。鍾許一劑。勢減七八。再劑而瘳。遂截石頑治廣文張安期夫人。先是其女及壻與婢數日連斃三人。其僕尚傳染垂危。安期夫人因送女殮。歸亦病瘳。雜治罔効。遂成壞病。勉與生薑瀉心湯救之。故友李懷柱乃郎幼婢。觸鄧氏疫癘之氣。染患月餘不止。且左右乏人失於調理。以致愈而復發。加以五液注下。瘳痢兼并。水穀不入者半月有餘。當此雖有合劑。亦難克應。乃搗歸脾中。日與補中益氣。兼理中六君。黃桂之屬。將養半月而康。

致人事不省。六脈止歇。按之則二至一止。舉指則三五至一止。惟在寒熱之際診之。則不止歇。熱退則止歇如前。此真氣衰微。不能貫通於脈。所以止歇不前。在寒熱之時。邪氣衝激經脈。所以反得開通。此虛中伏邪之象。為製一方。用常山一錢酒拌。同人參五錢焙乾。去常山。但用人參以助胸中大氣而祛逐之。當知因常山傷犯中氣而變劇。故仍用常山為嚮導耳。晝夜連進二服。遂得安寢。但寒熱不止。脈止如前。乃令日進人參一兩。分二次進。并與稀糜助其胃氣。數日寒熱漸止。脈微續而安。○玉峯春榜顧玉書。瘡發即昏熱譫語。痞脹嘔逆。切其氣口。獨見短滑。乃有宿滯之象。與涼膈散易人中黃。加草果仁一劑霍然。○督學汪緘菴之女。患前證。以桂枝白虎湯易人中黃。加葱豉。四服而安。○中翰金淳還乃郎。八月間患瘧。發於辰戌丑未。至春。子午卯酉每增小寒熱。直至初夏。始延治於石頑。診其六脈如絲。面青膚白。乃與六君子加桂附。四服不應。每服加用人參至一兩。桂附各三錢。又四服。而辰戌丑未之寒熱頓止。子午卯酉之寒熱更甚。此中土有權。而邪併至陰也。仍與前藥四服。而色榮食進。寒熱悉除。後與獨參湯送八味丸調理而安。○文學顧大來。年逾八旬。初秋患瘧。瘧皆熱譫語。喘乏遺尿。或者以為傷寒譫語。或者以為中風遺尿。危疑莫定。予曰無慮。此三陽合病。譫語遺尿。口不仁而面垢。仲景暑證中原有是例。遂以白虎加入參三錢而安。同時文學顧次占夫人。朔客祈連山。皆患是證。一者外風。用白虎加桂枝。一者兼濕。用白虎加蒼朮。俱隨手而

瘡若以中風遺尿例治則失之矣。是日坐間有同通問及今歲瘧脈不弦之故。予謂之曰。瘧屬少陽經證。其脈當弦而反不弦。如平人者。以邪氣與正氣混合不分。故絕不顯弦象。金匱有云。瘧瘡者。其脈如平。身無寒但熱。骨節煩疼。時嘔。白虎加桂枝湯主之。曷知脈既不弦。便非風水之邪。即不當用柴胡。尋少陽經藥豈可以常法施治乎。飛時治沈子嘉。平昔每至夏間。臍一著扇風則腹痛。且不時作瀉。六脈但微數。無他異。此腎藏本寒。閉藏不密。易於招風也。下寒則虛火上僭。故脈數耳。曾與六味去澤瀉。加肉桂肉果五味。台裝作丸服。因是臍不畏風。脾胃亦實。明秋患瘧。醫用白虎竹葉石膏等。瘧寒甚而不甚熱。面青足冷。六脈弦細而數。用八味地黃三倍桂附作湯。更以四君合保元。早暮間進二日瘧止。調理而愈。

厥

經云厥之為病也。足暴清。胸將若裂。腸若以刀切之。煩而不能食。脉大小皆濇。寒氣客於五臟。厥逆上泄。陰氣竭。陽氣未入。故卒然痛死不知入。氣復反則生矣。

按厥論云厥之寒熱者何也。陽氣衰於下。則為寒厥。陰氣衰於下。則為熱厥。曰陽厥者。因善怒而得也。曰風厥者。手足搐搦。汗出而煩滿不解也。曰瘧厥者。瘧病與厥雜合。而足弱瘧無力也。曰瘵厥者。瘵病與厥雜合。而脚氣頑麻腫痛。世謂脚氣衝心者是也。曰厥痺者。卧出而風吹之。血凝於膚者。為痺。凝於脉者。為泣。凝於足者。為厥。是也。今人又以忽然昏暈。不省人事。手足冷者。為厥。仲景論傷寒。則以陽證傳陰。手足寒者。為熱厥。主以四逆散。陰證惡寒。手足寒者。為寒厥。主以四逆湯。內經厥論之義。則不然。蓋足之三陽。起於足五指之表。三陰起於足五指之裏。故陽氣勝。則足下熱。陰氣勝。則從五指至膝上寒。其寒也不從外。皆從內也。論得寒厥之由。以其人陽氣衰。不能滲榮其經絡。陽氣日損。陰氣獨在。故手足為之寒也。附子理中湯。論得熱厥之由。則謂其人必數醉。若飽以入房。氣聚於脾。中腎氣日衰。陽氣獨勝。故手足為之熱也。加減八味丸。

醫通卷之三

厥

思得堂藏

四逆湯內經厥論之義。則不然。蓋足之三陽。起於足五指之表。三陰起於足五指之裏。故陽氣勝。則足下熱。陰氣勝。則從五指至膝上寒。其寒也不從外。皆從內也。論得寒厥之由。以其人陽氣衰。不能滲榮其經絡。陽氣日損。陰氣獨在。故手足為之寒也。附子理中湯。論得熱厥之由。則謂其人必數醉。若飽以入房。氣聚於脾。中腎氣日衰。陽氣獨勝。故手足為之熱也。加減八味丸。

屈伸不得。爪甲枯。厥為臂厥。身立如殽。為肝厥。此皆內虛氣逆也。並宜八味丸。喘而喘。狂走登高。為陽明厥。此為邪實。承氣湯下之。厥而腹滿。不知入。卒然悶亂者。皆因邪氣亂。陽氣逆。是少陰腎脉不至也。名曰尸厥。卒中天地戾氣。使然。急以二氣丹二錢。用陳酒煎。如覺煩躁起。傾放盆內。蓋者溫服。如人行五里許。又進一服。不過三服。即醒。若膏粱本虛之人。用附子一枚。人參三兩。酒煎分三次服。并灸百會穴四十九壯。氣海丹田三百壯。身溫灸止。又炷止許。菴豆大。粗則傷人。暴厥脉伏。不省人事。莫辨陰陽。急用雞子三枚。煮熱。乘熱開豆大一孔。襯粗紙一層。亦開孔對當臍。令熱氣透達於內。即蘇。然後按脈證療之。如連換三枚不應。不可救矣。

醫通卷之三

厥

思得堂藏

不知入。輕則漸蘇。重則即死。最為急候。後世不能詳察。但以手足寒熱為厥。又有以脚氣為厥者。謬之甚也。雖仲景有寒厥熱厥之分。亦以手足為言。蓋彼自辨傷寒之寒熱耳。實非內經之所謂厥也。觀大奇論曰。暴厥者。不知入言。謂經論曰。血之與氣。并走於上。則為大厥。厥則暴死。氣復反則生。不反則死。繆刺論曰。手足少陰太陰足陽明五絡俱竭。令人身體皆重。而形無知也。其狀若尸。或曰尸厥。若此者。豈止於手足寒熱及脚氣之謂耶。今人多不知厥證。而皆指為中風也。夫中風者。病多經絡之受傷。厥逆者。直因精氣之內奪。表裏虛實。病情當辨。名義不正。無怪其以風治厥也。醫中之害莫此為甚。

診。脉沉微不數。為寒厥。沉伏而數。為熱厥。沉細為氣厥。此

大爲血虛。浮滑爲痰。弦數爲熱。浮者外感。脈至如喘。名曰暴厥。寸脈沉而滑。沉爲氣。滑爲實。實氣相搏。血氣入藏。唇口身冷死。如身和汗自出。爲入府。此爲卒厥。

孫兆治一人。自汗。兩足逆冷至膝下。腹痛不省人事。六脈小弱而急。問其所服之藥。皆陽藥也。此非受病重。藥能重病耳。遂以五苓散白虎湯十餘劑而安。凡陰厥。脈冷則腎亦冷。今脛冷臂不冷。則非下厥上行。所以知是陽厥也。汪石山治一人。卒厥。暴死不知人。先前因微寒。數發熱而色痿黃。六脈沉弦而細。知爲中氣久鬱所致。與人參七氣湯一服。藥未熟而暴絕。汪令一人緊抱。以口接其氣。徐以熱薑湯灌之。禁止喧鬧移動。移動則氣絕不返矣。有頃果蘇。溫養半月而安。不特此證爲然。凡中風。中氣。中暑。中寒。

醫通卷之三

厥按

元

思得堂藏

暴厥俱不得妄動。以斷其氣。內經明言氣復返則生。若一稍而擾亂其氣。不得復返。致天柱者多矣。

諸氣門上

沙篆曰。經云。諸痛皆因於氣。百病皆生於氣。子和曰。天地之氣。常則安。變則動。人并天地之氣。五運伏役於外。七情交戰於中。是以聖人蓄氣如持至寶。庸人役物而反傷太。和此軒岐所謂諸痛皆因於氣。百病皆生於氣。遂有九氣不同之說。氣本一也。因所隔而爲九。怒喜悲恐寒熱驚思勞也。蓋怒則氣上。怒則氣逆。甚則嘔血及餐泄。故氣上矣。喜則氣緩。喜則氣和。志達營衛。通利故氣緩矣。悲則氣消。悲則心系急。肺布葉舉而上焦不通。營衛不散。熱氣在中。故氣消矣。恐則氣下。恐則精却。却則上焦閉。閉則氣還。還則下焦脹。故氣不行。寒則氣收。寒則腠理閉。氣不行。故氣收矣。畏則氣泄。畏則腠

醫通卷之三

氣

元 思得堂藏

理開。營衛通汗大泄。故氣泄矣。驚則氣亂。驚則心無所依。神無所歸。慮無所定。故氣亂矣。勞則氣耗。勞則喘息汗出。外內皆越。故氣耗矣。思則氣結。思則心有所存。神有所歸。正氣留而不行。故氣結矣。考其爲病之詳。變化多端。如怒氣所至。爲嘔血。爲餐泄。爲煎厥。爲薄厥。爲陽厥。爲胸滿脇痛。怒則氣逆而不下。爲喘渴煩心。爲消痺。爲肥氣。爲目暴盲。耳暴閉。筋緩發於外。爲癰疽。喜氣所至。爲笑不休。爲毛革焦。爲內病。爲陽氣不收。甚則爲狂。悲氣所至。爲陰絡氣并於肺。而肝木受邪。金太過則肺亦自病。恐傷腎。腎屬水。恐則氣并於腎。而心火受邪。水太過則腎亦自病。思傷脾。脾屬土。思則氣併於脾。而腎水受邪。土太過則脾亦自病。寒傷形。形屬陰。寒勝熱。則陽受病。寒太過則陰亦自病。熱傷氣。氣屬陽。熱勝寒。則陰受

丹溪云。冷氣滯氣逆氣。皆是肺受火邪。氣得炎上之化。有升無降。薰蒸清道。甚則轉成劇病。局方類用辛香燥熱之劑。以火濟火。各將誰執。氣無補法。世俗之言也。以其爲病。痞滿悶塞。似難於補。不思正氣虛者。不能運行。邪滯著而不出。所以爲病。經云。壯者氣行則已。怯者則著而成病。苟或氣怯。不用補法。氣何由行。氣屬陽。無寒之理。上升之氣。覺惡寒者。亢則

害。承乃制也。氣有餘便是火。自覺冷氣從下而上者。非真冷也。蓋上升之氣。自肝而出。中挟相火。自下而上。腎熱爲甚。火極似水。陽亢陰微也。

喻嘉言曰。人之體中肌肉豐盛。乃血之榮旺。極爲美事。但血旺易致氣衰。久而彌覺其偏也。夫氣與血兩相維附。何以偏旺耶。蓋氣爲主。則血流。血爲主。則氣反不流。非真氣之衰也。氣不流。有似乎衰耳。所以一切補氣之藥。皆不可用。而耗氣之藥。反有可施。緣氣得補而愈錮。不若耗之以助其流動之勢。久之血仍歸其統握之中耳。

七氣所致。因方論最詳。喜怒哀思悲恐驚。謂之七氣所傷。有少痰在咽喉間。如綿絮相似。咯不出。嚥不下。並宜四七湯爲末。煉蜜和薑汁爲丸。噙化。及局方烏沉湯。諸七氣湯。分虛

實選用。盛怒成疾。面色青黃。或兩脇脹滿。沉香降氣散。木香調氣散。或四七湯。加枳殼。木香。虛加入參。石菖蒲。肥人氣滯。必有痰。以二陳。蒼朮。香附。燥以開之。瘦人氣滯。必有火。且燥。宜蘇子。山梔。當歸。芍藥。丹皮。降以潤之。老人胸膈氣滯。痞滿不舒。或作痛。或不能食。脈雖數實。滑大。當作虛治。慎不可用耗氣藥。宜理中丸。或六君子。加香砂之類。氣不歸源。補骨脂爲主。白朮。沉香佐之。一切冷氣。及婦人血氣攻擊。心腹撮痛。局方烏沈湯最捷。婦女性執多偏屬陰。氣易於動。如痞悶脹痛。上澹心胸。或攻築脇肋。腹中結塊。月水不調。或眩暈嘔吐。往來寒熱。一切氣候。先用加味逍遙散。或蘇子降氣。沉香降氣。四磨六磨選用。氣從左邊起者。肝火也。氣刺痛。皆屬火。當降火藥中。加枳殼。氣鬱不舒而痛者。木香調

氣散。憂而痰鬱。導痰湯加香附烏藥。因死血而痛者。桃仁紅花歸頭食積寒痰。流入脇下。背脊刺痛。諸藥不効者。神保丸。久患氣結。諸藥不開者。先服沉香什氣丸三五服。以開其結。後用六君子送降氣散。調之。暴怒氣厥。不省人事者。蘇合香丸灌之。諸氣爲患。須分暴病久病。暴怒傷陰。陽氣獨亢。氣厥不省者。可用辛香破氣以通陰閉。若久抱抑鬱。氣不宜通。營衛不和者。又當辛溫散結。以調營衛。始爲合宜也。

枳殼利肺氣。多服損胸中至高之氣。青皮瀉肝氣。多服能損真氣。木香調諸經氣。兼瀉肺。能使上焦之氣下達。陰火上衝。禁用。砂仁醒脾氣。而能上升。然後滯氣得以下通。白豆蔻能溫肺氣。而使下行。然後陽氣得以上升。香附快滯氣。陳皮泄逆氣。烏藥紫蘇川芎。俱能散氣。使濁氣從汗散也。厚朴瀉胃。

氣前下氣。拉陳。橫。柳。海。至。高。之。氣。能。使。濁。氣。下。降。後。重。有。和。者。宜。之。發。香。之。聲。香。上。行。胃。氣。沉。香。升。降。諸。氣。腦。腐。散。與。氣。蘇。子。杏。仁。下。氣。潤。燥。氣。滯。有。火。者。宜。之。豆。蔻。丁。沉。檀。麝。俱。辛。熱。能。散。鬱。氣。暴。鬱。者。宜。用。和。久。成。火。者。忌。之。稟。壯。氣。質。氣。不。順。而。刺。痛。當。用。枳。殼。烏。藥。不。已。加。木。香。若。肥。人。氣。刺。痛。用。二。陳。加。厚。朴。枳。殼。氣。虛。脈。微。弱。者。即。當。用。異。功。加。枳。殼。木。香。石。頑。曰。舉。世。皆。言。氣。無。補。法。局。方。三。因。七。氣。四。磨。六。磨。等。方。其。中。俱。用。人。參。能。無。助。氣。為。患。乎。古。人。立。方。用。參。非。盡。為。補。而。設。也。如。局。方。七。氣。原。以。肉。桂。半。夏。為。主。而。借。入。參。引。入。氣。分。以。散。氣。豈。用。補。之。謂。耶。其。三。因。七。氣。純。是。辛。散。即。用。一。味。人。參。但。可。隨。諸。藥。建。行。氣。之。功。不。致。傷。氣。足。矣。何。暇。逞。其。補。性。乎。至。於。四。磨。六。磨。不。過。賴。以。資。應。敵。之。需。尚。恐。不。及。安。能。

思得堂藏

望其補益哉。診。下。手。脈。沈。便。知。是。氣。其。或。沈。滑。氣。兼。痰。飲。沈。極。則。伏。滑。弱。難。治。皆。由。大。氣。鬱。滯。不。舒。以。故。脈。顯。沈。伏。大。都。沈。實。有。力。則。宜。辛。散。沈。弱。少。力。則。宜。溫。養。氣。主。煎。之。總。不。離。手。辛。溫。散。結。也。

汪石山治一婦。年四十餘。患走氣遍身疼痛。或背脹痛。或脇拂痛。或一月二三發。發則嘔盡所食。方快。飲食不進。久伏床枕。或用流氣飲。二陳湯。益甚。汪診之。脈皆細微。而數。右脈尤弱。曰。此憂思傷脾。而氣鬱也。當補脾散鬱。以人參三錢。黃耆二錢。歸身一錢半。川芎八分。香附黃連甘草。乾薑砂仁各五分。數劑稍緩。再以參耆川芎。香附山梔。甘草。神効。期九服而愈。

飛。時。治。一。婦。平。昔。虛。火。易。於。上。升。因。有。怒。氣。不。得。越。致。中。滿。食。減。作。酸。噯。氣。頭。面。手。足。時。冷。時。熱。少。腹。不。時。痠。痛。經。不。行。者。半。載。餘。其。脈。微。糊。嗽。而。無。力。服。諸。破。氣。降。氣。行。血。藥。不。効。不。知。此。蘊。怒。傷。肝。肝。火。乘。虛。而。尅。脾。土。脾。受。尅。則。胸。中。之。大。氣。不。布。隨。肝。火。散。漫。肢。體。當。知。氣。從。淫。騰。淫。由。火。燥。惟。太。陽。當。空。則。陰。體。之。氣。自。散。臭。火。令。行。則。鬱。蒸。之。氣。自。伏。又。釜。底。得。火。則。能。腐。熟。水。穀。水。穀。運。則。脾。胃。有。權。大。氣。得。歸。而。諸。證。可。愈。矣。因。用。生。料。八。味。倍。桂。附。十。日。而。頭。面。手。足。之。冷。熱。除。間。用。異。功。而。中。寬。食。進。如。是。出。入。調。理。兩。月。經。行。而。愈。

思得堂藏

金匱云婦人咽中如有炙脔。此夏厚朴湯主之。即四

上焦陽也。衛氣所治。貴通利而惡閉鬱。鬱則津液不行。而積為痰涎。膽以咽為使。膽主決斷。氣屬相火。遇七情至而不決。則火鬱而不發。火鬱則焰不達。焰不達。則氣如焰。與痰涎聚結胸中。故若炙脔。千金作胸滿。心下堅。咽中帖帖。如有炙脔。吐之不出。吞之不下。證雖稍異。然亦以鬱而致也。用半夏等藥散鬱化痰而已。

經云。木鬱達之。火鬱發之。土鬱奪之。金鬱泄之。水鬱折之。然調其氣。過者折之。以其畏也。所謂瀉之。夫所謂達者。通暢之也。當以輕揚之劑舉而達之。發者。升發之也。當以升發之劑汗而發之。奪者。攻下之也。當以鹹寒之劑攻而奪之。泄者。開

醫通卷之三

思得堂藏

發之也。當以疎散之劑。瀉而泄之。折者。制禦之也。當以苦寒之劑。伐而折之。此皆論六氣之鬱也。至於五志之鬱。又非上法所宜。經云。皆貴後賤。雖不中邪。病從內生。名曰脫營。皆富後貧。名曰失精。及婦人情志不遂。怫鬱不舒。而致經閉不調。發熱欬嗽。師尼寡婦。種種諸患。各推其源而治之。

趙養葵云。鬱者。抑而不通之義。內經五法。為因五氣所乘而致鬱。不必作憂鬱之鬱。憂乃七情之病。但憂亦在其中。丹溪云。氣血冲和。百病不生。一有怫鬱。諸病生焉。又製為六鬱之論。立越鞠丸以治鬱。而以香附撫芎者。求開鬱利氣為主。謂氣鬱而淫滯。淫滯而成熟。熱鬱而成痰。痰滯而血不行。血滯而食不化。此六者相因而為病者也。此說出而內經之理始晦。內經之旨。又因釋註之誤而復晦。所以鬱病之不明於世。

久矣。蓋東方生木。木者生生之氣。即火氣附於木中。木鬱則土鬱。土鬱則金亦鬱。金鬱則水亦鬱。五行相因。自然之理。惟其相因也。予以一方。治其木鬱。諸鬱皆因而愈。逍遙散是也。甚者方中加佐金丸。以黃連治心火。吳茱萸氣肝之氣。亦同氣相求。而佐金以制木。此佐金之所以得名也。

凡寒熱往來。似瘧非瘧。惡寒惡熱。嘔吐吞酸。嘈雜胸膈。肝痛。小腹痛。悶。頭暈。盜汗等證。以逍遙散出入加減。此對證之方。無不獲効。倘一服即愈。少頃即發。或半日或一日又發。發之愈頻愈甚。此必下寒上熱之假證。此方不宜復投。當改用溫補之劑。如陽虛以四君子加溫熱藥。陰虛以六味地黃丸作湯。加溫熱藥。甚者又須寒因熱用。少以冷藥從之。用熱藥冷探之法。否則拒格不入。非徒無益而反害之也。

醫通卷之三

思得堂藏

石頑曰。鬱證多緣於志慮不伸。而氣先受病。故越鞠四七始立也。鬱之既久。火邪耗血。豈者。木香附輩能久服乎。是逍遙歸脾繼而設也。然鬱證多患於婦人。內經所謂二陽之病發心脾。及思想無窮。所願不得。皆能致病。為證不一。或發熱頭痛者。有之。喘嗽氣乏者。有之。經閉不調者。有之。狂瀨失志者。有之。火炎失血者。有之。骨蒸勞瘵者。有之。風疽生蟲者。有之。治法總不離乎逍遙歸脾。佐金降氣。烏沈七氣等方。但當泰

究新久虛實。選用加減出入可也。鬱脈多沈伏。或結或促。或沈或瀉。鬱在肝腎。則見於左。鬱在心脾。則見於右。氣血食積痰飲。一有留滯於其間。脈必因之而止滯矣。但當求其有神。何害之有。所謂神者。胃氣也。鬱脈雖多沈伏結促。不為患也。所慮在牢革弦強不和耳。

三沈伏結促。女氣散氣。則和。若年華強。則正氣先傷。無氣可散。即從事調補。尚難克効。况復誤行耗氣之藥乎。所以鬱證得弦強脈者。往往多成虛損也。

易思蘭治一婦。患渾身倦怠。呵欠口乾。經月不食。強之不。過數粒而已。有以血虛治之者。有以氣弱治之者。有知爲火而不知火之源者。用藥雜亂。愈治愈病。至冬微寒。次年夏間。諸病復作。肌消骨露。三焦脈洪大。侵上。脾肺二脉微沈。餘部皆平和。此肺火病也。以梔子仁薑汁浸一宿。炒黑研極細末。用人參麥冬烏梅煎湯調下。進二服。即知饑喜。食旬日。肢體充實如常。後因久病不孕。衆皆以爲血虛。而用參耆之品。半月胸膈飽脹。飲食頓減。至三月餘。而經始通。下黑穢不堪。或行或止。不得通利。其苦萬狀。易復以四

醫通卷之三

醫按

思得堂藏

烏湯換生地。加陳皮蘇梗黃芩山梔青皮枳殼十數劑。一月內即有孕。

痞滿

丹溪云。痞與否同。不通泰也。由陰伏陽蓄。氣與血不運而成。處心下。位中央。膜滿痞塞者。皆土之病也。與脹滿有輕重之分。痞則內覺痞悶。而外無脹急之形也。有中氣久虛。不能運行。稍微爲痞者。有過服消利。不能舒化。飲食爲痞者。有痰熱太甚。痰氣上逆。陽位爲痞者。古方治痞。用黃連黃芩枳實之苦。以泄之。厚朴生薑半夏之辛。以散之。人參白朮之甘。以補之。茯苓澤瀉之淡。以滲之。既痞同淫治。惟宜上下分消其氣。如果有內實之證。庶可畧與消導。世人痞塞。喜行利藥。以求速効。雖暫時快通。痞若再作。危殆滋甚。天地不交而成痞。此脾之清氣不升而下溜。胃之濁氣不降而上逆。當用補中益氣。加豬苓澤瀉。蓋升麻柴胡從九地之下而升其清氣。豬苓澤瀉從九天之上而降其濁氣。即所以交痞而爲泰矣。○諸痞塞及噎膈。乃痰爲氣微而上。氣爲痰厥而滯。痰與氣搏。不得流通。並宜連理湯。乾薑黃芩黃連人參湯。黃連湯。諸瀉心湯。選用。氣滯痞脹。用五扁寬中散。不應丁沈透膈湯。應諸痞痞塞脹滿。胸膈不利。或氣上逆。或腹疼痛。並宜指迷七氣湯。胃虛加參朮。氣滯加木香。大便秘加枳榔。面目浮加蘇葉。四肢腫加木瓜。虛痞只用局方七氣局方烏沈二湯最妙。○鬱怒暴痞。面目浮腫。心腹脹滿。二便秘滿。四肢脹大。增損流氣飲。○膈上諸般冷氣。嘔逆不食。不問痞塞疼痛。且與薑汁擦吐。然後用藥。痰飲尤宜。○邪氣作痞。宜用疎劑。若氣不順。逆上爲痞。此乃虛痞。愈疎而痞愈作。宜於收補中微兼疎通之意。不可過用香劑。古人治瀉後痞。用四

醫通卷之三

痞滿

思得堂藏

下而升其清氣。豬苓澤瀉從九天之上而降其濁氣。即所以交痞而爲泰矣。○諸痞塞及噎膈。乃痰爲氣微而上。氣爲痰厥而滯。痰與氣搏。不得流通。並宜連理湯。乾薑黃芩黃連人參湯。黃連湯。諸瀉心湯。選用。氣滯痞脹。用五扁寬中散。不應丁沈透膈湯。應諸痞痞塞脹滿。胸膈不利。或氣上逆。或腹疼痛。並宜指迷七氣湯。胃虛加參朮。氣滯加木香。大便秘加枳榔。面目浮加蘇葉。四肢腫加木瓜。虛痞只用局方七氣局方烏沈二湯最妙。○鬱怒暴痞。面目浮腫。心腹脹滿。二便秘滿。四肢脹大。增損流氣飲。○膈上諸般冷氣。嘔逆不食。不問痞塞疼痛。且與薑汁擦吐。然後用藥。痰飲尤宜。○邪氣作痞。宜用疎劑。若氣不順。逆上爲痞。此乃虛痞。愈疎而痞愈作。宜於收補中微兼疎通之意。不可過用香劑。古人治瀉後痞。用四

中九即此意也。○痞塞諸藥不効大便不通脈數實者小陷胸湯三黃湯選用甚則實鐵木香檳榔九通利之。若肥人痰痞風悶大便不通者御藥院木香檳榔九疎解之。肥人心下痞悶內有淫痰也。二陳湯加枳實芩連然不若小陷胸湯尤捷。○瘦人心下痞悶乃鬱熱在中焦三黃加枳實以導之。心下痞而寒熱不除者小柴胡加枳桔。○如飲食後感冒風寒飲食不消或食冷物而作痞悶宜溫中化滯二陳加縮砂紫蘇藿香或平胃加藿香草豆蔻之類。○虛人停滯不散心下痞或或或急常喜熱物者枳實理中湯。○老人虛人脾胃虛弱轉運不及飲食不化而作痞者九味資生丸飽悶常噯一圓或六君子加香砂山楂麴蘖之類。○胸中氣塞短氣痞皮枳實生薑湯。○有酒積雜病過下傷脾脾虛不運作痞養

痞滿

思得堂藏

胃兼和血參朮歸芍兼升柴稍佐陳皮枳殼之類。○大怒之後成痞或痰中見血或口中作血腥氣是瘀血用丹皮紅麴香附桔梗降香紅花蘇木山楂麥芽童便甚則加大黃桃仁泥。○有痰挾瘀血成癥瘕作痞脈沈濡日久不愈多鬱人悲或過度有之宜從血鬱治桃仁紅花香附丹皮韭汁之類。○舉世治中滿痞脹不問虛實咸禁甘草殊不知古人所謂中滿勿食甘者指實滿而言也若自覺滿而外無腹脹之形者當以甘治之。診○脈弦急而滑驟然胸中痞悶乃肝氣與食滯而成為實脈弦或沈弦或濡或虛大無力氣口為甚此日久脾胃受傷或過服伐藥所致為虛胸膈痞悶而寸口脈沈滑或遲滑者為有停滯。

痞滿之三

痞滿按

思得堂藏

羅謙甫治真之趙客六月間乘涼傷溼麪心下痞滿躁熱時作坐臥不安於寺中僧以九藥十數丸下之下十餘行痞滿遂愈。○曰唯為盜劫其貨心動遂躁熱而渴飲酒一觚是夜膈腹脹痛惜再以前藥復下十餘行病加困憊四肢無力躁熱身不寧喜冷水未穀不化痢下如爛魚腸腐赤水和雜全不思食強食則嘔痞甚於前噫氣不絕足脛冷小腹不任其痛診之脈浮數七八至按之空虛曰予溯流尋源益暑熱已傷正氣以熱毒之劑下之一下之後其所傷之物已去無餘遺巴豆之氣留毒於腸胃間使嘔逆而不能食胃氣轉傷而然及下膿血無度大肉脫下皮毛枯槁脾氣弱而衰矣舌上赤滑口燥咽乾下多亡陰之所致也陰既已亡火獨旺故心胸躁熱煩亂不寧經曰獨陽不生獨陰不長天之由也遂辭去易一醫不審脈究源惟兄痞滿以枳殼丸下之病添喘滿利下不禁而死金匱云不當下而強下之令人開腸洞泄便溺不禁而死正此謂也。石頑治內兄顧九玉領詔假道歸吳大暑中患胸痞腹脹脈得虛大而濡氣口獨顯滑象此淫熱泛溢於膈上也與清暑益氣二劑顧服止而胸痞不除與半夏瀉心湯減炮薑去大棗加枳實一服而愈。家弟曾餘雖列賢書最留心於醫理弟婦鄭氏乃世傳女科中山之女其弟俱為時醫戊申夏患嘔逆不食者月餘服寬胸理氣藥二十餘劑幾至絕粒而痞脹異常邀余診之脈得虛大而數按仲景脈法云大則為虛數則為虛此

胃中陽氣大泄而渴陰填塞於膈上也因取連理湯方用人參三錢服之四劑而痞止食進後與異功散調理數日而康

別駕吳蛟水公祖夫人患痞肢嘔逆向因下體畏寒肢肘麻昏久服八味參附不徹六脈弦滑而按之則濡此中焦素蘊痰淫湯氣不能周於四末之象得桂附辛熱之力有時雖可暫開究非真陽之虛且有地黃之滯所以痞暈漫無止期遂疏局方七氣湯加沈香一服豁然再劑神爽食進而安

內翰繆鈞問尊大人子長老先生青年罷職樂志林泉偶因小憤遂肢暈痞悶三月來服豁痰利氣藥不應反覺疲倦飲食日減下元乏力至七月下濟遂石頑診之六脈似

醫通卷之三

痞滿按

早思得堂載

覺有餘指下畧無冲和之氣氣口獨滯不調時大時小兩尺俱濡大少力此素多痰淫漸漬於水土二經復加剝削之劑屢犯中氣疲倦少食並所必至法當先調中氣輸運水穀之精微然後徐圖溫補下元為疏六君子湯加當歸兼調營血庶無陽無以化之虞其如夫人久患崩淋徧服諸血藥罔効以補中益氣加製香附烏梅升舉其陽兼調其氣所謂病在下取之上端不出古聖之成則耳

腹滿

經云太陰所至為中滿。諸淫腫滿。於脾。腹脹大皆屬於熱。清氣在下則生食泄濁氣在上則生此。金匱云跌陽脈微弦法當腹滿不滿者必便難兩胕疼痛此虛寒從下上也當以溫藥服之

跌陽以候內因寸口以候外因。跌陽脾胃之脈而見微弦為厥陰肝木所侵侮其陰氣橫聚於腹法當腹滿有加設不滿陰邪必轉攻而上決無輕散之理蓋陰邪既聚不溫必不散陰邪不散陰數必不通故知其便必難勢必逆攻兩胕而痛較腹滿更進一步也虛寒之氣從下而上由腹而胕纔見一斑亟以溫藥服之使陰邪從陰竅走散而不至上攻則善矣

醫通卷之三

腹滿

早思得堂載

病者腹滿按之不痛為虛痛者為實可下之古黃耆下者下之黃自去

腹滿時減復如故此為寒當與溫藥腹滿不減減不足言當須下之宜大承氣湯

腹滿不減減不足言當須下之宜大承氣湯一條已見傷寒陽明府實證此腹滿時減復如故為虛寒當溫之蓋腹滿雖因中氣虛寒然下焦之真陽未滅有時而升則有時而減然終屬虛寒故復如故而當與溫藥也按之心下滿者此為實也當下之宜大柴胡湯

邪從胸膈而入於陽位合用大柴胡兩解之與臍腹硬痛承氣證不同

病者痿黃躁而不渴胸中寒實而利不止者死

寸口脈弦者。即腹下拘急而痛。其人畜畜惡寒也。

此論外因之腹滿。故脈辨於寸口。寸口脈弦而腹下拘痛者。其人表氣微虛。不能外禦其邪。俾風邪即與水氣相合。而為脇下拘痛。表中陽虛。故畜畜惡寒也。

夫瘦人繞臍痛。必因風冷。穀氣不行。而反下之。其氣必衝。不衝者。心下則痞。

瘦人本無痰淫痺著。而繞臍痛者。為肌肉疎薄。風冷得以直入。于於脾土之陰分。土氣傷則不能轉運。是以穀氣不行。若反下之。徒虛其腸胃。邪氣愈逆。因而上衝。經曰。氣上衝胸。邪在大腸故也。不衝者。邪在於胃。客氣上逆。則心下痞也。

病腹滿。發熱十日。脈浮而數。飲食如故。厚朴七物湯主之。

醫通卷之三

腹滿

思得堂藏

腹滿者。邪氣入於裏也。發熱者。陽氣達於外也。雖病經十日。而脈浮數。邪猶未全入裏。況能食。以證胃氣之有積。故用小承氣合桂枝去芍藥湯。兩解表裏之法。較之桂枝加大黃湯。多枳朴而少芍藥。以枳朴專泄壅滯之氣。故用之。芍藥專收耗散之陰。此腹但滿而不痛。與陰血無預。故去之。

腹中寒氣。雷鳴切痛。胸腹逆滿。嘔吐。附子粳米湯主之。

腹中寒氣。奔迫上攻胸膈。以及於胃。而增嘔逆。頃之胃氣空虛。邪無所砥。輒入陽位。則殆矣。是以除患之機。所重全在胃氣。其邪初犯胃。尚自能食。而用附子粳米之法。溫飽其胃。胃氣溫飽。則上厚而邪難上起。胸膈逆滿之濁陰。得溫無敢留戀。必還從下竅而出矣。

痛而閉者。厚朴三物湯主之。

痛而閉塞。無雷鳴嘔逆之證者。為實。當下之。即用小承氣倍厚朴。而易其名。以其無亢極之火。故不用承氣二字。與理中湯之易名人參湯一義。

東垣曰。經云。諸脹腹大。皆屬於熱。此八益之邪。有餘之證。自外而入。風寒之邪。傳入於裏。寒變為熱。而作胃實。日晡潮熱。大渴引飲。誠語脹滿者。承氣湯下之。下之則脹已。是也。五藏六府俱有脹滿。更以脈家寒熱多少較之。胃中寒則脹滿。濁氣在上。則生脹。腹中寒淫荒遇故也。太陰之厥。則腹滿。脹脹後不利。不欲食。食則嘔。不得臥。按所云寒脹多如此。亦有高粱之入。醇酒厚味之淫熱。不得施化。鬱於內。而成脹滿者。此熱脹之謂也。調經篇云。因飲食勞倦。損傷脾胃。始受熱中。

醫通卷之三

腹滿

思得堂藏

未傳寒中。皆由脾胃之氣。不能運化精微。致水穀聚而不散。遂成脹滿。又有飲食過傷。而成脹。腹脹泄者。經云。清氣在下。則生飧泄。濁氣在上。則生脹。此陰陽反作。病之逆從也。夫飲食不節。起居不時者。陰受之。陰受之。則入五藏。入五藏。則閉塞不通。而成脹。脹矣。此皆飲食自倍。腸胃乃傷所致。治脹務在調其虛實。過其寒溫。兼寒熱補瀉之法。於戰守之間。從少從多。各從其類。可一言而盡也。

張三錫曰。脹滿悉屬脾虛運化不及。濁氣填塞所致。初起微佐以消化。舒鬱為先。勢甚而二便滯滯者。微利之。弱人或稍久。一切病後產後痞後。必用參朮耆芍。大補脾氣為主。而佐以消化。厚朴木香黃連之類。然王道無近功。必數十貼。以漸取効。每見粗工。專守下之。則脹已一法。用商陸牽牛等。一

瀉即消三日後復起然真氣因瀉而下脫邪氣必復聚而成脹遂致不救可勝嘆哉

腹脹諸證雖屬寒者多屬熱者少然世治腹喜用辛溫散氣之藥即使溼熱作脹亦必賴辛溫之品以散氣氣散則脹滿亦寬但須以去溼熱之藥為主而兼辛溫為引導則可然又有火盛陰虛熱乘血分者其腹雖脹而不甚大按之益堅小便黃赤大便秘澀至夜則微熱其脈數實而細小不可誤作食積溼熱治蓋消導則陰愈傷去溼則津愈涸矣宜用極苦極寒之藥如當歸龍薈九或四物湯加宣胡二連蘆薈俱用醋製可一服而効也○有氣虛不能裹血血散作脹必其人大便不堅或時結時澀滑則稍減結則漸加小便清利甚則渾白如泔其脈緩大而滑氣口益甚慎不可用辛溫耗氣之

醫通卷之三

腹滿

思得堂藏

思得堂藏

藥宜四君子去白朮加水香澤瀉當歸芍藥以固其氣中之血○有血虛不能斂氣氣散作脹必其人煩熱便燥小便黃數其脈浮數而弦人迎尤甚慎不可用苦寒傷胃之藥宜四物湯去地黃加黃耆肉桂甘草煨薑以和其血中之氣○外因六氣成脹藿香正氣散○內因七情成脹沉香降氣散○憂思過度致傷脾胃心腹膨脹喘促煩悶腸鳴氣走澀澀有聲大小便不利脈虛而澀局方七氣湯○濁氣在上則生膜脹生薑瀉心湯加水香厚朴○脾胃不溫不能腐熟水穀而脹附子理中湯○腎藏虛寒不能生化脾土而脹濟生腎氣丸○中滿腹內堅硬如盤不能坐臥大小便澀滯上氣喘促面色痿黃通身虛腫者此寒熱錯雜膠固於中營衛血氣凝滯於內也分消湯分消丸詳寒熱多少或加減用之諸七氣

選用亦可○氣口脈滑惡心飽悶口乾內熱者是食積積

實導滯九○飽食奔走或跌撲凝血不散或婦人血聚而成腹脹腹上有青紫筋腹中按之疼脈來弦澀當作蓄血治之○怒甚氣逆服肝脹滿兩手脈弦青皮陳皮木香山梔柴胡枳殼歸尾桃仁芍藥薄桂○腎酒之人病腹脹如斗前後澀便俱有血用利藥轉加其脈數而澀此得之溼熱傷脾陰不能統血胃雖受穀脾不輸運故成痞脹當理脾氣祛溼熱兼發血之劑如枳實黃連炮薑半夏茯苓當歸芍藥阿膠烏梅砂仁之類白芍烏梅收脾陰黃連枳實瀉濕歸膠補營血苓半去涎飲砂仁醒脾氣也倘觸動平昔所蓄之溼熱脹滿逆上喘急者多死下利不止者亦死

醫通卷之三

腹滿

思得堂藏

思得堂藏

停滯濡滑為溼熱弦細為肝邪乘脾人迎浮弦為風氣內聚弦細而數為陰邪上逆若虛大無根為脾胃氣衰沈細短澀為腎藏氣絕

石頑治太史錢官聲堯去秋瘧久大虛飲食大減經水不調季冬客行一度今春時發寒熱腹滿不食服寬腹利水藥不應擬進破血通經之劑適石頑相商其脈左寸厥厥動搖右關與兩尺雖微弦而重按久按却滑實流利惟右寸左關虛滿而數尋之澀澀少力此陰中伏陽之象詢為胎脈無疑良由中氣虛乏不能轉運其胎故爾作脹前醫曰自結稿迄今距十二載從來未曾受孕病後元氣大虛安有懷妊之理石頑曰向之不孕必有其故今病後餘熱留於血室因而得妊亦恆有之細推病機每粥食到口輒

欲作嘔惟向晚寒熱之際得熱飲入胃其寒熱頓減豈非胃氣虛寒水精不能四布留積而為涎液汪洋心下乎俗名惡阻是也其腹滿便難之虛實尤須明辨金匱有云跌陽脈微弦法當腹滿不滿必便難乃虛寒從下上也當以溫藥服之況大便之後每加腹急以裏氣下通濁陰乘機上擾與得下暫時寬快迥殊其治雖當安胎為主但濁陰之氣非藉辛溫不能開導其結遂疏四君子湯益入歸芍以收營血之散稍借肉桂為濁陰之嚮導使母氣得溫中健運之力胎息無濁陰侵犯之虞桂不傷胎麗安常先有明試余嘗屢驗之矣服後寒熱漸止腹脹漸寬飲食漸進胎息亦漸形著而運動於臍上至仲夏因起居不慎而胎漏下血前醫猶認石癥而進破積之方乃明論脈證左寸動滑斷屬乾象而與扶脾藥得安後產一子舉家稱快設不審而與通經破血能保子母幾全之慶乎

飛曉治謝元海因夏月常飲火酒致善食易飢半月後腹漸脹滿大便艱澀而食亦日減醫用削剋清火俱不効左脈細數右脈澀滯此始為火助胃強而善食繼為火灼胃液而艱澀艱澀則食滯而脹滿脹滿則食減今宜斷食辛烈乘元氣未滿祛其滯而回其液日久則費調理也因用枳實導滯湯去黃連白朮加葛根一服大便通利而滯行又用健脾理氣三日後以小劑生脈加萎蕤煨葛根不半月而愈

水腫

經云肺移寒於腎為滿水涌水者按腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹漿水之病也

水始起也目窠上微腫如新臥起之狀其頸脈動時欬陰股間寒足脛腫腹乃大其水已成矣以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也

邪氣內逆則氣為之閉塞而不行不行則為水脹三陰結謂之水

平治權衡去苑陳莖微動四極溫衣繆刺其處開鬼門潔淨府精已時復五陽已布故精自生形自盛骨肉相保巨氣乃平

此言土虛不能制水之病平治權衡者使陰陽各得其平

也苑者積也陳者久也莖者腐也陰陽平治水氣自去微動四極者運動四肢也溫則水氣易行故須溫衣不拘隧穴名曰繆刺廉理謂之鬼門膀胱謂之淨府開者發汗也潔者滲利也陽氣既和陰精時復由是五陽宣布陰水盡滲精血自生形肉自盛骨肉與衣相保大氣平矣

金匱云師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水其脈自浮外證骨節疼痛惡風皮水其脈亦浮外證肘腫按之沒指不惡風其腹如鼓不渴當發其汗正水其脈沈遲外證自喘石水其脈自沈外證腹滿不喘黃汗其脈沉遲身發熱胃滿四肢頭面腫久不愈必致癰脹

風水者腎本屬水因風而水積也經云并浮為風水傳為胕腫又曰腎風者面胕腫然壅害於言不能正偃正偃則

明經脈之證也。熱久在肌肉。故化癰膿。

風水脈浮。身重汗出惡風者。防已黃耆湯主之。腹滿者加芍藥。風水惡風。一身悉腫。脈浮不渴。續自汗出。無大熱。越婢湯主之。

水主腎病。腎脈本沈。以其肝木過盛。火熱生風。水勢乘風上湧。所以風水之脈反浮也。素問云。腎肝并浮。為風水。蓋腎肝同處。腎為陰主靜。其脈常沉。肝為陽主動。其脈常浮。二臟俱有相火。動於腎者。猶龍火之出於海。動於肝者。猶雷火之出於澤。龍起而水隨。風發而波湧。今水從風湧。是以腎肝並浮也。水既從風而脈浮。其病在表也。骨節疼痛。表之虛也。身重水客分肉也。汗出惡風。衛氣虛也。防已療風腫水腫。通腠理。黃耆溫分肉。補衛虛。白朮治風主汗。甘

草和藥益土。薑棗辛甘發散。腹痛者。肝邪氣塞。不得升降。再加芍藥以收陰也。若見一身悉腫。而脈浮不渴。續自汗出。無大熱。此風氣鼓搏其水。駸駸向外。當與越婢湯發之。此因勢利導之法。且中有石膏化熱。而無上逆喘滿之虞也。

皮水為病。四肢腫。水氣在皮膚中。四肢蠲蠲動者。防已茯苓湯主之。厥而皮水者。蒲灰散主之。

風水脈浮。用防已黃耆湯矣。而皮水即髮髻用之前。脈論中同一開鬼門。而標中之本。則微有分。風水下鬱其土氣。則用白朮崇土。薑棗和中。皮水內合於肺。肺病則氣病。故又名氣水。金鬱泄之。水積於皮。以淡滲之。故以茯苓易白朮。加桂枝解肌以散水於外。不用薑棗和之於中也。況四

肢蠲蠲。風在營衛。觸動經絡。桂枝安得不用耶。若皮水而見厥逆。知水漬入胃。胃病不能行陽氣於四末。故手足諸陽之本先病也。與傷寒厥而心下悸。當先治水。藥雖異而理則同也。

水之為病。其脈沉小。屬少陰。浮者為風水。虛脹者為氣水。發其汗即已。脈沉者宜麻黃附子湯。浮者宜杏子湯。

此論少陰正水之病。其脈自見沈小。殊無外出之意。若脈見浮者。風發於外也。虛脹者。手太陰氣鬱不行。而為虛脹也。風氣之病。發其汗則已。即脈沈無他證者。當効傷寒少陰例。用麻黃附子甘草湯。運動其水。以救腎邪。若見外證喘滿。知水氣之在上。而不狂下。即於前方除去附子。而加杏仁。以救肺邪。此治金水二臟之正法也。

吳水者一身面目黃腫其脈沈小便不利故令病水假令小便自利此以津液故令渴也越脾加木湯主之甘草麻黃湯主之

裏水即石水水積膀胱內胞而小腹硬滿如石也首條言其脈自沈外證腹滿不喘腎肝并沈之象其水潛伏於裏沈然不動非借風水越脾湯之法不能激之四沆也此言一身面目黃腫脈沈小便不利雖顯陽邪內動究竟脈沈不鼓不能破陰邪之堅壘必需前湯加木以發越脾氣俾陰邪從陽裏邪從表一發而陰霧迅掃此內經開鬼門法也夫小便不利而水積為患理固宜然設小便自利而水道順越可無病水之慮矣何至亡津作渴耶不知金匱設以為例意謂此證皆由小便不利所致即使凌瀾忽利反

醫通卷之三

水腫

平

思得堂藏

加煩渴此必陽邪內擾迫其陰津下亡當非寒去欲解之比故證雖變而治不殊總不出越脾加木之範圍也。按正水與石水似同而實異正水則外證自喘其本在腎其未結如石可知求其如風水皮水之脈浮殊不可得非用麻黃石膏重劑發之永無解散之期也甘草麻黃湯即越脾湯之變法病氣本輕但需開發肺氣於上則膀胱氣化行矣

問曰黃汗之為病身體腫一作發熱汗出而渴狀如風水汗沾衣色正黃如漿汁脈自沈何從得之師曰以汗出入水中浴水從汗孔入得之宜著芍桂酒湯主之溫服一升當心煩服至六七日乃解若心煩不止者以苦酒阻故也

黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已汗出又身常暮卧盜汗出者此營氣也若汗出已反發熱者久久其身必甲錯發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久久必身瞶瞶即胸中痛又從腰以上必汗出下無汗腰髀弛痛如

有物在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利此為黃汗桂枝加黃耆湯主之須臾飲熱粥一升餘以助藥力溫覆取微汗若汗不出更服黃汗皆由營氣不和氣聚虛襲入所以有發熱汗出身體重痛皮膚甲錯肌肉瞶動等證至於脛冷髀弛腰下無汗內經所謂身半以下溼中之也脈沈遲者水溼之氣滲於經脈而顯遲滯不行之狀證雖多岐觀其所治咸以桂芍和營散邪即兼黃耆可開闢之機杜邪氣復入之路也

醫通卷之三

水腫

思得堂藏

○按仲景於熱熱壅滯之候每云甲錯即肌若魚鱗之狀故發熱不止則熱熱潰腐而為惡瘡每言身瞶乃經脈動惕之兆故發汗不已則營氣內乏而胸中痛也

氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作桂枝去芍藥加麻辛附子湯主之當汗出如蟲行皮中即愈心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作枳朮湯主之腹中軟即當散也

肺主一身之氣而治節行焉今氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作形容水飲久積胸中不散傷其氣氣之氣乃至心下堅大如盤遮蔽大氣不得透達祇從傍邊轉轉如旋杯之狀正舉空洞之位水飲占據為言其用桂枝去芍藥加麻黃附辛以通胸中陽氣陽主開陽盛則有開無

塞而水飲之陰可見現耳。若胸中之陽不虧。當損其有餘。則用枳朮二味。開其痰結。徒其脾胃。而陽分之邪解之。自易耳。人但知枳實太過。而用白朮和之。不知痰飲所積。皆由脾不健運之故。苟非白朮。豁痰利水。則徒用枳實。無益耳。

夫水病人。目下有卧蠱。面目鮮澤。脈伏。其人消渴。病水腹大。小便不利。其脈沈絕者。有水。可下之。○諸有水者。腰已下腫。當利小便。腰已上腫。當發汗乃愈。

張介賓曰。水本畏土。因土虛不能制水。則寒水侮所不勝。反乘脾土。泛濫為邪。其始起也。必從陰分漸次而升。按肉如泥。腫有分界。夫水雖制於脾。而實主於腎。腎本水藏。而元氣寓焉。若腎中陽虛。則命門火衰。既不能自制陰寒。又不能溫養

醫通卷之三

水腫

三

思得堂藏

脾土。陰陽不得其正。則化而為邪。夫氣即火也。精即水也。氣之與水。本為同類。但在化與不化耳。故陽旺則化。而精即是氣。陽衰則不化。而水即為邪。凡火盛水虧。則病燥。水盛火虧。則病溼。故火不能化。則陰不從陽。而精氣皆化為水。所以水腫之證。多屬陽虛。

喻嘉言曰。病機之切於人者。水火而已。水流淫。火就燥。水柔弱。火猛烈。水泛溢於表裏。火遊行於三焦。斟酌救焚。可無其以應乎。經謂二陽結謂之消。三陰結謂之水。手足陽明熱結而病消渴。火之為害固已。而三陰者。手足太陰脾肺二藏也。胃為水穀之海。水病莫不本之於胃。乃以屬之脾肺者。何耶。使脾足以轉輸水精於上。肺足以通調水道而下。則胃無病。水之虞矣。惟脾肺二藏之氣結而不行。後乃胃中之水日

醫通卷之三

水腫

三

思得堂藏

蓄漸積。表裏無所不到也。是則脾肺之權可不神耶。然其尤重於腎。腎者胃之關也。腎司開闔。腎氣從陽則開。陽太盛則開門大開。水直下而為消。腎氣從陰則闔。陰太盛則開門常闔。水不通而為腫。經又以腎本肺標。相輪俱受為言。然則水病以脾肺腎為三綱矣。於中節目尤難辨。金匱分五水之名。及五藏表裏主病。徹底言之。後世漫不加察。其治水輒宗綱術。不能行所無事。可謂智乎。○治氣之源有三。一曰肺氣。肺氣消則周身之氣下行也。一曰胃氣。胃氣和則胸中之氣亦易下行也。一曰膀胱之氣。膀胱之氣旺則能吸引胸中之氣下行也。經曰。膀胱者州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。又云上焦如霧。言其氣之氤氳如霧也。又云腹中者。臣使之官。言其能分布胸中之氣而下傳也。夫腹中者。與上焦胸膈同位。膀胱位於腹內。膀胱之氣。空洞善容。而腹中之氣得以下運。若膀胱之氣不化。則腹已先脹。腹中之氣安能下達耶。然欲膀胱之氣化。其權在於保腎。腎以膀胱為府也。腎氣動必先注於膀胱。履動不已。膀胱脹滿。勢必逆奔於胸膈。其窒塞之狀。不可名言。治法補腎水而致充足。則精氣緩藏。而膀胱之脹自消。補膀胱而令氣旺。則腎邪不畜。而輸化之機自裕。所以然者。以腎不補則不能藏。膀胱不補則不能瀉。○凡治水腫喘促。以順肺為主。肺氣順則膀胱之氣化。而水自行矣。試以格物之理論之。凡禽畜之類。有肺者有尿。無肺者無尿。故水道不利而成脹滿。以清肺為急。此義前人闡發不到。後人以五苓五皮等方治水者。總之未明此旨。至於車水放塘。種種劫奪膀胱之劑。則殺人之事矣。

水腫有陰陽之辨。陽水者。脈息浮數。遍身腫。煩渴。小便赤澀。大便多秘。急宜疏導。飲禹功散。滑川散。神芎丸。神祐丸。選用。小便不通。危患且夕者。沈香琥珀丸。陰囊腫脹。二便不通者。三白散。然驟發便劇。元氣未衰者。可用上法。若病後脾虛發。腫。只宜輕劑投之。如六君五苓理苓之類。俱可應用。陰水者。脈沉遲。或細緊。遍身腫。不煩渴。大便自調。或清泄。小便雖少。而不赤澀。實脾散加減。小便頻數者。濟生腎氣丸。小便有澀。黃赤。有時不赤。晚則微赤。此陰本陽標。未可據用溫補。先與五苓散清理其標。次與復元丹。陰陽結邪。多陰少陽。為石水。越脾加水湯發之。腎肝并沈。為石水。真武湯溫之。小便涓滴不通。諸藥不應。急用金液丹。竈心赤土煎湯送半錢。誤用峻利。小便不通者。理苓湯和之。經云。結陽者腫。

醫通卷之三

水腫

思得堂藏

四肢。四肢為諸陽之本。陽結則不行其陰。故留結為之肢腫。五苓散分利之。水腫暴發。脈浮喘滿。效逆煩熱者。小青龍湯上熱戴陽下虛足冷。小青龍去麻黃換肉桂。加熟附子四五分。面目四肢浮腫。屬淫熱。五皮散初起。脈實氣盛。五子五皮飲。面獨腫而氣急。蘇子降氣湯煎成磨沈香調服。有一身腫面與足腫。早則面甚。晚則足甚。蘇子降氣合除淫湯各半貼和服。右半邊腫甚者。肺胃中有積滯也。導氣為先。大忌琥珀鬱金蘇方五靈之類。左半邊腫甚者。肝腎間有瘀血也。散血為要。大忌胃苓。非特蒼朮性燥。能阻滯惡血。即白朮亦須生用。生則有逐淫散血之功。而無壅滯之患。皮水四肢腫而頑躁動者。防已茯苓湯。感淫而腫者。其身雖腫而腰已下至脚尤重。防已黃耆湯加黑黃牛尿。輕者除。

淫湯加水瓜大腹皮。因於氣為腫者。脈必沉伏而腫滿喘急。增損流氣飲。大腹水腫喘脹大小便秘者。葶藶木香散。○不服水土而腫。胃苓湯。病後腰脚浮腫。為有水氣。胃苓湯加黃連。因患瘡。用乾瘡藥太早而致身腫。上半身甚者。羌活勝濕湯加升麻白芷。蘇葉。下半身甚者。五苓散換茅朮。加水瓜大腹皮。婦人經水先斷。後至四肢浮腫。小便不通。通身皆腫。此血化為水。名曰血分。此病乃七情乖違。脾胃虧損。不能統攝而成。最為難治。日用歸脾湯下板仁丸。一丸。藥雖峻厲。數日當効。畏而不用。有養病害身之患。若先小便不利。後至身面浮腫。經水不通者。血為水敗也。名曰水分。用歸脾湯送葶藶丸。七丸。其經脈不通而化為水。流走四肢。悉皆腫滿者。亦曰血分。其證與水腫相類。而實非水也。歸脾湯送。

醫通卷之三

水腫

思得堂藏

人參九十五丸。皆形氣不足。邪淫陰道。必用此藥。以宣導其邪。佐以調補元氣。庶藥力有所仗而行。則邪自不能客。而真氣亦不致於獨傷矣。水腫死證。見一卽危。傷肝脾黑及腫。傷心缺盆平。掌無紋。傷脾脾突。傷腎足底平。傷肺背平肩聳。如卵縮向上。陰囊無絲。及並腫腐者死。大便滑泄。水腫不消者死。加以喘滿。雖暴病亦必不治。泄後腹脹而有青筋者死。鼻扇目青。耳焦面黑。破胸脫肉者。死期迫矣。先起於腹。後散於四肢者。可治。先起於四肢。後歸於腹者。死。如肺氣不能下行。兩足腫潰。而小水全無。腹中之痛。不可名狀。以手揉左。則痛攻於右。揉右。則痛攻於左。當臍揉穴。則滿腹俱痛。叫喊不絕。利水敷臍之藥。俱不効。無可治矣。

開鬼門之劑。麻黃羌活。防風柴胡。葱白及柳枝煎洗。○潔淨府之劑。澤瀉木通通草。防已。葶藶。茯苓。猪苓。秋石代鹽。○去苑陳莖之劑。商陸大戟。甘遂。羌花。牽牛。○宣布五陽之劑。附子肉桂。乾薑吳茱萸。○血腫之劑。琥珀。鬱金。劉寄奴。蘇木。○丹方治水腫。用蠶心赤土升許。燒紅。乘熱以陳三白酒或火酒淋。澄清。空腹食之。愈。血腫。脈證俱實。大便閉者。生萊菔搗汁半盞。和白酒少許。隔湯頓熱食之。生牛膝搗絞汁服亦通。但精滑人禁用。○丹方治水腫。用蝦蟇七隻。去頭皮足。白酒漂淨。同獨蒜四五十枚。入猪脂中。白酒煮爛。去蝦蟇食猪脂。食後復便。頻腫即消。○又方治鯨魚一枚。去腸。入獨蒜。滿腹。白酒煮食。食後大小便與失氣齊通。即消。虛人燬灰分三

醫通卷之三

永隆

吳思得堂藏

次砂糖調服亦消。消後復脹者。過三四日再服一次。三次必盡。後以健脾胃理氣及溫腎藥調之。○水腫小便不通。諸藥不應。用車前草葉搗爛。絞自然汁一盞。入燒酒半杯。頓熱。空心通口服。不過七日。効。病久虛極。不勝開泄者。用薏苡四兩。湯泡。煮數沸。頻與熱服。即通。勿過熱。過熱即不効。○赤豆煮湯。代茶良。鯉魚重飭許者。和冬瓜葱白煮汁食。鯉魚亦佳。鯉魚作羹。用醋勿用鹽。而千金水腫。蒜醋皆忌。以其性味之濁也。而血腫尤忌。絲頭鴨。或白鴨。同赤豆煮汁。空腹食之。切忌鹽醬。入口病必轉甚。以鹽能助腎水之邪。豆麥助溼發熱也。不能戒者。用赤豆大麥。煮成黃。以伏龍肝水澄清。化青鹽下之。青鹽產砂土。與煮海成鹽不同。能清心滋腎。而無助水之患也。忌猪羊雞鰾蝦蟹麪。及一切生冷炙煇。尤戒房室憂

勞醉飽

診。脈沉主水。沉而滑。浮而遲。弦而緊。皆水腫。水病腹大。脈實大者生。浮虛者死。水病腹閉。其脈沉實。弦者生。沉細虛小者死。水病一身悉腫。瀉利厥逆。脈沉實者急。溫之。虛大者必死。加以喘迫。此為命絕。

李士材治錢賞之通體腫急。臍突背平。法在不治。舉家堅請用藥。以金匱腎氣丸料。大劑煎服。兼進理中湯。五日不効。乃以人參一兩。生附三錢。牛膝茯苓各五錢。小便忽通。進食。計服人參四兩。附子薑桂各兩餘而安。

劉默生治汪去塵脾虛水逆傷肺。喘嗽不食。小水不通。脈虛不勝補瀉。用茯苓五錢。澤瀉。橘紅各一錢五分。防風肉桂熟附各五分。二服水去。後加入人參調理而安。

醫通卷之三

永隆按

李

吳思得堂藏

石頑治王庸若。嘔逆水腫。便溺滴不通。或用五苓八正不應。六脈沉細如絲。因與金液丹十五丸。溺如泉湧而勢頓平。後以濟生腎氣培養而安。

鼓脹

靈樞經論云。其脹大堅以滿者。脹也。○水脹云。膚脹者。寒氣客於皮膚之間。蠶然不堅。腹大身盡腫。皮厚。按其腹。胃而不起。腹色不變。此其候也。○腹脹身皆大。大與膚脹等。色蒼黃。腹筋起。此其候也。○夫脹者。皆在於藏府之外。排藏府而郭胸脇。脹皮膚。故命曰脹。五藏六府。各有畔界。其病各有形狀。營氣循脈。衛氣逆為脹。脈循分爲膚脹。三里而寫。近者一下。遠者三下。無問虛實。工在疾寫。夫心脹者。煩心短氣。卧不安。肺脹者。虛滿而喘欬。肝脹者。脇下滿而痛。引小腹。脾脹者。善噦。四肢煩倦。體重不能勝衣。卧不安。腎脹者。洩滿。引背中央。然腰髀痛。胃脹者。腹滿。胃脘痛。鼻聞焦臭。妨於食。大便難。大腸脹者。腸鳴而痛。濯濯。冬日重感於寒。則發泄。○
醫通卷之三
鼓脹
五九 思得堂藏

不化。小腸脹者。少腹脹。引腰而痛。膀胱脹者。小腹滿而氣瘕。三焦脹者。氣滿於皮膚中。輕然而不堅。膚脹者。脇下痛。脹口中苦。善太息。凡此諸脹。其道在一。明知逆順。鍼數不失。補虛寫實。神歸其室。久塞其空。謂之良工。
按諸脹統言。無問虛實。工在疾寫。次云補虛寫實。神歸其室。二說相左。其義何居。原夫諸脹之因。良由衛氣逆。故宜疾寫以下其氣。氣下則脹消矣。衛氣水穀之悍氣。常行脈外。不能入於脈。今以偕逆過甚。乃并居營分而入於脈。則爲脈脹。衛氣並脈。循分肉間。則爲膚脹。故昭揭於藏府諸脹之前。且言凡此諸脹。其道在一。故其治。總不超鍼三里以疾寫之也。明知逆順者。知胃逆之甚與不甚也。鍼數不失者。隨近遠之一下三下也。

素問云。有病心腹脹。且食則不能。暴食。名爲鼓脹。治之以雞矢醃。一劑知。二劑已。其有時復發者。何也。此飲食不節。故時有病。氣聚於腹也。○胃脈實則脹。○脾氣實則腹脹。淫洩不利。○濁氣在上。則生脹。○中滿者。濁之於內。○下之則脹已。○飲食起居失節。入五藏。則腹滿閉塞。○腹滿。腹脹。支滿。脇下脹。上胃。過在足。太陰陽明。○太陰之厥。則腹滿。腹脹。後不利。不欲食。食則嘔。不得卧。○胃中寒。則腹滿。○臍寒生滿。○胃風。胃塞不通。腹善滿。失衣則腹脹。○熱勝則腹。○諸脹腹大。皆屬於熱。諸病有聲。鼓之如鼓。皆屬於熱。
丹溪曰。單腹脹。乃脾虛之甚。必用大劑參朮。佐陳皮茯苓者。水厚朴之類。或曰。腹已脹矣。反用參朮。何耶。曰。乃內經塞因。醫通卷之三
鼓脹
五九 思得堂藏

塞用之法。正氣虛而不能運行。濁氣滯塞於中。今扶助正氣。使之自然健運。邪無所留而脹消矣。
盛啟東云。凡下氣虛。中焦氣壅。欲散滿則恐虛其下。欲補下則滿甚於中。況少服則資壅多。服則宜通。當以啓發湯。峻補其下。疏啓其中。故氣既得峻補。則上行而啓其中。中焦運行之令。使之疎通。則中滿自消。下虛自實。乃塞因塞用也。○補脾藥必佐薑製厚朴。以其溫能益氣。辛能寬脹也。
張介賓曰。按五藏六府。雖皆有脹。然無不本於脾肺腎三藏。脾屬土。主運化。肺屬金。主五氣。腎屬水。主五液。故五氣所化之液。咸本於腎。五液所行之氣。咸本於肺。轉輸於金水二家。以制水而生金者。咸本於脾。是以脾脹之病。無不由此三者。但陰陽虛實治法各殊耳。大抵陽證必熱。熱者多實。陰證必

寒者多虛。先服於內。後服於外者。多實。先服於外。後服於內者。多虛。小便黃赤。大便秘結者。多實。小便清白。大便稀澇者。多虛。脈滑數有力者。多實。脈細微無力者。多虛。形色紅黃。氣息粗大者。多實。容顏枯槁。音聲喘促者。多虛。服起於經年。累月。由食少多瀉而致者。虛也。當補中為主。服起於旬日之間。忽因七情六氣而成者。實也。當疎利為主。朝寬暮急。血虛。暮寬朝急。氣虛。朝暮皆急。氣血俱虛。余於服滿。察其實者。直清陽明。反掌收功。若涉虛者。溫補脾腎。漸次康復。其有不實。亦不大虛者。先以清利見功。繼以補中調攝。又有標實而本虛。瀉之不可補之。無功極爲危險。在病名有鼓脹與蠱脹之殊。鼓脹者。中空無物。腹皮細急。多屬於氣也。蠱脹者。中實有物。腹形充大。非蠱卽血也。在治法有理脾理肺之殊。先喘

醫通卷之三

腹脹

卒

思得堂藏

而後服者。治在肺。先服而後喘者。治在脾。然脹則必喘。喘則必脹。二者相因也。脾不運而濁火上炎。肺不得清。則喘。肺氣被鬱。喘而不得下降。則脹。治分新久虛實。初起脈實大。二陳蘇子。葶藶泄之。二便通暢。喘脹俱減。其功易易也。

喻嘉言曰。從來腫脹。遍身頭面俱腫。尚易治。若只單單腹脹。則難治。遍身俱腫脹者。五臟六腑各有見證。故瀉肝瀉脾。瀉勝。大小腸。間有取効之時。單單腹脹久空。而清者不升。濁者不降。互相結聚。牢不可破。實因脾胃之衰微所致。而瀉脾之藥。安敢漫用乎。且腫脹之可瀉者。但可施之於壯盛及田野之流。豈高梁老弱所能受。設爲腫病。爲大滿大實。必從乎瀉。則久病後腫。與產後腫。將亦瀉之耶。後人不察。藥從攻瀉。其始非不遽消。其後攻之不消矣。其後再攻之。如鐵石矣。不

知者見之。方謂何物邪氣。若此之盛。自明者觀之。不過爲猛藥所攻。卽此身之元氣。轉與身爲難。有如驅良民爲盜賊之比。明乎此。則有培養一法。補益元氣是也。則有招納一法。宣布五陽是也。則有解散一法。開鬼門。潔淨府是也。三法是不言瀉。而瀉在其中矣。

夫脹皆脾胃之氣虛弱。不能運化精微。致水穀聚而不散。故成脹滿。飲食不節。不能調養。則清氣下降。濁氣填滿。胸腹滯熱相蒸。遂成此證。小便短瀇。其病膠固。難以治療。用半補半瀉之法。從脾順水。寬中爲主。不可過用猛烈。反傷脾胃。病再復服。不可治也。宜分消湯分消丸。隨寒熱虛實加減治之。脹滿得之未久。或脹或消。腹皮稍軟。不洩不喘。隨治隨愈。若脾心凸起。利後復急。久病羸乏。喘急不得安者。名曰脾腎俱

醫通卷之三

腹脹

卒

思得堂藏

敗。無有愈期。至致喉失音。青筋橫於腹上。及爪甲青。卒腫頭面。蒼黑。嘔吐頭重。上喘下泄者。皆不治。畜血成脹。腹上青紫筋見。或手足有紅縷赤痕。小水利。大便秘。金匱下瘀血湯。不應抵當丸去水。姪加礬雞作丸。空腹日進。梧子大三九。血下止。後服輕則散血消脹湯。肥白人腹脹。多是淫痰。二陳六君。平胃五苓。泰酌。瘦人腹滿。是熱。用妙川連厚朴。白芍香附。婦人血腫。煩躁。漱水不欲嚥。神昏善忘。小便多。大便黑。散血消脹湯。虛人血蠱。琥珀人參丸。或因產崩血虛。或瘀血不散。亦成腫脹。其人必脈滿面黑。不可作水淫治之。腹脹便血。其脈大時絕者死。腹大脹。四末清。形脫泄甚。上氣喘息者死。腹脹誤用攻藥。暫寬復脹者皆不治。先服於內。後服於外。小便赤澇。大便秘結。氣色紅亮。聲音高爽者。實

也。木香沉香。砂仁枳實。厚朴蒼朮。大腹皮。以治脾也。桑皮葶
藶。殼蘇子。桔梗枳橘。以治肺也。木通防己。茯苓車前。澤瀉
猪苓。以利小便也。麻黃防風。羌活葛根。以發汗也。如氣壯能
食。年少新病者。大黃芒硝。皆可應用。先服於外。後甚於內。
小便淡黃。大便不實。氣色枯白。語言低怯者。虛也。參苓白朮
陳皮甘草。以補脾也。人參黃耆。桔梗苈仁。以補肺也。沉香枳
殼。木香。以理氣也。桂苓澤瀉。猪苓白朮。以利小便。升麻柴胡
以開鬼門。如虛甚多寒者。桂附薑黃。俱宜取用。金匱腎氣
丸。益火消陰。脈沉者。誠為切要之藥。然必小腹脹極。而後旁
及於上者。為宜。試觀冰盤冷氣。必從下滲。冰鐺脹滿。則從上
而裂矣。小建中湯。於土中瀉水。必脈浮而弦強者。乃為合
劑。亦須脇下脹急。而後旁及於中者。方可投之。蓋風木之邪。

醫通卷之三

空 恩得堂藏

起於東方。土敗木賊。然後中央受困耳。服而本虛證實。攻
補兩難者。丹方用陳香櫞。去穢入瀉。白堊煨過。水腫用通草
湯。氣腫用砂仁湯。血腫濃煎土牛膝湯。虛極用人參湯。每日
空腹服二錢。此方能散積滯。而不大傷元氣也。○服而虛實
莫辨。宜用火酒熱飲。覺熱喉者。屬實熱。當進苦寒燥淫。攻堅
之劑。若欲熱火酒。如啜冷水者。屬虛寒。參朮薑桂。須大劑頻
投。方可救援。○金蟾散。治一切實服。用大蝦蟇一隻。以砂仁
推滿腹中。鹽泥固濟。煨令紅透。烟盡去泥研末。陳酒下三錢。
并治小兒疳積腹脹。米湯下一錢。○腫脹服藥。最忌鹽醬糟
物。愈久欲食。須用開鹽醬法。用大鱸魚一箇。破開入五苓散。
放瓦上封合。上下俱用火炙黃焦。存性為末。加麝香少許。空
心薑棗湯服之。水腫亦然。惟火脹不忌鹽醬。如面色枯槁。肢

體消瘦。單腹脹急。而塊壘不平者。皆屬火脹。此非水腫。無慮
助腎水之邪也。若脈弦細滑。雖能飲食。終亦必亡。火腫候服
金匱腎氣等藥。急投連環金鈴白芍之類。仍用桂附少許。為
熱因熱用之。嚮導庶可挽回。若喘滿肢枯。脈無胃氣者。不救
診。○脈弦為肝旺。脾胃脈實則脹。此屬實。關上脈虛即脹滿。
此屬虛。洪數為熱。脈遲弱為陰寒。浮為虛滿。緊為中實。虛數
者不可治。實大浮洪者易治。沉微細小者難痊。盛而緊大。堅
以瀉。遲而滑。皆脹滿多熱。脈浮大。腹脹為逆。發熱不休。或寒
熱如瘧。皆不可治。腹大脹。四肢冷。泄瀉。不及一時而死。腹脹
便血。脈大時絕為逆。服而上則喘。下則泄。獨脈浮大沉細
皆不治。

醫通卷之三

腹脹

空

恩得堂藏

項彥章治一女。腹脹如鼓。四體骨立。衆醫或以為狂為癰。
為瘰。診其脈告曰。此氣薄血室。其父曰。服芎歸輩積歲月。
非血藥乎。曰。失於順氣也。夫氣道也。血水也。氣一息不運。
則血一息不行。經曰。氣血同出而異名。故治血必先順氣。
俾經隧得通。而後血可行。乃以蘇合香丸投之。三日而腰
作痛。曰。血欲行矣。恐以芒硝大黃峻逐之下。汚血壅聚如
瓜者數十枚而愈。緣其六脈弦滑而數。弦為氣結。滑為血
聚。實邪也。故行氣而血大下。又一女病同而診異。項曰。此
不治。法當數月死。向者脈滑為實邪。今脈虛。元氣奪矣。又
一女病亦同而六脈俱弦。項曰。具藏脈見。法當踰月死。後
皆如之。
喻嘉言治一血蠱。服藥百日後。大腹全消。左脇始露病根。
一條。如小枕狀。以法激之。嘔出黑汚血斗許。餘從大便泄。

去始消。每思蓋服。不論氣血水痰。總必自開一字。如寇賊蟠據。必依山傍險。方可入乘。內經論五藏之積。皆有定所。何獨於六府之積。久為患。如鼓服等類者。遂謂漫無根柢。區界乎。

石頑治文學。顧若雨。鼓脹喘滿。晝夜不得寢食者二十餘日。吾吳名醫。用大黃三下不除。技窮辭去。更一醫。先與發散。次用消疳破氣二十餘劑。少腹至心下。遂堅滿如石。腰脇與肋中。皆疼痛如折。亦無措指而退。彼戚王墨公。邀余往診。脈得弦大而革。按之漸小。舉指復大。詢其二便。則大便八九日不通。小便雖少而清白如常。此因疳削太過。中氣受傷。濁陰乘虛。僭據清陽之位。而然。以其濁氣上逆。不便行益氣之劑。先與生料六味丸。加肉桂三錢。沈香三分。

通卷之三

鼓脹按

金

思得堂藏

下黑錫丹二錢。導其濁陰。是夜即脹減六七。胸中覺饑。侵晨便進糜粥。但腰膝疼軟如失。兩腎之狀。再劑胸腹全寬。少腹反覺微硬。不時攻動。此大便欲行。津液耗竭。不能即去故也。診其脈。僅存一絲。改用獨參湯。加當歸枳殼。大便略去結塊。腰痛稍可。少腹遂和。又與六味地黃。仍加肉桂。沈香調理而安。

積聚

經云。寒氣客於小腸。膜原之間。絡血之中。血滯不得注於大經。血氣稽留不得行。故宿昔而成積矣。

有身體股肢皆腫。環臍而痛。名曰伏梁。此風根也。其氣溢於大腸。而著於盲。盲之原在臍下。故環臍而痛也。不可動之。動之為水溺瀦之病。

病脇下滿氣逆。二三歲不已。名曰息積。此不妨於食。不可灸刺。積為導引服藥。藥不能獨治也。

按息積乃氣息痞於脇下。不在藏府營衛之間。積久成形。氣不干胃。故不妨於食。

婦人身重。大積大聚。毒可犯也。衰其大半而止。過乃死。

腸覃。寒氣客於腸外。與衛氣相搏。氣不得營。因有所繫。癖而

通卷之三

積聚

金

思得堂藏

內若惡氣。乃起瘕肉。乃生。其始生也。大如雞卵。稍以益大。至其成如懷子之狀。久者離歲。按之則堅。推之則移。月事以時下。此其候也。

石瘕生於胞中。寒氣客於子門。子門閉塞。氣不得通。惡血當寫不寫。衄以留止。日以益大。狀如懷子。月事不以時下。皆生於女子。可導而下。

金匱云。奔豚病。從少腹起。上衝咽喉。發作欲死。復還止。皆從驚恐得之。

驚則傷心。恐則傷腎。心傷氣虛。而腎邪乘之。從少腹起。上衝咽喉。腎脉所循之處也。其水邪逆上凌心。故發作欲死。少頃邪退還止也。

奔豚。氣上衝胸腹痛。往來寒熱。奔豚湯主之。

氣上衝胸腹痛者陰邪上逆也。往來寒熱者邪正交爭也。奔豚雖曰腎積而實衝脈為患。衝主血故以芎歸芍草等半生薑散其堅積之瘀。葛根以通津液。李根以降逆氣。並未嘗用少陰藥也。設泥奔豚為腎積而用伐腎之劑則謬矣。即便果有冰氣凌心不遇桂苓之類千金成法可師不必如東垣奔豚丸之用巴豆烏附等耗水傷津藥也。心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見有頭足上下痛而不可觸近大建中湯主之。

大寒填塞於胸膈之間不能出納是以痛嘔不能飲食也。腹中有寒則汁沫溢於腸胃之外是以上衝皮起出見有頭足痛不可觸乃有形之積聚於空郭之間故當大建其中使邪不致內干於藏也。乾薑人參膠飴太溫補其中土。

醫通卷之三
寒
寒
思得堂藏

蜀椒補心氣而散胸中之寒又能消皮膚中之陰聚總取其辛散耳。

脇下偏痛發熱其脈緊弦此寒也以溫藥下之宜大黃附子湯。

脇下偏痛發熱其脈緊弦寒在厥陰少陰之分也邪在下當從下解然寒邪之在陰分故當以溫藥下之附子驅少陰之寒細辛達厥陰之氣用大黃通泄其積此寒熱並施之妙用也。

寒氣厥逆赤丸主之。

寒氣逆於上下則陰陽之氣不相順接是以厥逆而不知也。烏頭驅上逆之寒茯苓導心氣下降細辛發腎氣上升半夏散寒飲結聚真朱為色有坎離相生之義世俗以烏

半相反殊失此方之與

難經云氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五藏所生其始發有常處其痛不離其部上下有所終始左右有所窮處聚者六府所成其始發無根本上下無所留止其痛無常處肝之積名曰肥氣在左脇下心之積名曰伏梁在臍上上至心下脾之積名曰痞氣在胃脘肺之積名曰息食在右脇下腎之積名曰瘕瘕發於少腹上至心下若豚狀或上或下無時瘕者按之應手亦如五積之不移瘕者假物成形如血隨石痕之類瘕者皮厚也在肌肉之間而可見者也瘕者僻也內結於隱僻外不得見者也。

李士材曰按積之成也正氣不足而後邪氣踞之然攻之太急正氣轉傷初中末之三法不可不講也初者病邪初起正

醫通卷之三
寒
寒
思得堂藏

氣尚強邪氣尚淺則任受攻中者受病漸久邪氣較深正氣較弱任受且攻且補未者病根經久邪氣侵凌正氣消殘則任受補蓋積之為義日積月累匪朝夕所以去之亦當有漸太急則傷正氣正傷則不能運化而邪反固矣余嘗用陰陽攻積丸通治陰陽二積藥品雖峻用之有度補中數日然後攻伐不問其積去多少又與補中待其神壯而復攻之屢攻屢補以平為期經曰大積大聚毒可犯也衰其大半而止過者死故去積及半純與甘溫調養使脾土健運則破殘之餘積不攻自走必欲攻之無餘其不遺人大歎者鮮矣經曰壯者氣行則已怯者則者而成病潔古云壯人無積惟虛人則有之皆由脾胃怯弱氣血兩衰四氣有感皆能成積若遽以堅破積之藥治之疾似去而人已衰藥過則依然氣愈

消痞愈大竟何益哉善治者當先補虛使血氣壯積自消也不問何藏先調其中使能飲食是其本也雖然此為輕淺者言耳若夫大積大聚不搜而逐之日進補養無益也審知何經受病何物成積見之既確發直入之兵以討之何患其不愈兵法曰善攻者敵不知其所守是亦醫中之良將也夫五積六聚隨氣上下發作有時心腹疼痛上氣窒塞小腹滿大小便不利大七氣湯用鐵落飲煎服形羸氣弱者禁用有飲癖結成塊在腸腹之間病類積聚用破塊藥多不効此當行其飲六君子合五苓散最妙更加旋復前胡枳實白芍即海藏五飲湯若在腹外者宜導痰湯主之何以知其飲其人先曾病差口吐涎沫清水或素多痰者是也又多飲人結成酒癖肚腹積塊脹急疼痛或全身腫滿肌黃食少宜大

醫通卷之三

積聚

思得堂藏

七氣湯紅酒煎服。腹中似若瘕瘕隨氣上下未有定處二陳加當歸杏仁桂心積榔名散聚湯若氣作痛遊走心腹間攻刺上下如雷鳴或已成積或未成積宜木香通氣散。肉積妨礙飲食四味阿魏丸。石瘕利血通經湯不應見現丸。虛人十全大補湯送下。腸覃阿魏麝香散。伏梁環臍而痛金匱三物大建中湯加桂苓。息積氣逆而不妨於食內服三因化氣散外用良方阿魏膏此膏貼一切痞積並効。食魚鼈成痞鵝鵝丸。瘕痞寒熱阿魏化痞散。喬氏陰陽攻積丸可代東垣五積諸方。局方治七種瘕塊五種癰病十種瘕忤七種飛尸十二種蠱毒黃病十二種瘕疾十種水病八種大風十二種瘕痺及五藏滯氣壅閉心腹脹滿諸蠱積聚時定時發十年二十年不瘥者千金耆婆萬病丸悉

主之。好食茶葉成癰面黃少力者用椒紅二兩茶葉一兩為末飛羅麪炒香打糊為丸茶清送下三十九。又方苦草一兩加茶葉一兩如好食米穀七炭紙布之類即以其物加入并用其物煮湯送下。瘕痞丹方用明淨雄黃醋炙研細神麝為丸空心溫酒送下四五分勿令間斷消盡乃止。血積桃仁穿山甲乾漆大黃蟲蟲血逐木瓦礫子。痰積半夏南星白朮枳實礞石硝石風化硝白芥子老痰海石蛤粉。水積大戟甘遂芫花芫花。酒積乾葛神麝砂仁荳蔻黃連乾薑甘遂牽牛。茶積薑黃茱萸椒薑。癖積三稜蓬木巴霜大黃。肉積山查阿魏硝石。蟲積雄黃錫灰檳榔雷丸蕪荑使君子鶴蟲。瘕積桃仁鹽甲草果。診。脈來細而附骨者積也。積脈堅強者生虛弱者死沉而

醫通卷之三

積聚

思得堂藏

有力為積沉緊者為寒積脈弦而牢積聚弦而伏者腹中有積不可轉也不治小沉而實者胃中有積聚不下食食即止脈沉重而中散者因寒食成積脈左轉而沉重者氣癥結在胸中右轉出不至寸口者內有肉瘕也。喻嘉言治一入少腹臍傍三塊堅硬如石以手拊之痛不可忍其脈止兩尺洪盛餘俱微細此由見塊醫塊不究其源而誤治也初起時塊必不堅以峻猛之藥攻之致真元內亂轉助邪為害故逆緊不散其實全是空氣聚成非如女子月經凝而不行即成血塊之比觀兩尺脈洪盛明是腎氣傳於膀胱姑用補中藥一劑以通中下之氣後用大劑藥內收腎氣外散膀胱先以理中湯加附了五分塊減十之三再用桂附大劑腹中奔氣響是三塊一時頓沒更

用補腎藥加桂附調理而愈。
顧晉封夫人患瘡在脇下。或令用膏藥加阿魏一分。麝香
半分。貼之。五六日間。遂下鮮血。血塊甚多。二三日方止。其
後每歲當貼膏時必發。近鄰嫗亦用阿魏膏貼瘡。下血如
前。世以阿魏麝香為瘡塊必用之藥。外用為患。若此。況服
食乎。因為拈出。以為虛人漫用攻擊之戒。

張氏醫通卷之三終

醫通卷之三

辛 思得堂藏

張氏醫通卷之四

清

長洲石頭張

聯路玉

以柔安世

男

訥遜言 恭訂

日本

大泉長庵前田安宅子仁

男

與子守 再訂

諸氣門下

痰飲

金匱云。問曰。夫飲有四。何謂也。師曰。有痰飲。有懸飲。有溢飲。
有支飲。問曰。四飲何以為異。師曰。其人素盛今瘦。水走腸間。
漉漉有聲。謂之痰飲。飲後水流在脇下。欬唾引痛。謂之懸飲。
飲水流行。歸於四肢。當汗出而不汗出。身體疼重。謂之溢飲。

醫通卷之四

痰飲

思得堂藏

欬逆倚息。短氣不得臥。其形如腫。謂之支飲。

痰飲為患。十人居其七八。金匱論之甚詳。分別而各立其
名。後世以其名之多也。徒徇其末而忘其本。曾不思聖人
立法。皆從一源而出。無多岐也。蓋胃為水穀之海。五藏六
府之大源。飲入於胃。遊溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸
於肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。以為常人。
金匱即從水精不四布。五經不並行之處。以言其患。隨證
分別。淺深。誨人。因名以求其義。淺者在於軀殼之內。藏府
之外。其飲有四。一由胃而下流於腸。一由胃而傍流於脇。
一由胃而外出於四肢。一由胃而上入於胸膈。始先不覺。
日積月累。水之精華。轉為混濁。於是遂成痰飲。必先團聚
於呼吸大氣難到之處。故由腸而脇。而四肢。至漸漬於胸

肺其勢愈逆則痰飲之患未有不從胃起見者矣夫五藏藏神之地也。積水泛為痰飲。包裹其外。詎非人身之大患乎。凡水飲畜而不散者。皆名留飲。留者留而不去也。留飲去而不盡者。皆名伏飲。伏者伏而不出也。隨其痰飲之或留或伏。而用法以治之。始為精義。今試言之。由胃而上胸膈心肺之分者。驅其還胃。或下從腸出。或上從嘔出。而不至於伏匿。若由胸膈而外出肌膚。其清者。或從汗出。其濁者。無可出矣。必有伏匿肌膚。而不勝驅者。若由胸膈而深藏於背。背為胸之府。更無出路。豈但驅之不勝驅。且有挾背間之狂陽壯火。發為癰毒者。伏飲之艱於下出。易於釀禍。其誰能辯之。誰能出之耶。

水在心。心下堅築短氣。惡水不欲飲。水在肺。吐涎沫。欲飲水。

醫通卷之四

痰飲

二

思得堂藏

水在脾。少氣身重。水在肝。脇下支滿。噎而痛。水在腎。心下悸。○夫心下有留飲。其人背惡寒。冷如掌大。○留飲者。脇下痛引缺盆。欬嗽則振已。○胸中有留飲。其人短氣而渴。四肢歷節痛。脈沉者有留飲。○膈上病痰滿喘欬吐。發則寒熱。背痛腰痛。目泣自出。其人振振身瞤而劇。必有伏飲。○夫病人飲水多。必暴喘滿。凡食少飲多。水停心下。甚者則悸。微者短氣。脈數弦者寒也。皆大下後善虛。脈偏弦者飲也。○肺飲不弦。但苦喘短氣。○支飲亦喘而不能臥。加短氣。其脈平也。○病痰飲者。當以溫藥和之。

心下有痰飲。胸脇支滿。目眩。苓桂朮甘湯主之。小便則利。靈樞曰。包絡是動。則病胸脇支滿。痰飲積其處。而為病也。心下有痰。水精不上注於目。故眩。茯苓治痰水。伐腎邪。桂

枝通陽氣。開經絡。白朮治痰水。除脹滿。然中滿勿食甘。反用甘草。何也。蓋桂枝之辛。得甘則佐其發散。和其熱。而使不僭上。甘草有茯苓。則不支滿而反滲泄。甘能下氣。除滿也。

夫短氣有微飲。當從小便去之。苓桂朮甘湯主之。腎氣丸亦主之。

微飲而短氣。由腎虛水邪停蓄。致三焦之氣。升降呼吸不前也。二方各有所主。苓桂朮甘湯。主飲在陽。呼吸之短。腎氣丸。主飲在陰。呼吸之短。蓋呼者出心肺。吸者入腎肝。茯苓入手太陰。桂枝入手少陰。皆輕清之劑。治其陽也。地黃入足少陰。山萸入足厥陰。皆重濁之劑。治其陰也。必視其人形體之偏陰偏陽。而為施治。一證二方。豈無故哉。

醫通卷之四

痰飲

三

思得堂藏

病者脈伏。其人欲自利。利反快。雖利。心下續堅滿。此為留飲欲去故也。甘遂半夏湯主之。

留飲結塞。發逆。胃氣不得轉輸。故脈伏不顯。若留飲既下。胃氣受傷。必欲自利。自利而反快者。中焦所塞暫通也。通而復積。故續堅滿。必更用藥盡逐之。然欲直達其積飲。莫若甘遂快利。用之為君。欲和脾胃除心下堅。又必以半夏佐之。然芍藥停滯。何留飲用之。甘草與甘遂相反。何一方並用。蓋甘草緩甘遂之性。使不急速。徘徊逐其所留。芍藥治木鬱土中。而成堅滿。又佐半夏以和胃消堅也。

脈沉而弦者。懸飲內痛。病懸飲者。十棗湯主之。懸飲結內作痛。故脈見沉弦。用芫花之辛以散飲。甘遂大戟之苦以泄水。大棗之甘入脾而勝水也。

病溢飲者。當發其汗。大青龍湯主之。取微似汗。汗多者溫粉粉之。小青龙湯亦主之。

水飲溢出於表。營衛虛為不利。猶傷寒之營衛兩傷。故必發汗以散水。而後營衛經脈始行。四肢之水亦得消矣。表營實熱者。用大青龍以發之。內畜寒飲者。用小青龍以發之。雖皆表散之法。而微有不同。不可不辨。

膈間支飲。其人喘滿。心下痞堅。面色黧黑。其脈沉緊。得之數十日。醫吐下之不愈。木防已湯主之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。木防已湯去石膏加茯苓芒硝湯主之。微利則愈。

支飲在膈間。氣血皆不通利。氣不利。則與水同逆於肺。而發喘滿。血不利。則與水雜揉結於心下。而為痞堅。腎氣上

醫通卷之四

痰飲

四

思得堂藏

應水飲。腎水之色黑。血凝之色亦黑。故黧黑之色而見於面也。脈沉為水。緊為寒。非別有寒邪。即水氣之寒也。醫雖以吐下之法治。然藥不切於病。故不愈。用木防已以散留飲結氣。石膏主心肺逆氣。人參以助胃祛水。桂枝以和營開結。且支飲得溫則行。若邪客之淺。在氣分多而虛者。服之即愈。若邪客之深。在血分多而實者。則愈後必再發。以石膏為氣分藥。故去之。芒硝為血分藥。能治痰輭堅。茯苓伐腎利水。而為芒硝之佐。故加之。下有支飲。其人苦冒眩。澤瀉湯主之。支飲阻其陽之升降。鬱火化火。火動風生而冒眩也。故用澤瀉開關利水。以泄支飲。白朮中燥溼。則陽自升而火自息矣。

支飲胸滿者。厚朴大黃湯主之。

此即小承氣以大黃多。遂名厚朴大黃湯。若厚朴多。則名厚朴三物湯。此支飲胸滿者。必緣其人素多溼熱。濁飲上逆所致。故用瀉滌中焦藥治之。

支飲不得息。葶藶大棗瀉肺湯主之。

支飲留結。氣塞胸中。故不得息。葶藶破結利飲。大棗通肺和中。以其氣壅則液聚。液聚則熱結。所以與肺癰同治也。嘔家本渴。渴者為欲解。今反不渴。心下有支飲故也。小半夏湯主之。卒嘔吐。心下痞。膈間有水。眩悸者。小半夏加茯苓湯主之。

嘔本有痰。嘔盡痰去。而渴者為欲解。與傷寒服小青龙湯已渴者。寒去欲解同義。今反不渴。是積飲尚留。去之未盡。

醫通卷之四

痰飲

五

思得堂藏

故用半夏散結勝溼。生薑散氣止嘔。千金方更加茯苓佐之。即與治卒嘔吐。心下痞。膈間有水。眩悸者同法也。腹滿口舌乾燥。此腸胃間有水氣。已椒蘆黃丸主之。口中有津液渴者。加芒硝半兩。

水積腸間。則肺氣不宜。膈鬱成熱。而為腹滿。津液遂不上行。而口舌乾燥。用防已椒目葶藶利水散結氣。而葶藶尤能利腸。然腸胃受水穀之氣者。邪實腹滿。非輕劑所能治。必加大黃以瀉之。若口中有津液。而仍作渴者。此痰飲聚於血分。必加芒硝以祛逐之。

先渴後嘔。為水停心下。此屬飲家。小半夏茯苓湯主之。

先渴者。因痰飲占據中官。津液不得灌注於上。肺失其潤。而然後嘔者。胃中所積之飲。隨氣逆而上泛也。故用其半

以滌飲茯苓以滲溼溼去則嘔止津通而渴自已此與傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服小青龍湯已而渴之義懸殊彼以津液耗損而渴此以痰氣積阻而渴渴之先後變見可以推飲之盛衰也世以半夏性燥渴家禁用曷知其有主渴之妙用哉

假令瘦人臍下有悸吐涎沫而顛眩此水也五苓散主之瘦人本無痰溼今顛眩吐涎明是水積臍下而悸故用五苓散精桂之辛溫以散之

久欬數歲其脉弱者可治實大數者死其脉虛者必苦冒其人本有支飲在胸中故也治屬飲家

下半條專補心下支飲冒眩之脈法冒屬風虛必無脈實之理治屬飲家不特澤瀉湯一方也

丹溪曰痰之源不一有因痰而生熱者有因熱而生痰者有因氣而生者有因風而生者有因驚而生者有積飲而生者有多食而成者有因暑而生者有傷冷物而成者有脾虛而成者有嗜酒而成者其為病也驚痰則成心包痛顛疾熱痰則成煩躁驚悸風痰成癱瘓大風眩暈飲痰成嘔吐脇痛四肢不舉食痰成瘡癰口臭痞塊滿悶暑痰成嘔逆眩冒冷痰成骨痺氣刺痛四肢不舉酒痰多成脇痛臂痛飲酒不消但得酒次日又吐脾虛生痰食不美反胃嘔吐淫痰多倦怠軟弱氣痰攻注走刺不定婦人於驚痰最多結成塊者為驚痰必有一塊在腹發則如身孕轉動跳躍痛不可忍又有老痰凝結膠固非借溫藥引導必有拒格之患履安常有言人身無倒上之痰天下無逆流之水故善治痰者不治痰而治氣

氣順則一身之津液亦隨氣而順矣○痰屬溼熱乃津液所化因風寒溼熱之感或七情飲食所傷以致氣逆液濁變為痰飲或吐咯上出或凝滯胸膈或留聚腸胃或客於經絡四肢隨氣升降遍身上下無處不到其為病也為喘為咳為惡心嘔吐為痞膈壅塞開格異病為泄為眩暈為嘔雜怔忡驚悸為顛狂為寒熱為痛腫或胸間漉漉有聲或背心一點常如冰冷或四肢麻痺不仁皆痰所致百病中皆有兼痰者世所不知也痰有新久輕重之殊新而輕者形色清白氣味亦淡久而重者黃濁稠粘欬之難出漸求惡味酸辣腥臊鹹苦甚至帶血而出治法痰生於脾胃宜實脾燥濕又隨氣而升宜順氣為先分導次之又氣升屬火順氣在於降火熱痰則清之濕痰則燥之風痰則散之鬱痰則開之頑痰則軟之食

痰則消之在上者吐之在下者下之又中氣虛者宜固中氣以運痰若攻之太重則胃氣虛而痰愈甚矣喻嘉言曰內經云諸氣膈鬱皆屬於肺蓋肺鬱則成熱熱盛則生痰痰挾瘀血遂成瘰癧膈間脹滿痞悶雖夏月痰飲積處無汗而冷痰清飲積滿囊囊必大嘔逆此盈科而進也多由厚味積熱腸胃枯涸又加佛鬱胃脘之血為痰濁所滯日積月累漸成噎膈反胃之次第若用燥劑其結轉甚惟竹瀝薑汁韭汁可以治之日飲三五杯必胸中煩躁不寧乃妙後用養血健脾潤燥藥○治痰之法曰驅曰導曰瀉曰化曰涌曰理脾曰降火曰行氣前人之法不為不詳至於窠囊之痰如蜂子之穴於房中如連貫之嵌於蓬內生長則易剝落則難其外窄中寬任行驅導滌涌之藥徒傷他藏此實閉拒而

不謂耳夫人身之氣經絡則注於絡絡盛則注於經。聚之
來始於痰聚胃口。嘔時微動胃氣。胃氣動則半從上出於喉。
半從內入於絡。胃之絡貫膈者也。其氣奔入之患。則衝透膈
膜而痰得以居之。痰入既久。則阻礙氣道。而氣之奔入者。復
結一囊也。然痰欲結聚於膈膜。而成痰。清氣入之。渾然不
覺。每動清氣而動。乃至寒之亦發。熱之亦發。傷酒傷食亦發。
動怒動欲亦發。總由動其清氣。濁氣隨火而升。轉使清氣逼
處不安也。故治痰藥之痰甚難。必先凝神入氣。以靜自調。薄
滋味以去胃中之痰。使胃經之氣。不急奔於絡。轉虛其胃。以
聽絡中之氣。返還於胃。逐漸以藥開導其痰。而漸去其痰。則
自愈矣。後世治痰飲有四法。曰實脾。燥溼。降火。行氣。實脾
燥溼。二陳湯加蒼白二朮。最為相宜。若陰虛則反忌之矣。降

痰通卷之四

痰飲

八

思得堂藏

火之法。須分虛實。實用苦寒。虛用甘寒。庶乎可也。若夫行氣
之藥。諸方漫然。全無著落。謹再明之。風寒之邪。從外入內。其
其痰飲。惟宜小膏龍湯。分其邪從外出。而痰飲從下出也。濁
陰之氣。從下入上。裏其痰飲。金匱半夏厚朴湯。即分其濁
氣下出。而痰飲從上出也。若多慾之人。則腎氣上逆。直透膜
原結壅萬千。膈脹重墜。不可以仰。用桂苓丸引氣下趨。痰飲
始豁也。又虛寒痰飲。少壯者。十中間見一二。老人小兒。十中
常見四五。若果脾胃虛寒。飲食不思。陰氣痞塞。嘔吐涎沫者。
宜溫其中。真陽虛者。更補其下。清上諸藥。不可用也。○再按
痰飲總為一體。而因則有二。痰因於火。有熱無寒。飲因於溼。
有熱有寒。即有溫泉無寒火之理也。○痰飲膠結於胸中。為
飽為悶。為頻欬。而痰不應。總為脾失其健。不為胃行其津液。

而飲食即以生痰。漸漬充滿肺竅。欬不易出。雖以治痰為急。
然治痰之藥。大率耗氣動虛。恐痰未出而風先入也。惟是確
以甘寒之藥。杜風消熱。潤燥補虛。豁痰乃為合法。○驚痰堵
塞竅。肝肺心胞絡間。無處不有。三部脈虛軟無力。邪盛正
衰。不易開散。欲用涌劑。正如兵家劫營之法。安危反掌。欲導
之下行。竅隱之痰。萬不能導。徒傷脾氣。計惟理脾為先。脾氣
者。人身健運之陽氣。如天之有日。陰凝四塞者。日失其所。痰
迷不醒者。脾失其權。理脾則如烈日當空。片雲纖翳。能掩之
乎。其理脾之法。須藥餌與飲食相忝。不但滑膩雜食當禁。即
飯食粥飲亦須少減。則脾氣不用以消穀。轉用之消痰。較藥
力萬萬耳。○膏粱過厚之人。每多味痰。尤宜清理脾胃。為主
夫五味入口。而藏於胃。胃為水穀之海。五藏六府之總司。人

醫通卷之四

痰飲

九

思得堂藏

之食飲太過。而結為痰涎者。每隨脾氣之健運。而滲灌於經
隧。其間往返之機。如海潮然。脾氣行則潮去。脾氣止則潮回。
所以治沈痼之法。但取辛熱微動寒凝。已後止而不用。恐痰
得熱而妄行。為害不淺也。不但痰得熱而妄行。即脾得熱亦
過動不息。如潮之有去無回。其痰病之決裂。可勝道哉。從來
服峻利之藥者。深夜亦欲飲食。人皆不知其故。反以能食為
慶。曾不思愛惜脾氣。令其晝運夜息。乃可有常。況人身之痰。
既由胃以流於經隧。則經隧之痰。亦必返之於胃。然後可從
口而上越。從腸而下達。此惟脾氣靜息之時。其痰可返。故凡
有痰證者。早食午食而外。但宜休養脾氣不動。使經隧之痰。
得以返之於胃。而從胃氣之上下。不從脾氣之四逆。乃為善
也。試觀痰病輕者。夜間安卧。次早即能嘔出泄出。痰病重者。

昏迷復醒。反能嘔出泄出者。豈非未嘗得食。脾氣靜息。而與痰以出路耶。世之喜用熱藥。峻攻者。能知此乎。噫。天下之服辛熱而轉能夜食者多矣。能因此而三覆否。

李士材云。先哲論脾為生痰之源。肺為貯痰之器。又曰。治痰不理脾胃。非其治也。以脾土虛。則清者難升。濁者難降。留中滯腸。淤而成痰。故治痰先補脾。脾復健運之常。而痰自化矣。析而言之。痰有五。欲亦有五。治法因之而變。在脾經者。名曰淫痰。脈緩面黃。肢體沉重。皆即不收。腹脹食滯。其痰滑而易出。二陳加枳朮。扶虛者。六君子湯。酒傷者。加白豆蔻乾葛。在肺經者。名曰燥痰。又名氣痰。脈滑面白。氣上喘促。濕漸寒熱。悲愁不樂。其痰滑而難出。利金湯去枳殼加姜蘇。薑用蜜煎。在肝經者。名曰風痰。脈弦面青。肢滿悶。便溺秘滯。時有躁

醫通卷之四

痰飲

思得堂藏

怒。其痰滑而多泡。十味導痰湯。用漿水煎服。甚則千縷湯加川芎大黃。在心經者。名曰熱痰。脈洪面赤。煩熱心痛。口乾唇燥。時多喜笑。其痰堅而成塊。涼膈散加苓半下之。在腎經者。名曰寒痰。脈沉而黑。小便急痛。足寒而逆。心多恐。其痰有黑點而多稀。桂苓九加澤瀉車前。腎虛水泛為痰。八味九。其人素盛今瘦。水走腸間。漉漉有聲。名曰痰飲。心下冷極。苓桂朮甘湯和之。飲後水流在脇下。欬唾引痛。名曰懸飲。十棗湯下之。飲水流於四肢。當汗不汗。身體疼痛。名曰溢飲。內經所謂溢飲者。渴暴多飲而溢入肌皮腸胃之外也。小青龍湯汗之。欬逆倚息。短氣不得卧。其形如腫。名曰支飲。五苓散。清濁湯利之。膈滿嘔吐。喘欬寒熱。腰背痛。目淚出。其人振振惡寒。身瞤惕者。名曰伏飲。倍朮九加茯苓半夏。更有一種。非痰非

飲。時吐白沫。不甚稠粘者。此脾虛不能約束津液。故涎沫自出。宜用六君子湯加炮薑益智仁以攝之。嗟乎。五痰五飲。證各不同。治法迥別。至於脾肺二家之痰。尤不可混。脾為濕土。喜溫燥而惡寒潤。故白朮半夏茯苓為要藥。肺為燥金。喜涼潤而惡溫燥。故門冬貝母桔梗為要藥。二者誤治。鮮不危困。每見世俗畏半夏之燥。喜貝母之潤。一見有痰。便以貝母投之。若是脾痰。則土氣益傷。飲食漸減矣。即使肺痰。母過於涼。潤以傷中。州稍用脾藥以生肺金。方為善治。故曰治痰不理脾胃。非其治也。信夫。

醫通卷之四

痰飲

思得堂藏

伏。此乃涎飲頑痰。伏在心胸上下。發為此疾。非風非毒。導痰湯加羌防白芷薑汁竹瀝。○痰火相煽於膈上。胸中時覺痞滿眩暈。或目齒疼。飲食後稍覺快爽。少間復加迷悶。大便或結或瀉。小便或赤或清。此皆痰飲或開或聚之故。治宜健脾以運痰。清肺以潤燥。六君子加蘇子瓜蒌薑汁竹瀝之類。○老痰積於胸膈作痞。或流滯於經絡四肢者。青礞石九。○壯實體厚之人。可用薑汁竹瀝下痰。痰丸然後用理脾行氣藥調理。○淫痰積於脇下。隱隱作痛。天陰疼軟更甚。輕則二陳湯加白芥子。重則控涎丹緩攻之。○痰挾死血。隨氣攻注流走刺痛。有時得熱則止。有時得熱轉劇。此本寒痰阻塞。故得熱則止。若痛久火邪傷血。則得熱轉劇。控涎丹加胡椒蠟尾木香。陵鯉甲。痛定時。局方七氣湯與六君子。並加竹瀝。相間

服之。○痰在脇下。非白芥子不能達。○痰在四肢。及在皮裏膜外。非竹瀝薑汁不行。二味治陰虛有痰。大有奇驗。但食少脾胃不實者。不可輕用。以其寒滑。能走大便也。○枳實治痰。能衝墻倒壁。黃芩花粉。大降膈上熱痰。然能鬱遏火邪。傷損中氣。脾胃虛寒。及有外感者。切忌。○痰在膈間。使人顛狂健忘。四肢偏枯。及類中風痰。俱用竹瀝。○痰在腸胃。可下而愈。枳實大黃芒硝之類。○膈上痰熱痞悶。小陷胸湯。加枳實茯苓薑汁竹瀝。○中脘留伏痰飲。胃脘難舉。手足不能轉移。背上痠澀畏寒者。指迷茯苓丸。○痰飲流入四肢。令人肩背痠痛。兩手軟痺。若誤以為風。則非其治。導痰湯加薑黃木香。不應加桂枝以和營氣。○眼黑而行步呻吟。舉動艱難者。痰入骨也。非用草薢苦參不除。其病遍體骨節疼痛。審氣血加化

醫通卷之四

痰飲

主 思得堂藏

痰藥。○淫痰痞塞胸中。不快。氣不宣通。及痰火吐痰。不見血者。沉香化痰丸。○肥盛多淫熱人。痰淫膠固於中外。動則喘滿。足腫者。選痰丸。○老痰不化。喉中常覺哽塞。咯之不出者。消痰餅子。○喉中有物。咯不出。嚥不下。或作刺痛。此是鬱痰。四七湯。脈滿者。卒難得開。必費調理。○多思慮人。胃中虛寒。飲食食減者。局方七氣湯。深師消飲丸選用。○心胃中有寒痰宿水。自吐出水後。心胸間虛。氣滿不能食。外臺茯苓丸。○寒涎沃膈。時吐痰水。不得眠。或時眩暈。溫膽湯。多驚加蠅尾。○痰火盛於上焦。氣盛喘促。有時能食。有時不能食。或周身走痛。飽悶痞脹者。用滾痰丸。西北人倒倉法最妙。○病人久虛。內有宿積痰飲。用參朮補之。久乃吐出臭痰。或綠色痰者。難治。蓋積之既久。而脾胃虛熱不運。且有積熱。故變臭耳。急

用二陳加枳朮黃連竹瀝。庶可十全一二。若肺癰吐臭痰。膿血不在此例。○脾肺氣虛。不能運化。而有痰者。六君子加木香。○肺胃氣虛。不能消化。而有痰者。六君子加桔梗。○脾氣虛。不能運化。而生痰者。理中丸加半夏茯苓。○脾中氣滯。而痰中有血者。加味歸脾湯去木香遠志。加牡丹皮砂仁。○肝經血熱。而痰中有血者。加味逍遙散去柴胡煨薑。加黃便藕汁。○肝腎陰虛。而痰中有血者。六味丸加烏鰂骨茜根。○若過服寒涼。唾痰有血者。異功散加炮薑。○痰飲結聚腹脇之間。有類積聚。但按之不甚堅。而時時口吐涎沫者。六君子合五苓加枳實。○平居無事。但有痰數口。或清或堅。宜小半夏茯苓湯。不應加入參。以健胃氣。則痰自不生矣。○陰血不足。相火上炎。肺受火乘。不得下行化令。由是津液凝滯。生痰不

醫通卷之四

痰飲

主 思得堂藏

血。常用潤劑。如二冬膏六味丸之類。滋其陰。使上逆之火。得返其宅而息。則痰自消。投以二陳等湯。立見其效。瘦人多此。○腎虛不能納氣。歸源出而不納。則為積滯。積滯不散。則痰生。八味丸。肥人多此。○老人腎虛。水泛為痰。上湧者。八味丸以攝之。不應用真武湯。○凡尺脈浮大。按之則濡。氣短有痰。小便赤澀。足跟作痛。皆腎虛不能行濁氣。凝聚而為痰也。腎氣丸。○脈來細滑或緩。痰涎清薄。身體倦怠。手足痠軟。此脾虛挾溼。六君子加炮薑。或補中益氣加半夏茯苓。然痰病須辯有火無火。無火者。純是清水。有火者。中有重濁白沫耳。○內傷中氣虛。而有痰。必用參朮。佐以薑汁傳送。甚者加竹瀝。○脾氣虛。宜清中氣以運痰。使之下行。六君子加枳朮。兼用升柴以提清氣。○脈濡緩。身體倦怠。體厚人屬溼痰。二陳加生

米蒸活氣虛佐參朮。脈沉滯或滑證著惡心。心下飽悶。屬
鬱痰。宜開鬱行氣。○脈滑見於右關。時常惡心吐清水。痞塞
就吐中。以鴉翎搽之。蓋熱痰在膈上。渴亦不去。必用吐。膠固
稠濁。非吐不開。浮滑宜吐。脈滿年高虛人不可吐。痰在經絡
中。非吐不可。吐中就有發散之意。須先升提其氣。乃吐。如瓜
蒂防風。川芎桔梗。芽茶薑汁之類。精明時於不通風處。以布
緊勒其肚。乃吐。○腎虛水泛為痰。有用腎氣丸屢未得効。因
思痰本陰類。復用地黃助陰。良非所宜。當於方中減熟地黃
山茱萸。加菖蒲沉香。開通其氣。自効。大抵陰虛痰燥。切忌二
陳六君。輩香燥益氣藥。陽虛飲泛。切戒四物六味滋陰膩
藥。此岐路攸分。不可不辨。○大凡痰飲變生諸證。不當為諸
證牽掣作名。且以治飲為先。飲消諸證自愈。如頭風眉棱骨
痛。累用風藥不効。投以痰劑收功。如患眼赤羞明而痛。與涼
藥弗瘳。昇以痰劑獲効。凡此之類。不一而足。散在各門。不復
繁引。

醫通卷之四

痰飲

醫通卷之四

痰飲

五思得堂藏

診。脈沉者。有留飲。雙弦者。寒也。偏弦者。飲也。肺飲不弦。但
苦喘滿短氣。支飲亦喘不得臥。短氣。其脈平也。病人一臂不
遂。時復移在一臂。其脈沉細。非風也。必有飲在上焦。痰得清
脈難愈。陳無擇云。飲脈皆弦細沉滑。左右關脈浮大而實者。
膈上有稠痰也。宜吐之。病人百藥不効。關上脈伏而滑者。痰
也。眼胞上下加煤黑者。亦痰也。
噎。噎者。坐處不時多噎。此胃中寒也。以胃氣虛寒不運。故
病後多有是證。理中湯。或六君子湯。加益智仁攝之。
虞恒德治一婦。因多食青餅得痰病。日間胸膈痛如刀鎗。

至晚胸中痛止而膝劇大痛。此痰飲隨氣升降故也。服丁
沉香桂烏附諸藥皆不効。乃以萊菔子研汁與半碗。吐痰
半升。至夜痛尤甚而厥。此引動其猖狂之勢耳。次日用參
蘆一兩。逆流水煎服不吐。又次日苦參煎湯服亦不吐。又
與附子尖桔梗蘆皆不吐。後一日清晨。用萊菔末一錢。磨
香少許。酸漿水調服。始得大吐稠痰升許。其痛如失。調理
脾胃而安。
錢仲立治一人。素患痰火。外貌雖癯。稟氣則實。醫者誤認
虛火。而用補中益氣。氣喘上升幾殆。遂用二陳探吐。出痰
碗許。始得安寢。仍用二陳去半夏加硝黃。下結糞無數。其
熱始退。調理脾胃而安。
王中陽治江東富商。自奉頗厚。怒患心驚。如畏人捕。聞脂

粉氣即便遺泄。坐臥欲人擁護。遍身紅暈紫斑。兩腿連足
淫淫損爛。臍下不絕。飲食倍常。酬應不倦。屢以驚悸虛脫
風痞治皆不効。王診得六脈俱長。三部有力。此係太過之
脈。心腎不交而上悸下脫。皆痰飲留積所致。風痞亦是痰
飲流入經隧。內淫招風之故。先以滾痰丸逐去痰毒。三日
一次。然後用豁痰藥。加減調理而安。
薛立齋治一人。背腫一塊。按之則軟。肉色如故。飲食如常。
分則吐痰。此脾虛而痰滯。用補中益氣加茯苓半夏羌活。
外以香附末薑汁調餅灸之而散。後因勞役頭眩作嘔。仍
以前藥減羌活。加芫荽子而愈。
李士材治秦景明。素有痰飲。每歲必四五發。發即嘔吐不
能食。此病久結成窠。非大瀉之弗愈也。須先進補中益

氣十日後以瓜蒂散頻投。漏如赤豆沙者數升已而復得。水晶色者升許。如是者七補之。七漏之。百日而翼囊始盡。附服六君子八味丸。經年不輟。

又治朱文哉。通體如蟲蟻。口舌糜爛。寅卯必見二鬼執盤。食以厭其脉。兩關弦滑且大。定為痰飲之病。投滾痰丸一服。微有所下。更以控涎丹下痰及積。身痛減半。更以參朮煎湯送控涎丹。復下數行而愈。

石頑治周又韜張使。本燕人體肥痰盛。善肉善飯。而患痰喘嗽數年。食傷恆發。則六脉遲滑。時見歇止。聲如拽鋸。遍地皆痰。每歲或一二發。或三五發。深秋初冬尤甚。遂用倒倉法。自言肢體皆輕。前證遂不復作。二年後因不禁牛肉。復發。然其勢較前不過十一。是亦不慎口腹所致耳。

欬嗽

素問云。肺之令人欬。何也。五臟六府皆令人欬。非獨肺也。皮毛者。肺之合也。皮毛先受邪氣。邪氣以從其合也。其寒飲食入胃。從肺脉上至於肺。則肺寒。肺寒則外內合邪。因而客之。則為肺欬。肺欬之狀。欬則喘息有音。甚則唾血。心欬之狀。欬則心痛。喉中中介如梗狀。甚則咽腫喉痺。肝欬之狀。欬則兩脇下痛。甚則不可以轉。轉則兩脇下滿。脾欬之狀。欬則右脇下痛。陰陰引肩背。甚則不可以動。動則欬劇。腎欬之狀。欬則腰背相引而痛。甚則欬涎。五臟之久欬。乃移於六府。脾欬不已。則胃受之。胃欬之狀。欬而嘔。嘔甚則長蟲出。肝欬不已。則膽受之。膽欬之狀。欬而嘔膽汁。肺欬不已。則大腸受之。大腸欬。欬而遺矢。心欬不已。則小腸受之。小腸欬。欬而失氣。

氣與欬俱失。腎欬不已。則膀胱受之。膀胱欬。欬而遺溺。久欬不已。則三焦受之。三焦欬。欬而腹滿不欲食飲。此皆聚於胃。關於肺。使入多涕唾而面浮腫氣逆也。

岐伯雖言五臟六府皆令人欬。其所重全在肺胃。而尤重在外內合邪四字。人身有外邪。有內邪。有外內合邪。此云五臟之久欬。乃移於六府。是指內邪鬱發而言。若外邪入傷肺合而欬。原無藏府相移之例也。

金匱云。欬逆倚息不得卧。小青龍湯主之。青龍湯下已多。唾口燥。寸脉沉。尺脉微。手足厥逆。氣從小腹上衝胸咽。手足痺。其而翕熱如醉狀。因復下流陰股。小便難。時復冒者。與桂苓五苓甘草湯治其衝氣。衝氣即低而反更欬胸滿者。用桂苓五味甘草湯去桂加乾薑細辛以治其欬滿。欬滿即

止而更復渴。衝氣復發者。以細辛乾薑為熱藥也。服之當遂渴而渴反止者。為支飲也。支飲者。法當胃。胃者必嘔。嘔者復內半夏以去其水。水去嘔止。其人形腫者。加杏仁主之。其證應內麻黃。以其人遂痺。故不內之。若逆而內之者。必厥。所以然者。以其人血虛。麻黃發其陽故也。若面熱如醉。此為胃熱上衝。薰其面。加大黃以利之。

按金匱治欬。叙之痰飲之下。以欬必因之痰飲。而五飲之中。獨膈上支飲。最為欬嗽根底。外邪入而令之因嗽。即無外邪。而支飲漬入肺中。自足令入欬嗽不已。況支飲久蓄膈上。其下焦之氣逆衝而上。尤易上下合邪也。夫以支飲之故。而令外邪可內。下邪可上。不去支飲。則欬終無寧宇矣。其曰欬逆倚息不得卧。小青龍湯主之。明外內合邪之

證。惟小青龍湯為的對耳。然用小青龍湯。其中頗有精義。須防衝氣自下而上。重增濁亂。其效不能堪矣。傷寒用小青龍湯。無少陰證者。可服。雜證用小青龍湯。亦恐少陰腎氣素虛。衝任之火易於逆上。衝任火上。無欬且增煩欬。況久欬不已。顧可動其衝氣耶。蓋衝任二脉。與腎絡同出胞中。腎虛不能固守於下。則二脉相挾。從少腹逆衝而上也。蓋腎氣本虛之人。即素無痰飲。繞感外邪。則衝任之火。便乘勢上凌膈上。迫揚津液而為痰飲。支塞清道。必至欬逆倚息不得卧也。倚息者。倚伏而喘息。陰火內應外邪。為證最惡。不特不以小青龍為務也。祇緣真元素虧。縱有合劑。不能逞迅掃之力。所以餘邪得以久持。致有如下變證也。多唾飲上溢也。口燥津液傷也。寸脉沉尺脉微。手足逆冷。

衛中陽氣耗也。氣從少腹上衝胸咽。陰火逆也。手足痺。營血虛也。其面翕熱如醉狀。陽明胃熱也。因復下流陰股。小便難。陰火下流膀胱也。時復胃。太陽餘邪未散也。然證雖屢變。皆為衝氣逆上之故。且有時復昏冒一證。即定太陽表證。確守胃家汗出自愈之例。故反覆出入。不離小青龍加減。所以用桂苓五味甘草湯。先治衝氣。衝氣即低。而反更欬胸滿。留水在膈間不散。再變前方。去桂加乾薑細辛。以治其欬滿。欬滿即止。第三變。而更復渴。衝氣復發者。以細辛乾薑為熱藥也。反之當遂渴。而渴反止者。為支飲也。支飲者。法當胃。胃者必嘔。嘔者復內半夏以去其水。水去嘔止。第四變。其人形腫者。以水尚在表也。加杏仁主之。其證應內麻黃。以其人遂痺。故不內之。若逆而內之。必厥。所

以然者。以其人血虛。麻黃發其陽故也。第五變。若面熱如醉。此為胃熱上衝。薰其面。加大黃以利之。前四變。隨證加減施治。猶未離本來繩墨。至第五變。其證頗似戴陽。而能獨斷陽明胃熱。乃加大黃以利之。按陽明病。面合赤色。不可攻之。為其腎虛陽氣不藏。故以攻下為戒。而此平昔陰虧血虛。反用大黃利之者。以其證變屢見。雖有面熱如醉。脉見寸沉尺微。洵非表邪拂鬱。而為胃中熱蘊無疑。竟行滌飲攻熱。恬不以陰虛為慮。而致扼腕也。嗟夫仲景治欬。全不從欬起見。治其支飲。下其逆氣。衝氣法中之法。游刃有餘矣。欬而上氣。喉中水雞聲。射干麻黃湯主之。欬而脉浮者。厚朴麻黃湯主之。欬而脉沉者。澤漆湯主之。

上氣而作水雞聲。乃是痰礙其氣。氣觸其痰。風寒入肺之一驗耳。發表下氣。潤燥開痰四法。萃於一方。用以分解其邪。若款而脈浮。則外邪居多。全以散邪為主。用法即於小青龍湯中。除去桂枝芍藥甘草。加厚朴石膏小麥。仍從肺病起見。以桂枝之熱芍藥之收。甘草之緩。藥示不用。而加厚朴以下氣。石膏以清熱。小麥以引入胃中。助其升發之氣也。若款而脈沉。為邪在營分。即肺之裏也。熱過於營。吸而不出。其血必結。血結則痰氣必外裏。故用澤漆之破血。為君。加入開痰下氣。清熱和營諸藥。俾壅一空。元氣不損。製方之妙若此。

火逆上氣。咽喉不利者。止逆下氣。麥門冬湯主之。

此胃中津液乾枯。虛火上炎之證。凡肺病有胃氣則生。無

醫通卷之四

咳嗽

思得堂藏

胃氣則死。胃氣者。肺之母氣也。故於竹葉石膏湯中。偏除方名二味。而用麥冬數倍為君。兼參草粳米以滋肺母。使水穀之精微。皆得上注於肺。自然沃澤無虞。當知火逆上氣。皆是胃中痰氣不清。上溢肺壅。占據津液流行之道。而然。是以倍用半夏。更加大棗。通津滌飲為先。奧義全在乎此。若渴飲不除。津液不致。雖日用潤肺生津之劑。烏能建止逆下氣之勳哉。今以半夏性燥不用。殊失仲景立方之旨。

戴人云。肺為諸款之門戶。每為六氣所乘。如風乘肺者。日夜無度。汗出頭痛。痰涎不利。熱乘肺者。喘急而嗽。面赤潮熱。甚者熱甚於中。手足反寒。熱移於下。便泄無度。火乘肺者。款喘上壅出血。甚者七竅血溢。燥乘肺者。氣壅不利。百節內痛。頭

面汗出。寒熱往來。皮膚乾枯燥癢。大便秘。痰膠而腥。寒乘肺者。嗽急而喘。惡寒無汗。鼻塞身疼。發熱煩躁。淫乘肺者。痰涎不利。面腫喘急。至於淫痰內動為款。又必因風因火。因熱因寒。所挾各不相同。至於乘肺則一也。

款嗽外感六氣。鬱而成火。必六淫相合。內傷五臟相勝。必五邪相併。有此不同。而中間又有散散二法。款者。謂收斂肺氣也。散者。謂解散寒邪也。宜散而斂。則肺受寒邪。一時款往。為害非輕。宜斂而散。則肺氣怯弱。一時發散。而走泄正氣。害亦非小。且如感風款嗽。已經散後。其表虛復感寒邪。虛邪相求。又為喘嗽。若欲散風。則愈虛其肺。收斂則愈滯其邪。當先輕解。漸收斂之。肺不致虛。邪不致滯。款嗽自止矣。

經言藏府皆有款嗽。嗽屬肺。何為藏府皆有之。蓋款嗽為病。

醫通卷之四

咳嗽

思得堂藏

有自外而入者。有自內而發者。風寒暑溼。先自皮毛而入。皮毛者。肺之合。故雖外邪欲傳藏。亦必先從其合而為嗽。此自外而入者也。七情鬱結。五臟不和。則邪火逆上。肺為氣出入之道。故五藏之邪。上蒸於肺而為款。此自內而發者也。然風寒暑溼。有不為嗽者。蓋所感者重。竟傷藏府。不留於皮毛。七情亦有為不為嗽者。蓋病尚淺。止在水藏。未即上攻。所以傷寒以有嗽為輕。而七情鬱結之嗽。久而後見。治法當審脈證三因。若外因邪氣。止當發散。又須原其虛實冷熱。若內因七情。與氣口脈相應。當以順氣為先。下痰次之。

戴復菴云。款嗽因風寒者。鼻塞聲重惡寒者是也。火者。有聲痰少面赤者是也。勞者。盜汗出。兼痰者。多作寒熱。肺脹青動。則喘滿。氣急息重。痰者。嗽動便有痰聲。痰出嗽止。五者大藥

耳亦常明其是否也。

趙養葵曰：欬謂無痰而有聲。肺受火燥也。嗽是有聲而有痰。脾受濕傷也。雖分五藏六府之殊。而其要皆主於肺。蓋肺為清虛之府。一物不容毫毛必欬。又肺為嬌藏。畏熱畏寒。火刑金燥故嗽。水冷金寒亦嗽。故欬嗽者必責之肺。而治法不在於肺。而在於脾。不專在脾。而反歸重於腎。蓋脾者肺之母。腎者金之子。故虛則補其母。虛則補其子也。○勞嗽見血。有勞傷元氣。內火妄動。而傷肺者。亦有勞傷腎水。陰火上炎。而傷肺者。有因過服天冬生地黃等寒藥。損傷脾胃。不能生肺氣。而不愈者。有因誤服知藥之類。損傷陽氣。不能生陰精。而不愈者。凡此皆脾肺虧損。而腎水不足。以致虛火上炎。真藏為患也。須用異功散加門冬五味。補脾土而生肺金。用六味丸。

醫通卷之四

欬嗽

恩得堂藏

滋腎水而生陰精。否則不救。○凡陰虛火盛。乾欬少痰。及痰咯難出之嗽。妄用二陳湯。轉劫其陰。而生大患矣。

張介賓云：大法欬嗽治表邪者。藥不宜靜。靜則留連不解。變生他病。故忌寒涼收斂。經所謂肺欲辛者是也。治裏證者。藥不宜動。動則虛火不寧。燥癢愈甚。故忌辛香燥熱。所謂辛走氣。氣病無多食辛是也。然治表者。雖宜動以散邪。若形病俱虛者。又當補中氣而佐以和解。倘專於發散。則肺氣益弱。膠理益疎。邪乘虛入。病反增劇也。治內者。雖當靜以養陰。若命門火衰。不能歸元。則參薑桂附在所必用。否則氣不化水。於無濟於陰也。至若因於火者。宜清。因於溼者。宜利。因痰者。降其痰。因氣者。理其氣。隨其所見之證。而兼以調之。大抵風邪胃火。此實熱為患。易治。惟肺腎虧損。此真虛為患。最難治。在

老人虛人。皆宜溫養。肺肺稍兼治標為當。

石頑曰：經云：勞風法在肺下。其為病也。使人強上實視。唾出苦澀。惡風而振寒。此為勞風之病。治之以救俯仰。巨陽引。○精者三日。中年者五日。不精者七日。欬出青黃涕。其狀如膿。大如彈丸。從口中若鼻中出。不出則傷肺。傷肺則死也。此段與義從無正釋。今特明之。夫人勞力。則肺氣脹滿。俞穴大開。而汗泄。斯時感冒風邪。乘其俞穴之開。直入肺下。少頃俞穴仍閉。其邪有入無出。鬱閉不通。而生痰聚飲。流入膈胸肩背。經絡竅隧之中。故使人強上實視。強上者。身半以上。為風所中。而胸背強反。但可仰臥而不能俯。非若腎風之不能正偃也。實視者。邪害空竅。所以目睛反戾。半開不動。不能視物也。唾出若涕者。痰飲上溢之徵也。惡風振寒者。肺氣受困。木邪

醫通卷之四

欬嗽

恩得堂藏

反肆為虐也。風寒之邪。必由巨陽而尋出路。今邪在肺下。逼近胃口。既不能從表而解。又非實熱燥結。可攻下而除。勢必借資膀胱陽氣。上吸胸中。使陰壅鬱閉之邪。庶得從上解散。本乎天者親上。故涕從口鼻而出。其色青黃。其狀如膿者。風邪挾肝膽。而乘脾胃之候也。大如彈丸者。乃久已支塞肺竅之結痰。見邪畜之盛也。設不急治。則傷肺而死矣。故治此證者。當急使巨陽之上引。則肺氣清肅下行。而風邪痰涕方得上出。胸中既空。洞無餘。自然俯仰無礙矣。又須知此證邪氣入深。即使治得其當。雖精壯之人。亦必服藥三日。始得見効。若治中年者。及不精壯者。更須五日七日為期。設遇虛老困憊之人。胃氣衰。不能行其藥力。何能計日取効哉。治此者。惟金匱桂苓五味甘草湯。加薑汁竹瀝。差堪對證。蓋桂枝上

散肺下邪風。下通膀胱陽氣。茯苓先升後降。專祛肺下濁飲。五味約束桂枝辛散。使津液不隨氣外泄。而為巨陽之留滯。甘草之甘緩。使三味緩留。膈上共成匡濟之功。若痰涎壅甚。者又當用桂枝二越婢一湯。小青龍加石膏湯。稟氣素虛者。炙甘草湯。皆為合劑。奈何守真宣明。論特舉芍枳丸。專治此證。未審何所見而云然。是予不敢附會也。凡咳嗽。飲水一二口而暫止者。熱嗽也。呷熱湯而暫停者。冷嗽也。治熱嗽以小柴胡加桔梗。冷嗽理中湯加五味。感風者。鼻塞聲重。傷冷者。涕清桂枝。挾熱為焦煩。受溼為纏綿。瘀血則膈間脛悶。停水則心下怔忡。或實或虛。痰之黃白。唾之稠粘。從可知也。感風而嗽者。脈浮惡風自汗。或身體發熱鼻塞。或鼻流清涕。欲語未竟而欬。宜桂枝湯加香豉細辛。然火嗽亦有鼻流清涕。

醫通卷之四

咳嗽

苦

思得堂藏

涕語未竟而欬者。但風則一嗽便多。稠痰火則頻數無痰。為明辯耳。感寒而嗽者。脈緊惡寒。發熱無汗。鼻塞遇寒則欬。內有鬱熱痰結也。葶蓋散兼喘。九寶湯。暴感風寒。二氣相兼而欬。嗽鼻塞聲重者。芍蘇散。肺感風寒。欬倚息不得。卧背寒則嗽甚。小青龍湯。桂苓五味甘草湯。各隨方下。變證加減。客邪傷肺。久嗽不止。寧嗽化痰湯。形寒飲冷。欬兼腹痛。脈弦者。小建中湯加桔梗。以提肺氣之陷。寒熱自汗加黃耆。○冬月嗽而發寒熱。謂之寒嗽。小青龍湯加杏仁。○冷熱嗽。因增減衣衾。寒熱俱感。遇寒作熱。亦嗽。飲熱飲冷亦嗽。脈浮風重。金沸草散。脈數或滿。熱重。葶藶湯去川芎加香豉三錢。○入房汗出中風。嗽而面赤。內經謂之內風。脈浮緊。小青龍脈沉緊。真武湯。○飲酒中風。多汗而嗽。謂之漏風。桂枝湯。

加澤瀉木麻黃根。○水腫脈浮自汗。喘嗽便秘。小青龍加葶藶木香。○喘嗽脈沉畏寒。生料濟生腎氣丸煎服。○有先傷風。欬嗽未除。更傷於熱。而欬嗽聲嘶者。為熱包寒。葶藶湯加減。○有素欬嗽人。更感於寒。而欬嗽聲啞者。為寒包熱。金沸草散去芍藥加石膏。不應用越婢湯。○熱嗽失音。多服寒劑。聲愈不出者。古今錄驗續命湯發之。輕則消風散去蠶蠶蟬蛻。加桔梗薄荷。以生薑汁調服。冷熱嗽失音尤宜。○夏月嗽而發熱者。小柴胡加石膏知母。但手足心熱而不發熱者。渴白散加橘紅桔梗。不應涼膈散去硝黃。加葶藶蜂蜜。○傷熱而嗽者。脈數煩渴引飲。咽乾乾痛。鼻出熱氣。喉聲不清。欬唾稠粘。其痰屢欬而難出。色黃且濃。或帶血絲。或出血腥臭。或堅如蜆肉。不若風寒之嗽。痰清而白也。葶藶湯。風熱相兼。加

醫通卷之四

咳嗽

苦

思得堂藏

減葱白香豉湯。○凡欬嗽面赤。胸膈常熱。惟手足有涼時。其脈洪者。熱痰在膈上也。小陷胸湯。○感溼嗽者。脈細而緩。身體重著。骨節煩疼。或自汗。或小便不利。麻黃加朮湯。○有一嗽痰即出者。脾濕勝而痰滑也。有連嗽十數聲。痰不即出者。肺燥勝而痰澇也。欬而無痰者。以甘寒潤其肺。痰多致嗽者。以辛平燥其脾。○形盛自汗。脈緩體重。嗜卧之人。欬者。脾淫勝也。二陳加防己黃耆白朮之類。兼食積痰垢。壅塞不利者。千禧湯。蕩滌之。兼食積痰氣。蘊釀火邪者。二陳加枳木黃連消導之。○秋深傷熱。欬嗽而洒淅惡寒發熱者。千金麥門冬湯。但嗽無寒熱。痰不得出。極力略之。乃得一絲粘痰者。千金五味子湯。○欬而無聲者。肺氣傷而不清。乃痰鬱火邪在中。不能上出。此肺燥也。桔梗湯加貝母歲莖。蜜炙枇杷葉。

○潔古云。欬而無痰者。以辛甘潤其肺。蜜煎薑橘。蜜燒連皮胡桃。虛人當用人參。同蜜燒胡桃。不時細嚼。或二味煎服。最妙。即觀音應夢散。○久嗽聲嘶者。古法用酥蜜膏。今改用生地黃煎。取辛以潤之。○欬嗽聲啞。氣促滿悶。語聲不出者。心包火盛而肺氣受傷也。古法用通聲膏。今改用千金地黃煎。取潤以泄之。蓋聲嘶雖云金實不鳴。久嗽多緣肺氣枯槁。是當清潤為主。實則二陳桔薄藏經。蜜煎薑橘之類。枯則生脉。二冬款冬竹茹。亦加蜜煎薑橘。又當詳形氣之肥瘠。時令之寒暄。而為施治。聲啞須分暴久。暴多寒鬱熱邪。而肺絡壅塞。久多熱傷肺痿。而真氣受傷。壅則麻杏甘石。苓半薑橘等。隨微甚。以搜滌之。傷則異功生脉保元。赤脉證以培養之。若風寒心煩。欬喘便秘。脾胃熱壅。食不下者。千金地黃煎主之。不

醫通卷之四

欬嗽

廿六

思得堂藏

可拘於成則。而廢活法也。若喘欬失血。聲嘶音啞。食少便泄之金破不鳴。岐彭不能圖治也。○其生薑治欬嗽聲啞。惟暴嗽寒鬱。肺氣不通者為宜。若久嗽熱傷肺氣而瘡者。雖二冬二母二地黃。芩花粉等。寒涼飲肺。為之禁劑。而麻杏辛桂。辛散耗氣。亦為戈戟。其詞子五味。酸瀼固氣。尤須慎詳。○壅嗽聲重痰稠。或欬有血。以薄荷生胡麻各一撮細嚼。煎蘇子降氣湯送下。○七情饑飽。嗽動傳藏府正氣。致邪上逆。結成痰涎。肺道不利。四七湯加杏仁五味。人參阿膠麥冬。○勞心思慮。心血耗散。人每有思慮。則心火上乘。必發乾欬。此為神傷。雖服藥亦難取効。以歸脾湯加麥冬五味。作膏蜜收。其木香或減半。或換砂仁。另為細末。雖火加入。不時滋養方妙。○大抵乾欬。乃燥氣乘肺。屬火鬱證。乃痰鬱火邪在肺。先用逍遙

散加苦桔以開之。後用六味丸加五味以補之。不已則成勞。此證不得志者有之。○欬嗽痛引肩背。雖久不已。不可誤認為虛。此屬三焦鬱火。加味逍遙散。濁痰加味導痰湯。如欬而脇痛。宜疎肝氣。枳殼煮散。或去川芎加青皮柴胡香附薑汁之屬。肥盛氣實者。二陳湯加白芥子。○火熱欬嗽。喉啞痰濃。或大便秘結者。涼膈散加桔梗。○凡內傷氣虛。不能上輪於肺。而時嗽時止。其人黃白少神。脉亦虛微少力。補中益氣去升麻。加煨葛根麥冬五味。或兼腎水不足。前湯送下。都忝九。○欬嗽痰中見血。而脉細者。此火邪傷血分也。歸脾湯。若痰中微有少血。或血絲。此肝血傷也。補中益氣去升麻。加白芍丹皮。○前後心脹。喉中有血腥氣。氣口脉瀼。此屬間有畜血也。試法。呷熱薑湯作呃者。瘀血也。犀角地黃湯加童便桃仁

醫通卷之四

欬嗽

廿七

思得堂藏

大黃攻散之。或平胃合越鞠。加韭汁童便消伐之。氣竭肝傷而欬嗽血腥者。四烏劍骨一蘆茹丸。○內傷瘀積在胃。不時吐血者。其人面色槁而滯。脉多弦瀼。當先與百勞丸去瘀。後用異功六君調補。○有兼停飲食而欬。須用消化之方。不可用烏梅棗殼酸瀼藥。其寒邪未除。宜用發散之劑。不可便用補藥。○欬嗽而面白悲嘆。或欬白痰白沫。屬肺胃虛寒。若胸脇逆滿。牽引背痛。心腹冷痛。飲食即吐者。溫肺湯。口甘涎沫流。脉沉弦細遲。屬中寒。口出清水。心下汪洋。作嘔維。胸膈脹痛不食。屬冷飲停於胃中。攻肺則欬。半夏溫肺湯。兼蘆散散亦妙。○嗽而聲啞氣乏。寒從背起。口中如含冰雪。甚則吐血。此肺氣不足。胃氣虛寒也。千金補肺湯。○嗽而聲啞脉細者。屬寒。宜半夏生薑細辛以辛散之。○如飲冷熱酒傷肺致嗽。

謂之決肺。或兼煎燀傷胃。致嗽咽癢。痰多唾血。喘急脇痛。不得安臥。改定紫菀茸湯。○致嗽嘔吐并作。為肺胃俱病。先安胃氣。二陳加蘆根薑汁。薑製枇杷葉。虛者六君子加桔梗。○有致嗽吐痰與食俱出者。此飲食失節。脾氣不利。清濁相干。二陳加枳木杏仁細辛。○有食積痰嗽發熱。其人面青白黃。色不常。面上有黃白紋痕者。二陳加香附枳殼麴蘗。食積發熱。加薑汁炒川連。停寒食作嗽。加炮薑。○嗽而得食即緩者。脾虛也。異功散有痰。六君子。○外感致嗽。與陰虛致嗽。尤宜辯晰。外感致嗽。則聲盛而濁。先緩後急。日夜無度。痰涎稠粘。而喘急。陰虛勞嗽。則聲怯而稿。先急後緩。或早甚。或暮甚。清痰少氣而喘乏也。○陰虛脉弦而數。或細數。或瀉。證兼盜汗。下午作寒熱。面色純白。兩頰赤。多清痰乾者。勞也。屬陰虛。

醫通卷之四

咳嗽

共 思得堂藏

火盛。夜服六味丸。晨服異功散。○久嗽之人。發散清肺俱不應。胸膈不利。致唾膿血。坐臥不寧。語言不出者。將成肺痿之候也。紫菀散。肺熱煩嗽。肌膚灼熱。面赤如醉者。紫菀膏微利之。○治嗽須分新久虛實。如久嗽脉弱。或雖洪大。按之不鼓。屬肺虛。宜門冬五味子。款冬紫菀之類。款而補之。○酒色過度。虛勞少血。津液內耗。心火自炎。致令燥熱乘肺。咯唾膿血。上氣涎潮。其嗽連續不已。加以邪客皮毛。入傷於肺。而自背得之尤速。當與炙甘草湯。或黃耆建中加丹皮。蓋丹皮辛香調和營氣。治無汗骨蒸。故陰虛人解表。以丹皮為嚮導。○好色之人。元氣幸弱。致嗽不愈。喉中血腥。腸中隱痛。瓊玉膏不應加減八味丸。久服乃効。○有暴嗽諸藥不効。服生料鹿茸丸。即愈。此乃腎虛所致。不可以暴嗽而疑速補之非。○有便

溺如常。飲食不妨。而致嗽不安。或兼血腥。年久不愈者。此肺胃虛熱也。異功散加丹皮山藥。○有肺胃虛弱。致嗽喘促。或時吐血。衄血。自汗盜汗者。門冬清肺飲。○勞嗽。即火鬱嗽。因火傷迫。遂成鬱遏。脹滿一逸不得。眠者難治。○致嗽吐粉紅痰。謂之吐血。僅可延歲月。若血色正赤如硃。濃厚如漆。為守藏血不治。○有經年累月久嗽。服藥不差。餘無他證。此是風寒客邪。久伏肺胃也。與勞嗽不同。三拗湯。佐以千緡湯。瘦人多火。禁用。○若饑時胸中大痛。脣面上有白點如痧。咽喉或癢或痛。而款不可忍。脉極數。或忽大忽小。此必肺中有寸白蟲。饑則蟲上求食。痛嗽不寧也。一味百部熬膏。暑加檳榔烏梅。○上半日嗽多。屬胃中有火。竹葉石膏湯降泄之。胃氣虛者。補中益氣。或五味異功。並加山梔。午後嗽多。屬陰虛。

醫通卷之四

咳嗽

共 思得堂藏

六味丸加麥冬五味。以飲之。黃昏嗽者。火浮於肺。不宜用涼藥。都烝九款而降之。五更嗽甚者。胃中有食積也。二陳湯加枳實川連。以消導之。虛者。六君子加薑汁炒川連。○增補素問五藏六府效治例。肺款千金五味子湯。去續斷地黃赤小豆。加麥門冬歲時細辛。心款涼膈散。去硝黃加黃連竹葉。肝款枳殼散。去芍防加肉桂橘紅蘇子。脾款六君子湯加枳殼桔梗。腎款都烝九加麥門冬人參。胃款異功散加蜀椒黃連烏梅。膽款小柴胡湯加蘆根汁。大腸款補中益氣湯去升麻加桔梗。小腸款桔梗湯加入參茯苓橘紅五味。膀胱款五苓散加入參三焦款局方七氣湯加黃連枳實。○久嗽服藥不應。可用薰法。款冬花將蜜拌潤。焙乾。入有嘴壺中。燒吸烟。熱之。若胸中悶。舉起頭。以指掩定。烟稍間再吸。○杏仁散肺

中風熱然肺實有火。因風寒者為宜。桑皮瀉肺氣。然性不純。良虛寒者當戒。補肺多用生薑。以其辛能發散也。括蕪仁甘。能潤肺。寒能降火。治熱嗽之要藥。陰虛血虛者勿用。以其能作嘔作瀉也。嗽而吐痰。膈乳滿。當看痰色如何。若濃濁如膿。或帶血絲而臭。當從肺癰例治之。

診。欬嗽之脈。浮為風。緊為寒。洪數為熱。濡細為溼。寸關滿。難而尺內弦緊。為房勞陰虛。右關濡大。為飲食傷脾。左關弦。數為疲極肝傷。右寸浮短。為傷肺遲滯肺寒。欬嗽洪滑。為多痰。弦濇為少血。肺脈微急。欬而唾血。脈或沉或浮。聲不損者。易治。脈來洪數。形瘦面赤。腎藏氣衰。不能上循於喉。而聲啞者。難療。亦有肺絡支塞而聲啞者。不在此例。暴病欬嗽。睡卧不下。為肺脹。可治。久病喘嗽。左側不能卧者。為肝傷。若精力

醫通卷之四

欬嗽

九

思得堂藏

未衰者可治。右邊不能卧者。為肺損。無問新久。皆不可治。久嗽。脈弱者生。實大數者死。欬而脫形身熱。脈小堅急。以疾為逆。不出十五日死。欬脫形。身熱脈疾。不過五日死。欬漫血。形肉脫。脈搏者死。欬嘔腹脹。且飧泄。其脈絕。不及一時而死。欬嗽形羸。脈形堅大者死。沉緊及伏匿者死。浮直者可治。浮軟者易治。欬而嘔。腹滿泄瀉。脈弦急欲絕者死。久嗽數歲。其脈弱者。可治。實大數者死。其脈虛者必苦胃。其人本有支飲在胸中故也。治屬飲家。

石頑齋吳江色侯華野郭公。仲秋喘嗽氣逆。診之兩尺左關弦數。兩寸右關濡數。弦者腎之虛。濡者肺之燥。夏暑內伏。肺絡遇秋燥收之令。而發為欬嗽也。診後公詳述病情。言每歲交秋則欬。連發四載。屢欬痰不得出。則喘。至夜坐

不得卧。欬劇則大便枯燥。有血。先曾服令高徒施元倩越脾湯。嗽即稍可。數日間堂事勞心。復欬如前。時元倩歸。首松陵諸醫。治之罔効。因求洞垣之鑒。起我沉痾。答曰。公本東魯。腎氣素強。因水虧火旺。陰火上燥。肺金燥不能生水。所以至秋則欬。欬劇則便燥有血。肺移熱於大腸之明驗也。合用千金麥門冬湯。除去半夏生薑之辛燥。易以葶白蜜之甘潤。藉麻黃以鼓舞麥冬生地之力。與越脾湯中麻黃石膏。分解互結之燥熱。同一義也。郭公曰。松陵諸醫。咸詆麻黃為發汗之重劑。不可輕試。僅用杏仁蘇子。甘桔前胡等藥。服之其欬轉甚。何也。答言。麻黃雖云主表。今在麥門冬湯中。不過借以開發肺氣。原非發汗之謂。麻黃在大青龍湯。麻黃湯。麻杏甘石湯方。其力便吸。以其中皆

醫通卷之四

欬嗽

九

思得堂藏

有杏仁也。杏仁雖舉世視為治嗽之通藥。不問虛實。用然辛溫走肺。最不純良。耗氣動血。其此為甚。然黑入大陷胸丸。佐甘遂。搜逐結痞。性味可知。公首肯以為然。連進二劑。是夜便得安眠。次早復診。其脈之弦雖未退。而按之稍與氣口則虛滿多力。因與六味生脈。加葶白蜜作湯四服。其嗽頓減。郭公復云。向聞元倩有言。六味八味丸中不可雜用參朮。而先生居之不疑。用之輒應。其義云何。答曰。六味為填補真陰藥。與人參同用。原非正理。此兼參冬五味。緣合肺腎金水相生。當無留中戀膈之慮。善後之策。即以此方制丸。三時恆服。不徹。至秋庶無復嗽之虞。先是公子柔胞。予用桂枝湯。及六味作湯。咸加蠟尾。服之而瘳。其後夫人。素有敗瘵失道。左右兩脇俱有結塊。大如覆盂。

發則欬嗽喘逆。腹脇掣痛。六脈止促。而按之少力。余用六君子加膽星枳實香附沉香二劑。服之大吐稠痰。結折一二升。因喘勢太甚。甲夜渡湖。速往。黎明至。署候之。喘止。嗽寧。脈息調勻。不必更進他藥矣。

江右督學何涵齋媳。內翰范秋濤女。素常欬嗽不已。痰中問有血點。恆服童真丸不效。秋濤歿後。哀痛迫切。欬逆倍常。而痰中雜見鮮血。因與瑞金丹四服。仍以童真丸烏骨雞丸調補而安。

又治通政勞書紳太夫人。年五十餘。素稟氣虛多痰。數日來患風熱欬逆。欬甚則厄。欲吐且宿。有肺淋。近幸向安法當先治其欬。因以桔梗湯加歲匙白微丹皮橘皮蜜煎生薑四劑。撤其標證。次與六君子加歲匙。以安其胃氣。繼

醫通卷之四

欬嗽按

三

思得堂藏

進烏骨雞丸。療其固疾。而夫人以久不愈。不忍傷殘。物命改用大溫經湯加麋茸角肥作丸。藥雖異而功則一也。

肺痿肺脹

金匱云。問曰。熱在上焦者。因欬為肺痿。肺痿之病。從何得之。師曰。或從汗出。或從嘔吐。或從消渴。小便利數。或從便難。又或從快藥下利。重亡津液。故得之。曰。寸口脈數。其人欬。口中反有濁唾涎沫者何。師曰。為肺痿之病。若口中辟辟燥。欬即胸中隱隱痛。脈反滑數。此為肺癰。欬唾膿血。脈數虛者為肺痿。數實者為肺癰。

兩手寸口。原為手太陰肺脈。此云寸口脈數。云滑數。云數。虛。云數實。皆左右三部統言也。其人欬。口中反有濁唾涎沫。項之遍地者為肺痿。言欬者口中不乾燥也。若欬而口中辟辟燥。則是肺已結癰。火熱之毒出見於口。欬聲上下觸動其癰。胸中即隱隱而痛。其脈必見滑數有力。邪氣方

醫通卷之四

肺痿

三思得堂藏

盛之徵也。數虛數實之脈。以之分別肺痿肺癰。是則肺痿當補。肺癰當瀉。隨言表。

肺痿吐涎沫而不欬者。其人不渴。必遺尿。小便數。所以然者。以上虛不能制下故也。此為肺中冷。必眩。多涎唾。甘草乾薑湯以溫之。若服湯已渴者。屬消渴。

肺熱則膀胱之氣亦熱。小便必赤澀而不能多。若但吐涎沫而不欬。復不渴。反遺尿而小便數者。明非熱在上焦之肺痿。亦非重亡津液之所致。必係上焦虛冷。不能制下。以故小便無所收攝耳。此為肺中冷。陰氣上逆。侮其陽氣。故必眩。陰寒之氣凝滯津液。故多涎唾。宜與甘草乾薑湯之甘辛。以溫其脾肺也。若始先不渴。服溫藥即轉渴者。明是消渴。飲一溲二之證。消渴又與癰疽同類。更當消息之矣。

喻嘉言曰。肺痿其積漸。已非一日。其熱不止一端。總由胃中津液不輸於肺。肺失所養。轉枯轉燥。然後成之。於是肺火日熾。肺熱日深。肺中小管日窒。欬聲以漸不揚。胸中脂膜日乾。欬痰艱於上出。行動數武。氣即喘鳴。衝擊連聲。痰始一應。金匱治法。非不彰明。但泥在肺癰一門。況難解其精意。大要緩而圖之。生胃津。潤肺燥。下逆氣。開積痰。止渴啞。補真氣。以通肺之小管。散火熱。以復肺之清肅。如半身痿廢。及手足痿痺。治之得法。亦能復起。雖云肺病。近在胸中。呼吸所關。可不置力乎。然肺癰屬在有形之血。血結宜驟攻。肺痿屬在無形之氣。氣傷宜徐理。兼潤肺燥。然肺雖燥而多不渴。勿以其不渴而用燥熱之藥。此辨證用藥之大法也。

醫通卷之四

肺痿

思得堂藏

○肺痿虛寒。羸瘦緩弱。戰掉。噎吸胸滿。千金生薑溫中湯。○肺痿欬。唾涎沫不止。咽燥而渴。千金生薑甘草湯。○肺痿欬。嗽有痰。午後熱。并聲嘶者。古法用人參養肺湯。今改用紫菀散。加丹皮。薑棗。○心火剋肺。傳為肺痿。欬嗽喘鳴。痰涎壅盛。胸膈痞滿。咽喉不利者。古法用人參平肺湯。今改用紫菀散。加麻黃。橘紅。薑棗。○肺痿欬。嗽不已。往來寒熱。自汗煩渴者。古法用知母茯苓湯。今改用紫菀散。加知母。銀州柴胡。薑棗。蓋欬嗽聲嘶。咽喉不利。皆是火鬱痰滯。必用生薑之辛以散之。然須蜜製。藉甘以潤之。此標本兼該之義也。劉默生言。痿本虛燥。總不離壯水清金。滋補氣血津液。消痰止咳。宜天冬。麥冬。生地。熟地。知母。人參。歲莖。紫菀。為主。痞結去。天冬。生地。加橘紅。蘇子。池瀉。去。天冬。生地。知母。加山藥。茯苓。并用固本。

九不時喻化。○肺痿欬。痰中有紅絲。蓋汗發熱。熱過即冷。飲食減少者。劫勞散。○虛勞肺痿失音。欬唾腥血稀痰。或面上生瘡。人參蛤蚧散。○丹方治肺痿。每日用人參細末一錢。入猪肺管內。砂鍋中煮爛。加葱酒服。○肺痿欬。唾咽燥。欲飲水者。自愈。張口短氣者。危。欬而口中自有津液。舌白胎滑。此為肺寒。甘草乾薑湯。○肺痿屬熱。如欬久肺癰。喉啞聲嘶。咯血。此屬陰虛。多不可治。○肺痿六脈沉澁而急。或細數無神。脈口皮膚枯乾。而氣高息齋者。死。

金匱云。上氣喘而躁者。屬肺脹。欲作風水。發汗則愈。

肺脹而發其汗者。即內經開鬼門之法。一汗而令風邪外泄。於肌表。水無風戰。自順趨而從下出也。

欬而上氣。此為肺脹。其人喘目如脫狀。脈浮大者。越脾加半。

醫通卷之四

肺痿

思得堂藏

夏湯主之。○肺脹欬而上氣。煩躁而喘。脈浮者。心下有水氣。小肯龍加石膏湯主之。

按二方分治肺脹。皆以其脈浮。當從汗解之例。越脾方中有石膏。無半夏。小肯龍方中有半夏。無石膏。觀二方所加之意。全重在半夏石膏二味。協力建功。石膏清熱。藉辛溫亦能豁痰。半夏豁痰。藉辛涼亦能清熱也。觀麥門冬湯方中。下氣止逆。全藉半夏入生津藥中。此二方又藉半夏入清熱藥中。仲景加減成方。無非生心化裁。後學所當神往矣。

上氣面浮腫。肩息。其脈浮大不治。又加利尤甚。

上氣之候。而至面目浮腫。喘息動肩。是肺氣壅遏。上而不下。加以脈浮大。氣方外出。無法可令內還而下趨。故云不。

治也。加利則上下交爭更何以堪。

肺脹而欬。左右不得臥。此痰挾瘀血礙氣而脹。當歸丹皮。赤芍。桃仁。枳殼。桔梗。半夏。甘草。竹瀝。薑汁。如外邪去後。宜半夏海石。香附。瓜蒌。甘草。為末。薑汁蜜調嚥之。

喻嘉言治施眉蒼。肺痿喘嗽吐清痰。肢體痿軟。不能舉動。脈來虛數。以蛤蚧二十枚。酒浸酥炙。人參黑參各十兩。蜜丸。時喻化。不終劑而痊。

石頑治陸去非。肺痿聲嘶吐痰。午後發熱自汗。左脈細數。右脈虛濡。平昔勞心。耽色所致。先與生脈散合保元湯。次與異功散加黃耆。並加薑棗。與都糸丸晨夕兼進。調補半月。而熱除痰止。月餘方得聲清。

又治孫起栢肺脹。服耗氣藥過多。脈浮大而重按豁然。飲

醫通卷之四

肺脹

思得堂藏

食不入。幸得瀉清便堅。與局方七氣。每劑用人參三錢。肉桂半夏。麝香。炙甘草各一錢。生薑四片。四劑霍然。蓋肺脹實證居多。此脈虛大。不當以尋常論也。

又治一尼肺脹。喘鳴肩息。服下氣止咳藥不應。漸至胸腹脹滿。脈得氣口弦細而澀。此必勞力氣上。悞飲冷水傷肺。肺氣不能收斂所致也。遂與越婢湯減麻黃。加細辛。葶藶。大瀉肺氣而安。

又治一酒客。嚴冬醉卧。渴飲冷茶。肺脹喘欬。脈得氣口沉緊。搏指與小。青龍去芍藥加葶藶半夏。一劑而痊。則知肺脹喘滿。當以葶藶為嚮導也。

肺癰

金匱云。問曰。病欬逆。脈之何以知為肺癰。當有膿血。吐之則死。其脈何類。師曰。寸口脈微而數。微則為風。數則為熱。微則汗出。數則惡寒。風中於衛。呼氣不入。熱過於營。吸而不出。風傷皮毛。熱傷血脉。風舍於肺。其人則欬。口乾喘滿。咽燥不渴。多唾濁沫。時時振寒。熱之所過。血為之凝滯。畜結癰膿。吐如米粥。始萌可救。膿成則死。

肺癰之脈。既云滑數。此復云微數者。非脈之有不同也。消數者。已成之脈。微數者。初起之因也。初起以左右三部脈微。知衛中於風而自汗。左右三部脈數。為營吸其熱而畏寒。然風入衛。尚隨呼氣而出。不能深入。所傷者不過在於皮毛。以漸舍肺。而致唾振寒。茲時從外入者。從外出之。

醫通卷之四

肺癰

思得堂藏

易易也。若夫熱過於營。即隨吸氣深入。不出而傷其血脉矣。衛中於風。得營中之熱。留戀固結於肺葉之間。乃致血為凝滯。以漸結為癰膿。是則有形之敗濁。必從瀉肺之法而下。驅之安在。始萌不救。聽其膿成。而致肺葉腐敗耶。欬逆上氣。時時唾濁。生不得眠。皂莢丸主之。

火熱之毒。結聚於肺。表之裏之。清之溫之。曾不少應。堅而不可攻。惟此無堅不入。津成瀉滌之功。不可以藥之微賤而忽諸。若因外感所觸而成。當取用千金桂枝去芍藥加皂莢湯最佳。足可補仲景之未遑也。

欬而胸滿振寒。脈數咽乾不渴。時吐濁唾腥臭。久久吐膿如米粥者。為肺癰。桔梗湯主之。

此上提之法也。癰結肺中。所以濁唾腥臭。乘其新造未固。

提而出之。如其勢已入裏又當引之從胃入腸。此法殊不
中用矣。所以宋人附以十六味桔梗湯。兼合葶藶瀉肺之
意。外內合邪之治也。

肺癰喘不得臥。葶藶大棗瀉肺湯主之。

此治肺癰。與緊之方也。肺中生癰。不瀉其肺。更欲何待。然
日久癰脹已成。瀉之無益。日久肺氣已索。瀉之轉傷。惟血
結而膿未成。當亟以瀉肺之法奪之。若一身面目浮腫。鼻
塞。涕湧出。為表證未罷。當先與小青龍湯一劑。後乃服之。
石頑曰。肺癰危證。乘初起時。極力攻之。庶可救療。金匱特立
二方。各有主見。如患人平昔善飲嗜噉。痰涎漸漬於肺。宜皂
莢丸。肥盛喘滿多痰。宜葶藶大棗瀉肺湯。千金補所不足。復
立桂枝去芍藥加皂莢湯。以治風寒客邪。感觸發熱之證。葶

醫通卷之四

肺癰

思得堂藏

莢湯以治心脾過勞。肺氣不化。水道不利之疾。功效最速。宋
人又有十六味桔梗湯。雖未盡善。亦可以備諸治之採用。若
畏其峻。而守王道之方。真養癰以待斃耳。明眼者辨治宜早
也。

凡咳嗽吐真稠痰。胸中隱痛。鼻息不開。香臭。項強不能轉側。
欬則遺尿。自汗喘急。呼吸不利。飲食減少。脈數盛而孔。惡風
毛聳。便是肺癰之候。蓋由感受風寒。未經發越。停留肺中。蘊
發為熱。或挾淫熱痰涎。垢膩蒸淫肺氣。皆能致此。慎不可用
溫補保肺藥。尤忌發汗傷其肺氣。往往不救。金匱皂莢丸。葶
藶大棗瀉肺湯。千金桂枝去芍藥加皂莢湯。葶藶湯。宋人十
六味桔梗湯。俱肺癰專藥。初起用葶莢湯。此方大疏肺氣。
服之使淫熱悉越溺孔而去。一二服即應。脈浮表熱加葱白

香豉。氣口脈盛加犀角竹茹。痰多加貝母。葶仁蛤粉。引痛加
紫苑白蜜。初起欬逆不利。二味桔梗湯加貝母紫苑。多汗
加防己黃耆。潰後唾膿血不止。葶藶薏苡瀉肺湯。隨證加

減。欬有微熱煩滿。胸中塊壘。甲錯者。千金用合歡皮一味。
日取掌大一塊煎湯服。平昔勞心思慮多鬱火入。唾臭痰
鮮血。此屬陰火。但與生料六味丸。加麥冬紫苑之類。若誤投
參耆補氣補火。臭痰轉甚。者。急宜上法加童便服之。自清。
初起疑似未真。生大豆絞漿飲之。不覺腥氣。便為真候。大抵
聲音清朗。膿痰稀澤。或間有鮮血。飲食知味。胸脇不疼。或欬
則微痛。痛在右畔肺之長葉。而坐卧得寧。形色如常。便溺自
調者。可治。若潰後大熱不止。時時惡寒。胸中隱痛。痛在左畔
肺之短葉。此金氣淺薄。潰後最難平復。而喘汗面赤。坐卧不

醫通卷之四

肺癰

思得堂藏

安飲食無味。膿痰腥穢不已者。難治。若喘鳴不休。唇反。咯吐
膿血。色如敗油。滯臭異常。正氣大敗。而不知痛。坐不得卧。飲
食難進。爪甲紫而帶灣。手掌如枯樹皮。面艷紅。聲啞鼻煽
者。不治。肺癰初起。脈不宜數大。潰後最忌短瀉。脈緩滑面
白者生。脈弦急面赤者死。肺癰已破入風者。不治。即濃煎
葱白香豉湯頻服之。然多不效。

肺癰丹方。初起唾臭痰沫。用陳年芥蘆汁。溫服灌吐。最妙。一
方用荷葉濃煎。稍入白蜜。不時服之。不問已潰未潰。皆效。亦
方以猪肺去心。竹刀剖去垢沫。取接骨木二兩。金器中煮熱
淡食。日服無間。五七日當効。潰後排膿。用金經湯。以小活經
魚去腸垢。入貝母末三錢。隔水童便煮。和汁食之。日服一枚。
皆屢驗。然不若葱豉根搗汁。頓熱服之。其効最捷。下咽其臭

即解。有蟲者蟲即死。出薤苳為肺癰專藥。然性燥氣滯。服之未免上壅。不及根汁之立能下奪。已潰未潰。皆可挽回。諸方皆不及也。肺癰潰後。膿痰漸稀。氣息漸減。忽然臭痰復甚。此餘毒未盡。內氣復發。必然之理。不可歸咎於調理。服食失宜也。但雖屢發。而勢漸輕。可許收功。若屢發而痰穢轉甚。脈形轉疾者。終成不起也。

瘧

經云。邪入於陰則瘧。人卒然無音者。寒氣客於厭。則厭不能發。發不能下。至其開闔不致。故無音。

失音大都不越於肺。然須以暴病得之。為邪鬱氣逆。久病得之。為津枯血竭。蓋暴瘧總是寒包熱邪。或本內熱而後受寒。或先外感而食寒物。並宜辛涼和解。稍兼辛溫散之。消風散用薑汁調服。緩緩進之。或只一味生薑汁亦可。冷熱嗽後失音尤宜。若咽破聲嘶而痛。是火邪過閉傷肺。昔人所謂金實不鳴。金破亦不鳴也。古法用清咽寧肺湯。今改用生脈散合六味丸作湯。所謂壯水之主以制陽光也。肥人痰溼壅滯。氣道不通而聲瘖者。二陳導痰開滯之。一切滋補皆為禁劑。至若久病失音。必是氣虛痰痰之故。宜滋肺腎之化源。非生

脈散下都悉丸不可。凡咽乾聲嘶者。潤肺為主。生脈散合異功散。若肺內作痛。破瘀為先。代抵當丸最妥。更有舌瘡不能言者。亦當分別新久。新病舌瘡不能言。必是風痰為患。類中風例治之。若肥人舌短不能言。或舌根強硬。導痰湯為主。若久病後。或大失血後。舌萎不能言。大虛扶元例治之。要在臨證審察。病因無誤。然中風暴病失音。多緣少陰真氣久虛而得。更兼遺尿五絕證見。不可治矣。若冬月咳嗽。寒痰結於咽。喉語聲不出者。此寒氣客於會厭。故卒然而瘖也。麻杏甘石湯。或古今錄驗續命湯選用。若失音不語。已經發散潤肺而不應者。生脈散并童真丸嚥化之。若軟喘氣促。而胸中滿悶。聲瘖不出者。肺胃氣燥。不能祛散餘邪也。紫苑散主之。亦有叫罵聲嘶而喉破失音者。十全大補湯。若肺氣虛寒。為厲風

所傷喘狀聲嘶。或先傷熱而寒鬱熱邪。聲痞不出者。千金酥蜜膏。又咽痛起於四五日間。或因秋劇而得。或多稠痰結痰。而咽喉上腭腫痛其聲雖啞而尚有音破濁。脉大緩而右寸尤甚。此熱結於肺也。宜用辛涼之劑。如桔梗湯加葱白香豉。荆芥薄荷。兼有風寒客邪。更須桂枝芍藥薑棗膠飴之類。并以薑蜜製黃栗實之。慎不可驟用飲降之藥。若暴啞聲不出。咽痛異常。卒然而起。或欲飲而不能飲。或無痰。或清痰上溢。脉多弦緊。或數疾無倫。此大寒犯腎也。麻黃附子細辛湯溫之。并以蜜製附子。慎不可輕用寒涼之劑。二證寒熱天淵。不可不辨也。胎前產後失音。另詳本門。

石頑治西客王如藩。屬寒來蘇。忽然喘逆聲痞。咽喉疼痛。察其形體豐盛而飲嗽如常。切其脉象浮栗而按之益勁。

醫通卷之四

瘡

聖思得堂藏

此必寒包熱邪。傷犯肺絡也。遂以麻杏甘石湯加半夏細辛大劑歲。二服喘止聲出。但呼吸尚有微痞。更與二陳枳桔蒡蘆之類。調理而安。

王惟一數年前雖有血證。而年壯力強。四月間忽患咳嗽。服發散藥後。痰中見血數口。繼服滋陰藥過多。遂聲嘶而啞。時覺胸中氣塞。遷延月餘。乃兄勸中脘中。遷余往診。脉雖沉澁。而按之益力。舉之應指。且體豐色澤。絕非陰虛之候。因詢之曰。白翁之聲啞。是金實不鳴。良非金破不鳴之比。因疏導痰湯加人中黃澤瀉方。專一滌痰為務。四劑後。痰中見紫黑血數塊。其聲漸出。而痰未除。更以秋石熱人中黃。兼肉丸服。經月而聲音清明。始終未嘗用清肺氣。調養營血藥也。

飛時治郭代工。午日少食角黍。倦息作瀉。曾用消劑。不効。因圓時跌仆。即昏迷不省。數日後邀予診視。六脈虛微。欲脫。右臂不能轉動。聲痞無聞。時有用大黃消劫之劑者。予急止之。此脾肺虛憊。安能任此。今縱有合劑。恐胃氣告匱。烏能行其藥力。惟粥飲參湯。庶為合宜。所謂養邪入胃。則虛者活。遂確遵予言。以調之。清止神寧。聲音漸出。而蘇。能食後亦惟獨參湯調養。不藥而愈。

醫通卷之四

瘡

聖思得堂藏

喘 短氣 少氣

經曰。諸病喘滿皆屬於熱。然則息短氣促。○欬嗽上氣。厥在胸中。過在手陽明太陰。○氣有餘。則喘欬上氣不足。則息利少氣。○肺氣虛。則鼻塞不利。少氣實。則喘喝。胸盈仰息。○秋脉不及。則令人喘。呼吸少氣。○勞則喘息汗出。○邪入六府。則身熱不得卧。上為喘呼。○夜行則喘出於腎。淫氣病肺。有所墮恐。喘出於肝。淫氣害脾。有所驚恐。喘出於肺。淫氣傷心。渡水跌仆。喘出於腎與骨。○肝脉若搏。因血在脇下。令人喘逆。○喘欬者。是水氣并陽明也。○不得卧。卧則喘者。是水氣之客也。○起居如故而息有音者。此肺之絡脉逆也。○二陽之病發心脾。其傳為息。實者死不治。○二陽陽明也。上不。能生。而。喘。息。上。○乳子中風熱。喘鳴肩息者。脉實大而緩則生。急而喘者死。○乳子中風熱。喘鳴肩息者。脉實大而緩則生。急而喘者死。

醫通卷之四

喘

思得堂藏

則死。○乳子言。虛後以乳。○凡喘便有痰聲。氣急喘者。呼吸急促而無痰聲。胃氣虛喘者。撻肩撻項。喘而不休。火炎上喘者。乍進乍退。得食則減。食已則喘。大瘰胃中有實火。膈上有積痰。得食入咽。墜下稠痰。喘即暫止。稍久食已入胃。助其溼火。痰再上升。喘反大作。俗不知此。作胃虛治。治以燥熱之藥者。是以火濟火也。○趙養葵曰。喘與短氣分。則短氣是虛。喘是實。然喘多有不足者。短氣間有有餘者。新病亦有本虛者。不可執論也。如實喘者。氣實脉盛。呼吸不利。肺裏壅塞。右寸沈實。宜瀉肺。虛喘者。先覺呼吸氣短。兩脇脹滿。右尺大而虛。宜補腎。此腎虛證非新病虛者乎。邪喘者。由寒邪伏於肺中。關竅不通。呼吸不利。

若寸沈而緊。此外感也。亦有六部俱伏者。宜發散。則身熱退而喘定。脉出。此鬱證人所難知。非短氣中之有餘者乎。○又一等似火非火。似喘非喘者。諸陽氣浮。無所依歸。故上氣而喘也。其人平日若無病。但覺氣喘。非氣喘也。乃氣不歸源也。不知者。以其有火也。誤以涼藥清之。以其喘急難禁也。又用四磨之類。寬之。下咽之後。似覺稍寬。少頃依然。豈知寬一分。更耗一分矣。惟大劑參耆補劑。加補骨脂阿膠等。以鎮於下。後以八味丸加五味鹿茸。不時服之。○又一等火鬱之證。六脉俱滿。甚至沈伏。四肢悉寒。甚至厥逆。拂拂氣促而喘。却似有餘。而脉不緊數。欲作陰虛。而按尺鼓指。此為畜鬱已久。陽氣拂遏。不能營運於表。以致身冷脉微。而悶亂喘急。當此之時。不可以寒藥下之。又不可以熱藥投之。惟逍遙散合佐金

醫通卷之四

喘

思得堂藏

丸之類。宜通蓄熱。得汗而愈。後仍以六味丸養陰和陽可也。喻嘉言曰。喘病無不本於肺。惟兼三陰者為最劇。而三陰又以腎為最劇。有此證者。首重在節慾。收攝腎氣。不使上攻可也。故喘病兼少陰。腎者為最劇。腎火動則水氣升。其次則太陰脾。脾火動則濕氣升。又次則厥陰肝。肝火動則風氣升。是故治喘以治火為先也。然濁氣既隨火而升。火降而氣不降者。何耶。以濁氣雖居於下。而肺之窠囊。可以僑寓其中。轉使消氣逼處不安。是雖以治火為先。然治火而不治痰。無益也。治痰而不治窠囊之痰。雖治與不治等也。惟薑汁竹瀝。可以透窠囊耳。○李士材曰。內經論喘。其因衆多。究不越於火逆上而氣不降也。雖然。火則一而虛實攸分。每見世俗。一遇喘家。純行破氣。

於太過者當矣。於不及者可乎。余嘗論證。因虛而死者十九。因實而死者十一。治實者攻之。即效。無所難也。治虛者補之。未必即効。須悠久成功。其間轉折進退。良非易也。故辯證不可不悉。而辯證尤為難也。巢氏嚴氏。止言實喘。獨王海藏云。肺氣果盛。則清肅下行。豈復為喘。皆以火燥真氣。氣衰則喘。所謂盛者非肺氣也。肺中之火也。斯言高出前古。惜乎但舉其端。未能縷悉。請得其詳而言之。氣虛而火入於肺者。補氣為先。生脉散。有痰六君子湯。陰虛而火乘金。不得臥者。壯水為急。六味丸。虛則合生脉散。風寒者。解其邪。華蓋散。淫氣勝者。利其水。滲淫湯。暑邪者。滌其煩。白虎湯。痰壅者。消其痰。二陳湯。氣鬱者。疎其鬱。四七湯。肺脹者。散其邪。脉浮大者。越脾加半夏湯。脉浮者。小青龍加石膏湯。腎虛火不歸源。八味

醫通卷之四

吳思得堂藏

九腎虛水邪泛溢。清生腎氣丸。此治喘之大法也。

喘嗽氣從臍下衝上。而尺脉洪盛或數。兼見盜汗潮熱。屬陰虛。六味丸作湯。加補骨脂五味子。送下靈砂丹。誤用四磨必死。若作痰治亦危。有因氣而喘者。遇惱便發。脉必沈弦。此氣滯其痰也。蘇子降氣湯。若但喘不嗽。不分遠近。前湯吞靈砂丹。秋冬感寒。每夜連嗽不絕。大喘至天明方緩。脇動痞悶者。麻黃杏仁湯。肺虛受寒而喘。麥蘇溫肺湯。寒鬱熱邪而喘。中有積痰。遇冷即發。麻黃定喘湯。遠年秋逆上氣。胸滿痞塞。聲不出者。人參定喘湯。虛冷上氣。勞嗽喘乏。千金用半夏一升。人參生薑桂心甘草各一兩。水煎分三次服。喘欬上氣不得臥。生薑橘紅。人參紫蘇各一錢。五味數粒煎服。腎與肺胃俱虛。喘嗽乏力。人參一錢。核桃肉三枚。還

皮蜜炙煎服神驗。腎氣上逆而喘。用連皮核桃肉三枚。生薑三片。歸臥加喘即安。七情鬱結。上氣喘急。四磨湯四七湯選用。肥盛多痰。喘不得休。不能臥。人扶而坐數日者。千緡湯一服即安。或千緡湯合導痰湯尤妙。然惟元氣未衰者宜之。虛人未可輕試也。喘而諸藥不効。腹堅脈實者。神保九。大便滯者勿用。氣實人誤服參耆而喘者。三拗湯渴之。但伏不得臥。欬逆上氣。面目浮腫者。古今錄驗續命湯。氣盛有餘。脉來滑實者勿用。經年喘嗽。遇寒更甚者。九寶湯寧嗽化痰湯選用。一切喘證。屬有餘者。治之即愈。若屬虛證。誤與泄氣。禍不旋踵。即暴喘腹脹。大便實者。方可用藥。加以滑泄。必死勿治。此陰火暴逆於手足太陰。所以喘脹腎氣失守。所以便溺。其人雖強。不久當嘔血而死。

醫通卷之四

吳思得堂藏

診。脉宜浮遲。不宜急疾。喘逆上氣。脉數有熱。不得臥者。難治。上氣面浮腫。肩息脉浮大者。危。上氣喘急。低昂。脉滑手足溫者。生。脉濇手足寒者。死。右寸沉實而緊。為肺感邪。亦有六部俱伏者。宜發散。大抵喘屬肺中火盛。脉浮滑者可治。若沉滑為腎虛。陰火上逆難治。

短氣。短氣者。一屬支飲。脉必弦滑。平人無寒熱。胃脘短氣。不足以息者。實也。金匱云。短氣有微飲。當從小便去之。苓桂朮甘湯主之。腎氣丸亦主之。仲景並出二方。分呼吸之短而治。妙義益彰。呼吸之短。用苓桂朮甘湯。以通其陽。陽氣化則小便能出矣。吸氣之短。用腎氣丸。以通其陰。腎氣通則小便之關門利矣。又云。欬逆倚息不得臥。小青龍湯服滿者。厚朴大黃湯即小承一屬氣虛。東垣云。短氣者。肺主諸氣。五藏

之氣皆不足。而陽道不行也。氣短小便便利者。四君子去茯苓加黃耆。如腹中氣不轉者。倍甘草。肺氣短促或不足者。倍參加白芍。使肝膽之邪不致犯之。若失血後陰火上乘而短氣不足以息。或腎虛發熱喘咳者。生脈散加歸善生地。病後產後。一切瘡疽潰後。氣虛不能接續。及年高病久。正氣耗散之人。雖有痰火。不可作有餘治。誤用耗氣之藥。禍不旋踵。須大劑生脈散為君。少佐陳皮。扶接元氣為主。

少氣。少氣者。氣少不足以言也。經曰。怯然少氣者。是水道不行。形氣消索也。又云。言而微。終日乃復言者。此奪氣也。又云。氣虛者。言無常也。又云。脾脈搏堅而長。其色黃。當病少氣。其治法不離獨參湯。生脈散。保元湯。異功散之類。逆氣。經曰。人有逆氣。不得卧而息者。是陽明之逆也。

醫通卷之四

短氣 少氣 逆氣 吳

思得堂藏

足三陽下行。今逆而上行。故息有音也。陽明者。胃脈也。胃者六府之海。其氣亦下行。陽明逆不得從其道。故不得卧而息有音也。夫起居如故而息有音者。是肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下。故留經而不行。絡脈之病人也。微故起居如故而息有音也。夫不得卧。卧則喘者。是水氣之客也。夫水者。循津液而流也。腎者。水藏。主津液。主卧與喘也。若四磨湯。七氣湯。皆治陽明之氣逆。杏子湯。小青龍湯。越脾湯。蘇子降氣湯。皆治肺絡之氣逆。麻黃附子細辛湯。腎氣丸。鹽砂丹。皆治腎氣之逆。

哮喘證多屬寒包熱邪。所以遇寒即發。喉中水雞聲。有積痰在肺絡中。必用吐法以提散之。不可純用寒涼。常須兼帶辛散。小青龍湯。吐最妙。年高氣弱人忌吐。凡喘未發時。

以扶正氣為主。既發時。以散邪為主。哮喘遇冷則發。其有二。一屬中外皆寒。溫肺湯。鍾乳丸。冷哮丸。選用并以此建。蓋護肺命穴最妙。一屬寒包熱。越脾加半夏湯。麻黃定喘湯。表散其邪。平時用蘆吸散亦妙。古人治寒包熱邪。預於八九月未寒之時。用淡痰丸下其熱痰。後至冬無熱可包。則不發矣。丹方治冷哮喘。用胡椒四十九粒。入活蝦。置腹中。鹽泥煨存性。即時分三次。醇酒服之。羸者諒分五七服。用之轉効。若有伏熱者。誤用喘逆倍劇。不可不辨。冷哮喘。肺前青盲。天突。有應有不應。夏月三伏中。用白芥子塗法。往往獲効。方用白芥子淨末一兩。延胡索一兩。甘遂細辛各半兩。共為細末。入麝香半錢。杵勻。薑汁調塗肺前青盲百勞等穴。空後麻臂疼痛。切勿便去。候三炷香足。方可去之。十日後塗一次。

醫通卷之四

哮喘

吳 思得堂藏

如此三次。病根去矣。遇厚味則發者。用萊菔子炒研一兩。猪牙皂英燒存性三錢。共為細末。薑汁調蒸餅為丸。綠豆大。每服五十九。沸湯或枳實湯下。名清金丹。消其食積。則肺胃自清。仍當薄滋味。以清肺胃之氣。傷風冷飲食而喘者。用白麩二錢。砂糖二錢。飴糖餅化汁。捻作餅子。爐內烘熟。刻出。加輕粉四錢。令患人食盡。吐出病根即愈。年幼體虛者。分三四次服之。蓋鹹味肺胃受傷。白麩砂糖。甘溫懸。肺使之留連病所。引頸輕粉。搜滌淤積之痰。上涌。三涌三補。屢建奇功。補用五味異功。稍加細辛服之。醋磨而嗽。甘草二兩。中半劈開。用猪膽汁五枚。浸五日。火炙為末。蜜丸茶清吞二錢。臨卧服之。凡哮喘見胸凸背駝者。此肺絡敗。為痼疾。不治。飛騎泊韓順溪內子。患喘證月餘。服破氣寬胸豁痰消火。

等藥不効發表利水亦不應其疾轉急稍動則喘難休息
診之六脈細數而面赤戴陽用大劑六味地黃作湯加青
鉛兩許一服而緩二服而止

諸嘔逆門

噎膈

靈樞云氣爲上膈者食飲入而運出爲下膈下膈者食時
時乃出

食飲入而運出氣壅膈上謂之上膈然有虛實之分若痰
而氣壅則食無所容虛而氣壅則食不得化皆令人食入
卽出也至若食時時乃出者寒積聚而謂下膈不過言膈
證中有此一證耳然有命門火衰不能生土脾胃虛寒多
致食時時乃出者豈非下膈之證乎讀者不可專以蟲爲
下膈而膠執也

素問云三陽結謂之噎

三陽結者大腸小腸膀胱結熱也小腸結熱則血脈燥大

腸結熱則後不圓膀胱結熱則津液涸三陽俱結前後秘
瀉下既不通必反上逆此所以噎食不下從下而通於上
也

飲食不下膈塞不通邪在胃脘

不通者濁氣在上腎肝吸入之陰氣不得下而反在上也
病在於胃故飲食不下

膈塞閉絕上下不通則暴憂之病也

此言噎膈皆起於鬱結不舒胃氣不能敷布所致張雞峯
所謂神思間病是也

薛立齋曰內膈噎逆食不得入是有火也病久而吐食入反
出是無火也若脾胃氣虛而胸膈不利者六君子加丁沉二
香壯脾土以生元氣若用辛熱之劑而嘔吐噎膈者異功散

加當歸川斛益土以抑陰火胃火內隔而飲食不入者四君子加酒炒苓連清火養胃若脾胃虛寒飲食不入或食入反出者六君子加木香炮薑溫中補脾如過服瀉劑變血有傷於中州者治法亦無越此若內有實積指迷七氣湯汚血在胃者局方七氣湯加桃仁與乾漆同炒去漆用之若誤服耗氣之藥血無所生噎膈而大便燥結者四君子加當歸芍藥補脾生血若火逆衝上食不得入者四君子加山梔川連清火養血若痰飲阻滯而食不得入者六君子加木香山梔補脾化痰若不慎房勞不節厚味不戒氣怒者不治年高無血亦不治噎而白沫大出黃如草矢不治胸腹噎痛如刀割者死期迫矣

李士材云噎膈反胃總是血液枯槁二證皆名為膈內經總論通卷之四

有三陽結謂之膈一語察古分吐證為三端上焦吐者皆從於氣食則暴吐中焦吐者皆從於積或先吐而瀉或先瀉而吐下焦吐者皆從於寒朝食暮吐暮食朝吐大抵氣血虧損復因憂思悲恚則脾胃受傷血液漸耗鬱氣生痰痰則塞而不通氣則上而不下如礙道路飲食難進噎塞所由成也脾胃虛傷運行失職不能熟腐五穀變化精微食難可入良久復出反胃所由成也二者皆膈間受病故通名為膈也噎塞之吐即潔古之上焦吐反胃之吐即下焦吐也王太僕云食不得入是有火也食入反出是無火也噎膈大都屬熱反胃大都屬寒然亦不可拘也脉大有力嘔吐酸臭當作熱治脉小無力嘔吐清水當作寒醫色之黃白而枯者為虛寒紅赤而澤者為實熱能令色脉庶乎無誤此證之所以疑難者方

欲健脾理痰恐燥劑有妨於津液方欲養血生津恐潤劑有礙於中州審其陰傷火旺者當以養血為先脾傷氣虛者當以溫補為主此皆虛實陰陽之辨臨證之權衡也○冬三月陰氣在外陽氣內藏外助陽氣不得發汗內消陽火勿令漏泄此固閉密之大要也○夏三月陽氣在外陰氣在內噎病值此時天助正氣而剋其邪氣不治自愈或不愈者陰氣熱盛正氣不升耳四君子湯送開關利膈丸○每飲食入胃便吐涎沫如雞子白蓋脾為涎脾虛不能約束津液故涎沫自出非人參白朮訶子益智仁不能攝也古人指噎膈為津液乾枯故水液可行乾物梗塞為稿在上焦愚竊疑之若果津枯何以食纔下咽涎隨上湧乎故知膈咽之間交通之氣不得降者皆衝脉上行逆氣所作也惟氣逆故水液不能居潤

下之常隨氣逆從耳若以津枯而用潤下之劑豈不反益其邪乎宜六君子加減扶寒脈遲細者加肉桂附子扶熱脈滑數者加枳實黃連若噎而聲不出者加五味子竹茹喉中有一塊食物不下者痰氣也加海石訶子膈間作痛多是瘀血歸尾桃仁韭汁童便甚者加大黃微利之千金方治胸中久寒噎逆氣上飲食不下結氣不消用五噎丸若飲食不得下手足冷上氣欬逆用五膈丸○血稿者地黃麥冬煎膏入藕汁人乳童便蘆根汁桃仁泥和勻細細呷之○因火逆而噎梨汁藕汁等分熬膏蜜收不時噴熱嚥之有痰加竹瀝○因七氣致病而中挾冷熱食積胃氣不和而噎膈者諸七氣湯選用○食物下咽屈曲自膈而下梗塞作微痛此汚血在胃口也用四物加韭汁薑汁竹瀝童便驢尿牛羊乳蜂蜜煎膏

潤利之後以代抵當丸下之。若火盛作嘔痛者忌薑汁。胃虛欲嘔吐者忌韭汁。犯之必轉劇。有冷積結滯者。用理中加川烏頭蜀椒。川連巴豆霜皂莢末密丸。涼水送下十五丸。暫服五七服。後以四君子加黃耆橘紅砂仁調理。如大便燥結不時進開關利膈丸二三十丸。以微導之。○丹方治噎膈吐逆不食。用啄木鳥去毛熬膏。和骨搗爛。入麝香一錢。蜜收。磁罐盛好。晝夜不時嗅之。嗅過即蓋。勿令散氣。以其性善入水。專泄肝鬱。然在初起時。用之輒應。若病久元氣竭。雖服峻補尚難為力。况外治乎。

醫通卷之四

噎膈

香

思得堂藏

診。脈緊而扎。緊則為寒。扎則為虛。虛寒相搏。脈為陰結。而遲其人則噎。然多有至死脈不變者。以胃中痰飲溼熱膠固。脈常和軟。然細察之。必兼弦象也。

易思蘭治一人。膈滿。其證胸脇胃脘飽悶。膈下空虛。如饑不可忍。腰腿痠疼。坐立戰慄。大便燥結。每日進清粥一二鍾。食下即嘔酸吐水。服藥二年不効。診之。左右寸關俱沈。大有有力。兩尺自浮至沈。三候俱緊。按之搖搖之狀。此氣膈病也。須開導其上。滋補其下兼而行之。遂與趙鞠去山梔。加連翹桔梗木香。侵晨令服。八味丸百粒。服至半月。動履如常。

喻嘉言治一婦。病膈二十餘日。飲粒全不入口。尺脈已絕不至。詢其二便。自病起至今。從未一通。一味痰沫上湧。喉嚨待盡。診得上部有脈。下部無脈。是吐則未必死也。但得天氣下降。則地道自通。然婦人尺脈全無。莫可驗其受孕。萬一傷之。呼吸立斷。用六君子加旋復花。煎調赤石脂末。

服下嘔即稍定。三日後漸漸不嘔。又三日後粥飲漸加。舉家欣快。但病者全不大便。刻刻以通利為囑。曰。藏氣久結。食飲入胃不多。積之既久。自然通透。若以歸地潤腸。恐滯膈而作嘔。硝黃通腸。恐傷胎而殞命。姑弗其請。堅持三五日。氣下腸通。腹中之孕果漸形著。而病全瘳矣。

又治一人患膈氣。粒米不入。始吐清水。次吐綠水。次吐黑水。次吐臭水。呼吸將絕。一晝夜先服理中湯六劑。不令其絕。來早轉方一劑而安。金匱有云。噎氣不除者。旋復代赭石湯主之。吾於此病分別用之者有二道。一者以黑水為胃底之水。此水且出。則胃中之津久已不存。不敢用半夏以燥其胃也。一者以將絕之氣。止存一系。以代赭墜之。恐其立斷。必先以理中分理陰陽。使氣易於降下。然後代赭

醫通卷之四

噎膈

至五 思得堂藏

得以建奇奏効。乃用旋復花一味煎湯。調代赭石末二匙與之。繞入口。即覺其轉入丹田矣。但困倦之極。服補藥二十劑。將息二月而愈。

李士材治張孟端夫人。憂憤交乘。食下輒噎。胸中隱隱痛。陽脈滑而陰脈搏。痰血互凝之象。以二陳湯加歸尾桃仁。鬱金五靈脂。四劑未効。因思人參與五靈脂同用。善於清血。即以前劑入人參三錢。倍用五靈脂。再劑血從大便而出。十劑噎止。彌月而愈。

又治金元之之內患噎。胸腹奇痛。經阻。醫認瘀血。察其脈細為氣衰。沈為寒痼。況自下及上處處皆痛。明非血矣。用參耆白朮木香薑桂煎成。和醇酒進之。甫入口便快。服理中湯半月而痛止。

石頑治朱彥真酒膈。嘔逆不食。每日惟痛飲熱酒一二觥。少頃即作酸嘔出。膈間大痛。雜治經年不効。良由平昔好飲熱酒所致。此即丹溪所謂好飲熱酒。死血留胃口之候。授以人參散。方用人參一兩。煎成。加麝香半分。冰片三釐。三劑便能進食。蓋藥片善散胃口之痰。與瘀血耳。十劑後改服栝子仁湯。半月而安。二方出自雲岐。人多未知。每以爭爲尚異。何可爲之辨耶。

又治沈錫蕃。平昔大便秘結。近患噎膈。不能安穀者月餘。雖素稟豐腴。近來面色皎白。大非往昔。時方穀雨。正此證危殆之際。始求治於石頑。診得六脈沈滯。按久則表。幸舉指即應。爲疏六君子湯。下一味狗寶作散調服。甫十劑而嘔止食進。再十劑而穀肉漸安。更十劑起居如故。惟是大

便尚覺艱難。乃以六味丸去澤瀉。加歸芍首烏作湯。服至月餘。便溺自如。秋深更服八味丸三月而康。大抵噎膈之人。體肥痰逆者可治。枯癯津衰者多不可治。同時有同道王公峻。患此。稟氣病氣。與沈相類。誤信方士。專力委之而致不起。顧人月亦患此證。自謂服惡不當。用參日服。仙人對坐草而斃。郭孝聞八月間噎食艱進。六脈弦勁搏指。延至來春三月告殂。然瘦人間有可療者。昔秦伯源噴膈嘔逆。而形神枯槁。神志鬱抑。且不能勝湯藥之費。予門人都恆友。令其用啄木鳥入麝香膏。時嗅其氣。以通其結。內服逍遙散加香砂以散其鬱。不數劑所患頓除。厥後海貨行陳君用噎膈亦用此法而愈。兩君至今色力尚強。又一農人噎膈不食。時嘔清涎如赤豆沙水。此屬血淤於內可知。

庸師不審。候用消冠破氣藥。而多耗粒不食。迫所必至。其鄰叟憐其貧窶。乃述其病苦。求治於石頑。遂擬一方。用桂苓飲加當歸桃仁。丹皮牛膝。用熬枯。然。在雲岐藥調服。下消黑如汚泥者甚多。當知人戮力受病。血鬱於內而致嘔逆。但當攻其積血。嘔逆自己。執謂治病不求其本。而可輕議其藥哉。

反胃

金匱云。問曰。病人脈數。數為熱。當消穀引食。而反吐者。何也。師曰。以發其汗。令陽微。脈氣虛。脈乃數。數為客熱。不能消穀。胃中虛冷故也。脈弦者。虛也。胃氣無餘。朝食暮吐。變為胃反。寒在於上。醫反下之。令脈反弦。故名曰虛。

凡脈陽盛則數。陰盛則遲。其人陽氣既微。何得脈反數。脈既數。何得胃反冷。此不可不求其故也。蓋脈之數。由於於誤用辛溫發散。而遺客熱。胃之冷。由於陽氣不足。而生內寒。醫不達權通變。見其脈數。反以寒劑瀉其無辜。致上下之陽俱損。其脈遂從陰而變為弦也。上之陽不足。日中以前所食亦不消化。下之陽不足。日暮已後。陽亦不入於陰。而糟粕不輸於大小腸。從口入者。惟有從口出而已。故曰胃

醫通卷之四

反胃

思得堂藏

氣無餘。言胃中之陽氣。所有無幾。所以反胃而朝食暮吐也。

寸口脈微而數。微則無氣。無氣則營虛。營虛則血不足。血不足則胸中冷。

上條以汗下之故。而致病脈若此。此條以上焦營衛不達。亦致反胃之證。故不復叙。唯言脈之陰陽本象。今微而數。微乃失陽之象。數乃失陰之體。寒止客熱而已。胸中者。營衛之海。營衛虛。不統於胸中。故胸中冷矣。夫營衛之氣。出入諸府。健運周身。本生於穀。復消磨其穀。營衛非穀不充。穀非營衛不化。所以胸中冷者。亦必致胃不納穀也。雖然。當以正氣不足論之。若以熱治寒。不惟反助客熱。且復耗其氣。損其陰矣。世人治是病。非丁附則薑桂。孰知正氣為

何如哉

跌陽脈浮而濡。浮則為虛。濡則傷脾。脾傷則不磨。朝食暮吐。暮食朝吐。宿穀不化。名曰胃反。脈繁而濡。其病難治。

脾氣運動。則脈不濡。胃氣堅固。則脈不浮。今脈浮是胃氣虛。不能腐熟水穀。脈濡是脾血傷。不能消磨水穀。所以陽時食入。陰時反出。陰時食入。陽時反出。蓋兩虛不相配合。故莫由轉輸。下入大小腸也。河間謂跌陽脈繁。內燥盛而中氣衰。故為難治。可見浮脈病成。必變繁脈也。況繁而見濡。明是亡血之象。上脫亡血。腸間乾澀。食不得入。下脫亡血。必并大小腸皆枯。食不得下。故難治也。

嘔而脈弱。小便復利。身有微熱。見厥者難治。四逆湯主之。殺入於胃。長氣於腸。脈道乃行。今胃不安於穀。而成嘔。嘔

醫通卷之四

反胃

思得堂藏

則陰氣不資於脈。故脈弱。弱則陽氣虛。不能充於內外。下焦虛。則小便自利。上焦虛。則濁氣上升。逼迫其浮陽於外。外雖假熱。內實真寒。證成厥逆。頃刻決難而不返矣。治之誠難。非四逆湯不能挽回也。

諸嘔吐。殺不得下者。小半夏湯主之。

諸嘔吐。殺不得下。指暴病嘔吐而言。故以半夏生薑。除胃中痰飲。水穀自無阻礙矣。

胃反嘔吐者。大半夏湯主之。

胃反嘔吐。為脾胃氣虛而飲積。故用半夏之燥。溼即兼入參以補胃氣也。蓋者性滯澀。溼用之何哉。以胃之上脫。燥故食難入。雖食亦不得下。中脫用之以潤胃燥。揚之水者。佐蜜以潤上脫之燥也。

胃反吐而渴。欲飲水者。茯苓澤瀉湯主之。

胃反吐。津液竭而渴也。欲飲水以潤之。無小便利而用澤瀉。何哉。觀外臺以此治消渴。脉絕。胃反嘔食。則知水雖入而不散於脈。脈之陰體絕矣。澤瀉者。不惟利膀胱之弱。亦能引桂枝之辛入膀胱。行布水精於五經。故凡渴欲飲水者。多用行水之劑。豈獨防其水停而已哉。正欲行水布散經脈。滋潤表裏。解其熱鬱耳。茯苓之淡行其上。澤瀉之鹹行其下。白朮甘草之甘布其中。桂枝之辛開其道。通其氣。導其水。以令四布而和營衛也。

反胃係真火式微。胃寒脾弱。不能消穀。朝食暮吐。暮食朝吐。或一兩時而吐。或積至一日一夜。腹中脹悶。不可忍而復吐。雖曰脾胃虛寒。然致病之由。必有積滯於內。千金治反胃初

醫通卷之四

反胃

卒

思得堂藏

起用金匱茯苓澤瀉湯。去白朮換乾薑。加人參。橘皮。大黃。青竹茹。得利去大黃。為胃虛反食。下喉便吐之主方。若吐出原物。酸臭不化。此飲食入胃。既抵胃之下脫。復返而出也。宜理中湯為主。甚則加丁附川連。若脈數而邪熱不殺。殺乃火性上炎。多升少降。應與異功散加沈香川連。歸芍生地。食物之後。冷涎不已。隨即反出。或心腹覺疼。霍香安胃散。或六君子加丁香藿香。咽喉阻塞。胸膈滿悶。暫用香砂枳朴。以開其結滯。然破氣藥過多。中氣因而下運。異功散加香砂。使氣旺自能運化。氣滯痞塞。實痛。平胃散加香砂仁。胃虛中氣不運而噎塞者。四君子加香橘紅砂仁。反胃而渴。欲飲水。金匱茯苓澤瀉湯。千金去白朮生薑加半夏。小便不利。桂苓九加半夏澤瀉。甘草生薑作湯服。虛人反胃多渴。

七味白朮散。反胃食入一日半。日吐如故。乃胃氣虛弱。而有痰。不能消化。隨氣逆上也。二陳加丁香。香薷。香雞內金。盧加白朮炮薑。大便燥結。久閉不通。似屬血熱。不可頓攻。止可清熱潤燥。小製湯丸。漸次加之。開胃自透。開胃利膈。然服通利之劑過多。血液耗竭。轉加閉結者。宜用人參固本丸。料煎膏。時時服之。胃反上氣。食即吐出。屬熱者。千金用盧根。菲根等分煎服。不應加竹茹生薑。反胃倦怠無力。垂死者。以人參一二兩。濃煎。加薑汁頓服。屬寒者。加桂附少許。下

焦虛寒。不能生土。食久反出。用附子一枚。切去尖上一片。鑊成一孔。入丁香四十九粒。仍將切下者掩上紮定。搗取生薑自然汁。煮熟焙乾為末。每用一匙。置舌上。徐徐以津唾送下。若煩渴。則頻與糜粥。忌油膩生冷。此孫兆秘傳累効。虛甚者。

醫通卷之四

反胃

空

思得堂藏

加入參一兩。駕馭之。鬱悵失意人。或孤寡初起。自當鬱鬱。逍遙散。久之必兼補養。歸脾湯。命門火衰。不能生土。食入反出。其脈沈遲。八味丸加丁沈。間進黑錫丹。精衰不能蒸騰於上。咽喉閉塞。水穀難進。強食則吐者。六味丸加肉桂五味。不應加沈香砂仁。有陽虛不能統運。嘔逆便血。用人參大黃附子。攻之即通。然真氣竭者。終不可救。瘀血在膈。阻滯氣道而厥者。代抵當丸。作芥子大。服二錢。去枕仰臥。細細嚥之。但飲熱湯。及椒薑。輒呃者。即瘀血也。反胃而胸中嘈雜不寧。或作或止。其人懷懷。面上有白點者。作蟲積治之。丹方治噎膈反胃。用虎脂酥炙為末。每服二錢。獨參湯送下。或貓胞一具。炙脆為末。稍加腦麝。陳酒服之。虎噬生人。貓食生鼠。其性則一。故可代用。若胃中寒痰。不能納食者。狗寶為

宋每服五七分至一錢。陳酒服之。已上三方。輕者一服。重者三服。劇者不過七服。後以理中四君八味等調之。○又方用陳香櫞一枚去瓢。入生薑汁。拌生附子末一兩。外以薑滓。漚紙裹煖。與透焙燥為末。每服五七分至一錢。濃煎獨參湯服之。此孫兆變法也。○反胃初愈。切不可與粥飲。每日與獨參湯。少加炒陳米。不時煎服。旬日後方可小試稀糜。往往即食飯者。多致復病而危。○凡反胃而致大吐白沫如雞子清者。是肺胃俱虛。矢如羊糞。則大腸血槁。即大補氣血。終亦必亡而已。

診。胃反脈數無力為血虛。脈緩無力為氣虛。數而有力為有熱。數而滑疾為有痰。緊而滑者。寒飲上逆。小弱而濡。血虛胃反。寸緊尺濡。其人胸滿。不能食而吐。吐止者為下之。故不

能食。設言未止者。此為胃反。故脈微滿。

滑伯仁治一婦反胃。每隔夜食。至明晚皆吐出不消。其脈沈而弱。他醫以煖胃藥罔効。滑遲疑未決。一日讀東垣書。謂反胃有三。氣積寒也。上焦吐者從於氣。中焦吐者從於積。下焦吐者從於寒。脈沈而遲。朝食暮吐。暮食朝吐。小便利。大便秘。為下焦吐也。法當通其秘。溫其寒。復以中焦藥和之。滑得此說。遂以薑苗丁桂半夏二十餘劑而安。所謂寒者勝之以辛熱也。

石頑治湯伯乾子。年及三旬。患嘔吐經年。每食後半日許。吐出原物。全不積腐。大便二三日一行。仍不燥結。渴不喜飲。小便時白時黃。屢用六君子。附子理中。六味丸。皆罔効。日瀕於危。逮後延余診之。其兩關尺弦細而沈。兩寸皆滿。

而大此腎藏真陽大腑。不能溫養脾土之故。遂以崔氏八味丸與之。或謂附子已經服過二枚。六味亦曾服過。恐八味亦未能克効也。余曰不然。此證本屬腎虛。反以薑附白朮伐其腎水。轉耗真陰。至於六味雖曰補腎。而陰藥性滯。無陽則陰無以生。必於水中補火。斯為合法。服之不終劑而愈。

嘔吐噦

乾嘔 瀉氣 走嘔 嘔苦 中酸

經云。諸逆衝上。皆屬於火。諸嘔吐酸。皆屬於熱。則嘔。寒氣客於腸胃。厥逆上出。故痛而嘔也。○人之噦者。穀入於胃。胃氣上注於肺。今有故寒氣與新穀氣俱還入於胃。新故相亂。真邪相攻。氣并相逆。復出於胃。故為噦。○病深者其聲噦。金匱云。病人欲吐者。不可下之。

欲吐者。陰邪在上也。若下之。不惟逆其陽氣。反傷無故之陰。變害莫測。豈獨反胃而已。

嘔而胸滿者。吳茱萸湯主之。

傷寒論用是方。治食穀欲嘔之陽明證。以中焦有寒也。茱萸能治內寒。降逆氣。人參補中益陽。大棗緩脾。生薑發胃氣。且散逆止嘔。通氣降胃之陽行。則胸滿消矣。此脾藏陰

醫通卷之四

嘔吐噦

空

思得堂藏

盛逆胃。與夫肝腎下焦之寒。上逆於中焦而致者。卽用以治之。故乾嘔吐涎沫頭痛。亦不出是方也。

嘔而腸鳴。心下痞者。半夏瀉心湯主之。

是證由陰陽不分。塞而不通。留結心下為痞。於是胃中空虛。客氣上逆為嘔。下走為腸鳴。故用是湯分解陰陽。水升火降。則痞者散。虛者實也。

嘔吐而病在膈上。後思水者。解。急與之。思水者。豬苓散主之。

嘔而思水者。水飲逆於胸中也。故用豬苓之味淡。從膈上滲其所積之飲。更以白朮利水生津。使水精四布。而嘔自除矣。

嘔而發熱者。小柴胡湯主之。

嘔而發熱。邪在半表半裏。通攻而上也。雖非傷寒之邪。而

病勢則一。故卽以小柴胡湯和之。

食已卽吐者。大黃甘草湯主之。

胃素有熱。食復入之。兩熱相衝。不得停留。用大黃下熱。甘草和胃。按仲景既云。欲吐者不可下。又用大黃甘草湯。治食已卽吐。何也。曰。欲吐者。病在上。因而越之可也。逆之使下。則必憤亂而益甚。既吐矣。吐而不已。有升無降。當逆折之。使其下行。故用大黃。丹溪云。凡病吐者。切不可下。近於困矣。

吐後渴欲得水。而貪飲者。文蛤湯主之。汗出卽愈。兼主微風脈緊頭痛。

是方卽大青龍湯。無桂枝有文蛤。大青龍主發散風寒。兩感。今是證初不言外邪。而用取汗。何哉。蓋因陽明經中有

醫通卷之四

嘔吐噦

空

思得堂藏

實熱。所以貪飲。故用麻黃杏仁。開發腠理。甘草薑棗調和營衛。石膏解利鬱熱。文蛤直入少陰。散水止渴。為太陽少陰二經散邪滲飲之聖藥。故又主微風脈緊頭痛之疾。

乾嘔噦。若手足厥者。橘皮湯主之。

乾嘔而噦。手足厥逆。乃胃中陽氣。為痰飲阻塞。不得流布。四末。故用橘皮生薑之辛。以開痰利氣也。

噦逆者。橘皮竹茹湯主之。

中焦氣虛。則下焦之風木得以上乘。穀氣因之不宜。變為噦逆。用橘皮升降中氣。人參甘草補益中焦。生薑大棗宣散逆氣。竹茹以降膽木之風熱耳。

乾嘔吐通吐涎沫。半夏乾薑湯主之。

乾嘔吐通吐涎沫者。由客邪逆於肝脾。寒主收引。津液不

化遂聚為涎沫。用半夏乾薑之辛。溫中燥溼。漿水之酸。收而行之。以下其逆也。

蛇蟲之為病。令人吐涎心痛。發作有時。毒藥不止。甘草粉蜜湯主之。

徐忠可云。此論蛇病之不因寒者也。故其證獨心痛吐涎。而不吐蛇。然其痛發作有時。謂不恆吐也。則與虛寒之綿綿而痛者遠矣。毒藥不止。則必治氣治血。攻寒逐積之藥。俱不應矣。故以甘草粉蜜主之。白粉殺蟲。蜜與甘草。既以和胃。又以誘蟲也。

嘔吐噦皆屬於胃。但有氣血多少之異。嘔屬陽明。多血多氣。故有聲有物。氣血俱病也。氣逆者散之。所以生薑為主。吐屬太陰。多血少氣。故有物無聲。乃血病也。以橘紅主之。噦屬少

醫通卷之四

嘔吐噦

思得堂藏

陽。多氣少血。故有聲無物。乃氣病也。以半夏主之。三者皆因脾虛。或寒氣客胃。飲食所傷。致上逆而食不得下也。

治嘔吐。以二陳湯為主。如氣滯者。加白豆蔻砂仁。熱吐加黃連。冷涎吐加丁香。氣升嘔加沉香。氣不和加木香。入薑汁少許。食頃即吐者。半夏生薑煎服。食入即嘔。橘皮生薑煎服。食已則吐。橘皮半夏生薑煎服。食久而吐。為反胃。脈沉無力。理中湯。或三物大建中湯。去乾薑。加白朮桂心。橘皮。脈滑而實。且食暮吐。暮食朝吐。此下焦實。半夏大黃等分為末。薑汁和丸。微利之。嘔吐穀不得下。小半夏湯。逆氣心中煩悶。氣滿嘔吐。千金半夏湯。即金匱小半夏湯。加桂心。少氣加甘草。夫半夏生薑之辛。但治上焦氣逆表實。若胃虛者。惟宜益胃。推揚穀氣而已。忌用辛瀉。故服小半夏湯不愈者。服大

半夏湯立愈。久寒胸膈通滿不能食。吳茱萸湯加桂心。半夏甘草小麥酒煎服。寒吐者。喜熱惡寒。肢冷脈細而滑。用

理中湯加枳實。或二陳加丁香炮薑。並須微溫與服。熱吐者。喜冷惡熱。煩渴小便赤澀。脈洪而數。二陳加梔連竹茹。枇杷葉。葛根。薑汁。蘆根汁。怒中飲食嘔吐。胸滿膈脹。開格不通。二陳加青皮木香。未効。丁沉香。砂仁厚朴神麴。更不効。有瘀血也。當從畜血例治。中脫素有痰積。遇寒即發。俗多冷涎。宜丁香豆蔻砂仁乾薑。陳皮半夏。生薑白芥子。嘔痰而致厥者。乃寒痰逆悶。謂之痰厥。薑附湯加木半細辛。痰滿胸膈。粥藥到口即吐。先用生薑湯下黑錫丹。以鎮降之。候藥可進。則以二陳加枳木砂仁厚朴薑汁。虛加入參。有一等肝火逆證。亦嘔而不食。但所嘔者。或酸水。或苦水。或青

醫通卷之四

嘔吐噦

思得堂藏

藍水。惟大小便不秘。亦能作心痛。此是火鬱木鬱之候。木鬱達之。火鬱發之。須用更連瀉煎細細呷之。再服逍遙散。脾胃本虛。機關不利。不能運化。而水到咽管。便嘔出者。六君子加砂仁炮薑。使中央之樞軸轉。機關利。自不嘔矣。丹溪云。凡嘔家禁服瓜薑實。桃仁萊菔子山梔。一切有油之物。皆犯胃作吐。凡藥中帶香藥。行散方効。

噦者。胃中虛冷。或停水飲之故。胃虛宜溫胃。理中為主。停水宜橘皮半夏湯。小便不利。加桂心茯苓。胃虛不食。加入參。脾胃有水。喘欬上氣。小背龍加減。亦有失於攻下。胃中實熱而噦者。證必腹滿。仲景云。噦而腹滿。視其前後。知何部不利。利之則愈。承氣湯。猪苓湯是也。噦逆屬虛熱。橘皮竹茹湯。風而虛寒。橘皮乾薑湯。寒甚去通草。加丁香附子。寒熱錯雜者。

去甘草加丁香柿蒂。傷寒後胃熱嘔噦千金通草橘皮湯。傷寒後嘔噦反胃乾嘔食不下千金蘆根飲子。春夏時行傷寒寒傷於胃胃冷變乾者千金用橘皮桂心葛根各二兩白茅根一升水煎服有熱去桂心。噦聲頻密相連為實攻熱為主若半時噦一聲者為虛溫補為主如腹滿不尿尿散頭汗目暈而噦者死在旦夕。

千金云凡服湯嘔逆不入腹者先以甘草一兩水煎服之得吐消息定然後服餘湯便不吐也凡嘔者多食生薑此是嘔家聖藥。

診。上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死。脈陽緊陰數為吐陽浮而數亦吐寸緊尺澹胸滿而吐寸口脈數者吐緊而瀉者難治緊而滑者吐逆脈弱而嘔小便復利身有微熱。

醫通卷之四

嘔吐噦

寒

思得堂藏

見厥者難治病人欲嘔吐者不可下之嘔吐大痛吐出色如青菜色者危。

乾嘔。乾嘔者有聲無痰然不似噦聲之濁惡而長也宜橘紅煎湯入薑汁白蜜少許細細呷之胃虛加入參胃寒加炮薑胃虛濁氣上通吳茱萸湯乾嘔發熱者黃芩湯乾嘔而利者黃芩加半夏生薑湯。

漏氣。身背熱肘臂疼痛其氣不續膈間厭悶食入則先嘔而後瀉名曰漏氣此風熱閉其腠理上焦之氣慄悍滑疾遇開即出經氣失道邪氣內著故有此證千金麥冬理中湯主之。肥盛多痰者澤瀉湯主之。

走哺。下焦實熱其氣內結不下必澀滯而滯濁反蒸於胃故二便不通氣逆不續嘔逆不禁名曰走哺人參湯主之。

食已暴吐脈浮而洪此上焦火通也宜橘半枳桔厚朴檳榔茯苓白朮氣降則火自清吐漸止乃以人參芍藥補之。下閉上嘔亦因火在上焦宜枳桔陳皮厚朴檳榔大黃木香微利之。

嘔苦。邪在膽經木善上乘於胃吐則通而膽汁上溢所以嘔苦也宜吳茱萸黃連茯苓澤瀉生薑。邪在膽逆在胃膽液泄則口苦小柴胡湯。胃氣逆則嘔苦吳茱萸湯。

中酸。濕熱鬱積於肝肝火逆上伏於肺胃之間飲食入胃被淫鬱遏不得傳化故作中酸所謂曲直作酸是也佐金凡。薛立齋云吞酸噯腐多屬脾虛木旺證多面色痿黃胸膈不利舉世好用清氣化痰之藥多致大便不實食少體倦而危當用六君子加炮薑木香吳茱萸脾胃俱虛六君子加肉

醫通卷之四

嘔吐噦

中酸

思得堂藏

芫慈補骨脂中氣虛弱者理中湯加吳茱萸薑火連理湯不應補中益氣加木香炮薑送佐金丸中氣虛寒必加附子或附子理中湯無有不愈。凡中酸不宜食粘滑油膩者謂氣不通暢也宜食疏淡諸物使氣通利。

吐酸。內經以諸嘔吐酸皆屬於熱東垣又以爲寒者何也。若胃中淫氣鬱而成積則淫中生熱從木化而爲吐酸久而不化肝木日肆胃土日衰當乎肝扶胃逍遙散服佐金丸若宿食滯於中脘平胃散加白豆蔻藿香砂仁神效。

嘔水。渴飲飲水水入即吐者名曰水逆五苓散氣虛四君子去甘草加枳橘生薑不應六君子換赤茯苓用伏龍肝煮湯澄清代水煎藥。吐沫。胃中虛寒不能約束津液故吐涎沫宜六君子加益

智生薑或理中湯加益智以收攝之。

吐蛇。吐蛇有寒有熱。有寒熱交錯。寒則手足厥逆。吐出之蛇色淡白者。理中湯加烏梅黃連蜀椒甚則蛇死而形扁者危矣。熱則蛇色赤而多且跳動不已。安蛇九主之。寒熱交錯則病者靜而復時煩。得食而嘔。蛇聞食臭出。其人當自吐蛇。烏梅丸主之。大抵吐蛇寒熱交錯者多。方中都用川椒黃連烏梅之類。蓋蛇聞酸則靜。得苦則安。遇鍊則伏而不動也。若誤服消劑及攻蟲諸藥。不應甘草粉蜜湯主之。

石頑曰。夫病有不現。經論之異證。則其治亦必有不拘繩墨之異法。如王御九仲君。因驚恐受病。時方晚膳。即兀兀欲吐而不得出。遂絕粒不食。而起居自如。半月以來。醫藥不靈。舉家無措。向後醇酒膏粱。累無阻礙。惟是穀氣毫不可犯。犯之醫通卷之四 吐蛇 思得堂藏

輒嘔。吳中名師從未有一識其為何病者。然各逞臆見。補瀉難陳。丹方迭進。牛黃狗寶。虎膽龍腦。總無交涉。兩三月來。淫瀝亦得相安。但完穀一試。雖極糜爛。立時返出。延及八月。莫可誰何。偶遇一人謂言。此病非藥可除。合用生薑血。乘熱飲之。一服便安。此雖未見於方書。揆之於理。諒無妨礙。一陽之夜。遂率一鷺。取血熱飲。下咽汨汨有聲。忍之再三。少頃嘔出瘀血升許。中有血塊數枚。是夜小試稀糜。竟不吐出。其後漸能用飯。從少至多。無藉湯藥而安。常思此病之不可解者。胃既不安。稼穡何反勝任血肉之味。今飲鷺血。嘔出宿瘀。頓愈。因效本草言。鷺性涼。利五臟。千金方云。射工毒蟲。鷺能食之。可知其有祛風殺蟲解毒散血之功也。今用其血。以開其結。確有至理。遂推受病之源。原因驚恐所致。驚則氣亂。亂血上

通而兀兀欲吐。若彼時吐出。却無痰積於中。胃氣阻逆之患矣。胃氣阻逆。令神得不困憊乎。其血肉可噉者。正賴脂膏以攸利。藏府之氣也。然藏府之氣。非穀不安。而安穀全賴乎血。血者神氣也。故取善消穀氣之血。乘其生氣未離。是可直透關鎗。引領宿積之瘀。一涌而胸次蕩然。雖屬尋常食品。而涼利五臟之功。詢不尋常。先是有入患此。絕粒三載。得此頓愈。其後中翰金澤還公。即太史韓慕廬東垣。咸賴此靈。然遠近相傳。凡噎膈嘔逆。用之輒効。當知噎膈嘔逆。雖屬胃中血枯。若中無瘀結。何致擇格不入。故取同氣相感之力。一涌而蕩散無餘。真補中寓瀉之良法。詳鷺血可以激發胃中宿滯。則生鷺血未為不可。生黃牛血亦未為不可。總取以血攻血。而無峻攻傷胃之虞。昔喬三餘治一總戎患噎膈。百藥不應。喬醫通卷之四 吐蛇不食 思得堂藏

以法激之。嘔出瘀積數升而安。喻嘉言治一血蟲。用法激之上涌。然後用藥。法皆秘而不宣。由是類推。可以默識其旨。此與勞傷吐血之日宰鴨血。沖熱酒服。同源異派。深得肘後經奧旨。足補夏子益奇方之未逮。

虞恒德治一中年婦。產後傷食。致脾虛不納穀。四十餘日。聞穀氣則惡心。聞藥氣則嘔逆。用異功散加香砂仁。神效。陳倉米。先以順流水煎沸。調伏龍肝。攪渾澄清。取二盞。加薑棗煎服。遂不吐。別以陳倉米煎湯。時時嚥之。服前藥二三劑漸安。

薛立齋治一婦。年三十餘。忽不進飲食。日飲清茶三五碗。少用水果。經三年矣。經水過期而少。此思慮傷脾。脾氣鬱結所致。用歸脾湯加吳茱萸。不數劑而飲食如故。

又治一婦因肝脾鬱滯而不飲食二年。面部微黃浮腫。仍
能步履。但肢體倦怠。肝脾二脈浮弦。按之微而結滯。用六
君子加吳茱萸。下痰積甚多。飲食頓進。形體始瘦。臥床月
餘。仍以六君子加減調理而安。
周慎齋治一人。飲食如常。每遇子時即吐。大便秘。詢其人
必有苦慮。憂思。脾氣鬱結。故幽門不通。宜扶脾開竅為主。
用人參白朮。以蒼朮拌炒。茯苓各一錢。炙甘草五分。附子
煮烏藥三分。水煎服愈。
石頭療吳江署篆張公。年壯體豐。恒有嘔逆痰涎之患。六
脈每帶濡滑。惟二陳加枳朮石斛輩服之應手。良由政務
繁冗。心力俱勞所致耳。

霍亂 乾霍亂 吐利

經云。清氣在陰。濁氣在陽。營氣順行。衛氣逆行。清濁相干。亂
於腸胃。則為霍亂。厥氣上逆則霍亂。

傷寒吐利。由邪氣所傷。霍亂吐利。由飲食所傷。其有兼傷寒
之邪。內外不和。加之頭痛發熱而吐利者。是傷寒霍亂也。原
仲景之意。豈非在飲食。如為是病。彼以寒邪傳入下焦。胃氣
因之不和。陰陽痞滿者。安得不有以致之乎。不然。何以用理
中四逆治之耶。此病多發於夏秋之交。在寒月亦間有之。昔
人云。多由伏暑所致。然亦未必皆爾。大抵溼土為風木所尅。
則為是證。故嘔吐瀉泄者。溼土之變也。轉筋者。風木之變也。
合諸論而求之。始為活法。然多有鬱結傷脾。飲食停滯。一時
停塞。氣不升降。而然。夏月霍亂吐瀉作渴。胃苓湯加半夏香

香而赤口乾。加炒川連。春夏秋三時。飲食後觸胃暴寒。成此
證者。藿香正氣散。若吐利轉筋。為風木行脾。平胃散加木瓜。
○夏秋感冒。吐瀉霍亂。六和湯為要藥。身熱煩渴。氣蘊喘悶。
或吐瀉厥逆躁擾者。此傷暑霍亂。宜香薷飲沈冷服。甚則手
足厥逆。少氣。脣面爪甲皆青。六脈俱伏。而吐出酸穢。瀉下臭
惡。便溺黃赤者。此火伏於厥陰也。為熱極似陰之候。急作地
漿煎竹葉石膏湯。誤作寒治必死。○夏秋霍亂。多食冷水。瓜
菓所致。宜木香藿香。陳皮厚朴。蘇葉生薑。四肢重著。骨節煩
疼。此兼溼也。二朮二苓。厚朴陳皮澤瀉。七情鬱結。宜烏藥香
附。木香厚朴。枳殼陳皮紫蘇。○夏秋之交。傷暑霍亂。大忌米
附薑桂。種種燥熱之藥。候服必死。凡夏秋霍亂。有一毫口渴。
即是伏熱。不可用溫理脾胃藥。如燥渴小便不利。五苓散為

至本方中肉桂亦宜酌用。惟世瀉不渴二便清利不甚臭穢者。方可用理中溫之。吐瀉不止。元氣耗散。病勢危篤。或水粒不入。或口渴喜冷。或惡寒戰慄。手足逆冷。或發熱煩躁。揭去衣被。此內虛陰盛。不可以其喜冷去被為熱。宜理中湯。甚則四逆湯。加食鹽少許。若暴瀉如水。周身汗出盡冷。脈弱不能言語。急投漿水散。並須冷服。若冒暑伏熱。腹痛作瀉。或利或嘔者。木瓜吳茱萸食鹽同炒。煎湯溫服。胎前產後霍亂另詳本門。凡霍亂新定。周時內慎勿便與穀氣。多致殺入。以胃氣反逆。不能平復也。如吐瀉已多。元氣耗極。審無邪者。方與米飲補養。

舉世治霍亂吐利。不問虛實寒熱。藥用藿香正氣。不知此方導主胃氣不和。陰陽錯亂。或夏秋寒熱交加。飲食冷熱並進。醫通卷之四

霍亂

霍亂 思得堂藏

及水土不伏之吐利霍亂。固為合劑。如見厥逆冷汗。虛煩喘。面赤戴陽。脈來虛微。弦細無力。此脾腎俱虛。火衰不能生土。虛陽失守之候。在嚴冬見之。尤為最劇。猛進理中四逆。尚恐不救。況堪從事。藿香正氣等耗氣之劑乎。

診。脈伏或微瀉者。霍亂。脈長為陽明本病。霍亂脈洪大。吉。虛微遲細兼喘者。凶。氣口脈滑。乃腸間有宿食。雖吐瀉當以鹽湯探吐之。吐盡用和中藥。凡吐瀉脈見結促代伏。皆不可便斷為死。霍亂之後。陽氣已脫。或遺尿不知。或氣怯不語。或汗如珠。如躁欲入水。或四肢不收。舌卷囊縮。皆為死候。乾霍亂。心腹脹痛。欲吐不吐。欲瀉不瀉。煩躁悶亂。俗名攪腸痧。此土鬱不能發泄。火熱內熾。陰陽不交之故。或問方論皆言。宿食與寒氣相搏。何以。火耶。曰。昏亂躁悶。非諸

躁狂越之屬。火者乎。每致急死。非暴病暴死之屬。火者乎。但攻之太過。則脾愈虛。溫之太過。則火愈熾。寒之太過。則反捍格。須友佐以治。然彼火可散耳。古法有鹽煎童便。非但用之降火。且兼取其行血。不可廢也。一法以鹽湯探吐。并用鹽填臍中。以艾灸二七壯。屢効。

吐利。吐利者。言嘔吐而利是也。上吐下利。煩擾躁亂。乃謂之霍亂。與但稱吐利者有異。蓋暴於旦夕者為霍亂。可延至數日者為吐利耳。有吐瀉及痢疾。進湯藥太驟。以致嘔逆。二陳加豆蔻砂仁。甚則加沉香。有熱加薑汁炒川連。乾嘔而利者。黃芩加半夏生薑湯。上吐下瀉不止。當瀉而反不瀉。脈微細而弱者。理中湯。或渴不能飲。脈細數。運理湯。夏月泄瀉。或嘔吐。生薑汁調天水散。有痰積泄利不止。甚則嘔而欲吐。利下不能飲食。由風痰羈絆脾胃之間。導痰湯加羌防。瀉屬脾。宜升胃。補中益氣湯。吐屬胃。宜醒脾。六君子加香砂。吐瀉並作。宜升胃醒脾。二湯各半和服。

醫通卷之四

霍亂

吐利

霍亂 思得堂藏

關格

靈樞云陰氣太盛則陽氣不能管也。故曰關。陽氣太盛則陰氣不能管也。故曰格。陰陽俱盛。不得相管。故曰關格。關格者。不得盡期而死也。

陰陽易位。病名關格。多不可治。若邪氣留著而致者。猶可治之。古上胎白。而水漿不下。曰格。格則吐逆。熱在丹田。小便不通。曰關。關則不得小便。必用吐。以提其氣之捍格。不必在出痰也。鹽湯探吐。并以牙皂湯浴其小腹及陰。或以鹽敷臍中。俱妙。有痰宜吐者。二陳湯探吐之。吐中便有升降。有中氣虛不運者。補氣藥中升降。先以四君子換參。蘆探吐。後用人參散。栝子仁湯調理。脈沉細。手足厥冷者。既清九。勞役後氣虛不運者。補中益氣湯加木香。積。心脾疼。後小便不通。皆是。

醫通卷之四

關格

思得堂藏

痰隔於中。焦氣滯於下。焦二陳加木通。枳殼。服後探吐之。寒在上。熱在下。黃連湯。桂枝易肉桂。熱在上。寒在下。生料八味丸。加牛膝車前。○關格不通。不得尿。頭無汗者。可治。有汗者死。

石頑曰。按內經所言。人迎與寸口俱盛四倍以上。為關格。是以陽經取決於人迎。陰經取決於寸口也。越人云。遂上魚為溢。為外關。內格。遂入尺為覆。為內關。外格。仲景亦謂在尺為關。在寸為格。關則不得小便。格則吐逆。皆以陽分取決於寸口。陰分取決於尺內也。所以難經又言上部有脈。下部無脈。其人當吐。不吐者死。仲景又有跌陽脈伏而濡。伏則吐逆。水穀不化。濡則食不得入。名曰關格。則知關格之脈證不一也。而馬仲化釋內經謂關格之義。非隔食癃閉之證。而張介賓

類經直將越人仲景之言。一槩非之。獨執人迎在頸。為陽明之表。脈遂謀東垣丹溪。皆仍叔和脈經。左為人迎。右為氣口之謬。嗚呼。內經固為聖經。確宜遵從。而越人仲景之書。未常不為聖經也。蓋人迎氣口。所以分表裏之陰陽。寸口尺內。所以分上下之陰陽也。人一身表裏。上下之氣化。皆肺所司。血脈皆心所主。故凡氣血之盛衰。靡不變見於氣口。氣口實為肺經之一脈。不過分其部位。以候他藏之氣耳。即如仲景所

指。跌陽少陰。雖主於足。然未常不於關尺推之。則內經所言。人迎氣口。候之左右。亦無不可也。醫道貴乎圓通。若執中無權。猶執一也。故釋內經之關格。但當言是表裏陰陽否絕之候。不當與上吐下閉之關格混同立論。則可。若言上吐下閉。當稱隔食癃閉。不得名為關格。則不可。或言關格之證。其脈

醫通卷之四

關格

思得堂藏

未必皆然。則可。若言關格之脈。必無在尺在寸之分。則不可。試觀仲景跌陽脈伏而濡。亦主關格。又有上微頭小者。則汗出下微。本大者。則為關格不通等例。其義自明。

劉宗厚曰。呃逆有虛有實。有火有痰。有水氣。不可專作寒論。蓋傷寒發汗吐下後。與瀉利日久。及大病後。婦人產後。有此証。皆屬脾胃大虛。若因痰水停積心下。或因暴怒氣逆痰厥。或傷寒熱病失下。則皆屬熱也。夫水性潤下。火性炎上。令其氣自下衝上。非火而何。大抵治法。虛則補之。虛中須分寒熱。如因汗吐下後。誤服寒涼過多。當溫補之。如脾胃陰虛。火逆上衝。當平補之。扶熱者。當涼補之。若實者。如傷寒失下。地道不通。因而呃逆。當寒下之。如痰飲停蓄。或暴怒氣逆。痰厥此等。必形氣俱實。別無惡候。隨其邪之所在。瀉之。清之。利之。胃虛木挾相火。直衝清道而上者。異功散加肉桂。甚則加黃藥附子。送六味丸。吐利後。胃氣虛寒者。理中湯加附子。

醫通卷之四

呃逆

思得堂藏

丁香柿蒂。吐利後。胃虛熱者。橘皮竹茹湯。呃逆嘔吐多者。屬胃虛有痰。半夏茯苓生薑。兼食結痰積。則隔間飽悶。枳木半夏生薑。平人飲熱湯及食椒薑。即呃者。此胃中有寒痰死血也。死血用韭汁童便下。越鞠丸。虛人用理中湯加迷朮。桃仁。痰加茯苓半夏。蓋呃逆皆是寒熱錯亂。二氣相搏使然。故治亦多用寒熱相兼之劑。如丁香柿蒂並投之類。試觀平人冷呃。令其思想則止。思則脾火氣乘。而胃氣和矣。○呃逆雖多有屬火者。然病後久虛發呃。皆屬於寒。宜用半夏一兩。生薑一兩。水煎熱服。或用丁香數十粒。柿蒂十枚。滾水泡服。或理中湯加枳殼茯苓半夏。不應加若蒂丁香。若胃中寒甚。呃逆不已。或復嘔吐。丁香煮散。或附子穀米湯。加炒川椒丁香。○暴怒呃逆。神昏吐涎。此肝火逆上。防有血積。隔間若按之。

痛者。藕汁麻油服少頃。即振吐之。不痛者。陳皮二兩。煎湯探吐之。○產後呃逆。最為惡候。急灸期門左穴。艾炷如小豆大。宜服四逆加人參湯。先活附子散。或桂心五錢。薑汁三合。和水煎服。

石頑曰。呃逆在辨寒熱。寒熱不辨。用藥立斃。凡聲之有力而連續者。雖有手足厥逆。大便必堅。定屬火熱。下之則愈。萬舉萬全。若胃中無實火。何以激搏其聲。逆上而衝手。其聲低怯。而不能上達於咽喉。或時鄭聲。雖無厥逆。定屬虛寒。苟非丁附。必無生理。若胃中稍有陽氣。何致音聲低怯不前也。蓋胃中有火。則有聲。無火則無聲。誤以柿蒂蘆根輩治之。倉扁不能復圖矣。又有始熱終寒者。始本熱邪。因過用苦寒。寒鬱其熱。遂至呃逆。急宜連理湯加薑半夏之五六日。大便不通者。

醫通卷之四

呃逆

思得堂藏

割陳醫輩導之。若真陽素虛人。誤用苦寒。逼其大便。必致熱去寒起。多成不救。復有飲熱飲冷而呃。皆微惡寒。目睛微黃。手足微冷。大便清黑者。屬瘀血。若飲熱則安。飲冷則呃。雖有背惡寒。手足冷。大便清等証。此屬淫痰。肥人多此。須推瘀血。痰飲例治之。

噫氣。○靈樞云。寒氣客於胃。厥逆從下上散復出於胃。故為噫。○保命集云。噫者。胸中氣不交也。仲景云。噫氣不除者。旋復代赭石湯主之。則知噫氣為中氣不洽。土不制水。水飲上泛。故用旋復半夏。以散痰飲。人參甘草薑棗。以溫胃氣。代赭以鎮墜逆氣。而引參力下行也。若老人噫氣。乃胃中虛寒。痰逆而然。止宜理中丸。溫助胃氣為主。或加枳實香附砂仁之類。助其消化。雖然真氣已衰。即使調理得宜。終不能過五年。

矣

諸通街上。氣逆街上。火氣炎上故也。經云。逆氣象陽。凡氣逆。必證象陽盛。面赤脉洪。當以法降其逆。乃愈。若以氣象陽盛。而用寒藥攻之。則不救矣。氣上衝咽不得息。喘息有聲。不得問。調中益氣湯加吳茱萸。觀厥氣多少用之。如夏月有此證。為大熱也。宜以酒炒川連知母。少加肉桂為末。酒丸服二錢。仍多飲湯。少時以美饈壓之。使直至下焦。以瀉衝脈之逆也。蓋逆者。寒熱之氣逆而不順也。當隨四時寒熱溫涼以制之。厥陰氣上衝心咽不得息。治法見傷寒厥陰病條。戴復菴云。虛炎之證。陰陽不升降。下虛上盛。氣促喘急。宜蘇子降氣湯下黑錫丹。

醫通卷之四

諸通街上

今

思得堂藏

胃脘癰

內經病能論云。人病胃脘癰。當候胃脉。其脉當沉細。沈細者。氣逆。逆者。人迎甚盛。甚盛則熱。人迎者。胃脉也。逆而盛。則熱聚於胃口而不行。故胃脘為癰也。

馬仲化云。胃為水穀之海。其經多氣多血。脈見右關。本宜洪盛。今反沈細。則是胃氣已逆。人迎者。胃經穴名。在結喉兩傍。動脉應手。其脉見於左手。今右關脈沈細。人迎甚盛。則是熱聚胃口而不行耳。靈樞經脈篇謂。人迎大三倍於寸口。則胃經為實。即此驗之。而知胃脘癰之脉也。

仲景云。嘔家有癰脹者。不可治。嘔脹盡自愈。此不言癰之所。在而言嘔脹者。以其但嘔而不效。知非肺癰。而為胃脘癰明矣。內經曰。熱聚於胃口而不行。胃脘為癰。胃脘屬陽明。陽明

醫通卷之四

胃脘癰

思得堂藏

氣逆。故腹不自效出。而從嘔出。腹亦不似肺癰之如米粥者。此出自胃脘。從溼化而聚結成膿。有結痰如蜆肉也。謂不可治。嘔言不得用辛香溫胃止嘔之劑。以膜之於濁。熏蒸穀氣。故嘔若腹出則嘔自愈。夫癰之在胃脘之上者。則然。若過乎中。在膈之下。則腹從大便而出。輕則全腹排膿。重則大黃牡丹湯。涼膈散選用。若腹自上而吐。輕則全腹排膿。重則射干湯。或犀角地黃湯加忍冬連翹。皆因勢利導之法也。膜稀嘔止。後用太乙膏作丸服。虛人宜八珍加黃耆。忍冬連翹之類調補之。凡舌胎經久不退。色黑垢膩。口中作甜。其氣穢濁。即是胃脘發癰之候。明眼辨之。毋俟癰成而致莫救也。石頑治談仲安。體肥善飲。初夏患壯熱嘔逆。胸膈左畔隱痛。手不可拊。便溺澀數。舌上胎滑。食後痛嘔稠痰。漸見血

水脉來清滑不調與涼脈散加石斛連翹下稠膩煩多先是腸胃作肺癰治不効予曰肺癰必致嗽吐腥穢痰此但嘔不嗽洵為胃病無疑下後四五日復嘔如前再以小劑調之三下而勢甫平後以保元苓橘平調二十日而痊先時有李姓者患此專以清熱豁痰解毒為務直至膈畔潰腐膿水淋漓纏綿匝月而斃良因見機不早直至敗壞悔無及矣

張氏醫通卷之四終

胃統

全一思得堂藏

張氏醫通卷之五

清

長洲石頑張

路玉

男

男

登誕

俾飛鳴

日本

大泉長巷前田安宅子仁

再訂

諸血門

諸見血證

經云太陽厥逆僵仆嘔血善衄○陽明厥逆喘咳身熱善驚衄嘔吐○血氣者身溫而惡寒寒則泣不能流溫則消而去之○夫血之於氣異名同類營衛者精氣也血者神氣也故奪血者無汗奪汗者不可復奪其衄○脾移熱於肝則為驚

醫通卷之五

諸見血證

全一思得堂藏

衄○脈至而搏血衄身熱者死脈來懸鉤浮為常脈沉者形勢相離之象也○大怒則形氣絕而血湧於上○悲哀太甚則胞絡絕胞絕則陽氣內動發則心下崩數溲血也○胞移熱於膀胱則癰溺血

金匱云師曰尺脈浮目睛黃衄未止量黃去目睛慧了知衄今止

尺以候腎腎虛則相火擾其陰血從膀胱而升故脈浮也腎之精上營腦子膀胱之脈下頰中二經中有不歸經之血故量黃黃退則血亦散所以知衄止也明理論云傷寒衄血黃邪在表雜病衄血黃邪在裏此曰尺浮不言寸浮知為腎虛血逆非外邪也

病人面無色無寒熱脈沉弦者衄浮弱手按之絕者下血煩

渴者必吐血。一作病人面無血色

面者血之華。血統則華鮮。若有寒熱。為傷其血而致。今無寒熱。則是因血脫而然矣。夫脈浮以候陽。沉以候陰。若但見沉弦。輕取絕無者。是無陽也。無陽知血之上脫。若止見浮弱。重按絕無者。是無陰也。無陰知血之下脫。而煩渴。血者以火氣擾亂。則神煩。火動於膈。則欬逆。欬則湧血而上越也。然則沉之無浮。浮之無沉。何便見為脫血乎。以其面無血色。而脈弦弱也。

男子脈虛沉弦。無寒熱。短氣裏急。小便不利。面色白。時目瞋。兼衄。小腹痛。此為勞使之然。

脈虛沉弦者。以按之則少神。且無寒熱。明非外感之邪也。其短氣裏急。少腹痛。小便不利。而面色白。皆內傷於氣之

醫通卷之五

諸見血證

思得堂藏

候。故雖時目瞋而衄。洵為勞役所致而然也。

男子面色薄者。主渴及亡血。卒喘悸。脈虛者。裏虛也。

心主血。心虛則脈虛。上句以面色薄。而主心血不榮於外。下句以喘悸脈浮。而主心氣不充於裏。皆由心神耗散。血亡津傷所致也。

夫吐血欬逆上氣。其脈數而有熱。不得卧者死。

此金水二藏不足故也。水不足。則火獨亢。而金傷矣。夫陰血之安養。內外者。皆腎水主之也。腎水虛。則不能安靜。而血被火逼。遂溢出血。出則五藏內外之陽。皆失其配。失配之陽。無根之狂陽也。有升無降。炎燥肺金。而為欬逆上氣。肺腎之陰。有絕無復耳。脈數身熱。陽獨勝也。不能卧。陰已絕也。陰絕則陽不能獨生。故曰死。

夫酒客欬者。必致吐血。此因極飲過度所致也。

酒性大熱。傷胃。胃氣不守。亂於胸中。中焦之血。不布於經絡。因熱射肺。而為欬逆。隨氣溢出也。此即千金所謂由傷胃吐血也。

吐血不止者。栝葉湯主之。

夫水者。遇寒則堅。冰潛於地中。遇風則洶湧。起於平陸。人之吐血。皆風火使然。栝葉。東西方金氣。可制肝木之逆。則血有所藏。艾葉之溫。可使火反歸陰。而宿藏於下。用馬通以降血逆。尤屬相宜。家秘多阿膠三錢。時珍綱目有阿膠無艾。總取辛溫之力。以和苦寒之性。不獨治吐血不止。而下血者亦可用之。

病人胸滿。脣瘡舌青口燥。但欲漱水不欲嚥。無寒熱。脈微大。

醫通卷之五

三

思得堂藏

來遲。腹不滿。其人言我滿。為有瘀血。

凡內外諸邪。有血相搏。積而不行者。即為瘀血。血積則津液不布。是以脣瘡舌青口燥。但欲漱水以潤其燥。血為陰邪。且內無熱。故不欲嚥也。脈大為熱。遲為寒。今無寒熱之病。而微大者。乃氣并於上。故胸滿也。遲者。血積膈下也。積在陰經之隧道。不似氣積於陽之盲膜。然陽道顯。陰道隱。氣在盲膜者。則壅脹顯於外。血積隧道。惟閉塞而已。故腹不滿。因閉塞自覺其滿。所以知瘀血使然也。

病者如熱狀。煩滿口乾燥而渴。其脈反無熱。此為陰伏。是瘀血也。當下之。

血陰也。配於陽。氣得之以和。神得之以安。咽得之以潤。經脈得之以行。身形之中。不可斯須離也。今因血積。神無以

養則煩。氣無以和則滿。口無以潤則燥。胃無以澤則渴。是皆陽失所配。營衛不布。津液不化。而為是證也。非陽之自強而生熱比。故曰如熱狀。脈反無熱。陰邪不能鼓。激其脈。故為陰伏。

下血先便後血。此遠血也。黃土湯主之。亦止吐血衄血。

經言大腸小腸皆屬於胃。又云陰絡傷則血內溢。今因胃中寒邪。併傷陰絡。致清陽失守。迫血下溢。二腸遂成本寒標熱之患。因取白朮附子湯之溫胃助陽。祛散陰絡之寒。其間但去薑棗之辛散。而加阿膠地黃。以固護陰血。其妙尤在黃芩佐地黃。分解血室之標熱。竈土領附子。直溫中土之本寒。使無格拒之虞。然必血色瘀晦不鮮者為宜。若紫赤濃厚光澤者。用之必殆。斯皆審證不明之誤。豈立方

醫通卷之五

諸見血證

思得堂藏

之故歟。千金用續斷止血湯。方用續斷當歸桂心蒲黃阿膠甘草乾薑生地黃八味。附此以備按證取用。

下血先血後便。此近血也。赤小豆當歸散主之。

此方在狐惑例中。治脈數無熱微煩。默默但欲臥。汗出初得之三四日。目赤如鳩眼。七八日目四眦黑。全是溼熱傷血。化為膿之候。此先血後便。乃小腸熱毒流於大腸。為火剋金之象。故亦主此方。以赤小豆之清熱利水為君。且浸令芽出。以發越蘊積之毒。使丙丁之火。疾趨水道而降。佐以當歸司統攝之權。使血有所歸。而不致於散漫也。千金用伏龍肝湯。即治先便後血之黃土湯中除去黃土。加乾薑牛膝地榆髮灰與金匱主治。則有寒熱之殊。不可不辨。可見治血。但使歸經。不必論其遠近也。

心氣不足。吐血衄血。瀉心湯主之。

心氣不足。言陰津不足。非心火之不足也。故以大黃導瀉結之火。芩連瀉心下之熱。而血自安矣。

趙養葵曰。凡腎經吐血者。俱是下寒上熱。陰盛於下。逼陽於上之假證。世人不識。而為所誤者多矣。吾獨窺其微。而以假寒治之。蓋真陰失守。命門火衰。火不歸源。陰邪逼其浮遊之火於上。上焦欬嗽氣喘。惡熱面紅。嘔吐痰涎出血。此係假陽之證。須用八味丸引火歸源。水探冷服。下咽之後。冷性既除。熱性始發。因而嘔噦皆除。即仲景人尿豬膽汁加於白通湯中。以通格拒之意也。倘一服寒涼。頃刻立化。慎之哉。

人有偏陰偏陽者。此氣稟也。太陽之人。雖冬月身不須綿。口常飲水。色慾無度。大便數日一行。苓連知藥硝黃。恬不知怪。

醫通卷之五

諸見血證

思得堂藏

太陰之人。雖暑月不離複衣。食飲稍涼。便覺腹痛泄瀉。參朮薑桂。時不絕口。一有慾事。呻吟不已。此兩等人。各稟陰陽之偏者也。與之談醫。各執其性之一偏。面目為全體。今之為醫者。不鑒其偏之弊。而製為不寒不熱之方。舉世宗之以為王道。豈知人之受病。以偏得之。感於寒則偏於寒。感於熱則偏於熱。以不寒不熱之劑投之。何以補其偏而救其弊哉。故以寒治熱。以熱治寒。此方士之繩墨也。然苦寒頻進而積熱彌熾。辛熱比年而沉寒益滋者何耶。此不知陰陽之屬也。凡治血證。前後調理。須按心脾肝三經用藥。心主血。脾裹血。肝藏血。歸脾湯一方三經之藥也。遠志棗仁補肝以生心火。茯神補心以生脾土。參耆甘草補脾以固肺氣。木香者。香先入脾。總欲使血歸於脾。故曰歸脾。凡有鬱怒傷肝。思慮傷脾。

尤宜火旺者。如山梔丹皮。火衰者。加肉桂丹皮。又有八味丸。以培先天之根。治無餘法矣。○血溢血瀉。諸畜妄證。其始也。宜以行血破瘀之劑。折其銳氣。而後區別治之。或問。失血復下。虛何以當。答曰。血既妄行。迷失故道。不去畜利。則以妄為常。易以禦之。且去者自去。生者自生。何虛之有。失血家須用下劑破血。蓋施之於畜妄之初。亡血虛家不可下。蓋戒之於亡失之後也。

或問。人身陽氣為陰血之引導。陰血為陽氣之依歸。何為清濁相干。亂於中外。而致血不歸經。則有上溢下脫之患。其血或從吐出。或從嘔出。或從咯出。或從鼻出。或從眼耳齒舌出。或從津唾而出。或從肌膚而出。或從二便而出。復有畜積不行者。為患各有不同。願一一顯示至理。條分藏府經絡之源。醫通卷之五

諸見血證

六 思得堂藏

以啟學人蒙昧。石頑答曰。經言。血之與氣。異名同類。雖有陰陽清濁之分。總由水穀精微所化。其始也。混然一區。未分清濁。得脾氣之鼓運。如霧上蒸於肺。而為氣。氣不耗。歸精於腎。而為精。精不泄。歸精於肝。而化清血。血不瀉。歸精於心。得離火之化。而為真血。以養脾藏。以司運動。以奉生身。莫貴乎此。雖經有上注於肺。乃化為血之說。而實不離五行之氣化。轉注如環也。如上所云。不過統論營衛血氣之大端。乃節文耳。夫營衛者。精氣也。血者。神氣也。氣主煦之。血主濡之。雖氣稟陽和。血稟陰質。而陰中有陽。陽中有陰。不能截然兩分。其至清至純者。得君主之令。以和調五藏。藏而不失。乃養藏之血也。其清中之濁者。乘輪運之權。以洒陳六府。實而不滿。則灌注之血也。其清中之清者。會常周之度。流行百脈。滿而不泄。

此營經之血也。其源則一。析而為三。各有司屬。若各守其鄉。則陰平陽秘。安有上溢下脫之患乎。蓋緣人之稟賦。不無偏勝。勞役不無偏傷。其血則從偏衰偏傷之處而滲漏焉。夫人稟賦既偏。則水穀多從偏勝之氣化。而勝者愈勝。弱者愈弱。陽勝則陰衰。陰衰則火旺。火旺則血隨之而上溢。陰勝則陽微。陽微則火衰。火衰則火失其統而下脫。其上溢之血。非一於火盛也。下脫之血。非一於陽衰也。但以色之鮮紫濃厚。則為火盛。色之晦淡無光。即為陽衰。究其所脫之源。或緣藏氣之逆。或緣府氣之乘。皆能致病。從上溢者。勢必假道肺胃。從下脫者。勢必由於二腸。及從膀胱下達耳。蓋出於肺者。或緣雷亢逆。或緣欬逆上奔。血必從之上溢。多帶痰沫。及粉紅色者。其出於心包。亦必上溢。色必正赤如硃。漆光澤。若吐出便凝。摸之不粘指者。為守藏之血。見之必死。出於脾者。或從胃脘上溢。或從小腸下脫。亦必鮮紫濃厚。但不若心包血之光澤也。出於肝者。或從上嘔。或從下脫。血必青紫稠濃。或帶血縷。或有結塊。出於腎者。或從欬逆。或從咯吐。或稀痰中雜出如珠。血雖無幾。色雖不鮮。其患最劇。間有從精竅而出者。若氣化受傷。則從膀胱溺孔而出。總皆關乎藏氣也。其出於胃者。多兼水液痰涎。吐則成盤。成蓋。汪洋滿地。以其多氣多血。雖藥力易到。不若藏血之為然。為五藏之本。亦不可忽。其血雖種種。各有所從。不獨出於鼻者為衄也。鼻衄皆火乘肺金。亦有陰盛迫其虛陽而脫者。雖經有藏府諸衄不同。然不離乎太陰之經。所以治有從陰從陽。順治逆治之辨。別證有久衄暴衄。宜補宜瀉之懸殊。其齒衄。有陽明少陰及風熱之

醫通卷之五

諸見血證

七 思得堂藏

辨。但從板齒出者為牙宜。屬陽明。齒動搖者為骨病。屬少陰。齲腫上壅者。少陽風熱也。耳聾則有肝腎二經之殊。但以常有不多不腫不疼者。為少陰之虛。暴出疹腫者。則厥陰經火也。眼眵亦屬厥陰。但以卒視無所見者。為實火。常流血淚者。素患之風熱也。其有諸竅一齊湧出。多緣頭撲腦傷。或藥毒所致。若因肝腎疲極。五臟內崩。多不可活。舌舐皆手厥陰心包之火旺。但以舌尖破碎者。為虛火。脈大滿口者。挾龍雷之勢。而上侮君主也。涎中見血。為唾衄。足太陰經氣不約也。汗孔有血。為肌衄。足陽明經氣不固也。如上諸衄。皆緣營氣之逆滿。衛氣之疎豁。不能固護而行清道。總無關乎藏氣也。其下行之血。見於魄門者。則以便前便後分遠近。近則大腸。遠則小腸也。以澀酒點滴分風溼。澀則風溼。滴則溼著也。以鮮

醫通卷之五

諸見血證

八

思得堂藏

紫清晦分陰陽。鮮則陽盛。晦則陽衰也。與腸澀之血。痔漏之血。婦人經發胎產之血。無異。雖由二腸。頗關經絡。是以隨經下趨。各有不同。至於崩淋下脫。倒經上溢。雖下上之岐路攸分。然皆衝脈為病。而崩淋皆脾氣下陷。倒經則肝血上逆。以脾為身之津梁。衝為肝之血海。是皆關乎藏氣。更有肝脾受傷。血雖不下。而氣色痿黃。大便稠黑。乃畜血之徵驗。為患種種。難以悉陳。如內傷發黃。鼓脹喘滿。腹大青筋。及產後敗血流於經絡。皆畜血致病。但證有虛中挾實。治有補中寓瀉。從少從多之活法。貴乎臨病處裁。大抵血氣喜溫而惡寒。寒則泣不能流。溫則消而去之。此軒岐密旨。但世之名於醫者。一見血證。每以寒涼濟陰為務。其始非不應手。而取効於一時。屢發屢折。而既病之虛陽愈衰。必致嘔逆喘乏。奪食泄瀉。尚

以為藥力未逮。猛進苦寒。在陰不濟陽而上溢者。尚為戈戟。況陽不統陰而亡脫者。尤為砒鴆。蓋因陽藥性暴。稍有不順。下咽立見其害。不若陰柔之性。至死不知其候。而免旁人譏謗也。噫。醫之弊。僅為知己道。難為世俗言也。

醫通卷之五

諸見血證

九

思得堂藏

衄血

耳衄

鼻衄

齒衄

衄者血從經絡中滲出而行於清道也。傷寒衄血。黃熱在表。有麻黃越脾等法。雜病衄血。黃熱在裏。經絡熱甚。陽氣壅重。迫血妄行而出於鼻。從無發散之理。若因七情喜怒勞役過傷而致者。無論是何經絡。並宜茅花煎湯調止。衄散或四物加犀角丹皮沉香。六脈弦細而滿。按之空虛。色白不澤者。脫血也。此大寒證。理中湯加黃耆。六脈俱大。按之空虛。心動面赤。善驚上熱。乃手少陰心火旺。而上熏於肺脈也。三黃補血湯。實熱衄血。脈實大便秘者。犀角地黃湯加木香大黃。衄血過多。屢服犀角地黃湯不止。此內虛寒而外假熱也。千金當歸湯兼標本而治之。若至夜發。此因多汗衛氣大虛。不能固其營血也。當歸補血湯不効。加木香更不効。必是血

醫通卷之五

衄血

十

思得堂藏

虛火旺。大劑保元湯。若誤用涼血藥。致瘀熱內結。胸中作痛者。一味木香酒磨。頓服錢許立効。內傷勞役之人。喘嗽面赤。發熱頭痛而衄。此肺經氣虛。失護衛之職。致心包火炎。經脈熱甚。故行清道。當歸補血湯加薄荷荊芥。不應補中益氣。倍黃耆。慎不可用辛熱之藥。兼有風寒。小建中加葱鼓。清道閉塞。流入胃脫。吐出清血。或衄血不盡。瘀積停留。致面目痿黃。大便黑色者。犀角地黃湯。攪擦而衄不止。小烏沉湯調黑神散。伏暑而衄。五苓散加茅花。久衄不止。熱在下焦。血分六味丸加五味子作湯。不効加重便。有先因衄血。衄止而變生諸證。或寒熱間作。或喘急無寐。病狀不一。漸成勞瘵。當於虛損諸證詳之。曾病衄後。血因舊路。或一月三四衄。又有洗面即衄。日以爲常。並宜止衄散。茅花煎湯調下。

衄不止。面浮腫者。蘇子降氣湯。使血隨氣下。得力全在因桂一味。久衄不已。須加氣藥。如木香香附之類。蓋血無氣引。則血不歸經也。有頭風繞發。則衄不止。用童便浸川芎一兩。童便製香附二兩。炙甘草半兩。共爲末。每服三錢。清茶調下。間用搐鼻法。

診。衄血脈浮大數者。爲邪伏於經。宜發汗。大而虛者。爲脾虛。不能統攝。宜補氣。小而數者。爲陰虛火乘。宜攝火。弦滿爲有瘀積。宜行滯。凡衄血之脈。數實或堅勁。或急疾不調。皆難治。久衄脈虛大。頭額痛甚。鼻流淡黃水者。死。

大衄血。大衄血者。口鼻俱出也。此積勞傷脾所致。補中益氣倍黃耆當歸。不應歸脾湯加童便藕節。

舌衄。舌上忽出血如線。先用蒲黃煎湯漱之。次用槐花炒

醫通卷之五

衄血

耳衄

鼻衄

齒衄

思得堂藏

研搽之。黃耆六一湯。合生脈散服之。熱壅舌上出血如泉。一味用文蛤爲散。搽之。虛熱舌脹大。出血不止。生乾薑末。蒲黃末。搽之。

齒衄。血從齒縫中或齒齦中出者。曰齒衄。又謂牙宣。有風壅。有腎虛。有胃火。風壅者。或齒齦微腫。或牽引作痛。消風散加犀角連翹。外擦青鹽。本末腎虛者。口不臭。齒浮動。齒縫中點滴而出。若隱隱作痛者。虛風襲入腎經。腎主骨。齒乃骨之餘也。宜鹽湯下小安腎丸。不痛。腎虛而有火也。六味丸加骨碎補。外用青鹽炒香附末。擦之。胃熱者。牙疼而齦間出血。如涌。齒不動。搖其人必好。飲或多啖炙烤所致。口臭不可近。宜清胃散。甚者服調胃承氣湯。

耳衄。耳中出血爲耳衄。兩關弦數。飲酒多怒。人屬肝火。柴

胡清肝散尺脈弱或躁屬陰虛生料六味丸加五味子更以
龍骨燒灰吹入即止

眼翳○血從目出乃積熱傷肝或候藥擾動陰血所致暴病
發熱見此梔子鼓湯加犀角秦皮丹皮赤芍候藥成壞病見
之雖用獨參保元生料六味皆不可救

肌翳○血從毛孔出者為肌翳脈數當歸補血湯脈浮黃皆
建中湯脈弱保元湯脈盛當歸六黃湯

滑伯仁治一婦體肥氣盛因無子常服暖子宮藥積久火
盛迫血上行為翳必升餘醫者猶以為上實下虛中升
劑鎮隆之經云上者下之今血氣俱盛溢而上行法當下
導奈何實實耶即與桃枝承氣三四下瘀積既去繼服既
濟湯二十餘劑而愈

醫通卷之五

眼翳 肌翳

十三

思得堂藏

一膏梁過飲致翳醫曰諸見血為熱以清涼飲子投之即
止越數日其疾復作又曰藥不勝病故也遂投黃連解毒
湯或止或作易數醫皆用苦寒之劑向後飲食起居漸不
及初肌寒而躁言語無聲口氣穢臭其翳之餘波未絕或
曰諸見血為熱熱而寒正理也今不愈而反害之何耶
醫惟知見血為熱而以苦寒攻之不知苦寒專瀉脾土
土為人之本火病而瀉其土火未除而土已病病則胃虛
虛則營氣不能滋榮百脈元氣不循天度氣隨陰化
不揚而肌寒也惟當甘溫大補脾土斯可向安矣
石頑治朱聖卿鼻翳如崩三日不止較之向來所發之
最劇服犀角地黃芩連知藥石膏山梔之屬轉盛第四日
邀余診之脈弦急如循刀刃此陰火上乘載血於上

涼之藥轉傷胃中清陽之氣所以脈變弦緊與生料六味
加五味子作湯另用肉桂末三錢飛羅麩糊分三丸用煎
藥調下甫入喉其血頓止少頃口鼻去血塊數枚而愈自
此數年之患絕不再發

醫通卷之五

衄血按

十三

思得堂藏

吐血 嘔血 衄血 咳血 咯血

繆仲淳曰。吐血有三訣。宜行血。不宜止血。血不循經絡者。氣逆上壅也。行血則循經絡。不止自止。止之則血凝。血凝則發熱惡食。病日痼矣。○宜補肝。不宜伐肝。經曰。五藏者。藏精氣而不瀉者也。肝主藏血。吐血者。肝失其職也。養肝則肝氣平。而血有所歸。伐肝則肝虛不能藏血。血愈不止矣。○宜降氣。不宜降火。氣有餘便是火。氣降則火降。火降則氣不上升。血隨氣行。無溢上竅之患矣。降火必用寒涼之劑。反傷胃氣。胃氣傷則脾不能統血。血愈不能歸經矣。○今之療吐血者。大患有二。一則專用寒涼之味。如芩連山梔。四物如檠之類。往往傷脾作瀉。以致不效。一則專用人參。肺熱還傷肺。致嗽愈甚。亦有用人參而愈者。此是氣虛喘嗽。氣屬陽。不由陰虛火。

醫通卷之五

吐血

思得堂藏

熾所致。然亦百中一二也。

劉默生曰。吐血一證。人惟知氣逆血溢。火升血泛。不知血在藏府。另有隔膜隔定。其血不能滲溢。夫隔膜者。極薄極脆。凡有所傷。則破。破則血溢於上矣。故有陽絡傷則血上溢。陰絡傷則血下滲。已傷之膜。若有復傷。其吐必多。隔膜雖傷。傷處有瘀血凝定。血來則緩。若陰火驟冲。破瘀積之血。血來如潮。之上湧。自覺漚漚有聲。彼時喘息不定。面赤如醉。煩躁不寧。心神昏亂。一皆龍雷之勢。脈亦急疾難憑。少頃火退神清。面白氣平。血亦漸止。方可診切。用藥須乘此時。瘀積蕩盡。緩緩清理。徐徐調補。然不可驟壅。亦不可用耗氣之藥。悉知此義。治血有本矣。○吐血者。一吐則傾盆盈碗。或鮮散中兼紫黑大塊。吐後不即凝結。蓋吐血出於胃。胃為水穀之海。多氣多

血。所以吐多而不即凝。以中雜水穀之氣也。皆勞力內傷中

氣而得。亦有醉飽接內而致者。治法不可驟止。止則使敗血留積為瘀血之根。不時舉發。為害非輕。亦不宜峻攻。復傷其血。只宜清理胃氣。以安其血。如犀角地黃湯。隨證加桃仁茜根。橘紅木香。大黃童便之屬。吐久不止。內虛寒而外假熱。千金當歸湯。不應。用十灰散。退之。若血色瘀晦如汚泥。為陽不制陰。宜花葉石散。溫以散之。○吐血初起。脈俱洪數者。屬外因。須用參蘇飲。加歸身倍茯苓。蓋茯苓能守五藏真氣。瀉腎中伏火。去脾胃中淫。二三劑後。脈數退而洪不退者。用六味地黃丸。加沉香。以納氣歸元。若洪退弱極。用四君子加橘紅。以補脾生肺。慎不可用涼藥。蓋火載上行。逆也。復用涼藥。強為降下。豈非逆而又逆乎。不若發散之為愈也。○上膈壅熱。

醫通卷之五

吐血

思得堂藏

胸腹滿痛。吐血脈洪大。弦長按之有力。精神不倦。或覺胸中滿痛。或血是紫黑塊者。用當歸丹皮荊芥。阿膠滑石酒大黃。玄明粉挑仁泥之屬。從大便導之。此釜底抽薪之法。不知此而從事於芩連知檠之屬。輔四物而行之。使氣血俱傷。脾胃多敗。百不一生也。○吐血在暑天。病人口渴面垢。頭暈乾嘔。五苓散。或桂苓甘露飲。並加麥冬五味藕節汁。○酒後悶嘔。血從吐後出者。新定紫苑茸湯。○飲酒過多。傷胃吐血。六君子加香砂乾葛。○傷胃吐血。因飲食太過。不能消化。煩悶強嘔。因傷胃口吐血。腹中絞痛自汗。其脈緊而數者。難治。枳實理中湯加丹皮藕豆灰。○諸失血後。倦怠怠惰。面失色。懶於言語。濃煎獨參湯加橘皮。所謂血脫益氣也。○勞心太過。吐血不止。歸脾湯去木香。加門冬阿膠。○婦人倒經。血溢於上。

蒸熱欬嗽不除。及男子精未充而御女。而成虛勞失血。並宜烏骨雞丸。異順丸選用。若血色晦淡不鮮。無論上吐下失。俱當用溫熱之劑。如甘草乾薑溫理中氣。切禁寒涼。若至衄血。血水難已。胃中熱甚。迫血妄行。犀角地黃湯加大黃。灰木香。桃仁。吐血勢不可遏。胸中覺氣塞滯。吐紫黑血者。桃仁承氣加茜根。千金翼治吐血。用生地汁半升。煎三兩。沸調生大黃末一方寸匙。分三服。治熱毒吐血有効。○有時吐血。兩口。隨即無事。數日又發。經年累月不愈者。小烏沉湯送黑神散。不時常服。○吐甚不止者。柏葉乾薑等分。加艾少許。入童便服。○失血後。頭暈發熱者。往往有之。此是虛火上炎。外撥之故。不可誤認外感。而用風藥。○吐血發渴。名曰血渴。十全大補湯。或生脈散。加黃耆。煨葛根。枇杷葉。量胃氣虛實用。

醫通卷之五

吐血

六

思得堂藏

之。○暴吐血新止後。丹方用燕窩。萊菔糖。各四錢。同煮服之。連服五七日。永不復發。○吐血脈以微細為順。洪大為逆。血若暴湧如潮。喉中汨汨不止。脈見虛大。此火勢未歛。不可便與湯藥。悉以熱童便。或藕汁灌之。俟半日許。脈勢稍緩。可進調養之劑。倘寸關雖弱。而尺中微弦。為陰虛。以防午後陰火上升。上午宜服獨參保元。以統其血。午後與六味丸。加重便牛膝。以濟其陰。服後脈漸調和。飲食漸進。肢體輕捷。面色不赤。足膝不冷。身不灼熱。額無冷汗。洩便如常。雖有紫黑血塊。時欲咯出。而無鮮血上行。方許可治。血雖止而脈大不減。或雖小而弦細數疾。或弦硬不和。慎勿輕許。可治。亦有他部柔和。而左手關尺弦強者。為陰虛火旺。最為危兆。其變有三。一則陰火引血。復上而暴脫。一則虛陽發露。而發熱。一則火上

逼肺而喘欬。此終不救。○脫血用大劑人參。益氣以固血。惟血色鮮明。或暑兼紫塊者。宜之。若見晦淡者。為血寒而不得歸經。須兼炮黑乾薑。或大劑理中溫之。尺部脈弦。大劑生料六味。加肉桂引之。亦有肉桂為末。和獨參湯服者。若血色如硃。光亮如漆。吐出即乾。以指甲刮之。成片而起者。雖能食不飽。後必暴脫而死。若血中見似肉似肺。如爛魚腸。此胃中脂膜為邪火所燥。凝結而成。方書咸謂必死。然吐後凝結既去。而不發熱。能進飲食。令服小劑異功保元。大劑六味都悉。多有得生者。不可盡委之於無救也。○此證宜與前虛損門參看。

醫通卷之五

吐血

七

思得堂藏

有三。一屬暴怒火逆傷肝。其證胸脇痛甚。則厥逆。柴胡疎肝散。加酒大黃。一屬極勞奔馳傷肝。其證遍身疼痛。或時發熱。犀角地黃湯。加當歸肉桂。桃仁泥。一屬竭力房勞傷肝。其證面赤足冷。煩躁口渴。生脈散。合加減八味丸。陽衰不能內守。而嘔者。異功散。研服八味丸。然不戒房至思慮勞役。終不救也。房室勞傷。氣竭傷肝。而有乾血者。四烏鯀骨一蘆茹丸。兼童便藕汁之類。

唾血。○平時津唾中有血如絲。或浮散者。此屬思慮傷脾。脾虛不能統血也。有兼心兼腎兼胃之不同。兼心加味歸脾湯。兼腎六味丸。加五味子。肉桂。兼胃四君子湯。加黃耆。山藥。粟米。名七珍散。食少痰清者。異功散。加枇杷葉。白藕豆。灰。胃中痰食不清。吐血。加半夏。生薑。即白藕豆散。

欬血。欬血者。因欬嗽而見血。或乾欬。或痰中見紅絲血點。一兩口。氣急喘促。此雖肺體自燥。亦為火逆。欬傷血膜。而血隨痰出也。其脈微弱。平緩易治。弦數急實。氣促聲嘶。咽痛者。不治。得此證者。若能靜養。庶有生理。治宜六味丸加門冬五味。清金壯水為主。累舉阿膠。貝母百合。欬冬紫苑。潤肺止咳。之劑。血止後。胃虛少食。氣息不續者。切勞散去半夏。加紫苑。耳及瓊玉膏調理之。○欬血久而成勞。或勞而欬血。肌肉消瘦。四肢倦怠。五心煩熱。咽乾煩赤。心冲潮熱。盜汗減食。異功散加阿膠。或四君子加黃耆。龜甲麥冬五味。○陰虛火動而欬血。或痰中有血。星如珠者。生料六味丸加茜根烏賊骨童便。○欬血不止。至夜發熱吐痰。或帶血絲者。六味丸加蛤粉童便。歸脾臥服。○肥盛酒客。痰中有血。滾痰丸。龍絲之。○欬

醫通卷之五

欬血

六 思得堂藏

唾膿血。欬即胸中隱隱痛。脈反滑數。或數實者。此為肺癰。更於本門求之。咯血。○咯血者。不嗽而喉中咯出小塊。或血點是也。其證最重。而勢甚微。常咯兩三口。即止。蓋緣房勞傷腎。陰火載血而上。亦有兼痰而出者。腎虛水泛為痰也。陰虛多火。黑瘦之人。最忌犯此。初起宜紫苑麥冬茯苓。兼仁山藥白芍丹皮童便。以清手足少陽厥陰諸經遊散之火。後以六味丸加牛膝滋補腎陰。以安其血。慎不可用攻血藥也。滑伯仁曰。咯血為病最重。以肺為清肅之藏。金為陰火所制。水虧火旺。迫而上行。以為咯血。逆之甚矣。經謂上氣見血。下聞病音者。言喘出於腎。而咯出於肺也。余嘗用生料六味丸加麥冬五味。下蜜砂丹治之。是得內經之旨也。然多有兼挾

風寒飲食而發者。不可誤認本病。而與前藥。若兼風寒。則人迎浮盛。或見弦緊。飲食則氣口短滑。或反伏瀉。風寒則黃蒼建中。飲食則枳實理中。不可妄用他藥。

喻嘉言曰。夫血病有新久微甚。無不本之於火。然火有陰陽不同。治法因之迥異。經云。暴病非陽。則其為火也。即非陽火。甚明。陽火者五行之火。何暴之有。設其暴也。復可以五行之水折之。惟夫龍雷之火。潛伏陰中。方其未動。不知其為火也。及其一發。暴不可禦。以故載陰血而上溢。故凡用涼血清火之藥。未有不轉助其虐者。大法惟宜溫補其陽。以制陰火之僭。經謂咯血者。屬腎。明乎陰火發於陰中。其血咯之成。魂而出。不比欬嗽痰中帶血為陽火也。此義從前未有發明。惟仲景云。誤發少陰汗。動其經血者。下厥上竭。為難治。後人隨文

醫通卷之五

咯血

五 思得堂藏

讀去總置不講。不知下厥者。陰氣逆於下也。上竭者。陰血竭於上也。蓋氣與血。兩相維附。氣不得血。則散而無統。血不得氣。則凝而不流。故陰火動而陰氣不得。不上奔。陰氣上奔而陰血不得不從之上溢而竭矣。血既上溢。其隨血之氣散於胸中。不得復返於本位。則下厥矣。陰既逆於下。勢必龍雷之火應之。血不盡竭不止也。仲景所以斷為難治者。非直不治也。吾為大開其局。則以健脾中之陽氣為第一義。健脾之陽。一舉有三善。一者脾中之陽氣旺。而龍雷之火潛伏也。一者脾中之陽氣旺。而胸中窒塞如太空不留纖翳也。一者脾中之陽氣旺。而飲食運化。精微復生。其已竭之血也。今方書妄引久嗽成勞。痰中帶血之陽證。不敢用健脾增欬為例。不思咯血即有欬嗽。不過氣逆。氣下則不欬矣。況原無欬嗽者乎。

古方治龍雷之火。每用桂附引火歸元之法。然施之於暴血之證。可曾不可常。蓋已虧之血。恐不能制其悍。而未動之血。恐不可激之擾耳。此以崇土為先。土厚則濁陰不升。而血應自息也。

血溢。原病式云。血溢者。上出也。心主血。熱甚則血隨火而妄行。或謂嘔吐紫漿。血為寒者。誤也。此非冷疑。由熱甚銷燬而為稠濁。熱甚則水化制之。故赤兼黑而為紫也。瀉心湯。蓋火性急速。故至溢脫。從未見有屬陰寒者耳。或偶觸破傷。血遂泉湧不止。惟用十全大補湯。頻頻多服。外用杏仁研細。拌白麩水調塗之。

九竅出血。是證非中毒。即跌蹶受傷。中毒者。用生年血等法。受傷者。觀其人不發熱。尚能飲食者。頻灌熱童便。無故發

醫通卷之五

血溢

九竅出血

二十

思得堂藏

熱九竅出血者。肝腎疲極。五臟內崩也。多不可治。若見血水必死。若因勞傷者。補中益氣倍參耆。或胎髮灰大煎汁。人參湯調服。或血餘灰。每服二錢。以茅根車前草煎湯調下。氣有餘便是火。血隨氣上。補水則火自降。順氣則血不逆。阿膠牛膝丹皮。補水之藥也。蘇子橘紅沉香。順氣之藥也。童便者。引血歸下。兼有行瘀之能。藕汁者。達血使無滯。而有止瀉之力。脈來沉實。腹中滿痛。或吐血塊。或為瘀血畜血。當歸桃仁赤芍。延胡索。連花大黃之屬。怒傷肝木。則血乾於上。使人薄厥。沉香木香。骨皮芍藥丹皮之屬。勞心。蓮肉桑仁。善積。茯神紫苑。栝仁。丹參之屬。房勞。熟地。枸杞。牛膝。杜仲。鹿茸。人參之屬。血熱。地骨。丹皮。犀角。血寒。桂心。附子。血熱不止。山梔。黃連。灰。血瘀。髮灰。大黃。灰。乾漆。灰。

血寒。乾薑。灰。血滑。煨桐。灰。蓮房。灰。血虛。地黃。灰。三七。鬱金。行血中之氣。側柏。涼血中之熱。大小。剉。行血中之滯。茅根。導之使下行也。

診。經曰。安臥脈盛。謂之脫血。失血脈數大。為陽盛。滑細。為少血。細數。為陰火鬱於血中。托為失血。血虛氣不歸附也。弦緊。脈痛。為瘀結。諸血皆屬於肝也。脈來寸口大。尺內微。為肺中伏火。尺中盛。而寸口虛大。為腎虛陰火。尺滑而疾。為血虛有熱。右手虛大。為脾胃之火。左手數盛。為肝膽之火。大抵失血脈微弱細小。而和緩者。易治。洪數實大弦急。或雖小。按之如引葛。如循刀。及芤血身熱。脈至而搏。嘔血。胸滿。引背。脈小而疾者。皆不治。

醫通卷之五

吐血

三十

思得堂藏

汪石山治一中年人。面色蒼白。平素內外過勞。或為食傷。則路硬痰而帶血絲。因服寒涼清肺消痰藥。至五十餘劑。聲漸不消。而至於啞。夜臥不寐。醒來口苦舌乾。而常白胎。或時喉中梗痛。或胸膈痛。或噎氣。夜食難化。或手弄物。久則麻木。常畏寒。不怕熱。前有癰疽。後有內痔。遇勞即發。初診左脈沉弱而緩。右脈浮軟無力。續後三五日一診。或時心肺二部浮虛。按不應指。或時脾脈輕按格指。重按不足。又時或數或緩。或浮或沉。或大或小。變動無常。夫脈無常。血氣虛而隨火用事也。譬之虛傷之人。朝更夕改。全無定准。以脈參證。其虛無疑。蓋勞則氣耗。而傷肺。肺傷則聲啞。又勞則傷脾。脾傷則食易積。前症後痔。遇勞則發者。皆因勞耗其氣。氣虛下陷。不能升降故也。且脾喜溫惡寒。而肺亦惡寒。故曰。形寒飲冷則傷肺。以既傷之脾肺。復傷於藥。

之寒涼。則聲安得不啞。舌安得不胎。胎者。仲景謂之胃中
有寒。丹田有熱也。夜不寐者。由于盜母氣。心虛而神不安
也。痰中血絲者。由脾傷不能固血也。胸痛噎氣者。氣虛不
能健運。食鬱於中而噎氣。或滯於上則胸痛。遂以參耆各
四錢。麥冬當歸貝母各一錢。遠志棗仁丹皮茯苓神各八分
菖蒲甘草各五分。有食則如山查麥芽。隨病出入。服年餘
而漸愈。此病屬於燥熱。故白朮尚不敢用。况他燥劑乎。
又診一人。年二十餘。形瘦色脆。病欬血。醫用滋陰降火清
燥之藥。延及三年不減。又一醫用參蘇飲。去人參服之。病
益劇。延汪診之。脈雖五至而細。其證皆逆。不可治也。或曰
五至平和之脈。何不可治。汪曰。五藏已衰。六府已竭。九候
雖調。猶死也。視其形證。皆屬死候。經曰。肉脫熱甚死。嗽而

上者者死。嗽而左不得眠。肝脈右不得眠。肺脈俱為
死證。今皆犯之。雖能飲食。不為肌膚。去死近矣。越五日果
死。凡患虛勞。犯前數證。又或嗽而聲啞。喉痛不能藥食。或
嗽而肛門發癢者。皆在不救。醫者不可不知。

喻嘉言治一人。素有失血病。晨起陡暴一口。傾血一盆。喉
間氣壅。神思飄蕩。壯熱如蒸。頸筋粗勁。診其脈。尺中甚亂。
曰。此昨晚大犯房勞也。因出驗血色。如太陽之紅。再至寢
所謂曰。少陰之脈繫舌本。少陰者腎也。今腎家之血洶湧
而出。舌本已硬。無法可以救急。不得已用九藥一服。鎮安
元氣。若得氣轉。丹田尚可緩圖。因濃煎人參湯下。黑錫丹
三十粒。喉間汨汨有聲。漸人少腹。頃之舌柔能言。但聲不
出。急用潤下之劑。以繼前藥。遂與阿膠一兩溶化。分三次

熱服。半日服盡。身熱漸退。頸筋漸消。進粥與補腎藥。多加
秋石。服之遂愈。

石頑治刑部湯元洲。年八十二。而痰中見血。服諸寧嗽止
血藥不應。脈得氣口芤大。兩尺微緊。面色槁白。屢欬痰不
得出。教甚方有黃色結痰。此精氣神三者並虧。兼傷於熱。
耗其津液。而欬動肺胃之血也。因其平時多火。不受溫補。
遂以六味丸合生脈散加麥冬。煎膏服之。取金水相生。源
流俱澤。而欬血自除。不必用痰血藥也。

又治錢曙胎。久欬吐血。四五日不止。不時悶熱面赤。或時
成盆成碗。或時吐粉紅色痰。至夜則發熱自汗。一夕吐出
一團。與魚腸無異。雜於鮮血之中。薄暮驟湧不已。神氣昏
昏欲脫。灌童子小便亦不止。同道相商無策。因思瘀結之
物既去。正宜峻補之時。遂猛進獨參湯稍定。緣脈數疾無
力。畧加肉桂炮薑童便少許。因勢利導。以歛虛陽之逆。一
夜中盡參二兩。明晨其勢稍定。血亦不來。而虛粥漸進。脈
息漸和。改用六味丸作湯。調補真陰。半月而安。同時有胡
又曾亦患虛勞吐血。一夕吐出如守宮狀者一條。頭足宛
然。色如櫻桃。不崇朝而斃。

陸晦菴曰。昔余患吐血。暴湧如潮。七八日不已。吾吳諸名
家莫能救止。有雲間沈四雅寓吳中。延請調治。慨然擔當。
求其定方。用人參三兩。附子一兩。肉桂一錢。舉家惶惑。未
敢輕用。越二日。其血益甚。更請診視。求其改用稍緩之方。
彼云。病勢較前更劇。前方正欲改定。始克有濟。更加人參
至五兩。附子至二兩。親戚見之愈驚。彼曰。喘嘔脫血。數日

不止且頭面悶熱下體厥冷正陽欲脫亡之兆命在呼吸若今日不進來日不可為矣子姪輩懇其稍裁參附彼堅持不允力諭放膽煎服僕常生候成功親友見予勢急且見其肯坐候進藥料可無虞遂依方求服彼欣出熱附二十餘塊投咀面稱二兩同人參五兩煎成入童便地黃汁一大碗調肉桂末冷服服後少頃下體至足微汗便得熱腫腫覺血止喘定周身柔和漸可轉側因餽十二金求其收功不受加至二十金始受愈後盛見垣先生見其一劑而効心甚疑駭詢其居常無病時恒服人參兩許無間今雖五兩峻補止煎數沸其味未盡猶可當之至於血證用附子二兩從古未聞因密貽其製藥者云慣用附子汁收入甘草其附已經煎過十餘次雖用二兩不抵未煎者二

三錢始知方士之術如此

飛嚙治蘇天若乃即賓旭新婚後於五月中暴吐血數升昏夜逆視湯藥不及命煎人參五錢入童便與服明晨諸醫咸集以爲人參補氣瘀血難以輕用議進生地山梔牛膝等味予曰六脈虛微而數無瘀可知血脫益氣先聖成法若謂人參補瘀獨不思血得寒則凝反無後患耶今神魂莫主轉側皆暈非峻用人參何以固其元氣之脫乎遂進參一兩二服頓安次與四君保元六味等間服後以烏骨雞丸調理而痊

洩血

經云胞移熱於膀胱則癰溺血可知溺血之由無不本諸熱者多欲之人腎陰虧損下焦結熱血隨溺出脈必洪數無力治當壯水以制陽光六味加生牛膝○溺血不止牛膝一味煎膏不時服之○有氣虛不能攝血者王眉膏最妙方用人參黃耆等分爲末以白萊菔切片蜜炙不時煎未食之豈非虛火宜補宜緩之意歟然痛屬火盛則謂之血淋不痛屬虛謂之洩血二者不可不辨○洩血先與導赤散加桂苓作湯若服藥不効此屬陰虛五苓散加膠艾下四味鹿茸丸○小便自利後有血數點者五苓散加桃仁赤芍梔子滑實者加大黃滑石甘草延胡索下之洩血日久元神大虛而挾虛熱所下如砂石而色紅有如石淋之痛神砂妙香散加澤瀉

肉桂病久滑脫者去黃耆山藥桔梗木香加煨飛龍骨益智仁即王荊公妙香散虛寒以此湯吞四味鹿茸丸○老人洩血多是陰虛亦有過服助陽藥而致者多難治惟大劑六味丸加紫苑茸作湯服之○教而洩血脫形脈小動而搏過也○洩血日久形枯色瘁癰閉如淋二便引痛喘急虛駭行步不能者與死爲鄰矣

石頑治中翰徐藝初夫人溺血兩月不止平時勞心善怒有時惱怒則膈塞氣壅鹿門諸醫雜治罔効適遯吳門婁東松陵諸名家因而下及於余余至方進香薷飲一服及診切之兩手關尺皆弦細少力兩寸稍大而虛遂疏異功散方令其久服可保無虞若有惱怒間進沉香降氣散一切涼血滋陰咸宜遠之以之治病徒滋傷胃之患而無陽

生之力也。觀列坐諸醫。諛謔萬狀。各欲獻伎以逞其能。慚余疎邁。不情趨附於時。况余圓姪孫壽民。又為刑部健菴之倩。與藝初郎舅至戚。不便久留。因謂之曰。東南名公雲集。無藉芻蕘。明晨遂扁舟解維。後聞諸治不効。更延他醫。究不出參朮收功耳。

又治內弟顧元叔。溺血。溺孔不時疼痛。溺則周身麻木。頭旋眼黑。而手足心經脈絀。惡寒。麻尤甚。脈來弦細而數。兩尺搏堅。與生料六味。或加牛膝。或加門冬。服之輒効。但不時舉發。復以六味合生。服用河車熬膏代蜜丸。服而痊。一撤商夏月。過飲燒酒。溺血。或用辰砂益元散。不効。服六味湯亦不効。予用導赤散。三服而愈。有文學宋孝先。年七十餘。溺血。點滴瀉痛。諸藥不効。服生料六味。亦不効云。是壯

醫通卷之五

濁血按

共一思得堂藏

歲。蘇居。絕慾太早之故。或令以菴豆浸淫。搗絞取汁。微溫日服一碗而愈。煮熟即不應也。

下血

血之在身。有陰有陽。陽者順氣而行。循流脈中。調和五藏。活陳六府。如是者。謂之營血也。陰者居於絡脈。專守藏府。滋養神氣。濡潤筋骨。若是藏感內外之邪。傷則循經之陽血。至其傷處。為邪氣所阻。漏泄經外。或居絡之陰血。因著留之邪。辨裂而出。則皆滲入腸胃而泄矣。世俗每見下血。率以腸風名之。不知風乃六淫中之一耳。或有風從腸胃經脈而入客者。或外淫風木之邪。內乘於腸胃者。則可謂之腸風。若其他不因風邪。而腸胃受火熱二淫。與寒熱燥濕。怫鬱其氣。及飲食不節。用力過度。傷其陰絡之血者。亦謂之腸風。可乎。蓋腸風所下之血。清而色鮮。四射如瀉。乃風性使然。素問所謂久風入中。則為腸風。殘泄是也。先與瀉青丸一二劑。後與逍遙散。

醫通卷之五

下血

共一思得堂藏

加酒煮黃連。羌防烏梅。虛人人參。胃風湯最捷。人所不知。若肛門射血如線。或點滴不已者。乃五痔之血。當詳本門治之。血濁而色黯者。為藏毒。蘊積毒氣。久而始見也。宜小烏沉湯。下黑神散。脈實便秘勢盛者。藏連丸。腸風拔淫盡者。下如豆汁。兼紫黑瘀血。此醇酒厚味所釀之淫。由足陽明隨經入胃。淫溢而下也。脈細有寒者。升陽除溼防風湯。脈數有熱者。去二朮加黃連當歸甘草。○腸風下血。以劉寄奴半兩。芽茶一兩。墨灰三錢。為散。分三服。烏梅湯送下。其血立止。後宜多服歸脾湯調理。○腸風下血。其血另作一派。澀出。遠射四散。如飴。腸中作痛。乃陽明氣衝熱毒所作也。人參敗毒散。不應。用升陽除溼和血湯。○宿有血證。因時熱下紫黑血。乃溼毒腸泄。陽明少陽經證也。升陽益胃湯。○下血久而不已。面色萎

醫壙卷之五

下血

廿八

思得堂藏

廿一

醫通卷之五

下血

无

思得堂藏

獨有白腸

蓄血

夫人飲食起居一失其節。皆能使血瘀滯不行也。如者。血蓄上焦。犀角地黃湯。心下手不可近者。血蓄中焦。桃核承氣湯。膈腹下腫大便黑者。血蓄下焦也。抵當湯。九下瘀血湯。及代抵當湯。隨輕重選用。三焦蓄血。俱見左脈。以肝主諸血故也。○登高墜下。重物撞打。筋脈刀傷。胸腹積血不散。以童便同酒煎大黃。隨輕重下之。或香殼散加童便。腰脇滯痛。復元通氣散去牽牛。加枳殼。紫胡牡丹皮。惡血留於腹脇。痛不可忍。復元活血湯。挾血如見紫狀。當歸活絡湯。醉飽入房。竭力傷肝。畜血在胃口者。韭汁童便下。越鞠丸。不應。合平胃散去蒼朮。加桃仁。丹皮相和服。虛人理中。越鞠相和服。在少腹代抵當丸。加熟附子三分。虛者。必加人參。錢許。以助藥力。○身有

醫通卷之五

思得堂藏

寒熱發黃。脈弦細而伏。服補瀉諸藥不應。千金用大黃芒硝歸尾桃仁。人參桂心為散。酒服二方寸匙。藉參桂之力以攻之。○膏梁肥盛。多味痰涎熱。血畜胃中。或兼腸滿。或少腹結痛。朝用清血丸。兼培胃氣。夕用變通抵當丸。專散畜血。方得峻藥緩攻之妙。○虛人雖有瘀血。其脈亦必有一部帶弦。宜兼補以去其血。桃核承氣加人參五錢。分三服緩攻之。可救十之二三。又中氣虛人。胃脘有死血。每食量湯必呃。宜人參雲朮各二兩為末。桃仁一兩。同乾漆炒。去漆細研。蜜丸。彈子大。早晚細嚼一丸。醇酒下。石頑曰。畜血下黑如漆。最為危殆。但下後神氣稍寧。脈無變異。即為可療。若下後神氣昏憤。脈見虛脫。加以厥冷呃逆。多不可救。如鍼工戚文郁。停食感胃後。大便下黑如漆。煩擾不

寧。脈來弦勁而數。此瘀垢未盡。與歸丹。芩桂牛膝。陵理之屬。復下瘀黑升許而癒。○嚴文式泰山。失記積勞發熱。七八日間。亦下黑如漆。兩日後神識稍安。脈來濡弱。知瘀黑已盡。與獨參湯。童便調補而痊。○目科鄒泰甫。怒氣傷肝。嘔逆不食。五六日後下血如漆。脈得弦小而疾。按之則衰。此瘀去而肝氣未平也。沈香降氣散疎之愈。○禮科姜如農。氣竭肝傷。而下瘀血。光亮如漆。三四日連綿不已。神識昏迷。時加微呃。脈求弦大而芤。此正氣告匱。脈隨虛陽鼓激。而見虛大也。雖倉扁復生奚益哉。

醫通卷之五

蓄血

思得堂藏

李士材治張鳴之。吐血兩年。面色痿黃。潮熱欬嗽。膈有微痛。脈數而沉。且搏。其痛不可按。而甚於夜分。是堅血畜積。非大下之不可。又以久病未敢峻攻。用鬱金降真歸地山甲。遂求入參。下血如漆者數次。而痛減。月餘復痛。此病重而藥輕也。乃以大黃乾漆。蓬朮鬱金。山甲肉桂。歸尾桃仁。蟲蟲為丸。每日服參膏之劑。午後服九藥錢許。十日血積大下。數次而安。盧不遑治。來照庵廉憲。乃姪。身體豐碩。傷寒已二十八日。人事不省。不能言語。手足揚擲。腹脹如鼓。而熱烙手。目赤氣盛。齒齙舌黑。參附石膏消黃芩。連服無效。不過服諸名公已言旋矣。診之。脈濁鼓指。用大黃一兩。佐以血藥一劑。下黑臭血一二斗。少蘇。四劑始清。夫治病用藥。譬之飲酒。滄海之量。與之消滴。則喉唇轉燥矣。顧若大軀體。病邪甚深。不十倍其藥。何能克効哉。

諸痛門

諸痛

素問云寒傷形熱傷氣氣傷痛形傷腫故先痛而後腫者氣傷形也先腫而後痛者形傷氣也

寒氣客於脈外則脈寒脈寒則縮蹇縮蹇則脈絀急脈絀急則外引小絡故卒然而痛得氣則痛立止因重中於寒則痛久矣○寒氣客於經脈之中與氣相薄則脈滿滿則痛而不可按也○寒氣留於胃腸之間膜原之下血不得散小絡不可按也○寒氣客於腸胃之間膜原之下血不得散小絡急引故痛按之則血氣散故按之痛止○寒氣客於俠脊之脈則深按之不能及故按之無益也○寒氣客於衝脈衝脈起於關元隨腹直上寒氣客則脈不通脈不通則氣因之故

醫通卷之五

諸痛

思得堂藏

思得堂藏

喘動應手矣○寒氣客於背俞之脈則血脈滯滯則血虛血虛則痛其俞注於心故相引而痛按之則熱氣至熱氣至則痛止矣○寒氣客於厥陰之脈厥陰之脈者絡陰器繫於肝寒氣客於脈中則血滯脈急故脇肋與少腹相引痛矣○厥氣客於陰股寒氣上及少腹血滯在下相引故腹痛引陰股○寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血滯不得注於大經血氣稽留不得行故宿昔而成積矣○寒氣客於五臟厥逆上池陰氣竭陽氣未入故卒然痛死不知入氣復返則生矣○寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也○寒氣客於小腸小腸不得成聚故後泄腹痛矣○熱氣客於小腸腸中痛瘕熱焦渴則聖乾不得出故痛而閉不通矣

岐伯歷舉卒痛一十三條屬熱者止一條餘皆屬寒辨之

之法當知按之痛緩者為純寒痛甚不可按者為寒伏火邪以能閉塞陽氣最甚也

張介賓曰後世治痛之法有曰諸痛屬實痛無補法者有曰通則不痛痛則不通者有曰痛隨利減者互相傳授皆以為不易之定法不知形實病實便閉不通者乃為相宜或形虛脈弱食少便泄者豈容混治觀王荊公解痛利二字曰治法云諸痛為實痛隨利減世俗以利為下也假令痛在表者實也痛在裏者實也痛在血氣者亦實也故在表者汗之則愈在裏者下之則愈在氣血者散之行之則愈豈可以利為下乎宜作通字訓則可此說甚善已得治實之治矣然痛證亦有虛實治法亦有補瀉辨之不可不詳須知痛而脈閉者多實實者不可不詳須知痛而脈閉者多實

醫通卷之五

諸痛

思得堂藏

思得堂藏

愛熱者多虛飽則甚者多實饑則甚者多虛脈實氣虛者多實脈虛氣少者多虛新病年壯者多實久病年衰者多虛補而不効者多實攻而愈劇者多虛痛在經者脈多弦大痛在藏者脈多沉微故表虛而痛者陽不足也非溫經不可裏虛而痛者陰不足也非養營不可上虛而痛者心脾傷也非補中不可下虛而痛者肝腎敗也非溫補命門不可亦泥痛無補法則殺人矣

頭風 雷頭風 眉稜骨痛 眞頭痛
頭重 頭推 頭項強痛 天白蟻

腦者名眞頭痛。

按頭者。天之象。陽之分也。六府清陽之氣。五藏精華之血。皆朝會於高巔。天氣所發。六淫之邪。人氣所變。五賊之運。皆能

犯上而爲災害。或被覆其清明。或墜遏其經隧。與正氣相薄。鬱而成熱。則脈滿而痛。若邪氣稽留。亦脈滿而痛。是皆爲實也。若寒淫所侵。雖正氣衰微。不與相薄而成熱。然邪襲於外。則血凝而脈縮。收引小絡而痛。得溫則痛減。是爲虛也。因風而痛者。抽掣惡風。或汗自出。因暑而痛者。或有汗。或無汗。皆惡熱而耳前與額脹痛。因淫而痛者。頭必重。遇陰天尤甚。因痰飲而痛者。亦昏重而痛。憤憤欲吐。因寒而痛者。絀急惡寒。因氣虛而痛者。遇勞則甚。其脈大。因血虛而痛者。痛連魚尾。善驚惕。其脈扎。或沈數。頭痛自有多因。而古方每用風藥者。蓋高巔之上。惟風可到。味之薄者。陰中之陽。自地升天者也。在風寒淫者。固爲正用。卽虛與熱者。亦假引經耳。薛立齋云。按頭痛除風寒外。多主於痰。痛甚者。乃風毒上攻。

有血虛者。有氣虛者。有諸經氣滯者。有六氣外傷有勞役內傷。有可吐者。有可下者。當分虛實寒熱兼變而治之。痰多加味導痰湯。風毒消風散。血虛芎歸湯。加葱豉全蠍。氣虛六君子加葱豉。氣滯蘇子降氣湯。痰多宜吐者。稀涎散。或梔子豉湯。加葱白。火鬱宜下者。涼膈散。加清酒。痰火俱盛者。滾痰丸。○頭痛諸藥不効。其痛更甚者。此督脈爲病也。宜苴蘇丹。○上熱頭痛目赤。下寒足跖爲甚。大便微秘。旣濟解毒湯。○大寒犯腦。內至骨髓。則頭痛齒亦痛。羌活附子湯。○頭痛乾嘔吐涎沫。吳茱萸湯。○風氣循風府而上。則爲腦風。項背惡寒。腦戶極冷。當歸四逆湯。○因發散太過。頭痛轉劇。小建中加當歸童便。○風火相煽。額與眉稜俱痛。選奇湯。加葱豉。○狗蒙招尤。目瞑耳聾。肝虛風動也。六君子加鈎藤羌防芎歸甘

菊。○頭痛耳鳴。九竅不利。腸胃之所生。或勞役動作則痛。此氣虛火動也。補中益氣加川芎蔓荊子。○胃熱火炎。動作則痛。煩渴引飲。面赤便秘者。川芎茶調散加酒炒芩連。梔子石膏。勢盛脈實者。酒炒大黃末五錢。濃茶調服。○血虛痛連魚尾。四物加入參細辛蔓荊。○有蠱瘡毒發頭痛。願下左右如蚯蚓徐行入耳。頂上起疙落塊。冷則痛甚者。山牛湯不應作結毒治之。○頭與腹俱痛。有五。臭毒頭痛。則與腹俱痛。一味香附煎成放涼服。傷酒傷溼。亦有頭腹俱痛。但傷酒食。則兼嘔逆眩暈。外臺茯苓飲加煨葛根。傷溼則腹隱隱痛。頭重不能舉。羌活勝溼湯外用瓜蒂散搐鼻。有不伏水土。頭腹俱痛者。藿香正氣散有瘡毒入腹。頭與腹俱痛者。黃連解毒湯加臘茶。○有頭痛止則腹痛。腹痛止則頭痛。此屬脾陰血虛。胃

中有火。隨氣輒上軌下而然。尋歸芍藥黃連木香。不應加。尋便香附葱白。

診。寸口脉中手短者曰頭痛。寸口緊急。或短或弦。或浮皆頭痛。浮滑為風痰。易治。短滑為虛。難治。浮弦為風。浮洪為火。沈細或緩為濕。寸弦曰頭痛。寸口脈浮。中風發熱頭痛。頭風。薛立齋云。偏正頭風。久而不愈。乃痰涎風火鬱遏經絡。氣血壅滯。甚則目昏。繫小二便秘滯。宜殺其血。以開鬱解表。逍遙散。偏左加黃芩。葱豉。偏右加石膏。葱豉。鬱甚合越鞠。兼淫瓜蒂散。搐鼻。兼風火而發。選奇湯。加石膏。葱豉。芽茶。夜甚加酒白芍。或川芎茶調散。加細辛。石膏。甘菊。凡怒則太陽作痛者。先用小柴胡。加茯苓。山梔。後用六味丸。常服以滋腎降火。永不復發。凡頭痛必吐清水。不拘冬夏。食薑即

醫通卷之五

頭痛

思得堂藏

止者。此中氣虛寒。六君子加當歸黃耆。木香。炮薑。煩勞則頭痛。此陽虛不能上升。補中益氣加蔓荊子。頭風宜熱藥者多。間有扶熱而不勝熱劑者。消風散。或川芎茶調散。加酒黃芩。輕者只用薑汁。收入陳茶葉內煎服。汗出即愈。此屢驗者。凡風熱頭痛。並宜用之。與選奇湯不殊。頭風多汗。當先風一日則痛甚。至其風日則病少愈者。半夏蒼朮湯。濕熱頭風。遇風即發。選奇湯。加川芎。柴胡。黃連。各清空。不拘偏正並用。偏正頭風作痛。痛連魚尾。常如牽引之狀。發則目不可開。眩暈不能持。辛湯。每服加全蠍五箇。覺上膈有熱。川芎茶調散。加片苓。有痰淫頭痛。其人嘔吐痰多。發作無時。停痰上攻所致。導痰湯加減。或合芎辛湯尤妙。寒痰厥逆頭痛。三因芎辛湯。一切偏正頭風。攻注。屬虛寒者。大追風

散。腎氣厥逆頭痛。四肢逆冷。胸膈痞悶多痰者。玉真丸。有腎臟陽虛之人。素有頭風。發動則挾淫熱上攻。頭面腫脹。項後兩向筋緊作痛。甚則牽引腰脊。其脈虛細而數。千金大

三五七散。并用金匱頭風摩散。慎不可用清熱敗毒等藥。有風痰頭痛。發時面頰青黃暈眩。目不欲開。頻言身體重。兀兀欲吐。此欲成頭風也。二陳湯加膽星。天麻。蠅尾。痰厥頭痛。兩寸脈滑而弦。眼重頭旋。惡心煩亂。吐清水。氣短促。心神不安。語言顛倒。目不敢開。如在風露中。頭疼如裂。身重如山。胸滿嘔逆。四肢厥冷。半夏白朮天麻湯。有肥白氣虛多痰人。卒然頭痛。脈沉細。四肢厥逆。痰響吐涎。星香湯。加生附子。熱厥頭痛。數年不愈。雖當嚴冬。猶喜風寒。其痛便止。暑近溫燥。稍見烟火。其痛便甚。或為灸火。或為熱藥所致。宜選奇湯

醫通卷之五

頭痛

思得堂藏

加川芎。柴胡。黃連。生地。當歸。黃芩。知母。荊芥。芽茶。風熱伏於血分。加以寒邪外鬱。即痛劇熱甚。賢鑑石膏散。淫熱頭痛。脈數而濡。或兩寸脈沈伏而數。身重肢節痛。或四肢面目浮腫。此證多見於酒客。宜散淫解熱。二陳二朮酒芩羌防之類。不已。用透頂散。搐鼻取涎。隨左右搐之。延出即安。丹方治頭風。用蛇蛻炙脆為末。每服一錢。葱豉煎數沸。和滓熱服。不拘偏正皆効。後發漸輕。再發再服。或加蜈蚣末三分。或加全蠍末三分。皆取截風之力也。每發輕者一服。重不過二服也。偏頭風者。其人平素先有淫痰。加以邪風襲之。久而鬱熱為火。總屬少陽厥陰二經。有左痛忽移於右。右痛忽移於左者。風火擊動其痰涎之氣。所以互換也。痛久不已。令人長目。目

者肝之竅。肝風內動。則害空竅也。蓋木邪亢盛。則生風。生火。鼓動胸中之痰積。皆隨火上逆為患耳。先以川芎茶調散吐之。吐訖。可服川芎薄荷等辛涼清上搜風之劑。○偏頭風。亦先風。一日即發。淫痰與火伏頭中。雖夏月常欲包裹。越脾湯加減。淫加油製蒼朮黑豆製川烏。火加薑汁炒山梔。左加酒黃芩。右加薑汁煨石膏。淫熱甚。連目腫者。加酒大黃。有邪風加細辛。川芎防風之類。○婦人頭風。兼白帶甚者。用白蜀葵花七朵。去蒂。川芎當歸各一錢。斷艾八分。水酒各半煎成。乘熱先薰後服。○頭風兼嘔涎者。白檀樹花陰乾焙脆為末。每服三錢。熱酒調服。或用荷葉蒂七枚。生薑七片。陳芽茶一撮。水酒各半煎服。攪汗癢。頭風腦中空痛。用當歸川芎各三錢。黃牛腦子一個。和勻分三次。熱酒送下。盡醉臥醒即愈。○頭

者年歲之數。以水五碗煎至三碗。就沙鍋中以厚紙糊滿。中間錢大一孔。取藥氣薰蒸痛處。每日一次。雖年久者。不過三五次。永不再發。平時置新鮮木瓜於枕邊。取香氣透達。引散肝風。亦良法也。
雷頭風。○頭痛而起核塊者。雷頭風也。或頭中如雷之鳴。為風客所致。清震湯。腫塊宜刺出血。亦有因痰熱生風者。半夏用牙皂薑汁製。取淨一兩。大黃酒浸透紙包煨。再浸再煨。熟極為度。淨二兩。白殭蠶連韌。橘紅桔梗天麻各五錢。片苓七錢。薄荷三錢。硝煨青礬石。白芷炙甘草各一錢。蒸餅丸。萊豆大。歸回茶吞二錢。
眉稜骨痛。○此證多屬陽明風熱。有虛實二途。虛而痛者。見光明即發。選奇湯加歸芍。實則眼不可開。晝靜夜劇。選奇湯加葱豉。風盛加葛根。火盛加石膏。按戴復菴云。二證皆屬於肝火。虛則地黃丸。實則導痰湯。大抵此證。清火散風不應。即當滋陰。若泛用風藥。則火熱上升。其痛愈甚矣。痛久成頭風。發則眉稜骨痛者。選奇湯加川芎白芷荆芥柴胡。
真頭痛。○天門真痛。上引泥丸。且發夕死。夕發旦死。腦為髓海。真氣所聚。卒不受邪。受邪則不可治。古法用黑錫丹。灸百會穴。猛進參附。可救十中之一。然天柱折。手足寒至節。必死不治。
頭重。○淫熱上攻。所以頭重。秋冬春俱宜羌活勝濕湯。夏暑蒼朮白虎湯。并瓜蒂搐鼻。若時行疫癘之時。患頭重者。敗毒散加蒼朮。藥本內傷元氣。頭重氣乏。補中益氣加蒼朮蔓荊子。

頭搖○頭搖有二證。風火相煽。卒然頭搖。項背強痛。少陽經證也。小柴胡去參。加防風。裏實腹痛。不大便而頭搖者。陽明府證也。涼膈散。大柴胡選用。若老人及病後辛苦人。因氣血虛。火犯上而鼓動者。十全大補湯。大建中湯。並加羌活。頭項強痛。邪客於三陽。則痛寒搏則筋急。葛根湯。風搏則筋弛。桂枝湯。加葛根。然多有挾痰。難以回顧者。乃痰客太陽。二陳加酒芩羌活紅花。

天白蟻○頭內如蟲蛀響者。名天白蟻。多屬於火。亦有因痰淫在上者。丹溪云。瘦人皆屬於火。宜薄荷梔子。茯苓甘草細辛。川芎。黃芩。石膏。芽茶之類。肥人皆屬濕痰。半夏茯苓。枳實。黃連。天麻。膽星。蒼朮。黃蘗。芽茶之類。戴復菴云。頭中鳴響。有虛有實。實者用涼膈散。礞石丸下奪之。虛者非獨參保元六

醫通卷之五

頭搖

頭項強痛

聖

思得堂藏

味八味。茸。硃丹。鹿茸丸等藥調補不應也。○丹方用茶子為細末。吹鼻中。蓋響屬火。茶子輕清。行清道。散遏伏之火。故也。凡頭風藥中必用茶引。即此可悟。

程文彬治一婦患頭風。雖盛暑必以帕蒙首。稍見風寒。痛不可忍。百藥不効。蓋因腦受風寒。氣血兩虛。氣不能升。故藥不効。令病人口含冷水。仰臥。以薑汁灌入鼻中。痛立止。與補中益氣加細辛。川芎。蔓荊。白芍。數服而愈。用薑汁滴鼻中。開久鬱之風寒也。若寒淫鬱痛。用獨頭蒜汁滴之。火鬱頭痛。以白菜腋汁滴之。左患滴右鼻。右患滴左鼻。良。李士材治額滲之勞神之後。躁熱甚。頭角掣痛。時作時止。醫禁其食。而解表。四日議攻。裏診之脈不浮緊。安得表邪。又不沉實。安得裏邪。祇手太陰大而無力。為神勞太過。乃

虛煩類傷寒也。先飲糜粥。用大劑歸脾湯而愈。

醫通卷之五

頭風按

聖

思得堂藏

面痛

而為陽明部分而陽維起於諸陽之會皆在於面故面痛皆因於火而有虛實之殊暴痛多實久痛多虛高者抑之鬱者開之血熱者涼之氣虛者補之不可專以苦寒降火為事許學士治鼻頰間痛或麻痺不仁如是數年忽一日連口唇頰車髮際皆痛不能開口言語飲食皆妨在頰與頰上常如糊手觸之則痛此足陽明經絡受風毒傳入經絡血凝滯而不行故有此證或以續命與之不効以犀角升麻湯與之數日愈夫足陽明胃也胃中腥羶五味無所不納其腐熱水穀之毒皆聚於胃故方以犀角為主升麻佐之專解飲食之毒餘皆滌除風熱之藥也○有老人過勞饑則面痛補中益氣加苓桂連翹氣粘黑參○因鬱結積成胃熱遂患面痛越鞠丸

醫通卷之五

面痛

聖思得堂藏

加山施連翹貝母橘紅之類

心痛胃脘痛

心痛 心痛

靈樞云邪在心則心痛善悲時眩仆此言胞絡受邪○手少陰之脈動則病噎乾心痛渴而欲飲此言別絡受邪○厥心痛與背相控善痰如從後觸其心偃俛者腎心痛也○腹脹胸滿心痛尤甚胃心痛也○如以錐鍼刺其心心痛甚者脾心痛也○色蒼蒼者死狀終日不得太息肝心痛也○卧若徒居心痛間動作痛益甚色不變肺心痛也○真心痛手足青至節心痛甚旦發夕死夕發旦死

五藏之滯皆為心痛腎心痛者多由陰火上衝之故胃心痛者多由停滯脾心痛者多由寒逆中焦肝心痛者多由木火之鬱病在血分肺心痛者多由上焦不滑病在氣分若如其在氣則順之在血則行之鬱則開之滯則通之火

醫通卷之五

心痛

聖思得堂藏

多實則或散或清之寒多虛則或溫或補之必真心痛者乃不可治否則但得其本則必隨手而應也

金匱云九痛九治九種心痛○兼治卒中惡腹脹痛口不能言又治連年積冷流注心胸痛并冷衝上氣落馬墜車血疾等皆主之忌口如常法

仲景於胸痺後附此方治九種心痛以其久著之邪不同暴病故藥則加峻而湯改為丸取緩攻不取急瀉也九種心痛乃久客之劇證即腎水乘心脚氣攻心等別名也痛久血瘀陰邪團結故用參附溫氣散邪藥中加生狼牙巴豆吳茱萸驅之使從陰竅而出以其邪據胃中結成堅壘非直搗其巢終不去也後人心痛分為九種曰飲曰食曰氣曰血曰冷曰熱曰悸曰蟲曰疰雖祖此義而實未詳內

經金匱之旨也。

論曰。諸心痛者。皆手少陰厥氣上衝也。有熱厥心痛者。身熱足寒。痛甚則煩躁而吐。額上自汗。其脈洪大。知為熱也。先宜越脾湯汗之。次用金鈴子散清之。有火實心痛者。因受時氣。卒然發痛。大便或秘。久而注悶。心腹高起。按之愈痛。不能飲食。急以涼膈散利之。不應。為食積痰飲留結也。煮黃丸。水煮金花丸。選用。有寒厥心痛者。手足逆而通身冷汗。出或大便利而不渴。氣力微弱。其脈沈細。急以朮附湯溫之。寒厥暴病。非久病也。期發夕死。當急救之。久痛非寒。暴痛非熱。不可不察。○凡言心痛。都屬胃脫。丹溪云。外受寒者。當溫散。內受寒者。當溫利。病久屬鬱。鬱則熱。用山梔為熱藥之嚮導。必佐以生薑汁。多用台芎開之。或二陳加川芎。蒼朮。倍加薑汁炒山

醫通卷之五

心痛胃脫痛

聖

思得堂藏

梔如痛甚者。加炮薑。為從治之法也。○外吸涼風。內傷冷物。寒客於胃。則卒然而痛。二陳加草豆蔻。乾薑。吳茱萸。日久發熱。加薑汁炒川連。山梔。○心腹絞痛如刺。兩脇脹滿。千金高良薑湯。○服實堅。按之心下滿痛者。為實。大柴胡湯。○脈弦數者。是水剋土也。治之以小建中湯。取芍藥味酸。於土中瀉木。如脈沉細。是水來侮土。治以理中湯。取乾薑味辛。於土中瀉水。○大寒客於心胸作痛。則嘔逆不能食。腹中寒氣上衝。痛不可按者。金匱三物大建中湯。上散濁飲寒氣。下安太陰。○寒氣作痛。綿綿不絕。無增無減。尤附湯加草豆蔻。厚朴。○風冷邪氣入乘心絡。或府藏暴感寒氣。上乘於心。卒然心痛。或引背脊。經久不差。崔氏烏頭丸。○凡心痛脈沉而遲者。易治。堅大而實。浮大而長。滑數者難治。○因冷積痰氣而痛者。

醫通卷之五

心痛胃脫痛

聖

思得堂藏

理中湯去人參。加苓半丁。香木香。白豆蔻。或四七湯加木香。肉桂。痛而氣上急者。蘇子降氣湯去前胡。加木香。痰涎壅盛而痛。小半夏茯苓湯加枳實。間進半硫丸。○鬱痰作痛。或因悲怒勞力。酒食而發。發則自下逆衝而上。後必作寒熱。以鬱必從少陽而發。出於外。其脈必數。其熱與痛忽重忽輕。其證多渴而大便秘。治宜清中蠲滯湯。○痰積作痛。脈滑而實。惡心煩滿。時吐酸水。此因氣滯。礙其道。不得運行而作痛。清中湯加香附。蒼朮。南星。滑石。不木香。海石之類。如痰甚者。導痰湯加白螺蛸殼。煨過一錢。○停飲惡心煩悶。時吐黃水。腹中漣漣有聲而痛。胃苓湯。○胸痛短氣者。水氣在臍府也。輕者五苓散。重者用子和法取之。有痰二陳湯加薑汁。○氣鬱脈沉伏。或結或弦。胸中氣壅。攻刺脹痛。沉香降氣散。○中氣虛。按之則痛定。二陳加炮薑。不應。理中湯。病久服耗氣藥太過。脈大或數無力。亦為中氣虛。六君子加炮薑。○心膈大痛。發厥嘔逆。諸藥不納者。趁勢以鷲翎搽吐。痰盡而痛愈。○凡按之痛減者。為虛。宜散。不宜辛散。○心痛屬火。不時舉發者。山梔薑汁炒黑。少加炮薑甘草。一服立止。○平日好飲熱酒。致死血留於胃口作痛。脈必濡或芤。飲下作呃。口中作血腥。氣手枯散。加桔梗。開提其氣。胃氣虛人。不能行其藥力者。加人參二三錢。用相反之味。激其性以搜血也。壯盛者代抵當丸。加乾漆灰。虛弱人。四物湯加桃仁。穿山甲。桂心。蓮朮。赤降香煎服。○卒中惡心痛。用苦參一兩。酢煮頓服。老弱者分二三服。○若脈微欲絕。手足逆冷。肉桂一兩。水煎分三服。○蟲痛。鶴虱一味。為末。蜜丸。蜜湯下。四五十丸。煨酒肉。取有形

澤以入蟲口也。○胃脘痛吐蟲。曾服打積藥不愈。是中氣傷。當調中氣爲上。○蟲痛面有白斑。唇紅能食。或口中沫出。當以祛蟲法治之。○因蛇作痛。痛有休止。令人吐蛇。蛇動故也。用川椒烏梅黃連檳榔煎服。○膈上隱隱作痛。坐不得臥。而吐臭穢痰涎。常作肺癰治之。○膈間腫痛。不能進食。但喜飲水。或咽腫。人迎盛而氣口緊者。當作胃癰治之。

心疝。○腎氣逆上攻痛。必從臍下上升。小便難。此名心疝。生韭汁和五苓散。以茴香煎湯下。或有疝氣衝心而痛者。當於疝門求治。亦有脚氣攻心而痛者。則於脚氣門求治可也。心癰。○因胃口熱。食易消。故瘥。素問謂之食瘥。爲痰火鼓動所致。亦類中消。小半夏茯苓湯加枳實。胃中火蘊而瘥。二陳加川連。或五苓散加辰砂。亦有病瘥。呷薑湯數口。或進乾薑。

醫通卷之五

心疝 心癰

思得堂藏

溫劑而愈。此膈上停寒。中有伏飲。見辛熱則消也。

診。○心脈微急爲痛。短而數心痛。滿則心痛。脈浮大弦長者死。沉細者生。胃脈微滑爲痰飲。滑實爲宿食。沈緊爲冷積。沈瀉爲氣滯。數爲火。浮爲風。弦爲血。忽大忽小者。爲蟲也。

東垣治一妊婦。冬至因慟哭。口吸風寒。忽病心痛不可忍。渾身冷氣欲絕。曰。此乃客寒犯胃。故胃脘當心而痛。急與草豆蔻半夏生薑炙甘草益智仁之類。或曰。半夏有毒。重妊服之可乎。曰。乃有故而用也。岐伯曰。有故無損也。服之遂愈。

滑伯仁治一婦。盛暑洞泄。厥逆惡寒。胃脘當心而痛。引腹引脇。轉爲滯下。嘔噦不食。醫以中暑霍亂治之。益劇。脈三部俱微短。沈弱不應呼吸。曰。此陰寒極矣。不亟溫之。則無

生理內經雖曰用熱遠熱。又曰有假其氣。則無禁也。於是

以薑附溫劑三四劑。間與來復丹。脈稍有力。厥逆漸退。更與薑附七日。諸証悉去。遂以九藥除其滯下而安。江應宿治一人。心脾痛積十年矣。時發則連日呻吟減食。遍試諸方罔効。診之六脈弦數。曰。此火鬱耳。投薑汁炒川連山梔薑從治爲君。川芎香附橘皮枳殼開鬱理氣爲臣。反佐炮薑從治爲使。一服而愈。再與平胃散加薑汁炒川連山梔神麴糊丸。以刈其根。不復舉矣。李士材治張何初。善怒善鬱。且酬應繁劇。胸中痛甚。夜不成寐。醫用薑蒲枳朴木香豆蔻。殊不知此證屬虛。虛則濁陰不降。神氣失守。故痛且寤也。遂以歸脾湯。倍用人參當歸。不十劑而胸次快然安寢。

醫通卷之五

心痛胃脘痛按

思得堂藏

又治宋敬夫心腹大痛。偃僕不能仰。日服行氣和血藥罔効。其脈左滑而急。其氣不能以息。偶一欸攢眉欲絕。爲心疝無疑。以生薑飲粥。取小檳香川棟子青木香廣木香吳茱萸木通延胡索歸身青皮一服而痛減。五日而安。

胸痺

金匱云師曰夫脈當取太過不及陽微陰弦即胸痺而痛所以然者貴其極虛也今陽虛知在上焦所以胸痺心痛者以其陰弦也

陽微在胸中氣分上看故曰陽微知在上焦陰弦在陰脈上看如陰寒之脈上于胸中氣分則為胸痺如陰脈上乘於心則為心痛也

平人無寒熱短氣不足以息者實也

上條是言不及此則言太過也平人蓋言無內因虛勞外因感冒而患短氣不足以息者當是胸中邪氣窒塞腎中陽氣不得上通於胸中故為實也

胸痺之病喘急欬唾胸背痛短氣寸口脈沉而遲關上小緊

醫通卷之五

胸痺

思得堂藏

數栝蒌薤白白酒湯主之

寸口脈沉遲者陽氣衰微也關上小緊者胃以上有陰寒結聚所以胸中喘急欬唾胸背痛而短氣栝蒌性潤專以滌垢膩之痰薤白臭穢用以通穢濁之氣同氣相求也白酒熱穀之液色白上通於胸中使佐藥力上行極而下耳

胸痺不得卧心痛徹背者栝蒌薤白半夏湯主之

心痛徹背者胸中痰垢積滿循脈而溢於背背者胸之府故於前藥但加半夏以祛痰積之痺逆也

胸痺心中痞痛氣結在胸胸滿脇下逆痞心枳實薤白桂枝湯主之入參湯亦主之

痰氣結聚於胸中胸滿溢於經脈故從脇下逆上以搶心也二湯一以治胸中實痰外溢用薤白桂枝以解散之一

以治胸中虛痰內結即用入參理中以清理之一病二治因入素稟而施兩不移易之法也

胸痺胸中氣塞短氣茯苓杏仁甘草湯主之橘皮枳實薑湯亦主之

夫短氣不足以息者實也故二方皆利氣之劑一以疏利肺氣一以疎利胃氣也

痺緩急者薤苳附子散主之

胸中為陽氣所居之位今胸中之陽痺而不舒其經脈所過非緩即急失其常度總由陽氣不運故也用薤苳舒其經脈附子復其胸中之陽則大氣一轉陰濁不留胸際曠然若太空矣

心中痞諸逆心懸痛桂枝生姜枳實湯主之

醫通卷之五

胸痺

聖元

思得堂藏

心中痞者心氣逆於上也上氣逆則中下亦逆氣逆則經脈亦逆故為諸逆也上下氣逆脈不交通心主孤懸於上不得營氣以和之故心懸痛也桂枝行心氣以散痞薑棗疏中焦以通經也

心痛徹背背痛徹心烏頭赤石脂丸主之

心痛徹背背痛徹心乃陰邪厥逆而上于胸背經脈之間牽連痛楚亂其血氣素其疆界此而用氣分之藥則轉益其痛勢必危殆仲景用蜀椒烏頭一派辛辣以溫散其陰邪然恐胸背既亂之氣難安即於溫藥隊中取用乾薑赤脂之瀉以填塞厥氣攻衝之經使痺胸之氣自行於胸背之氣自行於背各不相犯其患乃除今人但知有溫氣補氣行氣散氣諸法不知有填塞邪氣攻衝之實也

千金治胸痺連背痛用細辛散胸中逆氣心痛微背少氣不食用前胡湯胸中悵悵如滿噎塞習習如癢喉中漚燥唾沫服橘皮枳實生薑湯不應用治中湯胸痺腹背閉滿上氣喘息用下氣湯胸背疼痛用熨背散足補金匱之未逮病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦微心中憤憤然無奈者生薑半夏湯主之千金加橘皮吳茱萸名通氣散治胸滿短氣而噎

此即胸痺一門之證必編者之差誤入於嘔吐噦中今併論於此蓋陽受氣於胸中以布氣息今陰乘陽位阻其陽氣亦息呼吸往來之道若喘若噎若噦心含神者也聚飲停痰則炎熾不寧微心憤亂無可奈何故用半夏生薑之辛溫以燥飲散寒則陽得以布氣得以調而胸際始曠也

醫通卷之五

胸痺

平

思得堂藏

其用橘皮吳茱萸及加竹茹人參皆此例也○喻嘉言曰按胸痺之證人所通患金匱出十方論治然未明言其故蓋胸中如太空其陽氣所過如離照當空曠然無外設地氣一上則窒塞有加故知胸痺者陽氣不用陰氣在上之候也然有微甚不同微者但通其上焦不足之陽甚者必驅其下焦厥逆之氣通胸中之陽以薤白白酒或栝蒌半夏桂枝枳實厚朴乾薑白朮人參甘草茯苓杏仁橘皮擇用對證三四味即成一方不祖苦寒不入即清涼蓋屏蓋以陽通陽陰分之藥所以不得預也甚者則用附子烏頭蜀椒大辛熱以驅下焦之陰而復上焦之陽補天浴日在醫之手眼奈何後世總不知胸痺為何病耳

腹痛

小腹痛

腹中窄狹

東垣云腹中諸痛皆由勞役過甚飲食失節中氣受傷寒邪乘虛入客陽氣不通所致故卒然而痛經云得炅則痛立止中脘痛屬太陰理中湯脾腹痛屬少陰真武湯小腹痛屬厥陰當歸四逆湯加吳茱萸若夫熱病腹痛熱則芍藥甘草湯黃芩湯寒則理中湯若脾胃素虛人飲食不能消剋者六君子加香砂若兼外感宿食者藿香正氣散若但少腹硬滿而痛小便利者即是畜血之證桃核承氣湯小便利者即是瀉瀉之證五苓散有心腹大痛欲吐不得吐欲瀉不得瀉是名霍亂急以鹽湯灌之其或清痰留滯於胸膈之間食積鬱結於腸胃之內皆能令人腹痛痰則控涎丹食積枳實導滯丸

醫通卷之五

腹痛

五

思得堂藏

凡治腹痛必用溫散如台芎蒼朮香附之類白芍能治血虛腹痛惟厥陰發熱者為宜其性酸寒收斂無溫散之功若氣虛者服之反傷脾胃也○熱結而痛無增減欲得熱手按及喜熱飲食脈沉遲者寒也理中湯加肉桂香砂○腹痛用溫藥不効痛愈甚大便秘者微利之平胃散加藿香半夏紫蘇木香大黃虛人入參養胃湯○時痛時止熱手按而不減脈洪數者熱也二陳湯加厚朴枳實苓連山梔○腹中水鳴乃火擊動其水也二陳加苓連木香枳實木通虛人六君子加香砂豬苓澤瀉○感暑而痛或瀉利并作服必虛豁十味香薷飲○感濕而痛小便不利大便澀泄胃苓湯○如腹中常有熱而痛此為積熱調胃承氣湯下之○因客寒作痛者服必弦緩小建中加炮薑兼氣鬱脈沉者更加台芎蒼朮香附

○因熱作痛。脈必數疾。二陳湯加苓連芍藥。痛甚稍加炮薑。從治之。若時痛時止。口乾惡心頭眩。或瀉黃沫者。火也。前藥勿用。炮薑加大黃微利之。○脈沉結或伏。必腹痛。痛引兩脇及肩背。皆不得俯仰者。氣滯也。二陳加川芎木香枳殼香附。不應有血也。加蓬朮穿山甲。○七情內結。心腹絞痛。不能飲食。時作時發。發即欲死。七氣湯選用。○酒積作痛。麴蘗丸。○食積作痛。保和丸。○蟲痛者。換機作痛。上下不定。痛有休止。或有塊梗起。痛則嘔吐清水。當從蟲積治之。○因疝致痛者。必引睪丸。或小腹有一條梗起。宜從疝治。○因癰致痛。得熱湯飲轉劇者。是臭毒攻逆也。另詳本門。

小腹滿。小腹滿有三。皆為內有留著。非虛氣也。小腹正中為少陰任衝之分野。兩傍為厥陰肝經之分野。一屬燥結。

醫通卷之五

小腹滿

五三 思得堂藏

大腸。其證五六日大便不通。按之堅滿。繞臍攻痛。小便雖利而黃赤。其脈數實有力。為府邪實結而痛滿。大承氣下之。若因津血枯澀而結者。其脈雖數而不甚旺。麻仁丸通幽湯之類。無故而大便不通。少腹微滿。尺脈雖數。而必微弱者。蜜煎導之。夏月可用猪膽導。慎不可用攻裏之藥。攻之胃氣受傷。必生他患也。一屬熱結膀胱。其證溺閉不通。按之雖滿而不甚堅。彈之有聲。微指其脈數盛有力。而煩渴引飲者。晝甚五苓散。夜劇指苓湯。一屬血結膀胱而腹滿。其證善忘如狂。或渴飲漱水而不能飲。或喜熱飲仍不能多。小便清利。或反倍於平時。或數欠而不消。大抵邪結膀胱。陽分熱邪傷血。雖有畜血。其人真陰不虛。則小便自清。尺脈必盛。代抵當丸。若反倍於常時者。為邪據下焦。真陽外亡之候。本方去硝減黃。倍

桂加熟附六七分救之。若緣醉飽入房。強力忍精。而致少陰與任督受傷。血結陰分者。此真陰虧損。必致小便滴數。脹滿如淋也。生料清生腎氣丸。紅酒煎服。有婦人經行之時。交合受傷。時時不淨。而少腹滿痛者。此衝脈受傷也。十全大補湯倍用肉桂。若有塊絞痛。喜熱按。此氣血虛而有瘀積也。當歸生薑羊肉湯。如肉桂吳茱萸。茯苓芍藥。不應加入參。又有本來下元虛人。勉力勞役。而致受傷。畜血小腹滿痛者。此肝經受傷。其滿必偏見於左傍也。調肝散代抵當丸。審微甚選用可也。然亦有右傍偏滿者。此必飽食奔馳。脾陰下溜。食積痰膩留結也。當於積滯門求之。其臭毒腹痛嘔逆。另詳雜門。診。○陰弦腹痛。細小緊急。皆為腹痛。與滑為痰飲。弦為冷食。陰弦或緊宜溫。沉弦滑實可下。沉伏者為氣滯。細小緊急腹

醫通卷之五

小腹滿

五三 思得堂藏

中刺痛。尺脈緊。臍下痛。弦急。小腹痛。尺脈伏。癥瘕痛。細小而遲者。易治。堅大疾者。數而緊者。浮大而長者。為病不應脈皆難治。痛甚而喘。臍下急。大痛。人中黑者死。腹中窄狹。○肥人乃是淫痰留滯。氣不升降。當行氣燥濕。越麴平胃為主。瘦人乃是陰虛火旺。薰蒸藏府。逍遙佐金降火。開鬱為主。肥人腹中輾轉有聲。須作痰治。二陳二朮為主。氣虛者加入參。當臍痛。○當臍痛為腎虛。任脈為病。六味丸加龜板灰。○傷寒陽脈滿。陰脈弦。法當腹中急痛。此為本虛受寒。小建中湯和之。虞恆德治一壯年。寒月入水網魚。饑甚遇涼。粥食入腹。大痛。二晝夜不止。醫以大黃丸不通。又以承氣下糞水而痛。

愈甚診其六脈沉伏而實面色青黑此大寒證而下焦又有燥屎作痛先與治中湯加丁附二貼又灸氣海二十一壯痛減半繼以巴豆沉香木香作丸如菉豆大生薑湯下五七丸下五七次而愈
又治一人六月投淵取魚至深秋雨涼半夜小腹痛甚大汗脈沉弦細實重取如循刀責責然夫腹痛脈沉弦細實如循刀責責然陰邪固結之象便不當有汗今大汗出此必瘀血留結營氣不能內守而滲泄於外也且弦脈亦肝血受傷之候與大承氣加桂二服微利痛減連日於未申時復堅硬不可近與前藥加桃仁泥下紫血升餘痛止脈雖稍減而責責然猶在又以前藥加川附子下大便四五行有紫黑血如破絮者二升而愈

醫通卷之五

腹痛按

思得堂藏

汪石山治一老婦病腹痛初從右手指冷起漸上至頭如冷水澆灌而腹大痛痛則遍身大熱熱退則痛止或過食或不食皆痛每年發一二次近來二三日一發遠不過三五日用四物四君二陳七氣皆不應汪診之脈皆微弱似有似無或二三至一止或四五至一止乃陽氣大虛也用獨參五錢入陳皮七分煎服十數貼而愈夫四肢者諸陽之本頭者諸陽之會經曰陽虛則惡寒今指稍冷逆上至頭則陽虛陰盛可知陽虛不能健運而痛大作痛作而復熱者物極則反也及其陰陽氣衰兩不相爭則熱歇而痛亦息矣故以獨參湯補之數年之病遂愈

脇痛 李陽春 腹下腫痛

經云肝病者兩脇下痛引小腹令人善怒○肝病內含胸脇○邪在肝則兩脇下痛○肝熱病者脇滿痛○膽動病心脇痛不可反側○肝所生病腋下腫脇痛○肝病傳肝脇痛出食
肝舍於左脇故脇痛多屬於肝然經筋所過挾邪而痛者自有多端不可執一且左右者陰陽之道路故肝主陰血而屬於左脇脾主陽氣而隸於右脇左脇多怒傷或留血作痛右脇多痰積或氣鬱作痛其間七情六鬱之犯飲食勞動之傷皆足以致痰凝氣聚血畜成積雖然痰氣亦有流於左脇者然必與血相持而痛血積亦有傷於右脇者然必因脾氣衰而致其間虛實治法可默悟矣

醫通卷之五

脇痛

思得堂藏

傷寒少陽脇痛用小柴胡湯硬滿加薄桂不大便加枳殼兼胸脇滿痛加枳桔若不因傷寒而脇痛身體微熱枳殼散蓋枳殼為治脇痛專藥諸方皆用之○寒氣引脇下痛枳實理中湯戴復菴云腹內諸般冷痛枳實理中湯加減作無限用○脇痛而氣喘分氣紫蘇飲增損流氣飲選用有脇痛而吐血者此熱傷肝也小柴胡去半夏黃芩加丹皮鱉甲○兩脇腫痛或腹脹或小便澀滯者屬淫熱龍膽瀉肝湯○脈弦痛在左屬肝火宜柴胡山梔當歸青皮芍藥不已加吳茱萸炒川連甚則加酒炒龍膽草○如果肝氣實當歸龍薈丸○因怒傷肝肝氣鬱甚柴胡疎肝散○氣滯作痛兩手脈沉伏或弦痛引胸脇不得使伸屈伸一陳加枳殼香附木香○左脇痛者木氣實也抑青丸火盛者佐金丸從治之有蓄血偏著

左脇而痛者。復元活血湯。○右脇痛。乃悲傷肺氣所致。推氣散加桔梗。或只用川芎枳殼二味作湯服之。○脇下偏痛發熱。其脈弦。此寒也。以溫藥下之。宜金匱大黃附子湯。○兩脇走痛。脈沉弦而滑。乃淫痰流注在脇下。導痰湯加白芥子枳殼香附木香。甚則控涎丹導而下之。○食積寒痰。流於脇下。痛若錐刺。手不可近。諸藥不効者。神保丸。○食積脇痛發寒。熱痛引心下。惡心惡食。必有一條扛起。有脈必滑。二陳加香砂枳朮。麴朮查芽。甚則加吳茱萸製川連。○結積痰癖冷痛。煮黃丸。○氣弱人脇下痛。脈弦細或緊。多從勞役怒氣得之。六君子加木香青歸桂心。○肥白人氣虛發熱而脇痛。用參耆柴胡黃芩枳殼木香之類。甚則加桂。○瘦弱人陰虛寒熱。脇下痛多怒。必有瘀血。宜桃仁紅花柴胡青皮丹皮鱉甲。

醫通卷之五

李膈痛

吳思得堂藏

之類。甚則加大黃。○欬引脇下痛。為水飲停蓄。小青龍湯。脇下硬滿引痛。乾嘔短氣。汗出不惡寒。有時頭痛。心下痞者。十棗湯。○乾欬引脇下痛。發寒熱。為鬱結所致。逍遙散。若脇下有塊痛。乃過飽勞力所致。逍遙散加木香丹皮青皮。○死血作痛。日輕夜重。或午後熱脈短澀。桃核承氣湯。易肉桂加穿山甲鱉甲青皮。不應加熟附子一片。如跌蹠脇痛。亦宜上方。○凡內傷脇痛不止者。生香油一盞。生蜜一杯。和勻服。二次即止。○房勞腎虛之人。胸膈脇肋多隱隱微痛。乃腎虛不能納氣。氣虛不能生血之故。宜補骨脂杜仲牛膝補腎。當歸熟地。及七味丸調理。

李膈痛。○經云。冬脈不及。則令人心懸如病飢。眇中清。脊中痛。少腹滿。小便變。又足少陽之筋。引脇外轉筋。膝不可屈伸。

膈筋急。前引解後引尻。即上舉。季脇痛。按季脇痛。無不因腎虛者。加減八味丸。腎氣丸選用。○腋下腫痛。少陽淫熱留薄。則腋下腫痛。小柴胡加撫芎枳殼。實人去參。加草龍膽。體肥痰盛。加白芥子。有痰飲搏聚而痛者。加味導痰湯。加柴胡為嚮導。○脈弦者。肝氣有餘。兩脇作痛。弦數有力。為肝盛有餘。弦數無力。為肝虛有火。弦小而細。為飲。脈沉為氣。浮弦為風。弦小而弱者。為陽虛。沉細為陰虛。○劉默生治諸葛子立。脇痛連腰脊。不能轉側。服六味丸。加杜仲續斷。不効。或者以為不能轉側。必因閃挫。與推氣散轉劇。劉診之曰。脈得弦細乏力。虛寒可知。與生料八味加茴香。四劑而安。

醫通卷之五

腋下腫痛

吳思得堂藏

腰痛

經云。腰者腎之府。轉搖不能。腎將憊矣。○巨陽虛則頭項腰背痛。此二條言。○膀胱之脈挾脊抵腰。故挾脊痛。腰似折。此

按內經言太陽腰痛者。外感六氣也。言腎經腰痛者。內傷房勞也。假令腎藏真氣布護。六氣焉能為害。惟腎藏虛傷。膀胱之府。安能獨足。又有膏粱之人。久服熱劑。醉以入房。損其真氣。則腎藏熱。腰脊痛。久則髓減骨枯。發為骨痿。此為本病。其有風寒溼熱。閃挫。瘀血滯氣。痰積。皆為標病。而腎虛則其本也。○風痛者。脈浮。或左或右。痛無定處。牽引兩足。小續命加減。○寒痛者。其腰如冰。其脈必緊。得熱則減。得寒則增。乾薑附子湯加肉桂杜仲。外用摩腰膏。兼風寒者。五積散熱服微

醫通卷之五

腰痛

五九 思得堂藏

汗之。○內畜風熱痛者。脈必洪數。口渴便閉。小柴胡去半夏。加羌活續斷黑豆。若大便閉者。先用大柴胡微利之。○溼痛者。如坐水中。腎屬水。久坐水溼。或著雨露。以致腰下冷痛。脈必弦緩。小便自利。飲食如故。天陰頭必重。體必沉重。滲溼湯。腎虛由臥溼地。流入腰脚。偏枯冷痺。重千金獨活寄生湯。兼風溼者。改定三痺湯。如挾寒溼。并用摩腰膏。虛寒甚而挾溼者。尤附湯。挾溼熱者。羌活勝濕湯。合二妙散。腎氣虛寒而受寒溼。腰疼不得立。用燒羊腎主之。此千金法也。○閃挫痛者。跌撲損傷。肝脈搏堅而長。兩尺實。忽然不可俯仰。復元通氣散。不効。必有惡血。復元活血湯。○氣滯而痛。脈沉弦或結。伏。初起烏藥順氣散。不應。八味順氣散。○痰注而痛。脈滑或沉伏。動作便有痰。或一塊作痛。導痰湯加香附烏藥枳殼。脈

實加大黃。○肝氣不條達。睡至黎明。覺則腰痛。頻欲轉側。曉

起則止。宜柴胡疎肝散。或二妙散加柴胡防風。即東垣著朮湯。○腰痛如以帶束引痛。此屬帶脈為病。用辛味橫行。而散帶脈之結。甘味舒緩帶脈之急。調肝散。○腰痛牽引足膝。青蠟丸加款尾最妙。以補腎兼補肝也。○兩腰痠痛。乃熱邪滲入血脈。久閉之故。桃枝承氣多用肉桂。少加熟附行經。但痛者可治。微廣而不痛者。不可治也。○諸般腰痛。皆由腎虛。若兼六淫。須除其邪。如無他證。而腰肢痠弱。隱隱作痛。身體疲倦。脚膝痠軟者。總屬腎虛。然須分寒熱主治。脈細而軟。或虛浮。力怯短氣。小便清利。屬陽虛火衰。腎氣丸加肉苁蓉補骨脂。巴戟鹿茸之類。脈大而軟。或細數。小便黃。屬陰虛火炎。六味丸加龜版當歸杜仲續斷之類。

醫通卷之五

腰痛

五九 思得堂藏

腰痠。○腰痛尚有寒溼傷損之異。腰痠悉屬房勞腎虛。惟有峻補。男子用青蛾丸。或八味丸加補骨脂杜仲。有熱去附子加五味。走精用六味丸。去澤瀉。加鱉膠沙苑蒺藜五味子。大便不實。加肉果補骨脂。山藥粉糊代蜜。婦人用六味加杜仲續斷。有帶。去熟地。加艾附。經候不調。加當歸阿膠。腰軟。○溼氣襲於少陽經絡之中。則為腎著。金匱用甘薑苓朮湯。後世更名為腎著湯。或滲溼湯選用。斷喪太過者。八味丸。腎虛風襲。腰背痠痛。安腎丸。腰膝痛。○寒溼流注於足少陽之經絡。則為腰膝痛。蓋腰乃膽經之所過。因受寒溼。結滯於骨節而痛。滲溼湯去橘紅加肉桂。有痰滯經絡。導痰湯加減。若腎肝伏熱。用薑汁炒黃藥酒防己。少加肉桂。若腰膝連脚膝曉夜疼痛者。腎虛風毒乘

之也。用虎骨散加補骨脂。老人腎虛腰痛連膝痛者。二至丸診。脈大為肝腎陰虛。尺沉為腎藏陽虛。浮緩為虛風。弦細為寒溼。或弦或滑為瘀血。或滑或伏為痰飲。沉弦而緊為寒。沉弦而細為溼。沉弦而實為閃肭。若腎虛及盛怒傷志。則腰失強。不能轉搖者死。

石頭治沈雲步。總常有腰疼帶下之疾。或時勞動。日晡便有微熱。診其兩尺皆弦。而右寸關虛濡少力。此手足太陰氣衰。敷化之令不及也。合用異功散加當歸丹皮。調補胃中營氣。兼杜仲以壯關節。澤瀉以利州都。則腰疼帶下受其益矣。

江蘇總藩張公。嚴冬腰腹疼重。甲夜延石頭診候。脈得沉滑而駛。遂取導痰兼五苓之製。一劑而腹痛止。三啜而腰

痛弛縱自如。未嘗用腰腹痛之藥也。

醫通卷之五

腰膝痛

卒

思得堂藏

脊痛脊強 尻痛

脊者。督脈之經。與膀胱之經。皆取道於脊也。故項脊常熱而痛者。陰虛也。六味丸加鹿茸。常寒而痛者。陽虛也。八味丸加鹿茸。有腎氣攻背。而項筋痛連脊。不可轉移者。此地氣從背而上入也。椒附散。太陽經脊痛項強。腰似折。項似拔。羌活勝溼湯。脈浮緊為傷寒。麻黃湯。沈緩為風溼。五苓散。換著朮桂枝。加羌活。打跌傷損。從高墜下。惡血在太陽經中。腰脊痛不可忍。地龍湯。

尻痛。尻乃足少陰與督脈所過之處。兼屬厥陰。若腎虛者。六味丸加肉桂。不愈。加鹿茸。肥人屬溼痰。二陳合二妙。有因死血作痛者。當歸赤芍。牡丹桃仁。延胡索。生牛膝。穿山甲。肉桂之類。清理之。不應。加地龍生附子。

醫通卷之五

脊痛脊強

尻痛

卒

思得堂藏

肩背痛

經云。背者。胸中之府。背曲肩隨。府將壞矣。○肺病者。喘欬逆氣。肩背痛汗出。○肺盛有餘。則肩背痛。風寒汗出。中風小便數而欠。氣虛則肩背寒。少氣不足以息。潮色變。○邪在腎。則肩背痛。是腎氣上逆也。

東垣云。肩背痛不可回顧。此手太陽氣鬱不行也。以風藥散之。通氣防風湯。若面白脫色。短氣者勿服。宜逍遙散加入參火鬱熱盛。東垣升陽散火湯。形氣虛甚。十全大補湯。○肩背痛。脊強。腰似折。項似拔。此足太陽經氣不行也。羌活勝濕湯。○風寒汗出。中風。肩背痛。小便數而欠者。風熱乘其肺。而肺氣鬱甚也。當瀉風熱。消風散去蠶蟬蛻加枳桔。○寒熱少氣。不足以息。而肩痛。小便遺失者。補中益氣加門冬五味。○

醫通卷之五

肩背痛

思得堂藏

溼熱相搏。肩背沉重而痛。當歸拈痛湯。○當肩背一片冷痛。背脊疼痛。古方用神保丸愈者。此有寒積也。有因寒飲伏結者。近効白朮附子湯。亦有因痰氣留伏者。指迷茯苓丸。○素有痰飲流注。肩背作痛。導痰湯。○有腎氣不循故道。氣逆挾脊而上。致肩背痛。沉香肉桂。茯苓牛膝。茴香川椒青鹽。或觀書對奕久坐。而致脊背痛者。補中益氣加羌防。○肥人喜捷而痛快者。屬痰。宜除溼化痰。兼補脾胃。六君子加木香。○瘦人多。是血少氣虛。宜養血清火。聖愈湯。○背痛須加羌防引經。肥人少佐附子。瘦人須佐苓連丹皮。○有素虛人及病後房勞後。婦人產後。經行後。心膈間痛。或牽引乳脇。或走注肩背痛。宜十全大補隨證加減。

診。寸口脈促上擊者。肩背痛。洪大為熱。浮大為風。沉而滑

者。背脊痛。必有寒飲伏結也。

丹溪治一人。忽患肩脾縫有一線疼起。上循肩至胸前側脇而止。晝夜不眠。其脈弦而數。重按豁大。左大於右。夫脾小腸經也。胸脇膈經也。此因謀事不遂。思慮煩心。心不病而小腸之火乘膈所致。以人參四錢。木通二錢。煎湯下龍薈丸數服而愈。

李士材治愈元清。背心一點痛。久而漸大。服行氣和血藥不効。其脈濡滑。遇天陰痛輒甚。其為濕痰無疑。以胃苓湯加半夏三錢。數劑而痛消。

醫通卷之五

肩背痛

空

思得堂藏

臂痛手痛 手氣

東垣云。臂痛者。有六道經絡。各加引經藥。乃驗。以兩手伸。直垂下。大指居前。小指居後。而定之。臂痛之前。廉痛者。屬陽明。升麻。白芷。乾葛。為引經。後廉痛。屬太陽。羌本。羌活。外廉痛。屬少陽。柴胡。連翹。內廉痛。屬厥陰。紫胡。當歸。內前廉痛。屬太陰。升麻。白芷。葱白。內後廉痛。屬少陰。細辛。當歸。

臂痛為風寒溼所搏。或因飲液流入。或因提挈重物。皆致臂痛。有腫者。有不腫者。除飲證外。其餘諸痛。並宜五積散。獨痺湯。選用。虛人必加入參。以助藥力。○若坐卧為風溼所搏。或睡後手出被外。為寒所襲而痛者。五積散。審知是溼痺經絡。血凝氣滯。作痛。獨痺湯。○挈重傷筋。以致臂痛。宜和氣調血。十全大補湯。○痰飲流入四肢。肩背痠疼。兩臂軟痺。導痰加

醫通卷之五

臂痛 手氣

思得堂藏

木香。片子薑黃。黃蘗。白朮。若作風治誤矣。○中脘留伏痰飲。臂痛。數舉。手足不能轉移。指迷茯苓丸。○丹溪治臂痛。以二陳湯。加酒炒黃芩。蒼朮。羌活。

手痛。○經云。手屈不伸者。其病在筋。意苴仁湯。伸而不屈者。其病在骨。近効白朮附子湯。十味劉散。選用。

手氣。○手腫痛。曰手氣。或指掌連臂膊痛。悉屬風熱挾痰。獨痺湯。○薄桂。味辛。淡。能橫行手臂。引調氣血。藥至痛處。片子薑黃。能引至手臂。惟溼痛最妙。○又有腫痛。時常脫節者。此屬溼痰。倍用蒼朮。乃効。

石頑治禮科姜如農次媳。春初患發熱。頭疼。腹痛。欬逆。無痰。十指皆紫黑而痛。或用發表。順氣不效。延余診之。脈來弦細而數。右大於左。曰。此懷抱不舒。肝火鬱於脾土。而發

熱。熱蒸於肺。故欬。因肺本燥。故無痰。脾受木剋。故腹痛。陽氣不得發越。故頭疼。四支為諸陽之本。陽氣不行。氣凝血滯。故十指疼痛。紫其脈弦者。肝也。數者。火也。細者。火鬱於血分也。遂以加味逍遙散。加桂枝。於土中連木。三劑而諸證霍然。十指亦不疼紫矣。

醫通卷之五

風濕

空

思得堂藏

腿痛 大股痛

腿痛亦屬六經。前廉為陽明。白芷升麻乾葛為引經。後廉太陽。羌活防風。外廉少陽。柴胡羌活。內廉厥陰。青皮吳茱萸。內前廉太陰。蒼朮白芍。內後廉少陰。獨活澤瀉。痛有血虛血寒。寒淫風溼。淫熱流注。陰虛陽虛。腎虛風襲之殊。○血虛者。足不任地。行則振掉。脈細弱。六味丸加巴戟續斷杜仲鹿茸。○血寒者。經息。脈沉。喜湯火。嚴冬尤甚。舒筋三聖散。○淫者。兩腿隱隱痛。或麻骨作腫。身沉重。肢節疼痛。惡風不欲去衣。脈浮濇。或浮細。除風溼羌活湯。脈沉白朮附子湯。肥人導痰湯加減。○淫熱者。痛自腰胯以至足脛。或上或下。或紅或腫。小便赤濇。脈濡大而數。當歸拈痛湯。○流注者。鬱痰留於腰脇有塊。互換作痛。惡心頭眩。脈沉滑或弦。二陳湯加羌活白朮。

醫通卷之五

腿痛

思得堂藏

○陰虛者。肌體羸瘦。足心及脛熱痛。左尺細數。或兩尺數盛。虎潛丸去糯米加肉桂。○陽虛者。兩足浮腫無力。大便瀉。小便短少。痛不能動。左尺虛大。或兩尺浮遲。脾與命門俱虛。先用補中益氣加桂附。後用八味丸。○腎虛風襲則下體痿弱。骨節疼痛。喘欬失精。腰腹腿脛俱痛。尺中浮大而數。安腎丸。○大股痛。○痛而喜按者。肝腎虛寒而淫氣痺著也。四助丸。二方選用。痛不可按者。敗血也。川芎肉桂湯。或舒筋三聖散。酒調服。婦人產後多有此證。宜加穿山甲桃仁。虛人十全大補湯加附子穿山甲。○有淫熱者。痛處必腫。而沉重不能轉側。二妙散加羌活升麻赤草之類。或除淫湯。滲淫湯選用。○寒熱而腫痛者。須防發癰。

膝痛 足跟痛 足心痛

經云。膝者筋之府。屈伸不能。行則僂俯。筋將憊矣。故膝痛無有不因肝腎虛者。虛則風寒淫氣襲之。又曰。身半已下者。皆中之也。故治膝脛之痛。又須以去淫為主。大抵痛在筋者。多挾風熱。則屈不伸而腫。二妙散加羌活升麻。兼陰虛者。則熱而不腫。虎潛丸。或二妙加牛膝肉桂。因臥溼地。流入脚膝。痺弱疼痛。千金獨活寄生湯。夏月淫熱沉重而痛。當歸拈痛湯。痛在骨者。多兼寒飲重而屈伸不利。常若拭不乾狀。附子丸。川芎肉桂湯。活絡丹。鐵彈丸選用。虛寒挾風淫而痛。虎骨四助丸。如肝腎虛熱。筋骨痿弱。顛掉而痛。鹿茸四助丸。若痛在衝陽及肉者。屬足陽明經。痛在委中膕腸者。屬足太陽經。在外廉者。屬少陽。在內廉者。屬三陰。隨其經而取之。

醫通卷之五

膝痛 足跟痛 足心痛

思得堂藏

足跟痛。○腎臟陰虛者。則足脛時熱而足跟痛。六味丸加龜版肉桂。陽虛者。則不能久立。而足跟痛。八味丸。挾淫者。必重者而腫。換骨丹。史國公藥酒。肥人淫痰流注。導痰湯加木瓜。草薢防己。虛人用補中益氣。十全大補湯。並少加附子為引。○凡下部痛。多用藥酒。殊不知病甚於冬者。為寒淫。故宜用酒。若春夏甚而秋冬減者。此屬淫熱。若用藥酒。是反助其淫也。○足心痛。○足心及踝骨熱疼者。為腎虛淫著。命門火不歸經。腎著湯。下八味丸。○肥人多淫痰流注。足心作痛。但久坐臥起則痛甚。行動則緩。宜腎著湯。合二妙散。慎不可用補腎藥及血藥助陰。愈增其劇。○戴人治一人。兩膝腫屈伸有聲。刺然。此筋淫也。淫則筋

急有獨緩者不鳴急者鳴也乃一涌一泄上下去其水水去則自然無聲矣

身體痛

體痛爲一身盡痛傷寒霍亂中暑陰毒淫痺痛痺皆有體痛但者兼證及問因診脈而別之治法分見各門其流連難亡者於此求之○寒而身痛痛處常冷或如淫狀甘草附子湯○內傷勞倦兼風溼相搏一身盡痛補中益氣加羌防藥本蒼朮○淫熱相搏肩背沉重疼痛上熱胸膈不利遍身上下沉重疼痛當歸拈痛湯○風溼相搏一身盡痛陰溼中汗出懶語四肢困倦乏力走注疼痛乃下焦伏火不得泄而躁熱常微汗出而熱不解麻黃復煎湯○身體拘急皆屬虛寒與寒溼風溼小續命證加減○發寒熱而周身作痛胸脇痞悶不舒肝血虛而鬱火用事也逍遙散加羌活桂枝小便不利加山梔丹皮○天暑衣厚則腠理開汗出邪留於分肉之

間聚沫則爲痛六和湯加羌活○遍身皆痛如勞證者十全大補去白朮熟地加羌活附子○下體痛宜分利小便五苓二妙爲主○下體腫痛脈浮自汗惡風者防已黃耆湯溫覆微汗之痛而大便不通者厚朴七物湯微利之○丹溪曰因淫痰濁血流注爲痛若在下焦道路深遠非烏附不能下達少加引經用之若以爲主治非徒無益而反害之也善治者必行氣流溼疎風導滯滋養新血升降陰陽治有先後須分腫與不腫可也○肢節腫痛痛屬火腫屬溼蓋爲風寒所鬱而發動於經絡之中溼熱流注於肢節之間而無已也先宜微汗以散之故羌活桂枝爲肢節痛之要藥○身體疼痛及重者溼也五苓散汗之如風溼相搏一身盡痛加羌防升柴藥本蒼朮風能勝溼故也○痛家不可食厚味與肉大能助

火若食肉厚味痛愈盛者并魚腥燂醬酒醋皆斷去之。丹溪曰環跳穴痛不已防生附骨癰。振地成坑以火燂赤沃以小便赤體坐其上以被圍繞下體使熱蒸騰理開血氣暢則愈。

診○傷寒六脈俱緊為太陽表證身如被杖脈沉緊為陰毒發汗後脈弦遲身體痛為氣血不和一身關節盡痛而脈沉弦為中溼肢體重痛微腫汗出惡風關節不利不可轉側而脈緩為風溼遍身疼痛脈弦小或豁大為氣血虛損。

張氏醫通卷之六

清一

長洲石頭張

碧路玉

登誕先

男

俾飛鳴

再訂

日本

大泉長巷前田安宅子仁

男

典子守

再訂

痿痺門一

痺

經云風寒溼三氣雜至合而為痺。風氣勝者為行痺。寒氣勝者為痛痺。溼氣勝者為著痺。以冬遇此者為骨痺。以春遇此者為筋痺。以夏遇此者為脉痺。以至陰遇此者為肌痺。以秋遇此者為皮痺。

行痺者病處行而不定走注歷節疼痛之類。當散風為主。禦寒利氣仍不可廢。更須參以補血之劑。蓋治風先治血。血行風自滅也。○痛痺者寒氣凝結陽氣不行。故痛有定處。俗名痛風是也。治當散寒為主。疎風燥溼。仍不可缺。更須參以補火之劑。非大辛大溫不能釋其凝寒之害也。○著痺者肢體重著不移。疼痛麻木是也。蓋氣虛則脉血虛。則木。治當利溼為主。祛風解寒。亦不可缺。更須參以理脾補氣之劑。蓋土強自能勝溼。而氣旺自無頑麻也。○骨痺者即寒痺。痛痺也。其證痛苦切心。四肢攣急。關節浮腫。筋痺者即風痺。行痺也。其證遊行不定。與血氣相搏。聚於關節。筋脉弛縱。或赤或腫。○脉痺者即熱痺也。藏府移熱。復遇外邪。客搏經絡。留而不行。其證肌肉熱。皮膚如鼠

走屑口反裂皮膚色變。肌痺者。即著痺。溼痺也。留而不
移。汗出四肢痿弱。皮膚麻木不仁。精神昏塞。皮痺者。即
寒痺也。邪在皮毛。癢疹風瘡。搔之不痛。初起皮中如蟲行
狀。已上諸證。又以所遇之時而命名。非行痺痛痺著痺外
又有皮脈筋肌骨之痺也。

故骨痺不已。復感於邪。內含於腎。筋痺不已。復感於邪。內含
於肝。脈痺不已。復感於邪。內含於心。肌痺不已。復感於邪。內
含於脾。皮痺不已。復感於邪。內含於肺。所謂痺者。各以其時
重感於風寒溼之氣也。肺痺者。煩滿喘而嘔。心痺者。脈不通
煩則心下鼓。暴上氣而喘。噤乾善噦。厥氣上則恐。肝痺者。夜
臥則驚。多飲數小便。上為引如懷。腎痺者。善脹。尻以代踵。脊
以代頭。脾痺者。四肢懈惰。發熱嘔汁。上為大塞。

醫通卷之六

痺

二

思得堂藏

肺痺則肺氣不清。胃熱上逆。故煩喘而嘔。心痺則脈道不
通。心火內衰。溼氣凌心。故恐。肝痺則血液阻滯。水飲客之。
故上為引急。如有所懷也。腎痺則胃之關門不利。故善厥。
濁陰溼邪傷其陽氣。所以脚攣不能伸。身憊不能直也。脾
痺則陽氣不通。故四肢懈惰。上焦痞塞也。

腸痺者。飲食而由不得。中氣喘爭。時發飧泄。

腸者。兼大小腸而言。腸間病痺。則下焦之氣不化。故雖數
飲而小便不得出。則本末受病。故與中氣喘爭。蓋其清濁
不分。故時發飧泄也。

胞痺者。少腹膀胱按之內痛。若沃以湯。漚於小便。上為清涕。
胞者。膀胱之腑也。膀胱氣閉。則水道不行。故按之內痛。若
以熱湯沃之。小便得外熱之助。方得稍通。而猶滯澀不利。

則治宜溫助氣化。可知膀胱之脈從巔入絡。故上為清
涕。以太陽經氣不固。而精氣上脫。又須溫補無疑。蓋緣精
泄之後。寒氣乘虛入於膀胱之內。而致小便淋瀝不通。並
中痛引穀道。甚則臍腹脹痛。此屬津液枯竭之故。誤與利
水藥。必致喘逆腹急而死。老人陰虛泉竭。多有此證。曾見
膀胱脹破。淋瀝無度。時雖暫寬。不久即斃。

諸痺不已。亦溢內也。其風氣勝者。其人易已也。其入藏者死。
其留連筋骨間者。疼久。其留皮膚間者。易已。凡痺之類。逢寒
則急。逢熱則縱。

寒從中生者。是人多痺氣也。陽氣少。陰氣多。故身寒如從水
中出。

人有身寒。湯火不能熱。厚衣不能溫。然不能凍慄。是人素腎

醫通卷之六

痺

三

思得堂藏

氣勝。以水為事。太陽氣衰。腎脂枯不長。一水不能勝兩火。腎
者水也。而生於骨。腎不生。則髓不能滿。故寒甚至骨也。所以
不能凍慄者。肝一陽也。心二陽也。腎孤藏也。一水不能勝二
火。故不能凍慄。病名骨痺。是人當變節也。

素腎氣勝。言寒氣本充也。以水為事。言嗜慾無節。傷其真
陽。無陽則陰無以生。故腎脂枯不長。無陰則陽無以化。故
寒甚至骨也。

病在陽者。命曰風。病在陰者。命曰痺。陰陽俱病。命曰風痺。

陽受風氣。故在陽者。命曰風。陰受濕氣。故入陰。則命曰痺。

風痺淫澀。病不可已者。足如履冰。時如入湯中。股脛淫澀。煩
心頭痛。時嘔時眩。則眩已汗出久。則目眩。悲以喜恐。短氣不
樂。不出三年死也。

寒痺之爲病也。留而不去。時痛而皮膚不仁。刺布衣者。以火
燎之。刺大人者。以藥熨之。以醇酒二十觔。蜀椒一升。乾薑一
觔。桂心一觔。凡四種。皆咬咀。漬酒中。用綿絮一觔。細布四丈。
并內酒中。置酒馬矢煨中。蓋封塗。勿使泄。五日五夜。出布絮。
曝乾之。乾復漬。以盡其汁。每漬必晬其日。乃出乾。乾并用漬。
與綿絮複布爲復巾。長六七尺。爲六七巾。則用之。生桑炭炙
巾。以熨寒痺所刺之處。令熱入。至於病所。寒復炙巾以熨之。
三十遍而止。汗出。以巾拭身。亦三十遍止。起步內中。無見風。
每刺必熨。如此病已矣。此所謂內熱也。

內納同。謂溫其經。使熱氣內入。血脈流通也。布衣血氣滯
濁。故當以火燎之。卽近世鍼挑艾熨之類。

周痺者。在於血脈之中。隨脈以上。隨脈以下。不能左右。各當
醫通卷之六

痺

思得堂藏

其所。風寒淫氣客於分肉之間。迫切而爲沫。沫得寒則聚。
聚則排分肉而分裂也。分裂則痛。痛則神歸之。神歸之則熱。
熱則痛解。痛解則脈厥。厥則他痺發。發則如是。此內不在藏。而
外未發於皮。獨居分肉之間。真氣不能周。故命曰周痺。
金匱云。問曰。血痺病。從何得之。卽曰。夫尊榮人。骨弱肌膚盛。
重因疲勞。汗出。時不時動搖。加被微風。遂得之。但以脈自微。
滿在寸口。關上小緊。宜鍼引陽氣。令脈和。緊去則愈。
血痺。陰陽俱微。寸口關上微。尺中小緊。外證身體不仁。如風
痺狀。黃耆桂枝五物湯主之。

血痺者。寒淫之邪。痺著於血分也。辛苦勞勩之人。皮膚皴
密。筋骨堅強。雖有風寒濕邪。莫之能客。惟尊榮奉養之人。
肌肉豐滿。筋骨柔脆。素常不勝疲勞。行卧動搖。或遇微風。

則能痺著爲患。不必風寒淫之氣雜至而爲病也。上條言
脈自微滿。而關寸小緊。爲濕痺血分。所以陽氣不能外行。
故宜鍼引陽氣。以和陰血。下條言陰陽俱微。而尺中小緊。
爲營衛俱虛。所以身體不仁。故宜藥通營衛。行散其痺。則
緊去人安而愈矣。夫血痺者。卽內經所謂在脈則血凝。
不流。仲景直發其所以不流之故。言血既痺。脈自微滿。然
或寸或關或尺。其脈見小急之處。卽風入之處也。故其鍼
藥所施。皆引風外出之法也。

賢者之病。其人身體重。腰中冷。如坐水中。形如水狀。反不渴。
小便自利。飲食如故。病屬下焦。身勞汗出。衣裏冷溼。久久得
之。腰以下冷痛。腹重如帶五千錢。甘薑苓朮湯主之。

此證乃淫邪中腎之外。與腎藏無預也。雖腰中冷。如坐
水中。實非腎藏之真氣冷也。今邪著下焦。飲食如故。不渴。
小便自利。且與腸胃之府無預。况腎藏乎。此不過身勞汗
出。衣裏冷溼。久久得之。但用甘草乾薑茯苓白朮。甘溫淡
滲行濕足矣。又何取暖腎壯陽哉。

諸肢節疼痛。身體羸瘦。脚腫如脫。頭眩短氣。溫溫欲吐。桂枝
芍藥知母湯主之。

此卽總治三焦痺之法。頭眩短氣。上焦痺也。溫溫欲吐。中
焦痺也。脚腫如脫。下焦痺也。肢節疼痛。身體羸瘦。筋骨痺
也。由是觀之。當是風寒濕淫。痺其營衛。筋骨三焦之病。然淫
多則腫。寒多則痛。風多則動。用桂枝治風。麻黃治寒。白朮
治濕。防風佐桂枝。附子佐麻黃。白朮其芍藥生薑甘草。亦
知桂枝湯之和其營衛也。知母治脚腫。引諸藥下行。附子

醫通卷之六

痺

思得堂藏

以行藥勢。開痺之大劑也。

藏人云。痺病以濕熱為源。風寒為兼。三氣合而為痺。其脉沉清。奈何治此者。不問經絡。不分藏府。不分表裏。便作寒溼脾氣。烏之附之。乳之沒之。種種燥熱攻之。中脫灸之。膝下燒之。三里火之。蒸之灸之。湯之炕之。以致便溺滯滯。前後俱閉。虛躁轉甚。肌膚日削。飲食不下。雖遇扁華。亦難措手。若此者何哉。胸膈間有寒痰故也。痺病本不死。死於醫之誤也。

景岳全書云。觀痺論曰。風寒溼三氣雜至。合而為痺。而善天剛柔論又曰。在陽者。命曰風。在陰者。命曰痺。何也。蓋三氣之合。乃專言痺證之所因也。曰在陽為風。在陰為痺。又分言表裏之有殊也。如風之與痺。本皆由感邪所致。但外有表證之見。而見發熱頭疼等證。或得汗即解者。是皆有形之謂。此亦

醫通卷之六

痺

六 思得堂藏

陽邪在陽分。是即傷寒中風之屬也。故病在陽者。命曰風。若既受寒邪。而初無發熱頭疼。又無變證。或有汗。或無汗。而筋骨之痛如故。及延綿久不能愈。而外無表證之見者。是皆無形之謂。此以陰邪直走陰分。即諸痺之屬也。故病在陰者。命曰痺。其或既有表證。而疼痛又不能愈。此即半表半裏。陰陽俱病之證。故陰陽俱病者。命曰風痺。此所以風病在陽。而痺病在陰也。然則諸痺者。皆在陰分。亦總由真陰衰弱。精血虧損。故三氣得以乘之。而為此諸證。經曰。邪入於陰則痺。正謂此也。是以治痺之法。最宜峻補真陰。使血氣流行。則寒邪隨去。若過用風溼寒滯等藥。而再傷陰氣。必反增其病矣。行痺者。走注無定。風之用也。經言。病在陽者。命曰風。在陰者。命曰痺。陰陽俱病。命曰風痺。越脾加木。附湯。輕則羌防。歸凡

葛桂赤枝。甘草威靈仙。若木黃蘗。若病久大虛。非大補氣血不可。如日從事。手散風清火。則脾肺必敗。終致不起。○痛痺者。痛有定處。乃溼氣傷腎。腎不生肝。肝風挾溼。流走四肢。肩

筋疼痛。拘急浮腫。全匱烏頭湯加羌活官桂。服後發熱稀劑。助其作汗。乃解。身體痛如欲折。肉如錐刺。刀割。千金附子湯。○若痺者。痺著不仁。經曰。營氣虛則不仁。衛氣虛則不用。營衛俱虛。則不仁且不用。靈樞云。衛氣不行。則為麻木。東垣治麻木。必補衛氣而行之。澤身麻木不仁。或左或右。半身麻木。或面或頭。或手臂或脚腿。麻木不仁。並宜神效黃耆湯。皮膚間麻木。此肺氣不行也。本方去蔓荆倍黃耆。加防風。如肌肉麻。營氣不行也。去蔓荆加桂枝。羌防。手足麻痺。臂痛不能舉。多眠昏冒者。支飲也。氣口脉滑。指迷茯苓丸。脉浮者。二陳湯

醫通卷之六

痺

七 思得堂藏

加桂枝枳桔。○若手麻乃是氣虛。十指麻乃是溼痰死血。手指麻木是氣不行。有頑痰死血也。導痰湯加烏藥蒼朮。○風吹手足痠疼而腫。是寒溼。桂枝附子湯。○因於風者。百節走痛。烏藥順氣散加羌活南星蒼朮。○因於濕者。天陰即發。身體沉重痠疼。除濕獨活湯。在上痛者。加桂枝枳桔。在下痛者。加防己木通。多汗加黃耆防風。自汗身重。防己黃耆湯。○寒濕不可屈伸者。烏頭湯。治絡丹選用。并外用厚風膏。○因火者。五苓散加酒芍黃蘗竹瀝薑汁。○因溼熱者。肢節疼痛。肩背沉重。胸膈不利。下注足脛痛腫。當歸拈痛湯。○熱毒流入肢節疼痛。患處必熱。千金犀角散。○血瘀者。芍歸桃仁紅花風靈仙煎成人麝少許。○血痺者。邪入於陰也。經云。人卧則血歸於肝。汗出而風吹之。血凝於膚者。為痺是也。黃耆桂枝

五物湯。晝輕夜重。加當歸。痺而身寒。如從水中出者。屬寒。溼附子丸。血氣凝滯。手足拘攣。痿重。風寒溼三氣雜至者。改定三痺湯。周痺者。其氣不能周於身。故周身痺痛。用獨活湯。行痺上半身甚。用烏藥順氣散。下半身甚。用虎骨散。痛痺用烏頭湯。著痺用除濕獨活湯。不應。用補中益氣加熟附子。羌活若木黃藥。有痺。通身走痛。無定。二陳湯加羌活。風化。薑汁糊丸服。痺在骨。安腎丸。痺在筋。養羊角散。痺在脈。人參丸。痺在肌肉。神効黃耆湯。痺在皮。越婢湯。加羌活細辛白茯苓。痺在腸。吳茱萸散。痺在胞。腎瀝湯。虛寒。茯苓丸。虛寒甚者。已戟丸。熱痺。千金犀角散。冷痺。已戟天湯。寒痺。宜以蜀椒乾薑桂心各四兩。醇酒五觔。煮四兩布五尺。馬矢火煨一伏時。將絮布裹乾收盡。炙熱敷之。

○若痺不移。肌肉破。身熱。脈滑者。不治。

凡治痺證。不明其理。以風門諸通套藥施之者。醫之過也。夫痺證。非不有風。然風入在陰分。與寒溼互結。擾亂其血脈。致身中之陽。不通於陰。故致痺也。古方多有用麻黃白芷者。以麻黃能通陽氣。白芷能行營衛。然已入在四物四君子等藥之內。非顯發表明矣。至於攻裏之法。則從無有用之者。以攻裏之藥。皆屬苦寒。用之。則陽愈不通。其痺轉入諸府。而成死證多矣。可無明辯而深戒歟。

診。脈大而滑為痺。脈急亦為痺。肺脈微為肺痺。心脈微為心痺。右寸沉而遲。滑為皮痺。左寸結而不流。刺為血痺。右關脈舉按皆無力。而滑為肉痺。左關弦緊而浮沉有力。為筋痺。

痛風 歷節

蓋楓云。賊風邪氣之傷人也。令人病焉。今有不離屏蔽。不出室穴之中。卒然病者。不離賊風邪氣。其故何也。曰。此皆嘗有所傷於濕氣。藏於血脈之中。分肉之間。久留而不去。若有所隱匿。惡血在內。而不去。卒然喜怒不節。飲食不節。寒溫不時。腠理閉而不通。其開而遇風寒。則血氣凝結。與故邪相襲。則為寒痺。其有熱則汗出。汗出則受風。雖不遇賊風邪氣。必有因加而發焉。其母所遇邪氣。又母怵惕之所志。卒然而病者。其故何也。惟有所因。鬼神之事乎。曰。此亦有故邪留而未發。因而志有所惡。及有所慕。血氣內亂。兩氣相搏。其所從來者微。視之不見。聽而不聞。故似鬼神。

為肝。汗出入水中。如水傷心。歷節黃汗出。故曰歷節。盛人脈滑小。短氣。血汗出。歷節疼。不可屈伸。此皆飲酒汗出。當風所致。病歷節。不可屈伸。疼痛。烏頭湯主之。并治脚氣疼痛。不可屈伸。

烏頭湯治歷節。不可屈伸。疼痛。復治脚氣疼痛。不可屈伸。二者之病。皆是風寒傷於筋。麻黃開汗孔。通腠理。散寒邪。解風痺。芍藥以理血。甘草通經脈。以和藥。黃耆益衛氣。氣壯則邪退。烏頭善走。入肝逐風寒。故筋脈之惡者。必以烏頭治之。然以蜜煎。取緩其性。使之留連筋骨。以利其屈伸。且蜜之潤。又可益血。養筋。兼制烏頭燥熱之毒。丹溪云。痛風者。大率因血受熱。已自沸騰。其後或涉冷水。或

立淫地或扇取京或卧當風寒外料熱血得風寒汗漏凝滯所以作痛夜則痛甚行於陰也治法以辛熱之劑流散寒淫開發腠理其血得行與氣相和其病自安然有數種治法稍異痛風而痛有常處其痛上赤腫灼熱或澤身壯熱此致風風毒宜敗毒散如肢節痛須用羌活去風淫亦宜用之肥人肢節痛多是風淫寒飲流注宜導痰湯瘦人肢節痛是血枯宜四物加羌活老人性急作勞患兩腿痛動則痛甚或血病用滑藥惡血流入經絡隧道而變痛風並宜四物加桃仁陳皮牛膝生甘草煎入生薑研滑行散有痰積者加酒熱服并刺委中出血然非二三十貼不効○壯年人性躁兼嗜厚味思痛風變痛此扶痰與氣證導痰湯加牛膝枳殼通草羌仁煎入生薑研滑行散熱服亦須多服乃効○按濕熱衰火死

血鬱於經絡四肢麻痺或痛或癢經而新者可以緩治久而重者必加烏附驅逐痰淫壯氣行經大便阻滯必用大黃味者畏其峻攻多致狐疑不知邪毒流滯經絡非烏附豈能散結燥熱結滯腸胃非礞黃豈能潤燥要在合宜耳

歷節○景岳全書曰歷節風痛以其痛無定所即行痺之屬也病源云歷節風痛是氣血本虛或因飲食腠理開汗出當風所致或因勞倦調護不謹以致三氣之邪循歷關節與氣血相搏而疼痛非常或如虎之咬故又有白虎歷節之名中藏經曰歷節疼痛者因陰犯陽而得之此其槩也大都痛痺之證多有晝輕而夜重者正陰邪之在陰分也其有遇風雨陰晦而甚者此正陰邪侮陽之證也或得暖遇熱而甚者此

筋脉拘攣伸縮不利者此血虛血燥證也非養血養氣不可通身骨節疼痛肢節如刺晝靜夜劇如虎醫之狀乃痛風之甚者也必飲酒當風汗出入水遂成斯疾寒則君公當歸湯千金大黃湯防已湯選用熱則千金犀角湯當歸拈痛湯加薑汁炒黃藥製者為寒服者為濕汗者為風三氣雜至傷於血脉之中膏肓滯滯不行故痛用虎骨犀角沉香青木香當歸羌活桂枝秦艽牛膝骨碎補桃仁甘草水煎入麝少許○歷節風毒攻注骨節疼痛發作不定為藥順氣散不愈五積散四肢歷節疼其人短氣脉沉為留飲導痰湯加減○身腫腫痛一味木通用二兩煎服身必發出紅丹汗出至足頃時即愈外治之法以新艾所許先以一半焙乾攤痛處外鋪燈心草一層以指甲在痛傍不時撲之冷則更遞焙用三次少

歌又頃如前再用自四五度効不可撫摩撫摩則七竅閉鬱也○又法好陳醋五大碗煎沸入葱白一朶將葱裏痛處熨之者即麻木也

石頭曰按痛風一證蓋樞謂之賊風素問謂之痺金匱名曰歷節後世更名白虎歷節多山風寒淫氣乘虛襲於經絡氣血凝滯所致近世邪說盛行而名之曰諸風風毒腫脹乃謂之曰箭袋禁絕一切湯藥悉行艾熨鍼挑此雖蓋樞刺布衣之法而藥熨之方世絕不聞使既病之肌肉復受無辜之痛楚奈何憤憤無知甘受其惑良可慨夫

麻木與痺證卷首

營衛滯而不行則麻木如坐久倚者壓住一處麻不能舉。理可見矣。麻則屬痰屬虛。水則全屬溼痰死血。一塊不知痛癢。若木然者是也。○脉沉滑。體厚人屬痰與溼。二術二陳。先少佐羌獨桂枝等風藥一二味。次兼參耆補氣。○脉微弱。或弦大無力。病久體羸者。屬氣虛。補中益氣加熟附子一片。夏月對生脉散。或消燥湯。○一塊不知痛癢。陰寒益甚。或日輕夜重。脉澹而芤。或弦。屬痰挾死血。宜活血行氣。二陳加芎歸桃仁泥。紅花牛膝韭汁之類。大便見黑而不作瀉者。小劑桃枝承氣湯微利之。○十指麻木。屬胃中溼痰死血。二陳加二朮桃仁紅花。少加附子行經。○溼熱下流。兩脚麻木。或如火燎者。二妙加牛膝作丸。不應。少加肉桂。東垣治閉眼則渾身麻木。

醫通卷之六

麻木

上

思得堂藏

開眼則漸退。久而方止。晝減夜甚。為陽氣衰而溼伏陰分也。三痺湯去烏頭加蒼朮黃藥。又合眼則麻。開眼即不麻。近火則頭眩眩暈者。風氣下陷於血分。不得升越而作也。三痺湯去烏頭加羌活麻黃。凡婦人素有鬱悒者。當舒鬱。逍遙散加補氣行溼藥。

薛立齋治劉孟春有痰。兩臂作麻。兩目流淚。服祛風化痰藥。痰愈甚。臂反痛不能伸。手指俱攣。薛曰。麻屬氣虛。因前藥而復傷肝。火盛而筋攣耳。况風自火出。當補脾肺滋水。則風自退。痰自消。遂用六味丸。補中益氣湯。三月而愈。石頑治洋客巴慈明婦。產後眩暈心悸。神竟離散。若失藏府之狀。閉眼則通體麻木。如在雲霧之中。必緊閉其目。似覺稍可。晝日煩躁。夜則安靜。專車女科者。用四物等血藥。

則嘔逆不食。更一醫用薑附等熱藥。則躁擾不寧。其脉虛大而數。按之則散。舉之應指。此心火浮散之象。因艱產受驚。痰飲乘虛。襲入心包絡中。留伏膈上。有人無出。所以綿延不已。蓋目閉則諸數皆閉。痰火潛伏不行。故得稍安。與東垣所主。目閉則諸數俱閉。痰火潛伏不行。故得稍安。與東垣所言。合眼則陽氣不行之麻木迥殊。况晝甚夜輕。明是上焦陽位之病。與理痰清火之劑。諸證漸寧。然或因驚患。或因飲食不時舉發。此伏匿膈上之痰。無從搜滌也。乘發時。用獨參湯下紫雪。開通膈膜。仍與前藥調補半載而康。

醫通卷之六

麻木

上

思得堂藏

痿 諸厥

素問云肺熱葉焦則皮毛虛弱急薄者則生痿也心氣熱則下脈厥而上上則下脈虛虛則生痿痿者折挈筋縱而不任地也肝氣熱則筋弛口苦筋脈乾筋脈乾則筋急而發為筋痿脾氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發為肉痿腎氣熱則腰脊不舉骨枯而髓減發為骨痿

戴人云痿之為狀兩足痿弱不能行皆由腎水不能勝心火心火上燥肺金肺受火制六葉皆焦皮毛虛弱急而薄者則生痿躄躄者足不能伸而行步危然也腎乃肺金之子今腎水衰少則火上炎腎水既衰則骨體衰竭由使內太過所致直斷曰痿病無寒故痿之作也五六月皆其時也故病痿之人其脈浮軟今之行藥者凡見脚膝痿弱難於行步或一

醫通卷之六

痿

思得堂藏

足不伸便作寒淫脚氣治之驟用烏附乳沒威靈仙之類燂鐵艾火湯蒸袋蒸痿弱轉加如此而死豈非天乎夫治痿與治痺頗異風寒濕痺獨可蒸湯灸燂時或一効惟痿用之轉甚者何也蓋痿以肺熱葉焦而成以此傳於五臟豈有寒者歟若痿作寒治是殺之也夫痿病不死死者皆藥之誤也石頑曰痿證藏府病因雖曰不一大都起於陽明濕熱內蘊不清則肺受熱乘而日精脾受淫淫而日溢遂成上枯下淫之候舉世靡不以腎虛為事陽明淫熱從無齒及之者或云痿病既屬濕熱何古方多用附子辛熱而愈者殊不知淫熱沉滯既久非借辛熱之力不能開通經路原為腎臟虛寒而設若真陽未衰藥行溫補而不知清熱滋陰反助淫熱之患耶

醫通卷之六

痿

思得堂藏

凡人自覺兩足熱如火炙自足踝下上衝膝腿且痿弱軟痛能行而不能久立脈濡而數乃陰虛而扶濕熱也虎潛丸不應少加附子骨痿不能起於牀者金剛丸經言骨痿者生於大熱也有所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣內伐內伐則熱令於腎腎者水藏也今水不勝火則骨枯而水虛足不任身發為骨痿此淫熱成痿多發於夏令人骨乏無力故治痿獨取陽明東垣獨得其秘而用清燥之劑主以清暑益氣湯風濕痺者手足軟弱脈沉滑兼腰膝麻木或腫二陳湯加二朮羌活黃蘗竹瀝薑汁黑瘦人脈濡弱或左脈大而無力行步艱難或兼盜汗陰虛等證者是血虛有火四物加牛膝肉桂黃蘗者木陰血衰弱不能養筋筋澁不能自收持故痿弱無力補血榮筋丸氣虛痿弱無力四君子加蒼朮黃蘗肉桂黃耆肥白人脈沉緩或滑惡心腎隔不利屬氣虛有痰六君子加蒼朮黃蘗竹瀝薑汁兼食積即氣口弦滑腹脹惡食是食積妨礙脾氣不得運於四肢導痰湯加蒼朮木瓜防己挾死血者脈沉澀或弦而按之則芤為惡血流於腰膝或因產後或跌撲傷損而得者不可作虛治痿厥足痿弱不收為痿厥有二一屬腎與膀胱經云恐懼不解則傷精精傷則骨痿痿厥精時自下是腎傷精脫也都然丸審係陽虛用八味丸又云三陽為病發寒熱下為癰腫及為痿厥癰腫是膀胱在下發病也五苓散一屬脾淫傷胃經云凡治痿厥發逆肥貴人膏梁之疾也腎者易加草解又云秋傷於濕上逆而發發為痿厥小青龍湯去麻黃加羌活○腎虛之人六七月之間淫令大行淫熱相合痿厥之病大

作脉沉濡而數。小水赤澀。或作腫痛。腰以下痿軟不能動。行走不正。兩足軟弱。消燥。伸不能屈。屈不能伸。腰膝腿脚腫痛。行步艱難。安腎丸。目中流火。視物昏花。耳鳴耳聾。困倦乏力。寢汗怕風。行步不正。兩脚軟弱。臥而多驚。腰膝無力。膝以下消瘦。加味虎潛丸。凡老人痿厥。累用虎潛丸不愈。即於本方加附子立愈。蓋附子有反佐之力也。○又有脚膝痿弱。下尻骨皆冷。陰汗腥臭。精滑不固。脉沉數有力。此爲腎氣厚味所致。火鬱於內。逼陽向外。即陽盛拒陰。滋腎丸苦寒下之。肥盛者黑人。足膝痿痺。皆屬溼熱。帶行散。二妙散。誤用溫補必殆。

子和云。風痺痿厥四證。本自不同。而近世不能爲辨。一槩作風冷治之。下虛補之。此所以曠日彌年而不愈者也。夫四末

醫通卷之六

痿厥

大思得堂藏

之疾。動而或動者爲風。不仁或痛者爲痺。弱而不用者爲痿。逆而寒熱者爲厥。其狀未嘗同也。故其本源又復大異。風者必風熱相兼。痺者必風寒溼相合。痿者必火乘金。厥者或寒或熱。皆從下起。今治之者。不察其源。見於手足。輒曳便謂之風。左傳雖謂風淫末疾。不知風暑燥溼火寒六氣。皆能爲四末之疾也。

祝仲寧治一人。病腰膝疼痛。皆以爲寒。率用烏附蛇酒藥。盛暑猶著綿。如是者三載。祝診之。曰。此溼熱相搏而成。經所謂諸痿生於肺熱也。即令視其綿。與清燥湯飲之。曰。疾已深。又爲熱藥。誤非百貼不効。服三月餘而痊。李士材治兵尊高玄圃患兩足痿軟。神氣不足。向服安神壯骨之藥。不効。改服滋腎牛膝薏苡二妙散之屬。又不効。

純用血藥。脾胃不實。診之脉皆冲和。按之亦不甚虛。惟脾部重取之澀而無力。此土虛下陷。不能制水。則溼氣墜於下焦。故膝脛爲患耳。進補中益氣倍用升柴。數日即愈。夫脾虛下陷之證。若誤用牛膝等下行之劑。則愈陷。此前藥之所以無功也。

醫通卷之六

痿厥

七

思得堂藏

百合

金匱云。論曰。百合病者。百脉一宗。悉致其病也。意欲食。復不能食。常默默。欲卧不能卧。欲行不能行。飲食或有美時。或有不欲聞食臭時。如寒無寒。如熱無熱。口苦。小便赤。諸藥不能治。得藥則劇。吐利。如有神靈者。身形如和。其脉微數。每溺時。頭痛者。六十日乃愈。若溺時頭不痛。漸然者。四十日愈。若溺時快然。但頭眩者。二十日愈。其證或未病而預見。或病四五日而出。或病二十日。或一月微見者。各隨證治之。百合病發汗後者。百合知母湯主之。百合病下之後者。滑石代赭湯主之。百合病吐之後者。百合雞子湯主之。百合病不經吐下。發汗。病形如初者。百合地黃湯主之。百合病一月不解。變成渴者。百合洗方主之。百合病渴不差者。

醫通卷之六

百合

六

思得堂藏

枯蕪牡蠣散主之。百合病變發熱者。百合滑石散主之。百合病見於陰者。以陽法救之。見於陽者。以陰法救之。見陽攻陰。復發其汗。此為逆。見陰攻陽。乃復下之。此亦為逆。所謂百脉一宗。言周身之血。盡歸於心主也。心主血脉。又主火。若火溫則熱。畜不散。流於血脉。故百脉一宗。悉致其病也。人身氣陽而血陰。若氣盛則熱。氣衰則寒。今病在血。不干於氣。所以如寒無寒。如熱無熱。飲食不食。欲卧不卧。欲行不行。皆陽火燥陰。無可奈何之狀也。又上熱則為口苦。下熱則為便赤。亦陽火燥陰之患也。藥雖治病。然必藉胃氣以行之。若毒血在脾胃。經脉閉塞。藥雖入而胃弱不能行。故得藥轉劇而吐利也。病不在皮肉筋骨。則身形如和。惟熱在血。故脉微數也。脉數血熱。則心火上炎。不下交

於腎。而膀胱之經亦不得引精於上。上虛則溺時漸然頭眩。甚則為頭痛。以此微甚。可卜其愈日之遠近也。其治法咸用百合為君。以安心補神。能去血中之熱。利大小便。導滯蒸積。然必鮮者。如克有濟。若汗之而失者。佐知母以調其上焦之津液。下之而失者。佐滑石代赭。以理其下焦之痺結。吐之而失者。佐雞子黃。以補其中焦之管血。若不經吐下發汗。但佐生地黃汁。以涼血。血涼則熱毒解。而蘊積自行。故大便出如黑漆矣。其一月不解。百脉壅塞。津液不化。而成渴者。故用百合洗之。則一身之脉皆得通暢。而津液行。渴自止。勿食鹽豉者。以味鹹而凝血也。若洗後渴不減。是中無津液。則以枯蕪牡蠣主之。若變發熱。乃脉鬱而成熱。佐滑石。以通利之。百合病皆持兩端。不表不裏。為其

醫通卷之六

百合

六

思得堂藏

熱行血脉之中。非如傷寒可行汗下等法。所以每多誤治之失。往往有綿延經歲不已者。愈期不復可拘也。至於誤行汗下。變證叢生。大畧不逾上法。但當隨所稟虛實偏勝而調之。切勿誤認下元虛弱。而用溫補之法也。按百合病。即瘵證之甚者。傷寒後得此為百合。肺病日久而得者為瘵。石頑治內翰孟端士尊堂太夫人。因端士職任闕堂。久疎定省。兼開稍有違和。虛火不時上升。自汗不止。心神恍惚。飲食不能食。欲卧不能卧。口苦小便難。溺則洒淅頭暈。自去歲迄今。歷更諸醫。每用一藥。必增一病。用白朮則室塞脹滿。用橘皮則喘息怔忡。用遠志則煩擾開熱。用木香則腹熱咽乾。用黃耆則迷悶不食。用枳殼則喘欬氣乏。用門

冬則小便不禁。用肉桂則顯服效逆。用補骨脂則後重燥結。用知藥則小腹枯癯。用苓梔則臍下引急。用香薷則耳鳴目眩。時時欲入扶掖而走。用大黃則臍下築築。少腹愈覺收引。遂致畏藥如蠱。惟日用人參錢許。入粥飲和服。聊藉支撐。交春虛火倍劇。火氣一升。則周身大汗。神氣駭駭。欲脫。惟倦極少寐。則汗不出而神思稍寧。覺後少頃。火氣復升。汗亦隨至。較之盜汗迥殊。直至仲春中漸。遂石頑診之。其脈微數。而左尺與左寸倍於他部。氣口按之似有似無。診後。敘述從前所患。并用藥轉劇之由。曾遍詢吳下諸名醫。無一能識其為何病者。石頑曰。此本平時思慮傷脾。脾陰受困。而厥陽之火。盡歸於心。援其百脈致病。病名百合。此證惟仲景金匱要畧言之甚詳。本文原云。諸藥不能

治所以每服一藥。輒增一病。惟百合地黃湯為之。餘藥奈病久中氣虧乏。逮盡復經藥誤而成壞病。姑先用生脉散加百合茯苓龍齒。以安其神。稍兼芫連以折其勢。數劑稍安。即令勿藥。以養胃氣。但今日用鮮百合煮湯服之。交秋天氣下降。火氣漸伏。可保無虞。迨後仲秋。端士請假歸省。欣然勿藥而康。後因勞心思慮。其火復有升動之意。或令服佐金丸而安。嗣後稍覺火炎。即服前丸。第苦燥之性。若先入心兼之辛燥入肝。久服不無反從火化之虞。平治權衡之要。可不預為顧慮乎。

脚氣

千金論云。何以得之於脚。問曰。風毒中入。隨處皆得作病。何偏著於脚也。答曰。夫人有五藏。心肺二藏經絡所起在手。十指。肝腎與脾三藏經絡所起在足十趾。夫風毒之氣皆起於地。地之寒暑風溼。皆作蒸氣。足常履之。所以風毒之中入也。必先中脚。久而不瘥。遍及四肢腹背頭項也。微時不覺。漸滯乃知。經云。吹傳聞傳是也。

論得以便令人覺不。凡脚氣病皆由感風毒所致。得此病多不令人即覺。會因他病一度。乃始發動。或奄然大悶。經三兩日不起。方乃覺之。諸小庸醫皆不識此疾。漫作餘病治之。莫不盡藥。故此病多不令人識也。始起甚微。食飲嬉戲氣力如故。惟卒起脚屈弱不能動。有此為異耳。黃帝云。緩風淫痺

是也。論風毒相貌。夫有脚未覺異。而頭項臂膊已有所苦。有諸處皆悉未知。而心腹五內已有所困。又風毒之中入也。或見食嘔吐。憎聞食臭。或有腹痛下痢。或大小便秘澀不通。或胸中衝悸。不欲見光明。或精神昏憤。或喜迷妄。語言錯亂。或壯熱頭痛。或身體酷冷。或煩燥。或覺轉筋。或腫不腫。或胫腿頑痺。或時緩縱不隨。或復百節攣急。或小便不仁。此皆脚氣狀貌也。亦云風毒脚氣之候也。其候難知。當須細意察之。不爾必失其機要。一報病成。難以理。婦人亦爾。又有婦人產後春夏取涼。多中此毒。宜慎之。其熱悶掣。驚悸心煩。嘔吐氣上。皆其候也。又但覺膝下冷瘡。惛惛然不快。兼小便淋瀝。不同生乎。即是脚氣之候。而弱名緩風。痺痛為淫痺。

入房能成此疾。

論冷熱不同。問曰。何故得者。有冷有熱。答曰。足有三陰三陽。寒中三陽所患必冷。暑中三陰所患必熱。故有表裏冷熱不同。熱者治以冷藥。冷者治以熱藥。以意消息之。脾受陽毒。即熱煩。腎受陰淫。即寒痺。

論須察緩急。凡小兒病候有異。即須太怖畏。決意急治之。勿緩氣上入腹。或腹或不腹。胸脇逆滿。氣上肩息。急者死。不旋踵。寬者數日必死。不可不急也。但看心下急。氣喘不倖。或自汗數出。或作寒乍熱。其脈促短而數。嘔吐不止者皆死。論虛實可服藥不可服藥。凡脚氣之疾。皆由氣實而死。終無一人以服藥致虛而死。故脚氣之人。皆不得大補。亦不可大瀉。終不得畏虛。故預止湯不服也。如此者皆死不治。

論脈候法。凡脚氣雖殊。診候不異。而三部之脈。要須不達四時者為吉。其逆四時者勿治。論如脈經所說。此中不復具載。其人本黑瘦者易治。肥大肉厚亦白者難愈。黑入耐風。淫赤白不耐風。冷瘦人肉硬。寒人肉軟。則難愈。至為難愈也。

論腫不腫。凡人久患脚氣。不自知別於後。因者。腫發動。治之得法。後直患嘔吐而復脚氣。余為診之。乃云。此脚氣病者。曰。其平生不患脚腫。何因名之。曰。氣不消。氣不消。以風石發。狐疑之間。不過一旬而死。此氣不消。一而以一。以風石發。亦有腫者。有不腫者。其以小腫。頭重不仁。多不腫。小腹頭後。不過三五日。即令人嘔吐。若名脚氣。一。此者死在旦夕。凡患脚氣。到心難治。以其腎水乾。心火旺也。

論須慎不慎。凡脚氣之病。極難。極難。凡患此者。要此等並切禁。不得犯之。并忌大怒。性持食。更忌未。此等並切禁。又不得食諸生果子。殺醉之食。更宜皆不可。症又大宜生牛乳生果子。

論灸法。凡脚氣初得脚弱。便速灸之。并服竹瀝湯。長可服八風散。無不應者。惟急速治之。若人但灸而不能服散。散而不灸。如此者半瘥半死。至為難者。或至一二年復更發。動覺得。便依此須速灸之。及服散。治十愈。此病難者。雖不即死。治之不當。根源不。久其於殺人。不可不精以為意。初風市穴灸百壯。重者五六百壯。勿令頻灸。三報之。次伏兔穴灸百壯。亦可五十壯。次犢鼻穴灸五十壯。至百

壯。次膝腹穴灸百壯。次三里穴灸百壯。次上廉穴灸百壯。次下廉穴灸百壯。次絕骨穴灸百壯。凡此諸穴灸，不必一頓灸盡壯數，可日日報灸之。三日之中，灸令盡壯數，為佳。凡病一腳則灸一腳，病兩腳則灸兩腳。凡脚弱病，皆多兩脚，又一方云：如覺脚弱，便灸三里及絕骨各一處，兩脚懸者，令四處灸之，多少隨病輕重，大要難輕，不可減百壯，不瘥速以次灸之。

論服湯藥色目。風毒之氣入人體中，脉有三品，內外證候相似，但脉有異耳。若脉浮大而緩，宜服續命湯。兩劑應瘥。若風盛，宜作越婢湯加白朮四兩，胡洽云：若惡風者，更加附子一枚。若脉浮大緊轉臥，宜作竹瀝湯。若病人脉微而弱，宜服風引湯。此脉多是因虛而得之。若大虛短氣力乏，其間可作

諸通卷之六

脚氣

思得堂藏

補湯。隨病冷熱而用之。若未愈，更服竹瀝湯。若病人脉浮大而緊，此是三品之中最惡脉也。或沉細而歇者，此脉正與浮大而緊者同是惡脉。浮大者病在外，沉細者病在內，治當消息以意逆之。雖其形尚可，而手脚未至弱極，數日之中，氣上即便命終。如此之脉，往往有人得之，無一存者。急服竹瀝湯，日服一劑，切要湯勢當令相及，勿令半日之中空無湯也。此湯竹汁多服之。若不極熱，輒停，在胃心，更有人患，每服當使極熱。若服竹瀝湯得下者，必佳也。續命湯治風毒病初得，似時行毒病而脉浮緩，終不變，此不治。或數日而死，或十日而死，或得便不識人，或發黃，或發斑，或目赤，或下部穿爛者，此最急，得之即先服續命湯一劑，須服葛根麻黃湯下之。若此不折，更與續命湯兩三劑，必瘥。夫脚氣之病，先起額

南稍來江東，得之無漸，或微覺疼痛，或兩腿腫滿，或行起澀，或上入腹，不仁，或時冷熱，小便秘澀，喘急氣衝，氣急欲死，食咽不下，氣上逆者，皆其候也。若覺此證，先與犀角從復花湯，宜久服之，以氣下小便利為度。

按東垣云：脚氣實由水溼，然有二焉。南方卑溼，清溼襲廬，則病起於下，此是外感。北方常食糲乳，又飲酒太過，脾胃有傷，不能運化，水溼下流，此因內而至外者也。脚氣兩腿腫，是為壅疾，皆當疎下。然太過則損脾，不及則病不去。南方多兒兩足粗大，與疾偕老者，初起治宜橫櫛湯，或四七湯，香蘇散，並加橫櫛橘皮，以宣通其氣，不使其壅，壅既成者，破去惡血，然後服藥。經云：善則腫熱，破之也。

脚氣之病，初起甚微，飲食如故，人多不覺，惟卒然脚膝屈弱，

諸通卷之六

脚氣

思得堂藏

或腫或不腫，或頑痺，或緩縱，或掣急，皆是淫邪為患。其腫者為淫脚氣，不腫者為乾脚氣。脚氣之發，必身痛發熱，大類傷寒，不可妄用傷寒等藥。若卒起脚弱，或少腹不仁，或轉筋，或逆，或腹痛下利，或二便秘澀，或驚悸妄錯，但兩腿腫赤，便作脚氣治。風勝者，自汗走注，脉浮弦，越婢加木湯。寒勝者，無汗，掣急，掣痛，脉遲澀，酒浸牛膝丸。濕勝者，腫痛重者，脉遲細，除濕湯。冷痺惡風者，非木附麻黃並用，必不能開。越婢加木附湯汗之，或麻黃附子細辛湯加桂枝白朮亦妙。脚痺冷痛，或時閉熱，不可屈伸者，千金蜀活湯。風冷脚痺，疼痛變弱，不可屈伸，千金烏頭湯。暑勝者，煩渴身熱，或成水泡瘡，脉洪清燥湯。脚氣頭疼身熱，肢節疼痛，或一脚偏患，軟弱痺曳，狀如偏風者，小續命加木瓜。三陽經受熱，

氣流脚踝上。振赤腫痛。寒熱如瘧。自汗惡風。或無汗惡寒。敗毒散加蒼朮。○三陰受寒。濕著於脚膝上。枯瘦色淡。少腹不仁。腹急疼痛。上氣喘急。八味丸加沉香。○脚氣上入腹。腹急上衝。脚氣欲絕。千金半夏湯。脚氣衝心。疼痛腫滿。大小便秘。沉香導氣湯。○脚氣遍身腫痛。喘促煩悶者。水通散。○因脚氣而服補劑太過。小便不通者。薑汁炒黑山梔。水通赤芍。赤茯苓。當歸。生甘草。稍不時煎服。○脚氣初發。一身盡疼。或肢節腫。使溺阻。此屬濕熱。先以羌活導滯湯導之。後以當歸拈痛湯除之。○脚氣上入少腹。不仁。崔氏八味丸。○脚氣入腹。喘急腹脹。蘇子降氣湯。佐以養正丹。下氣甚捷。○脚氣迫肺。令人喘嗽。小肯龍湯加檳榔。○脚氣嘔逆。惡心畏食。生料平胃散加水香。大便秘加煨大黃。○脚氣風毒生瘡。腫痛。心

石頭治文學。稍延。事精。凡氣傷。喘汗。熱熱如沐。六脈浮乳。按之乏力。勢不得不從事溫補。遂獲速效。黃連中。易桂心。加入參。數貼而安。因有脚氣痼疾。恆服腎氣丸不效。六七年來。宿患未除。堅想石頭劑。絕病根。乃藥取木附桂。附青。附參。附等法。兼採八風散。中菊花。龍甲湯。中龍甲貝齒。并罕犀角。風引湯。中獨活。防己。竹瀝湯。中薑汁。竹瀝。為丸。共裹。祛風逐溼之功。服後必蒸蒸汗出。不終劑而數年之疾頓愈。非孫達法存千金妙義。烏能及此。

鶴膝風

鶴膝風者。屈伸而膝腫是也。經云。膝者筋之府。屈伸不能。行則攣。俯仰將憊矣。治宜去風順氣。活血壯筋。十全大補加杜仲牛膝羌活。或五積散加松節。血少虛寒而痛者。四物加制芥牛膝。送活絡丹。氣血流動。更服八味九加鹿茸牛膝調理。正氣旺而患自除矣。兼風溼者。換骨丹。下利後膝腫痛。風邪乘虛入三陰經也。大防風湯。服藥不能應手者。外用雷火鍼法。每日燂之。不必著傷肌肉也。方用斷艾五錢。丁香五分。麝香三分。合研勻。入紙筒中。痛處襯紙。三五層。點火燂之。以筋脉活動為度。數日自効。又鶴膝風初起。漫腫不紅。屈伸不便者。乘未潰時。用陳年芥菜子研細。以薑汁葱涕和白蜜調塗一伏時。患處起疱。乾脫皮自愈。上二法。若膿成者。不

醫通卷之六

鶴膝風

光

思得堂藏

可用也

婦人鶴膝風證。因胎產經行失調。或鬱怒虧損肝脾。而為外感所傷。或先肢體筋攣。繼而膝漸大。腿漸細。如鶴膝之狀。若腫高赤痛者。易治。漫腫不赤痛者。難治。二三月潰而膿稠者。易治。半載後潰而膿清者。難治。誤用攻伐。復傷元氣。尤為難治也。大要當固元氣為主。若食少體倦者。六君子湯。肺熱內熱。寒熱往來者。逍遙散。發熱惡寒者。十全大補湯。少寐驚悸者。歸脾湯。月經過期者。補中益氣湯。月經先期者。加味逍遙散。腎水虛弱者。六味地黃丸。腎虛風襲者。安腎丸。腎氣丸。熱用。凡潰後常大補脾胃。若膿出反痛。或寒熱煩渴等證。皆屬氣血虧損。一於培補。庶保終吉。

喻嘉言曰。鶴膝風者。即風寒溼之痺於膝者也。如膝骨日大。

上下肌肉日枯。且未可治其膝。先養血氣。使肌肉漸榮。後治其膝可也。此與治偏枯之證大同小異。急既其未枯者。使氣血流行而復榮。倘不知此。但用麻黃防風等散風之藥。鮮有不全枯者。故治鶴膝風。而惡攻其痺。必并其足痿而不用矣。古方治小兒鶴膝風。用六味地黃丸加鹿茸牛膝。不治其風。其義最善。蓋小兒非必為風寒溼所痺。多因先天所稟腎氣衰弱。陰寒凝聚於腰膝。故以六味丸補腎中之水。以鹿茸補腎中之火。以牛膝引至骨節。而壯其衰損之筋。此治本不治標之良法也。

醫通卷之六

鶴膝風

光

思得堂藏

諸風門

癰風

經云。癰者。營氣熱。其氣不清。故使鼻柱壞而色敗。皮膚瘍潰。風寒客於脈而不流。名曰癰風。○風氣與太陽俱入。行諸脈。散於分肉之間。與衛相干。其道不利。故使肌肉腠理而有癰。衛氣有所礙而不行。故其肉有不仁也。○病骨節重。頸眉落。名曰大風。○脈風成爲癰。○癰風者。數刺其腫上。已刺以銳鍼。鍼其處。按出其惡氣。腫盡乃止。常食方食。毋食他食。○經內經之論。當分營衛爲治。古方雖多。但混濁其風熱於營衛。又無先後之分。至東垣丹溪始分之。活法機要云。先擇皮散。從少至多。服五七日。灸承漿穴七壯。灸瘡愈再灸。三灸之後。服再造散。祛血分之風熱。戒房室三年。病愈。此先治其衛。

醫通卷之六

癰風

三

思得堂藏

後治其營也。丹溪云。癰風須分在上在下。看其疔瘡。先見在上。散多者。氣受之也。以醉仙散取臭毒惡血於齒縫中出。先見在下。體多者。血受之也。以再造散取惡物蟲積於穀道中出。所以雖有上下道路之異。然皆不外於陽明一經而已。若上下同得者。氣血俱受也。用必勝散。上下兼取。陽明主胃。與大腸無物不受故也。夫氣爲陽。爲衛。血爲陰。爲營。身半已上。陽先受之。身半以下。陰先受之。故再造散治其病在陰者。用皂角刺出風毒於營血中。肝主血。惡血留止其屬肝也。蟲亦生於厥陰。風木所化。必用是法治其臟氣。殺蟲爲主。以赤茯苓出營分毒邪。白牽牛出衛分毒邪。大黃引入腸胃。利出瘀血惡物。醉仙散治病在陽者。用鼠粘子出風毒。通身惡瘡。亞麻逐風。滋肺潤皮膚。痰熱主惡血。身體風癢。通導氣。防風爲

諸風之引導。枯槁根治瘀血。消熱附腫。枸杞和血。消風熱。散瘡毒。艾刺子主賊風。苦參治熱毒風。皮膚肌肉煩躁。生瘡。赤癰。眉脫。八味藥治功固至。然必銀粉爲使。銀粉乃下膈通大腸之要劑。用以驅諸藥入陽明經。開其風熱。拂鬱。逐出惡風。臭穢之毒。殺所生之蟲。循經上行。至牙齒輕薄之分。而出其臭毒之涎水。服此藥。若有傷於齒。則以黃連末搗之。丹溪取二方。爲破敵之先鋒。必勝散則兼二方之妙用。但須慎口味。戒房室。服之必効。○治癰風五法。○一出汗。用麻黃劑。防羌獨皂角。苦參全蠍之類。熱服覆汗。○二薰浴。先用黃蘗黃連薄荷爲末。水調塗服四圍。次用荆芥苦參風藤枳殼蒼耳羌活桑椹桃柳枝連根葱煎湯薰浴。浴起用木通石菖蒲大黃爲末。加麝少許。擦患上。○三敷擦。用白礬川槿皮五倍子全

醫通卷之六

癰風

三

思得堂藏

蠟爲末。加蠶蜋少許。香油調敷。狼油尤妙。燥癢用大楓肉。番水驚風柏仁。照芝藤。黑豆杏仁。木棉子。共搗一處。入場成確內。以鐵蓋蓋上。鐵線紮定。鐵釘旋緊。糠火中煨一夜。取其藥油。調後藥。預用胡椒川椒各二兩。枯礬輕粉各六錢。爲細末。入前藥油。調勻。擦患處。數日如蛇蛻脫下。再擦二次。効。肥人用川烏草烏。細辛杏仁。白附子雄黃。白芥子爲末。加麝少許。生薑煎。擦頭厚者。加蠶蜋白礬。不時擦之。擦時須覓空房。用紙糊好。勿見風。七日後又換別靜房居之。以前房便溺臭穢不堪也。七日後日擦一次。至病痊爲度。如有一處不知痛癢。卽是病根。如前但擦其處。日三五次。○四湯液。用涼膈散解消風散之類。○五九散。用九龍九漆黃九希蒼九白花蛇九。鷲翎散。蜈蚣散。選用。○癰風諸藥不効。千金書。婆薑病九。極

有神驗。○癰風面目蠕動。升麻胃風湯。并用桃柳槐桑枝煎湯。煎洗面。服消風涼解之類。外用硫磺雄黃乳香沒藥血竭輕粉枯礬麝香。身賊骨爲散。香油調敷腫處。七日不得洗面。○癰風脚底穿。用番木鱉酥炙三錢。芋麻一觔。燒灰存性。爲散。空心酒下一錢。重者。不過一月。効如過服惡寒作嘔者。胡椒湯服之。卽止。○癰風眉毛脫落。用鹿角剉炒存性。六錢。皂角煨灰存性。一兩。豉煎擦眉上。日三五次。又方用骨碎補去毛炙乾。生半夏爲末。等分。生薑煎。日五七次。內服一味皂角刺炒脆爲末。食後白酒釀。或茶清服二錢。○白癰風者。血虛不能濡潤經絡。毒邪傷犯肺經氣分也。聖惠方用桑枝十觔。羌活草穗三觔。煎膏溫酒調服。外用雄黃硫磺黃丹南星。枯礬蜜陀僧等分。豉煎擦之。擦後漸黑。再擦則愈。一方

以散癰滯風毒。此與豆淋酒下浮萍之意不殊也。○惡血滯結於臍。非薄滯其內。則不能移。若毒在外者。非剉爛身患處。及兩臂腰尻兩手足指縫。及委中各出血。其毒必不能散。若表裏俱受毒者。非外砭內泄。其毒決不能退。如有寒熱頭疼等證。當須大補氣血。○服輕粉之劑。若腹痛去後。兼有膿穢之物。不可用藥止之。若口舌腫痛。穢水時流作渴。發熱喜冷。此爲上焦熱毒。潤黃散。若寒熱往來。小柴胡加知母。若口縫出血。發熱而大便秘結。此爲熱毒內淫。黃連解毒湯加犀角連翹。若大便調和。犀角地黃湯。若癰風氣下焦脚弱。或腹理汗大泄者。越脾加木湯。若穢水雖盡。口舌不愈。或發熱大渴。而不能飲。此爲虛熱也。七味白朮散。○丹方治癰風赤腫。屬血病者。以陵鯉甲。隨患先起處。取甲塗生漆於裏面。砂內炙脆爲末。清晨陳酒調服七八分。三服効。七日愈。隨處取甲治之。○薛立齋曰。癰風多由勞傷氣血。腠理不密。或醉後房勞沐浴。或登山涉水。外邪所乘。衝氣相搏。淫熱相併。血隨火化。而致眉毛先落者。毒在肺。面發紫泡者。毒在肝。脚底先痛或穿者。毒在腎。遍身如癰者。毒在脾。目先損者。毒在心。此五臟受病之重者也。一曰皮死麻木不仁。二曰肉死鍼刺不痛。三曰血死爛潰。四曰筋死指脫。五曰骨死鼻柱壞。此五臟受傷不可治也。大抵風自頭面起者爲順。自足心起者爲逆。若聲啞目盲。尤爲難治。治當辨本證兼證。變證類證。陰陽虛實而斟酌焉。若安投燥熱之劑。膿水淋漓。而肝血愈燥。風熱愈熾。腎水愈枯。如火愈旺。反爲壞證矣。○口喎目斜。若手足牽搐。或眉

發。發動。或面發紫泡。或成塊。屬肝經血虛風熱。用加味逍遙散六味地黃丸。以生肝血。滋腎水。若寒熱往來。或耳聾。脇痛。屬肝木燥盛。用柴胡四物湯。以清肝火。生肝血。若筋攣骨痛。不能動履。用六味丸。補中益氣。以滋化源。○身上虛癢。此血不營於腠理。所以癢也。四物加酒。蒸煎服。調紫背浮萍末。癢甚。加荆芥。蟬蛻。○夏秋濕熱行令。若飲食不甘。頭目眩暈。遍體痠軟。而兩腿麻木。口乾自汗。氣促身熱。小便黃數。大便稀溏。濕熱傷元氣也。清燥湯。○身起疣瘡。搔破膿水淋漓。若寒熱往來者。肝經氣血虛而有火也。加味逍遙散。○若肌肢攣如帛隔者。氣血不能外營也。人參養胃湯。○若面部擗之麻癢者。氣血不能上營也。補中益氣湯。○口舌生瘡。或咽喉作痛。或飲食喜冷。大便秘結者。實熱也。四順清涼飲。○肌熱惡

醫通卷之六

風

思得堂藏

熱煩渴引飲者。血虛也。當歸補血湯。○牙齒作痛。或牙齦潰爛。若喜寒惡熱。屬胃火。清胃散為主。○舌赤裂。作渴引飲。或小便頻數。不時發熱。或熱無定處。或足心熱起者。乃腎水乾枯。心火亢盛。用加減八味丸。若誤用寒涼。必變虛寒而死。診○脈兩寸浮而緊。浮而洪。陽脈浮弦。陰脈實大。浮緩者易治。洪大而數。或沉實者難愈。脈沉而病在上。脈浮而病在下。及無汗者。皆為不治之證也。

胃風

經云。胃風之狀。頸多汗惡風。飲食不下。鬲塞不通。腹善滿。失衣則脹。食寒則泄。診形瘦而腹大。

胃風者。頭面腫起。右關脈弦緩帶浮。多因飲食後乘涼所致。喻嘉言曰。胃風變證有五。一曰風成爲寒熱。以風入於胃。必左投肝木而從其類。風氣通於肝也。肝木盛則侮脾土。故生寒熱。庸醫認爲外感。此也。宜小柴胡湯。一曰瘰成爲消中。瘰者。熱也。熱積胃中。善食而易饑。火之害也。宜白虎加人參。一曰厥成爲難疾。厥者逆也。謂胃氣逆而上行。成難頂之疾。如眩暈之類是也。宜芎辛湯。一曰久風爲飧泄。言胃中風熾。食已即泄。不留停也。若風氣入血分。則下鮮血。挾溼熱。則下如豆汁。人參胃風湯。有血加防風。一曰脈風成爲癰。言胃中

醫通卷之六

胃風

思得堂藏

之風。醱醱既久。則管氣熱脹。其氣不清。故使其鼻柱壞而色敗。肌肉之間。漸至潰爛。輕則肌體麻木。目增動。牙關緊。面腫能食。升麻胃風湯。此五者。總爲胃風之病也。

破傷風

破傷風證。因擊破皮肉。風邪襲入。而發熱腫脹。治法與感冒不異。又諸瘡潰後。風邪乘虛內襲。其候最急。往往視為尋常。致變種多。有不可救療者。亦有宿熱鬱結。多著白痧。瘡口閉塞。氣難宣通。而熱甚生風者。或有湯洗淫氣。從瘡口入。其人昏迷沉重者。或有艾灸火烘。火氣逼入而煩躁發熱者。但須辨瘡口平無汁者。破傷風也。瘡口邊出黃水者。破傷淫也。瘡口嫩腫赤色。破傷火也。其湯火之毒。亦與破傷風無異。其為證也。皆能傳播經絡。燔燥真氣。是以寒熱間作。甚則口噤。目斜。身體強直。如角弓反張之狀。死在旦夕。當同傷寒處治。有在表在裏。半表半裏之不同。河間曰。太陽在表者。汗之。陽明在裏者。下之。少陽在表裏之半者。和解之。但患

醫通卷之六

破傷風

思得堂藏

思得堂藏

處復加腫赤。神昏少食。不分經絡者。穿山甲一錢。蜈蚣末半錢。麝香一字。濃煎葱白香豉湯服之。患上用葱涕調炒飛麝至之。其但言三陽而不及三陰者。意謂風邪在三陽之經。便宜按法早治而愈。若待傳入三陰。其證已危。惟天靈蓋煨一錢。穿山甲半錢。麝香一字。為散。濃煎葱白香豉湯服之。或服滿自利。或口燥咽乾。舌卷囊縮。額上汗珠不流。身上汗出如油。眼小目眩。肢體痛劇。而不在傷處者。皆死證也。破傷風邪在表者。九味羌活湯。半表半裏者。小柴胡湯。大凡汗不止。筋攣抽搐。升麻湯加黃芩。若服蜈蚣等風藥過多。有自汗者。白朮黃芩防風生甘草作湯溫服。大便秘結。小便赤澀。或用熱藥。白汗不休。宜速下之。先用芎黃湯二三服。後以大芎黃湯下之。若不愈。反作痙狀。用羌獨活防風杏仁

地榆水煎頻服。名獨瀉湯。大便閉者。用膽導蜜導法。病久衰

弱。當養血。以四物加藥。本防風細辛白芷。瘡瘍破傷風邪。身體疼痛。風邪攻注。癰疽。皮膚瘙癢。麻木不仁。頭昏牙緊。以防風藥。木羌活地骨皮荆芥穗為末。酒調服。瘡癰壅塞。內熱生風者。九味羌活湯。傷淫而瘡口常有稀膿者。先服除淫湯二三劑。後用一味白木膏。或浸酒亦可。傷火燥腫赤色。時頭痛發熱。甚則煩躁者。芎黃湯加薄荷荆防。不應加酒。黃連四五分。黑山梔二錢。兼小便不利。合導赤散。牙關緊急不開。用蜈蚣一條。焙乾研細末。擦牙吐涎立解。或服左龍丸亦得。破傷掀腫不能透膿。用硃砂南星獨活穿山甲人指甲。炒研為末。酒調服二三次。外用南星防風為末。薑汁調敷患處。

醫通卷之六

破傷風

思得堂藏

思得堂藏

石頑曰。破傷一證。金瘡跌撲。與潰瘍迥殊。金瘡跌撲受傷。則寒熱頭痛。面目浮腫。胸膈痞悶。六脈浮弦。或糝糊不清。其傳經與傷寒不異。其勢較傷寒更劇。故可用疎表之法。然亦不可峻用風藥。以其經中之血。先以受傷。所謂奪血者。無汗是也。若潰瘍破傷。則患處忽復腫脹。按之不知疼痛。周身肌肉不仁。緩急引痛。胸膈痞滿。神思不清。六脈弦細。或虛大糝糊。雖風引毒氣。攻注周身。切不可用攻表藥汗之。必肉瞤筋惕。甚則發狂。所謂齊家不可發汗。發汗必致癰也。輕者。葱白香豉湯加陵細甲白芷蜈蚣之屬。重則葱白香豉湯加黃芩肉桂遠志防風。陵細甲犀角之類。甚則萬靈丹。葱或煎湯調服。嘔逆不食者。此風引邪毒攻心也。急與護心散。外用葱熨法。分解其邪。如大便不通者。切不可用芎黃湯。惟宜蜜煎導導

之其勢稍退。便當用保元。仍加遠志肉桂犀角。陵經甲等。解
散餘毒。兼使參耆無壅滯之患。其間滋補。各隨其所。冀之
偏。以為權衡。貴在隨證之活法耳。

疹。脈浮而無力。太陽也。脈長有力。陽明也。浮而弦者。少陽
也。洪數者。傷火也。沉細者。傷濕也。虛細脈。滿皆不治。

虞恆德治一人。因勦關殿。肩發骨被打破。得破傷風。頭面
大腫發熱。以九味羌活湯取汗。外用杏仁研爛。入白麩少
許。新汲水調敷。瘡上。腫消熱退而愈。後屢試屢驗。

跌踉

經云。人有墮墜。惡血留內。腹中脹滿。不得前後。先飲利藥。
金匱治馬墜及一切筋骨損方。大黃一兩。另用酒一大盞。浸
及桃仁。蒲黃。甘草。髮灰。以童子小便煎成。內大黃。去滓。分溫
三服。先以敗蒲席煎湯浴之。浴後服藥。以衣被蓋覆。斯須通
利。數行。痛楚立差。傷損氣血。凝滯則腫。或紫或青。痛不可
忍。宜活血行氣。最忌惡血攻心。與破傷二証。凡血上逆者。即
以逐瘀為急。口禁牙關緊。即是胃風。依破傷治之。傷損著
寒。痛不可忍。用葱杵爛。炒熱。罨上。其痛立止。冷則溫之。惡
血上攻。韭汁和童便。飲半杯。即下。從高墮下。腹中瘀血滿
痛。不得出。短氣。二便不通。千金桃仁湯。挫閃氣血。不順。腰
脇疼痛。或發寒熱。香散散加桃仁。蘇木。脇痛加柴胡。川芎。

跌踉閃挫。瘀結腹脹。大便不通。調管治絡飲。跌撲損傷。瘀
畜大便不通。紅腫青紫。疼痛昏悶。內墜欲死者。當歸導氣散。
○跌踉閃挫。腰脇氣滯。牽引掣痛。復元通氣散。從高墮下。
惡血流於胸中。痛不可忍。復元活血湯。○被打傷破。內有瘀
血。腹脹。蒲黃生者。篩取一升。當歸肉桂各二兩。酒服方寸匙。
日三服。○丹方治折臂斷筋損骨。生地大黃。搗汁。和酒服一
月。即接連。仍以滓炒熱貼之。○瘡蟲播酒服亦可。焙乾為末。
每服一錢。入麝少許。溫酒調服。接骨神効。○跌斫或金刀傷
骨。用老鴨眼睛。和根葉細搗。封貼傷處。令患者痛飲至醉。
此續骨法也。若筋斷取筋相對。用旋花根。即丹。杵汁。滴傷
處。將查封瘡上。半月筋自續。此續筋法也。○又方治筋絕。取
生蠶肉及黃。封塗傷處。筋即續。亦治骨斷。以蠶生搗和酒酒

飲并以滓。乾即再塗。骨連筋續乃止。○諸傷損瘀血。瘀聚
痛不可忍。以大黃一兩切。杏仁三十粒。研細酒煎服。瘀血即
下。若恐氣絕。取藥不及。先以熱小便灌之。外用大黃末。薑汁
調塗。一夜青紫即變。瘀積日久。青黑痛極。以附子一枚。咬咀。
豬脂煎數沸。去滓取脂。和醋塗之。○墮墜重傷。危在旦夕。用
烏雞連毛搗爛。和醋烘熱。隔布熨之。甚則破牛馬腹。納入。浸
熱血中救之。○金傷腸出。以豬脂抹手推入。急用桑皮線縫
合。即以熱雞血塗之。次入燒人屎拌塗尤妙。○從高墜下。或
行車走馬。跌折筋骨。骨傷自然銅散。筋傷乳香定痛散。金刃
出血不止者。紫金丹敷之。○跌撲致衄。或吐血不止。濃煎蘇
木湯去滓。煎小烏神湯下。黑神散。促筋脫。用槐樹皮搗爛。
拌臘精焙熱塗紫。○損傷一證。專從血論。但須分有瘀血停

醫通卷之六

跌打

思得堂藏

瘀與亡血過多之證。蓋打撲墮墜。皮不破而內損者。必有瘀
血。若金刃傷皮出血。或致亡血過多。二者不可同法而治。有
瘀血者。宜攻利之。若亡血者。兼補調之。須察其所傷。上下輕
重淺深之異。經絡氣血多少之殊。惟宜先逐瘀血。通經絡。和
血止痛。然後調氣養血。補益胃氣。無不効也。
診○金瘡出血太多。其脈虛細小者生。數實而浮大者死。跌
瘀血不止。脈來或大或止者死。細滑者生。從高顛仆。內有血
腹脹滿。脈堅強者生。小弱者死。

經云諸症項強。皆屬於濕。○肺移熱於腎。傳為柔痙。金匱云。

太陽之病。發熱無汗。反惡寒者。名曰剛痙。○太陽病。發熱汗
出。而不惡寒者。名曰柔痙。○太陽病。發熱脈沉而細者。名曰
痙。為難治。○太陽病。發汗太多。因致痙。○風病下之則痙。復
發汗必拘急。○瘡家雖身熱。不可發汗。汗出則痙。○病者
身熱足寒。頭項強。惡寒。時頭熱。面赤。目赤。獨頭動。振。卒口
噤。背反張者。痙病也。若發其汗者。寒溼相搏。其表益虛。即惡
寒甚。發其汗已。其脈如蛇。○暴腹脹者。為欲解。脈如故。反復
難治。○痙。脈云。痙家脈伏。直上下行。○太陽病。其證備身。體強
凡。凡音然。脈反沉遲。此為痙。括葉桂枝湯主之。○太陽病。無

醫通卷之六

痙

思得堂藏

汗而小便反少。氣上衝胸。口噤不得語。欲作剛痙。葛根湯主
之。○痙為病。胸滿口噤。卧不著席。脚掣急。必齕齒。可與大承
氣湯。合上十一條推之。則痙病之屬表者。宜用桂枝葛根。屬
裏者。可用承氣。是為邪實者設也。若首二條之葛根桂枝。所
不待言。第三條無汗。麻黃附子細辛湯。有汗。桂枝附子湯。四
條真武湯。五條附子湯。六條芍藥甘草附子湯。七條未發汗
前。桂枝加附子湯。發其汗已。其脈如蛇。甘草附子湯。八條乾
薑附子湯。九條是統言痙病之脈。無證可驗。不得擬方。第十
條言痙病之不宜用灸。灸則艾火助虐。一切辛烈藥。不可施。
所以難治。惟腹脹便秘者。庶可行下。奪一法。虛者可用灸甘
草湯。其脈經云一條。與第九條不異。演文無疑。按痙病與金
匱開卷第一證治。論證最詳。而方治最畧。以其證最危。過難

於造次也。觀其論中。惟出太陽陽明邪實三方。不及三陰虛證之治者。以痙病之脈皆弦勁伏匿。證多反張厥逆。是難議攻發。易於溫散也。若不通篇體會。曷知先聖立言之旨。陳無擇曰。夫人之筋。各隨經絡結束於身。血氣內虛。外為風寒溼熱之所中。則痙。蓋風散氣。故有汗而不惡寒。曰柔痙。寒泣血。故無汗而惡寒。曰剛痙。原其所因。多由亡血筋無所營。故邪得以襲之。所以傷寒汗下過多。與夫病瘥人及產後致斯疾者。繫可見矣。診其脈。皆沉伏弦緊。但陽緩陰急。則久久拘攣。陰緩陽急。則反張強直。二證各異。不可不別。張景岳曰。痙之為病。強直反張。病也。其病在筋。筋拘攣。所以反張。其病在血液。血液枯燥。所以筋攣。觀仲景曰。太陽病發汗太多。因致痙。風病下之。則成痙。瘡家不可發汗。汗之亦成痙。只此數言。可見痙病者。多由誤治之壞證。其虛其實。可了然矣。自仲景之後。惟陳無擇能知所因。曰多由亡血筋無所營。因而成痙。則盡之矣。但惜其言之既善。而復未有善者。曰氣血內虛。外為風寒溼熱所中。則痙。斯言不無有誤。若其所云。則仍是風溼為邪。而虛反次之。不知風隨汗散。而既汗之後。何復言風溼隨下行。而既下之後。何反致溼。蓋誤汗者。必傷血液。誤下者。必傷真陰。陰血受傷。則血燥血燥。則筋失所滋。筋失所滋。則為拘攣。而反張強直之病。勢所必至。又何待風寒溼熱之相襲。而後為痙耶。且仲景所言。言不當汗而汗也。不當下而下也。汗下既誤。即因誤治而成痙矣。豈誤治之外。必再受邪。而後成痙。無邪則無痙哉。此陳氏之言。不惟失仲景之意。而反致後人疑惑。用持兩端。故凡今人之

治此者。未有不以散風去溼為事。亦焉知血燥陰虛之證。尚能堪此散削否。此千古不明之疑竇。不可不為辯察。故列陳子之論於前。以資後學之印證。痙證甚多。而人多不識者。在不明其故。而鮮有察之者耳。蓋凡以暴病。而見反張戴眼。口噤拘攣之類。皆痙病也。觀仲景以汗下為言。謂其誤治亡陰。所以然也。予因類推。則常見有不因誤治。而凡屬陰虛血少之輩。不能營養筋脈。以致搐攣僵仆者。皆是此證。如中風之有此者。必以年力衰殘。陰之敗也。產婦之有此者。必以去血過多。衝任竭也。瘡家之有此者。必以血隨膿出。營氣涸也。小兒之有此者。或以風熱傷陰。遂為急驚。或以汗渴亡陰。遂為慢驚。凡此之類。總屬陰虛之證。蓋精血不虧。則雖有邪干。亦無痙病。果何事之病。而病至堅強。其枯可知。故治此者。必當先以氣血為主。而邪甚者。或兼治邪。若邪微者。通不必治邪。蓋此證之所急者。在元氣。元氣復而血脈行。則微邪自不能留。何足慮哉。奈何今人。但見此證。必各分門類。而悉從風治。不知外感之風。客邪證也。治宜解散。內生之風。血燥證也。止宜滋補。矧此數者。總由內證。本無外邪。既以傷精敗血。枯燥而成。而再治風寒。難乎免矣。故予詳筆於此。以明痙證之要。○仲景云。痙止屬太陽。而不及他經者何也。蓋痙必反張。其病在背。背之經絡。惟太陽督脈耳。言太陽。則督在其中矣。此其義也。然仲景止言其表。而未詳其裏。考內經之經脈篇。曰。足少陰之脈。貫脊屬腎。其直者。從脊上貫肝膈。經筋篇。曰。足少陰之筋。從脊內挾脊上至項。結於枕骨。與足太陽之筋合。又曰。足太陽之筋病。脊反折。項筋急。足少陰之筋病。主癰

瘰及瘰陽病者。瘰反折不能伸。陰病者不能仰。由此觀之。則瘰之為病。乃太陽少陰之病也。蓋腎與膀胱為表裏。膀胱為津液之府。而腎為藏精之藏。病在二經。水虧可知。故治此者。最當以真陰為生。

薛立齋曰。瘰以有汗無汗辨剛柔。又以脈通不脈通辨陰陽。仲景雖曰。瘰皆身熱足寒。然陽證不脈通。其脈逆者。皆陰也。○剛瘰無汗惡寒。項背強。脚攣急。手足搐搦。口噤咬牙。仰面開眼。甚則角弓反張。卧不著席。脈來弦長勁急。葛根湯。○柔瘰自汗惡風。四肢不收。閉眼合面。或時搐搦。脈來遲濡弦細。桂枝湯加括蕒。○血虛之人發瘰。或反張。或只手足搐搦。或但左手足動。搦十全大補湯加鉤藤蠟尾。○風熱瘰瘰發瘰不省。或只手足搐搦。或只右手足動。宜祛風導痰湯。○瘰

醫通卷之六

瘰

思得堂藏

病胸滿。口噤咬牙。脚攣急。卧不著席。大便硬者。可與大承氣湯。○若一邊牽搐。一眼喎斜者。屬少陽。及汗後不解。乍靜乍亂。直視口噤。往來寒熱。小柴胡加桂枝白芍。○足三陰瘰。俱手足厥冷。筋脈拘急。汗出不止。項強脈沉。厥陰則頭搖口噤。著附湯加當歸肉桂。太陰則四肢不收。木附湯加甘草生薑。少陰則閉目合面。參附湯加甘草乾薑。古法用附子散。通治三陰諸瘰。多汗去川芎獨活加黃耆當歸。○賊風口噤。角弓反張成瘰。倉公當歸湯。○產後發瘰。詳婦人本門。診。太陽病發熱。脈沉而細者。名曰瘰。為難治。瘰脈伏。按之緊如弦。緊直上下行。瘰病發其汗已。其脈如蛇。暴腹脹大者。為欲解。脈如故。反伏弦者瘰。

瘰瘰

瘰者。筋脈拘急也。瘰者。筋脈弛縱也。俗謂之搐。小兒吐瀉之後。脾胃虧損。津液耗散。故筋急而搐。為慢驚也。俗不知風乃虛象。因名誤實。反投牛黃抱龍等祛風藥。致天枉者。不知其幾。大抵發汗後失血。後產後瘰瘰。潰後氣血津液過傷。不能養筋而然。與筋傷肉瞶顛振相類。分氣血緩急。兼補養為治。庶有生理。若妄加灼艾。或飲以發表之劑。死不旋踵矣。

瘰瘰之證。多屬心脾肝三經。若自汗少氣。脈急。按之則減小者。此心氣之虛也。神砂妙香散。若氣盛神昏。筋攣。脈滿大。此心火之旺也。導赤散加芩連山梔。扶神犀角。若體倦神昏。不語。脈遲緩。四肢欠溫者。脾虛生風也。歸脾湯加鉤藤羌活。若寒熱往來。目上視。頭顛。脈弦急者。肝熱生風也。加味逍遙散。

醫通卷之六

瘰瘰

思得堂藏

加桂枝。○熱傷元氣。四肢困倦。手指麻木。時時瘰瘰。補中益氣湯去白朮加白芍五味。○暑風搐搦。如小兒驚風狀。緣先傷於暑。毛孔開而風乘之。局方香薷散加羌防蒼芍。○風虛昏憤。不自知覺。手足瘰瘰。口眼瞤動。或渴或自汗。積命黃散。○癰疽膿水過多。金瘡出血過多。及嘔血衄血下血後。或虛弱人誤汗誤下。氣血津液受虧。而致此者。大劑保元湯加芎歸鉤藤。兼生陰血。則陽火自退。不應。六君子加芎歸鉤藤。以補脾土。故小兒吐瀉之後。脾胃虧損。亦多患之。乃虛象也。無風可逐。無痰可消。當大補脾土為急。若陽氣脫陷者。補中益氣加薑桂。陽氣虛敗者。十全大補湯加薑附。亦有得生者。然筋搐頭掉。肢體惡寒。脈微細。人皆知為虛也。是為真象。至於脈大無力。發熱煩渴。是為假象。惟當固本為善。若無力抽搐。

就眠反折。汗出如珠。俱不治。○產後陰血去多。多有惡痰。婦人木門。

診。惡痰之脉。虛微細弱者。可治。弦緊急疾者。難愈。在暴病得之。爲風痰及肝火。襲於經脉之象。卽久病見之。亦屬痰火。乘虛肆虐之兆。凡新病得之。脉滿大數實者。搜滌風痰。最爲要著。久病得之。脉中寓搜。在所必需。設久病而脉實滿。暴病而脉虛微。法無可療之機也。

顛振

經云。寒氣客於皮膚。陰氣盛。陽氣虛。故爲振寒。寒慄。深師曰。振乃陰氣爭勝。故爲戰。慄則陽氣不復。故爲顛。○骨者髓之府。不能久立。行則振掉。骨將慄矣。○顛振與惡痰相類。惡痰則手足牽引。而或伸或屈。顛振則但振動而不屈也。亦有頭動而手不動者。蓋水盛則生風。生火。上衝於頭。故頭爲顛振。若散於四肢。則手足動而頭不動也。○經曰。諸風掉眩。皆屬於肝。若肝木實熱。瀉青丸。肝木虛熱。六味丸。肝木虛弱。逍遙散。加參朮鈎藤。○扶衰導痰湯。加竹瀝。○脾胃虛弱。六君子湯。加芎歸鈎藤。○衛虛多汗。惡寒。加黃耆二錢。附子五分。脾虛補中益氣。加鈎藤。○心血虛少。而振。平補正心丹。○心氣虛熱。而振。本方去肉桂。山藥。麥冬。五味。加琥珀。牛黃。黃連。名號珀養心丹。○心虛挾痰。而振。本方去龍齒。肉桂。山藥。麥冬。五味。加琥珀。川芎。膽星。麝香。甘草。爲秘方補心丹。○心虛挾血。而振。龍齒清魂散。○腎虛而行步振掉者。八味丸。十補丸。選用。○實熱積滯。可用汗吐下法。○戴人治馬。手足振掉。若線提傀儡。用湧法。出痰數升而愈。此必痰證。痰脉。而壯盛氣實者。不可不知。

診。顛振之脉。小弱緩滑者。可治。虛大急疾者。不治。間有沉伏。濡難者。必痰滯結。滯於中之象。凡久病脉虛。宜於溫補。暴病脉實。宜於峻攻。若久病而脉反實大。暴病而脉反虛弱。決無收功之理也。

舉

內經言。變皆屬肝。肝主筋故也。有熱有寒。有虛有實。熱變者。經所謂肝氣熱。則筋腹乾。筋腹乾。則筋急而變。六味丸加牛膝。腎陽之類。因於溼首如裹。溼熱不攘。大筋緩短。小筋弛長。緩短為拘。弛長為痿。先指瓜蒂散。次與羌活勝濕湯。○虛邪搏筋。則筋急。五積散。○血虛則筋急。增損四物湯。○劇勞筋脉拘急。疼痛少眠者。黃耆丸。更於暖室中。近火按摩為佳。○虛風襲於經脉。手足拘攣。屈伸短縮。腹痛。八甲屑俱青。轉筋。不思飲食。甚則舌卷囊縮。木瓜散。○拘攣癱瘓。口目喎斜。骨節疼痛。行步不正者。舒筋三聖散。○痺溼筋攣。骨痛者。續斷丸。○誤汗漏風。筋攣縮急。或方士用木鱉發汗。見風筋脉拘攣者。並宜桂枝湯倍桂加歸附。○病初起者。分表裏治。如

醫通卷之六

舉

思得堂藏

戴人用甘遂末三錢。積豬腎一枚。細批破。少用鹽椒泥透。摻藥末在內。荷葉包裹煨熟。溫酒細嚼。則上吐下瀉而愈。

石頭曰。舉證人悉知為寒。不知亦有屬血枯而熱者。蓋寒則歷逆而痛。熱則歷熱而枯。至於溼熱下流。又為實證。則痔瘡便秘。以此辨之。虛實寒熱。可判然胸臆矣。

診。舉者拘攣。浮緩屬風。沉細為溼。洪緩溼熱。濡細寒溼。虛大氣衰。小弱血虛。尺中弦弱。腎虛精竭。若久病而脉反實強。乍病而見虛瀼。雖有合劑。難於圖治也。

石頭治包山勞役。年高。舉廢。山中諸醫用木瓜獨活。防己。希蒼威靈仙之類。將半年餘。乃致跬步不能動移。或令服八味丸。亦不應。診其脉。尺中微浮而細。時常九夏自膝至足。皆寒冷。如從水中出。知為腎虛風雨所犯而成是疾。

遂授安腎丸方。終劑而能步履。連服二料。終無痿弱之狀矣。

醫通卷之六

舉

舉

思得堂藏

眩暈

經曰。因於風。欲如運樞。起居如驚。神氣乃浮。內經論眩。皆屬於木。屬上虛。仲景論眩。以痰飲為先。丹溪論眩。兼於補虛治痰降火。

戴復菴云。有頭風證。耳內常鳴。頭上如有鳥雀啾啾之聲。切不可全謂耳鳴為虛。此頭腦扶風所致。有眩暈之甚。擡頭則屋轉。眼常黑花。觀見常如有物飛動。或見物為兩。宜三五七散。或秘旨正元散加鹿茸。兼進養正丹。不効。一味鹿茸。每服半兩。酒煎去滓。入麝少許。緣鹿茸生於頭。頭暈而主以鹿茸。蓋以類相從也。曾有服頭痛藥不愈。服茸殊丹而効。此為虛寒也。若實者用之。殆矣。故丹溪曰。眩暈不可當者。大黃三次。酒炒乾為末。茶調下。每服一錢至二錢。

醫通卷之六

眩暈

思得堂藏

劉宗厚曰。眩暈乃上實下虛所致。所謂虛者。血與氣也。所謂實者。痰涎風火也。經云。上虛則眩。又云。徇蒙招尤。目眩耳聾。下實上虛。則與劉氏所稱。無乃冰炭乎。蓋邪之所湊。其氣必虛。留而不去。其病為實。亦何冰炭之有。然當以脈法辨之。寸口大而按之即散者為上虛。以鹿茸法治之。寸口滑而按之益堅者為上實。以酒大黃法治之。

外感六淫。內傷七情。皆能眩暈。然無不因痰火而作。諸云。無火不動痰。無痰不作暈。須以清火豁痰為主。而兼治六淫之邪。無不愈者。風寒在腦。或感邪淫。頭眩重痛欲倒。嘔逆不止。三因芍藥湯。冒雨或中溼。眩暈嘔逆。頭重不食。本方去細辛。其茶加半夏茯苓。惡風眩暈。頭旋眼黑惡心。見風即復作者。半夏蒼木湯。風虛眩暈多痰。導痰湯加天麻。腎

氣素虛而逆者。沉香降氣下養正丹。不應八味丸。風熱眩暈。眼掉。川芎茶調散。痰厥眩暈。半夏白朮天麻湯。痰火眩暈者。二陳湯加白朮川芎天麻。有熱更加山梔黃芩。七情鬱而生痰。亦令頭眩。但見於鬱悵之人。及婦女單二陳加木香丁香白朮砂仁。早起眩暈。須臾自定。乃胃中老痰使然。古方用黑錫丹劫之。不若青礞石丸鎮墜。後用理中丸調

理。痰結胸中。眩暈惡心。牙皂末和鹽湯探吐。吐定服導痰湯。勞役過度。眩暈發熱者。補中益氣湯加天麻。兼服逆六君子湯。氣虛而喘。加黃耆。陰虛火炎痰盛。少加熟附子煎成。加薑汁竹瀝。因虛致眩。雖定後。而常欲向火。欲得暖手按者。陽氣不足故也。附子理中湯。淫慾過度。腎與督脈皆虛。不能納氣歸源。使諸逆奔上而眩暈。六味丸加沉香鹿茸。各

醫通卷之六

眩暈

思得堂藏

香茸八味丸。肥白人眩暈。清火降痰為先。而兼補氣藥。黑瘦人眩暈。滋陰降火為要。而帶抑肝之劑。胃中有死血。作痛而眩。飲韭汁酒良。產後血暈。見婦人本門。

診。左手脈數熱多。脈滑有死血。浮弦為肝風。右手滑實痰積。脈大是久病。虛大是氣虛。

石頑治司業董方南夫人。體雖不盛。而恒有眩暈之疾。診其六脈皆帶微弦。而氣口尤甚。蓋緣性多鬱怒。怒則飲食不思。恒服消導之味。則中土愈困。飲食皆化為痰。痰從火化而為眩暈矣。豈平常肥盛多淫之痰可比。例乎為疏六君子方。水泛為丸。服之以培中土。中土健運。當無敷化不及。留結為痰。而成眩暈之慮。所謂治病必求其本也。胡客梁姓者。初至吳會。相邀石頑往診。時當夏月。裸坐盤

發倍於常人而形偉氣壯熱汗淋漓於頭項間診時不言所以切其六脈沉實不似有病之脈惟兩寸略顯微數之象但切其左則以右掌抵額切其右則易左掌抵額知其肥盛多淫而夏暑久在舟中時火鼓漲其痰而為眩暈也詢之果然因與導痰湯加黃芩澤瀉茅朮厚朴二服而安又治松陵貢士吳友良年逾古稀頭目眩暈乃弟周維素捐岐黃與神中益氣數服始用人參一錢加至三錢遂寤寐不食坐不得卧三晝夜喃喃不休仲君孝廉謙六相延石頑往候見其面赤進退不常左頰聾聾動診其六脈皆促或七八至一歇或三四至一歇詢其平昔起居云是知命之年便絕慾自保欲啖自強此壯火熾陰而乘肝風上擾之兆與生料六味除去茱萸易入鈎藤大劑煎服是夜即得酣寢其後或加龍甲或加龍齒或加棗仁有時妄動怒火遽且不寧連宵不已則以秋石湯送靈砂丹應如桴鼓盛夏酷暑則以小劑生脈散代茶後與六味全料調理至秋而安

神志門

癲

經曰人生而病癲疾者名為胎病此得之在母腹中時其母有所驚氣上而不下精氣并居故令子發為癲疾也○病初發歲一發不治月一發不治月四五發名曰癲○癲疾脈搏大滑久自已脈小堅急死不治○癲疾之脈虛則可治實則死○癲陰則為癲疾

癲雖為陰若得搏大滑脈故自已若得小堅急為陰脈之極也故不治虛則邪氣未盛故可治實則純乎邪矣故死難經曰重陰者癲○癲病始發意不樂直視僵仆其脈三部陰陽俱盛是也

脈經曰陰附陽則狂陽附陰則癲○陽附陰者腰已下至足

熱腰上寒也陰附陽者腰以上至頭熱腰下寒也○癲之為證多因鬱抑不遂佗條無聊所致精神恍惚語言錯亂或歌或笑或悲或泣如醉如狂言語有頭無尾穢潔不知經年不愈皆由鬱痰鼓塞心包神不守舍俗名痰迷心竅安神豁痰為主先以控涎丹涌出痰涎後用安神之劑○怒動肝火風痰上盛而發癲狂導痰湯加苓連菖遠煎成入硃砂沉香磨汁調服○言語失倫常常戲笑不發狂者心虛也定志湯加薑汁竹瀝隔間微痛者兼有瘀血加琥珀鬱金○癲疾因思慮而得者先與補涎散後用歸脾湯加辰砂末調補之○心經蓄熱時時發躁眼鼻覺熱者定志九加苓連麥冬牛黃實者涼膈散加川連麥冬菖蒲○癲病語言錯亂神氣昏惑者千金防已地黃湯○因思慮妄想不到致神不

守舍而妄言妄見。若神祟所憑。初起用半夏茯神散。數服自愈。若日久為湯藥所汨。神出舍空。非大劑獨參加薑汁竹瀝填補其神。不能克應。有病癲人。專服四七湯而愈。蓋氣結為痰。痰飲鬱閉其神識也。癲疾既久。動輒生疑。面色痿黃。或時吐沫。默默欲眠。此蟲積為患。妙功丸。若癲哭呻吟。為邪所憑。非狂也。燒蠶紙酒水下方寸匙。

李士材治張少搭女。以喪子悲傷。忽雷雨交作。大恐苦無所避。且日或泣或笑。或自語。或罵詈。如中鬼祟。診其心脈浮滑。餘皆沉細。此氣血兩虧。憂恐傷心。心傷則熱。熱積生風也。以滾痰丸用桔梗延胡索陳皮杏仁煎湯送下。出痰積甚多而愈。

狂

經云。狂始生。先自悲也。喜忘苦怒善恐者。得之憂。狂始發。少臥不饑。自高賢也。自辨智也。自尊貴也。喜罵詈。日夜無休。狂言善驚善笑。好歌樂。妄行不休者。得之大恐。狂目妄見。妄聞善呼者。少氣之所生也。狂者多食。善見鬼神。善笑而不發於外者。得之有所大喜。足陽明之脈病。惡人與火。聞木音則惕然而驚。病甚則棄衣而走。登高而歌。甚至不食數日。踰垣上屋。四股者。諸陽之本也。陽盛則四股實。實則能登高也。熱盛於身。故棄衣欲走也。陽盛則妄言。罵詈不避親疎。而不欲食。不欲食故妄走也。有怒狂者。生於陽也。陽者因暴折而難決。故善怒也。病名陽厥。陽明者常動。巨陽少陽不動。不動而動大疾。此其候也。奪其食則已。夫食入於陰。長氣於陽。故奪其食則已。使之服以生鐵洛為飲。夫生鐵洛者。下氣疾也。

此陽氣拂鬱。不得疎越。少陽膽木挾三焦相火。太陽陰火上逆。故使人易怒如狂。奪其食者。不使火助邪也。飲以生鐵洛者。金以制木。木平則火降。故曰下氣疾也。狂之為病。皆由阻物過極。故猖狂剛暴。若有邪附。妄為不避水火。罵詈不避親疎。或言未嘗見之事。非力所能。病反能也。上焦實者。從高抑之。生鐵洛飲。陽明實則脈伏。大承氣湯去厚朴加當歸鐵洛飲。以大利為度。在上者因而越之。來蘇膏或載入三聖散湧吐。其病立安。後用洗心散涼膈散調之。形證脈氣俱實。當湧吐兼利。勝金丹一服神効。雖數年狂凝無不克應。但不可誤施於癲癩之證。經云。悲哀動中則

傷魂傷魄則狂妄不精。不精則不正。當以喜勝之。以溫藥補魂之陽。龍齒清魂散。經云喜樂無極。則傷魄。魄傷則狂。狂者意不省。當以恐勝之。以涼藥補魄之陰。清神湯。肺虛喘急。加沙參。胃虛少食。加入參。肝虛驚恐。加羚羊角。熱入血室。發狂不識人。柴胡加犀角生地黃。挾血如見祟狀。當歸湯。血湯加酒大黃微下之。肝盛多怒狂妄者。鍼大敦在足大指上。屢驗。

一婦人狂言叫罵。歌笑非常。似祟憑。依一邊眼與口角。起。或作癲治。或作心風治。皆不効。乃是舊有頭風之疾。風痰作之。使然。用芎辛湯加防風。數服頓愈。

婦科鄭青山。因治病不順。沉思輒夜。兼受他醫謾言。心甚憤憤。天明病者霍然。憤喜交集。病家設酌酬之。而諷者已

醫通卷之六

狂

思得堂藏

通憤無從洩。忽然大叫發狂。同道諸名家治之罔効。一日口科王道來往候索。已服未服等方視之。一併毀棄。曰。此神不守舍之虛證。豈豁痰理氣清火藥所能克効哉。遂令覓上好人參二兩。一味煎湯服之。頓安。三服而病如失。更與歸脾湯調理而康。

癲

脈經云。面部左右彈者。陽證也。動則苦腰痠癲。惡風偏枯。僂仆半喎。身強皮痺。從少陽斜至太陽者。陽維也。動則苦癲。僂仆半喎。手足相引。甚者失音。不能言。從少陰斜至厥陰者。陰維也。動則苦癲。癲。尺寸俱浮。直上直下。此為督脈。腰背強痛。不得俯仰。大人癲病。小兒風癲。脈來中央浮。直上直下者。督脈也。動則苦腰背痠寒。夫癲。小兒癲也。巢氏妄立五癲之說。曰陽癲。曰陰癲。曰風癲。曰溼癲。曰馬癲。證治難出。殊不知癲癇之發。皆由肝腎龍雷上衝所致也。

癲病與卒中癲病相似。但癲病發時。昏不知人。卒然眩仆倒地。甚則癲癇抽搐。目上視。或口眼喎斜。或口作六畜聲。將醒時吐涎沫。醒後又復發。有連日發者。有一日三五次發者。若

醫通卷之六

癲

思得堂藏

中風中寒中暑中熱。則仆時無聲。醒時無涎沫。醒後不復發也。則癲癇亦屢發。然身體強直。角弓反張。不似癲之身軟。或為六畜聲也。癲證之發。由腎中龍火上升。而肝家雷火相從。挾助也。惟有肝風。故作抽搐。抽搐則通身之脂液逼迫而上。隨逆氣而吐。出於口也。陰氣虛。不能寧於內。則附陽而上升。故上熱而下寒。陽氣虛。不能周衛於身。則隨陰而下陷。故下熱而上寒。

丹溪主痰與熱。以星半苓連為主。熱多者。涼膈散加川連麥冬以泄之。痰多者。戴人三聖散以吐之。如驚者。東垣安神丸以平之。可下。以承氣湯下之。然後用安神平肝之劑。歸地牛黃硃砂青黛柴胡川芎之類。心熱痰迷心竅者。清神湯。病久而成癲。藥發日久。必至生蟲。妙功九神効。所與行

痰滌熱。癰證已愈。然須防其再發。宜十全大補加參仁遠志
麥冬。稟氣素虛者。鹿角膠經年常服。六味丸加遠志沉香。亦
不可缺。風癰發。項強直視。不省人事。此肝經有熱也。或
有咬牙者。為青丸合導赤散治之。如病發者。可用輕粉白礬
代諸石。發過米飲調下。重劑以鎮之也。○若起於鬱者。四七
湯加木香兩星。發時用前藥下鹽砂丹。不得卧。用養正丹。多
服。下黑錫丹。痰多者。導痰湯加木香竹瀝。○癰病。晝發。灸陽
驤。宜神中益氣加益智。夜發。灸陰驤。宜六味丸加鹿角膠。丹
礬丸。治五癰諸證。方用黃丹一兩。白礬二兩。銀礬中煨。通紅
為末。入臘茶一兩。不落。水豬心血為丸。葦豆大。硃砂為衣。每
服三十九。茶清送下。久服其涎自便出。服一月後。更以安神
藥調之。○久患氣虛。痰氣壅塞。須防卒變。不可妄許以治也。

醫通卷之六

癰

五

思得堂藏

○凡見目腫如魚者。不治。治之亦必無功。
石頭曰。癰證往往生於鬱悶之人。多緣病後本虛。或復感六
淫。氣虛痰積之故。蓋以腎水本虛。不能制火。火氣上乘。痰壅
藏府。經脈閉遏。故卒然倒仆。手足搐搦。口目牽掣。乃是熱盛
生風之候。斯時陰陽相薄。氣不得越。故逆作諸聲。證狀非一。
古人雖分五癰。治法要以補腎為本。豁痰為標。隨經見證用
藥。但其脈急實。及虛散者。不治。細緩者。雖久劇可治。
診。脈浮滑洪數為風癰。細弦微緩為虛癰。浮為陽癰。沉為
陰癰。虛弦為驚。沉數為實熱。沉實弦急者。不治。

煩躁與精神論

經云。氣亂於心則煩。蓋熱客於肺則煩。入於腎則躁。大抵心
火旺。則水虧金燥。惟火獨熾。故肺腎合而為煩躁也。○煩躁
俱作。有屬熱者。有屬寒者。先哲治煩躁不躁者。多屬熱。惟得
而煩者。為虛寒。治煩躁不煩者。多屬寒。惟火旺脈實者。為熱。
蓋煩者。胸中煩。為內熱也。躁者。身體手足躁擾。或裸體不欲
近衣。或欲投井中。為無根之外熱。急以附子理中四逆薑附
輩熱藥治之。若誤認為熱。投以涼藥。則周身之火。得水則升。
走。頃刻喘汗外脫而死也。○凡表證不得汗。內外皆熱。而躁
亂不寧。取汗則定。裏實熱鬱。大下不通。無論傷寒雜證。心
神不安。脈數實有力者。下之則定。○火客心包。或酒客膏粱。
上焦不消。令人煩躁。宜芩連山梔等涼藥為君。稍用炮薑為

醫通卷之六

煩躁

五

思得堂藏

使。甚則涼膈散下之。○汗下後熱不止。而發狂煩躁。面赤咽
痛者。此熱乘少陰之經也。草歷苦酒湯探吐之。

虛煩與雜論

經云。夏原者。心也。其不及者。令人煩心。○肝虛腎虛脾虛。皆令人體重煩冤。是知煩多生於虛也。○大法津液去多。五內枯燥而煩者。八珍湯加竹葉棗仁麥冬。○營血不足。陽盛陰微而煩者。當歸補血湯下。硃砂安神丸。或生脈散加歸地棗仁竹茹之屬。○腎水下竭。心火上炎而煩者。大劑生料六味丸。少用肉桂為引。○肥人虛煩。不眠為欲溫膽湯。○大病後有餘熱。嘔吐欬逆。虛煩不安。竹葉石膏湯。○五心煩熱。口乾唇燥。胸中熱悶。千金竹葉湯。○虛煩懊憹。顛倒不安。梔子豉湯。不應加犀角黑參。○久病餘熱不止。虛煩不安。臥寐不寧。六味丸加棗仁。○煩而小便不利。五苓散加辰砂滑石。○煩而嘔。不喜食。金匱橘皮竹茹湯。○胎前產後諸煩。見婦人

本門

醫通卷之六

虛煩

本

思得堂藏

譫妄

譫多言也。言為心聲。由火熾而鳴。故心熱則多言。猶醉而心熱。故多言也。或寐而多言者。俗云睡語。熱之徵也。若熱甚難寐。而神昏不清。則譫語也。妄虛妄也。火為陽。故外清明而內濁。其主動亂。故神志失常。如見鬼神也。夫血氣者。身之神也。神既衰乏。痰客中焦。妨礙升降。不得運用。以致十二官各失其職。視聽言動。皆有虛妄。蓋虛病痰病。有似鬼祟。宜清神湯。或平補鎮心丹。去肉桂山藥既味。加琥珀磨星麝香。大便不通。心腹脹滿。刺痛。口紫氣急者。此為實。涼膈承氣選用。若作邪祟治之。以金石必死。○產後譫妄。見婦人本門。

石頭治文學黃無潔譫振。譫妄顛仆。數月以來。或六七日一發。或二三日一發。或一日二三發。發則大吐涎水血

醫通卷之六

譫妄

空

思得堂藏

沫。或一日半日而發。或二三時而發。醫購不靈。近於邪祟。術士皆言宿孽所致。晝夜恆見亡甥僕婦二鬼纏綿。或時昏憤不省。或時妄言妄見。精氣不時下脫。不能收攝。服二冬二地連藥金櫻石蓮之屬。無算。反加作渴不食。後延石頑診之。脈來寸盛尺微。前大後小。按之忽無。舉之忽有。知為神氣浮散之候。因與六君子加龍齒菖蒲遠志。送養正丹。間續而進。前後共六七服。是後譫妄顛仆。絕不復發。邪祟亦不復見。惟愛泄為平時固疾。不能霍然。更與平補鎮心丹兩月而安。其專人及昆弟親戚。咸謂金石之藥。能鎮鬼神。曷知從前譫妄。皆神氣浮散之故。得養正鎮攝之功。當無神魂飛越之患矣。因識此以破杯影弓蛇之惑。

循衣摸床

循衣摸空摸床。多是大虛之候。不問雜病傷寒。以大補之劑投之。多有得生者。許學士謂。肝熱風淫末疾。故手爲之循衣。撮空。其人必識語妄言。經謂肺入火爲譫妄是也。○海藏云。婦人血風證。因大脫血崩漏。或前後失血。因而枯燥。其熱不除。循衣撮空摸床。則目不醒。揚手擲足。搖動不寧。錯語失神。脈弦浮而虛。內躁之極也。生地黃黃連湯主之。熱極神昏。十餘日不大便。腹脹喘滿。氣羸鼻乾不潤。上下通躁。脈沉實而滑。此地道阻塞不通之故。急宜涼膈承氣下之。若熱乘肺金。氣虛不能主持。又手冒心。循衣撮空。識語昏沉。不省人事。節菴升陽散火湯。小便利者可治。不利者不治。按涼膈承氣氣藥也。自外而入內者用之。生地黃黃連湯血藥也。自內而至

醫通卷之六

循衣摸床

空

思得堂藏

外者用之。升陽散火湯。氣虛火乘藥也。內外合邪者用之。三方俱治不大便者。○病人手循衣縫。譫語者不可治。病人陰陽俱絕。掣衣撮空妄言者死。撮空服承氣下之後。脈弦者生。濡者死。

喜笑不休

經云。神有餘則笑不休。○精氣并於心則喜。○心主手厥陰之脈。是動則病目黃。喜笑不休。河間云。喜笑者。皆心火之盛也。五行之中。惟火有笑。昔人治笑不休。口流涎。用黃連解毒湯加半夏薑汁竹瀝而笑止。戴人治一婦。病喜笑不休。已半年矣。以鹽塊二兩。燒令通赤。放冷研細。河水煎服。搦吐出熱痰五升。次服降火之劑。不數日而笑定。內經曰。神有餘則笑不休。此所謂神者火是也。火得風而成焰。笑之象也。倪惟德治一婦。病氣厥。笑哭不常。人以爲鬼祟所憑。診之六脈俱沉。胃脘必有積。遂以二陳湯導之。吐痰升許而愈。此積痰類祟也。

醫通卷之六

喜笑不休

空

思得堂藏

怒

經云。暴怒傷陰。○怒則氣逆。○陰出之陽則怒。○血并於上。氣并於下。心煩冤善怒。怒屬肝。經云。在藏為肝。在志為怒。又云。肝藏血。血有餘則怒是也。生鐵洛飲。大小柴胡柴胡疎肝。四七。四磨。越鞠七氣。沉香降氣等。皆治善怒致病之藥。丹後治怒方。香附末六兩。甘草末一兩。和勻。白湯調下二錢。日再服。

醫通卷之六

怒

金

思得堂藏

悲

經云。精氣并於肺則悲。○在藏為肺。在志為悲。○悲。肺之志也。金本燥。能令燥者火也。心火主於熱善痛。故悲痛苦惱者。心神煩熱躁亂而非清淨也。所以悲哭而五液俱出者。火熱亢極而反兼水化制之也。金匱云。婦人藏燥。善悲傷欲哭。有如神靈所作。數欠伸。甘麥大棗湯主之。

藏燥者。火盛燥津。肺失其潤。心系了戾而然。故用甘草。緩心系之急。而潤肺燥。大棗行脾胃之津。小麥降肝火之逆。火降則肺不燥。而悲自已也。

戴人云。少陽相火。凌燥肺金。金受屈制。無所投告。肺主悲。故但欲痛哭為快耳。

醫通卷之六

悲

金

思得堂藏

石頑曰。凡肺燥悲愁欲哭。宜潤肺氣。降心火為生。余嘗用生脉散。二冬膏。並加薑棗治之。未嘗不隨手而効。若作顛疾。用金石藥則誤矣。

驚

經云。東方青色。入通於肝。開竅於目。其病發驚駭。諸病胎。胎。發驚駭。皆屬於火。足陽明之脉病。惡人與火。聞木音。則惕然而驚。驚則心無所歸。慮無所定。故氣亂矣。身體。日減。氣虛無精。病虛無氣。洒洒然如驚。驚者乎之。

夫驚雖生於心。而肝膽脾胃皆有之。驚是火熱。燥動其心。心。動而神亂也。若因內氣先虛。故觸事易驚。或卒然聞響。大。聲。目擊異物。遇險臨危。皆使人有惕惕之狀也。驚則氣亂。鬱。而生火。生涎。涎與氣搏。變生諸證。或短氣。或自汗。或眠多異。夢。隨即驚覺。並宜溫膽湯加熟棗仁。如遠志丸。妙香散。平補。正心丹。龍齒清心散。皆可選用。即多驚。口中有聲。溫膽湯。下遠志丸。即多驚。應遺洩者。補膽防風湯加羌活桂枝。此下。

醫通卷之六

驚

思得堂藏

焦風寒。宜風藥行經也。若氣鬱生痰。而驚悸不眠者。四七湯。加茯神。遠志。石菖蒲。○大抵驚則神出於舍。舍空則痰飲乘。虛。襲入。其神不得歸焉。亦有肝虛風鬱之者。本學方治。即則。驚。夢。飛。揚。驚。悸。多。履。通。夕。不。寐。先用獨活湯數劑。後用珍珠。母丸。神効。蓋因肝藏本虛。虛風內襲。所以竟遊無定。肝藏。竟。者。也。風。氣。水。飲。乘。虛。襲。入。於。肝。是。以。竟。不。寧。而。飛。揚。若。離。體。狀。若。作。心。血。虛。治。必。殆。此。證。最。易。溫。怒。小。怒。則。驚。悸。轉。劇。虛。火。不。時。上。升。豈。非。肝。藏。受。困。之。驗。歟。二。方。非。深。明。木。盛。生。風。木。搖。生。火。之。理。不。能。識。其。奧。妙。不。能。用。以。建。功。也。診。○寸口脉動為驚。驚者其脉止而復來。其人目睛不轉。不。能。呼。氣。

石頑治河南督學汪絨菴。後病虛無氣。洒洒然如驚。

常時款青黑結痰。欬欬則心中憊憊大動。欬則渾身麻木。

心神不知所之。偶聞一聲響。則頭面開熱微汗。神竟如飛。越狀。專事婦科者。屢用補養心血之劑。罔効。虛羸轉劇。遂。石頑診之。脉浮微弦而芤。獨左寸厥厥動搖。此必胎前。先。傷。風。熱。坐。草。時。進。力。過。甚。痰。血。隨。氣。上。逆。衝。過。膈。膜。而。流。入。心。包。也。朝。用。異。功。散。加。童。便。煨。煨。粉。以。清。理。痰。氣。夕。用。大。劑。獨。參。湯。下。來。復。丹。以。蒐。滌。瘀。積。蓋。痰。在。膈。膜。之。上。非。始。硝。無。以。透。之。血。在。膈。膜。之。上。非。五。靈。無。以。清。之。然。非。藉。人。參。相。反。之。性。不。能。激。之。使。出。也。服。數。日。神。識。漸。寧。形。神。漸。旺。改。用。歸。脾。湯。加。龍。齒。沉。香。調。理。而。康。

又治吳昭如室。年壯體豐。而素有嘔血腹脹。脾約便難之。恙。兩。遭。回。祿。憂。患。頻。承。近。於。失。血。之。後。忽。然。神。氣。憤。亂。口。

醫通卷之六

驚

驚

思得堂藏

噤目眩。乃導周渭文秉燭相邀。診其氣口。數盛而促。人迎。強。大。而。孔。形。神。不。能。自。主。似。有。撮。空。之。狀。謂。老。以。為。證。犯。條。欬。不。出。五。日。當。斃。予。謂。不。然。若。是。撮。空。必。然。手。勢。散。漫。今。拈。著。衣。被。偏。力。拈。摘。定。為。扶。驚。挾。怒。無。疑。爪。者。筋。之。餘。非。驚。怒。而。何。况。脉。來。見。促。當。是。痰。氣。中。結。殊。非。代。脉。之。比。詢。其。病。因。驚。怒。俱。有。遂。勸。一。方。用。釣。藤。鈞。一。兩。煎。成。入。竹。瀝。半。盞。薑。汁。五。七。連。夜。製。服。明。日。復。延。往。候。云。服。藥。後。即。得。安。寐。六。脉。亦。已。稍。平。但。促。未。退。仍。用。前。方。減。半。調。牛。黃。末。一。分。其。夕。大。解。三。度。共。去。結。糞。五。六。十。枚。腹。脹。頓。減。脉。靜。入。安。稀。糜。漸。進。數。日。之。間。平。復。如。常。

悸

金匱云。寸口脈動而弱。動則爲驚。弱則爲悸。

驚自外邪觸入而動。故屬陽。陽變則脈動。悸自內恐而生。故屬陰。陰耗則脈弱。

心下悸者。半夏麻黃圓主之。

此形寒飲冷。經脈不利。水停心下而致動悸。故用麻黃以散督中寒。半夏以散心下水。與傷寒水停心下。用小青龍湯無異。首論以脈弱爲悸。而此湯用麻黃半夏散寒治水。知其脈必不弱。非強即緊。蓋脈弱爲心氣不足。豈此藥所宜用乎。用圓不用湯者。取緩散水。不取急汗也。

卒嘔吐。心下痞。胸間有水。眩悸者。半夏茯苓湯主之。

嘔逆痰飲。爲胸中陽氣不得宣散。眩亦上焦陽氣不能升。

醫通卷之六

悸

六八

思得堂藏

發所致。故半夏生薑並治之。悸則心受水凌。非半夏可獨治。必加茯苓以去水。水去則神安而悸愈矣。

假令瘦人。臍下有悸。吐涎沫而顛眩。此水也。五苓散主之。一瘦人。火水之盛。爲水邪抑鬱。在陰分不得升發。故於臍下作悸。及至鬱發。轉入於陽。與正氣相擊。在頭爲眩。在項爲顛。腎液上逆。爲吐涎沫。故用五苓以伐腎邪。利水道。水去火自安矣。

悸卽怔忡之謂。心下惕惕然跳。築築然動。怔忡忡忡。本無所驚。自心動而不寧。卽所謂悸也。心虛而停水。則胸中滲漉。水既上乘。心火惡之。心不自安。使人有怏怏之狀。常築築然動。是則爲悸。蓋水衰火動。則爲煩。水乘火位。則爲悸。原病式曰。水衰火旺。必煩渴引飲。水停心下。而爲悸也。心下悸有氣。

虛血虛。屬飲屬火之殊。夫氣虛者。由陽氣內微。心下空虛。內動爲悸。心氣不定。五藏不足甚者。憂悲傷不樂。忽忽喜忘。

驚悸狂眩。千金定志九。千金茯苓神湯。或六君子加菖蒲遠志。

血虛者。由陰氣內虛。虛火妄動。歸脾湯加丹參麥冬。停飲者。水停心下。侮其所勝。心主畏水。不能自安。故惕惕而動。半夏茯苓湯。茯苓甘草湯。或二陳湯加白朮豬苓澤瀉。有表邪挾。

飲。半夏麻黃丸。小青龙湯。選用。火旺者。因水不能制火。故時。

悸時煩。躁動不寧。天王補心丹。不應。六味九。加五味麥冬。遠。

志。有邪氣攻擊而悸者。宜審其何邪而後治之。有營衛滯流。

脈未結代者。必補氣益血。生精。炙甘草湯。因痰飲而悸。導痰。

湯加棗仁。有時作時止者。痰因火動也。溫膽湯加川連。有。

醫通卷之六

悸

六九

思得堂藏

誤自悔。懷懷嗟吁。獨語書空。若有所失。溫膽湯加人參。栝子仁。胸中痞塞。不能飲食。心中常有歉。愛居暗處。或倚門後。見人則驚。過無地。此卑慄之病。霍香正氣散。虛者人參養營湯。有真心跳。乃血少。非驚悸也。又或夢中如墮。若崖。或睡中忽自身體跳動。此心氣不足也。歸脾湯下珠砂安神丸。肥人多屬痰飲。瘦人多屬血虛。陰火上衝。夫悸之證狀。不齊。熱不外於心。傷而火動。火鬱而生涎也。若夫虛實之分。氣血之辨。痰與飲。寒與熱。外感六淫。內傷七情。在臨證辯之。診。沉細屬飲。結代者。虛而有飲。虛弱者。屬氣虛。沉數者。爲血熱。尺中弦緊。爲腎氣凌心。寸口脈動而弱。動則爲驚。弱則爲悸。

石頑治老僧悟菴。心悸善恐。通脈補養心血之藥。不應。天。

王補心月服過數劑。悸恐轉增。而目四肢微有浮腫之狀。乃求治於石頑。察其形肥白不堅。診其脈濡弱而滑。此氣虛痰飲侵於膈上也。遂以導痰湯稍加參桂。通其陽氣。數服而悸恐悉除。更以六君子加桂水浸作丸。調補中氣而安。

恐

經曰。心怵惕思慮則傷神。神傷則恐。恐則心怯。神傷則心怯。心怯則心下悸。恐人將捕之。肝病者如人將捕之。○腎病者。心怵惕如人將捕之。○心胞絡是動。心中悸。大動。○精氣并於腎則恐。○胃為恐之土。故也。○恐則精却。却則上焦閉。閉則氣還。還則下焦脹。故氣不行矣。○腎虛精虛其不足也。

恐者似驚悸而實非。忽然心中恐懼。如人將捕之狀。屬腎本藏而傍及於他藏。治法則有別焉。○治腎傷者。宜補精氣。六味丸加枸杞遠志。治肝虛者。宜養陰血。六味丸加棗仁龍齒。治陽明者。壯其氣。四君子加木香。治心包者。鎮其神。遠志九加硃砂琥珀犀角。頭眩而恐。脈弦無力。屬膽虛。六君子加柴胡。

防風當歸。兼進加減八味丸。○膽虛目暗。喉痛數唾。眩冒五色所障。夢見爭訟。恐懼面色變者。補膽防風湯。○勞心思慮傷。驚者。麻黃善恐。夢寐不寧。一味鹿角膠酒溶多服。○腎藏陽虛善恐。八味丸。

健忘

經云。上氣不足。下氣有餘。腸胃實而心肺虛。虛則營衛留於下。久之不以時上。故善忘也。

按內經之原。健忘者。俱貴之心腎不交。心不下交於腎。濁火亂其神明。腎不上交於心。精氣伏而不靈。火居上。則因而為痰。水居下。則因而生躁。躁擾不寧。是以健忘也。治法。心氣不足。妄有見聞。心悸跳動。恍惚不定。千金扶神湯。思慮過度。病在心脾者。歸脾湯。按虛痰者。加薑汁竹瀝。精神短少。入參養營湯。送遠志丸。痰迷心竅者。導痰湯加木香。上虛下熱。天王補心丹。心火不降。腎水不升。神明不定。而健忘。六味丸加五味遠志。心氣不定。恍惚多忘。四君子去白朮加菖蒲遠志珠砂。等分。蜜丸服。心氣不足。精神恍惚。少睡。夜多盜汗。怔忡健忘。通卷之六

健忘

健忘

健忘

健忘

忘。辰砂妙香散。痰積於內而善忘。如狂。代抵當丸。

石頑曰。因病而健忘者。精血虧少。或為痰飲瘀血所致。是可

以藥治之。若生平健忘。乃心大衰。疎之故。豈藥石所能療乎。

故凡開鑿提挽之方。悉行裁汰。

入魔走火

人天境內三教同源。入聖超凡。趨舍各異。醫司蒼生之命。體法王之心。凡三教大流。疾厄之苦。如萃一身。皆當貫徹其旨。庶無自欺之弊。昔聞師尼寡婦之治。與常人有別。豈稱子泰堂打七之入魔。煉士坐功運氣之走火。與常人無異耶。余雖不敏。業嘗究心斯道。遍考方書。從無及此。每見呆修行人。見性不與往往。入於魔境。或喪志如木偶。或笑啼癡妄。若神祟所憑。良由役心太甚。神出舍空。痰火乘機所致。詳推治例。與不得志人鬱悒。佗係之候。不甚相遠。但其間多扶五志之火。雖有虛證。虛脈。一切溫補助陽。滋精藥。藥不可施。多有瘵瘵安神不應。服大劑獨參湯而愈者。有安神補氣不應。服六味地黃兼滋腎丸而愈者。有瀉痰降火不應。後服天王補心丹

入魔走火

入魔走火

入魔走火

入魔走火

經歲不輟而愈者。然此皆下根人。執迷不省。隨其所著。而流入識神矣。更有業種魔根。說遇名師。為藏身悔過之地。始焉非不勇猛。善知識見其畧有見地。稍加策厲。安知其進銳者其退速。未幾本性熾然。恣行貪著。集成異端。噴癡暴戾。淫殺盜妄。靡所不至。此宿世定業。雖諸佛不能化導。豈藥石能治乎。至於修真煉氣之士。不求自然之旨。刻以吐納為務。乃至氣亂於中。火熾於外。而為怔忡痞逆。躁擾不寧等患。慎不可妄行耗氣散表之藥。為害莫測。況有不能秘精養神。真氣不能外廓內充。為風寒所侵。水穀所犯。惟黃著建中。枳實理中為正治。其餘七情六氣。以意逆之。或有過劑傷中。虛火為患。者大劑獨參湯以飲之。即有得其術者。真氣初調之時。一身陰氣趕散。腹痛腸鳴不已。蟲垢悉從魄門而出。是後真氣方

得內守可以結胎可以辟穀當此切勿誤認爲病而餌湯藥以耗真氣不特前功盡廢且有性命之虞亦有居處失宜不能調制其火胎息不安者獨參湯送養正丹取丹砂鉛汞之同氣相求自然胎息安和醫師不悟見其灼熱燔蒸誤認客邪散表勢必崑崙飛焰玉石俱焚矣不特發表當禁一切辛散走氣苦寒傷陽沉降助陰藥咸宜遠之大抵煉氣之道以陽爲寶純陽爲仙純陰則鬼此理之最顯者用藥不可不知近世醫術淺陋藥石無功多有沿襲坐功却病之法不過欲斷除妄念勘破關頭味者不能果決每致壯火飛騰頭面赤熱膈塞心忡喘逆蒸汗而成上脫之候亦有陰氣消亡強陽不制精髓不固二便引急而成下脫之候急乘欲脫未脫時峻投保元湯下靈砂丹以救上脫數進生料六味下黑錫丹

醫通卷之六

入魔走火

苦

思得堂藏

以固下脫屢奏奇功於反掌間當知精津血液總藉神氣之統攝也曷觀世俗三教所習趨舍雖異而致病之由皆不離於色相苟能靜究其理妄希圖治而曰無賊於人吾未敢信以爲然

養性論

養性之道從古醫林未之及也惟係真人千金方後述之頗詳近于衍釋其義三復讀之要非予心所謂養性之旨也夫所謂養性者務竭己靈以開天下後世學道人之心眼則吾性常留宇宙間庶得養之道若從事平煉形食氣徒資一己之私烏得謂之道耶嗟予素秉秉味不達名師之點勘賴有先哲遺言得以煥發性靈以資利濟之用因於千金方中檢得二方一爲耆婆大士萬病丸一爲西嶽真人靈飛散迥出意表其萬病丸方業經收入局方雖有癰疽瘰癧黃腫水病癰痺瘡癤種種諸治詳其方下首治七種痞塊因以隸諸積聚門中予嘗以療歷年不愈諸治不効遂入骨髓諸病靡不隨手取應不特方下諸治也至靈飛散方僅見靈寶七箋

醫通卷之六

養性論

苦

思得堂藏

方書曾未採錄方中雲母功專扶陽力能辟除三尸蕩練五藏佐以鍾乳之補真陽人參之安五藏茯苓之守正氣桂心之利關節柏仁之益聰明菊花之清神氣續斷之續筋骨地黃之填骨髓天門冬之滋津液與雲母同爲殺三蟲伏尸之專藥攷諸本經一皆輕身延年之仙品洵爲修身養性靜功服食之首推孫子餌之尸解良由雲母性善靈飛使然較之老彭鹿角丸專取血肉之味培理血肉之軀宗旨懸殊趨舍各別第以石藥性悍服之恐有未安不無遺恨將來之慮於是力行修製親爲嘗試但初服兩三月間或時稍有頭旋眼黑服及半載漸覺步履輕捷足膝不能自主此藥力潛上無以統攝其下也服至年餘視聽斯聰應酬無倦卽有六淫外侵五味內泊得此溫養之力力能自散無取他藥攻發也予

初服此見者莫不以之爲誕。迄今三易星霜而筋力猶然與
往昔無異。是以親屬交知。互相邀尤。間有服食之初。鼻中微
蜈。二三次而止者。亦有腹中微痛。剛下蟲血而安者。此靈藥
攻逐三尸積陰之故。積陰獨除。與陽日長。色力日增。靈根日
固。觸境遇緣無非至道。道在日用常行。又何必離隔陰陽。鍊
形食氣。方爲至道哉。

張氏醫通卷之六終

醫通卷之六

張氏醫通

張氏醫通

張氏醫通卷之七

清

長洲石頑張

璐路玉



男

以柔安世

叅訂

日本

大泉長卷前田安宅子仁再訂

男

典子守

大小府門

泄瀉

靈樞云。夫中熱消痺則便寒。寒中之屬則便熱。胃中熱則消
穀。令人懸心善饑。臍以上皮熱。腸中熱則出黃如糜。臍以下
皮寒。胃中熱則腹脹。腸中寒則腸鳴。食泄。胃中寒。腸中熱則
脹而且泄。胃中熱。腸中寒則疾。飢小腹痛脹。

醫通卷之七

泄瀉

一

思得堂藏

世醫治病。但知熱以寒治。寒以熱治。外此總不講也。設病
中熱消痺。而見懸心善饑。洵爲熱證無疑。然必審其臍以
上皮熱。方是胃中熱。氣蘊隆。若出黃如糜。不但胃中有熱。
而腸中亦爲熱邪奔迫可知。倘臍以下皮寒。而見腹脹。有
似乎實熱固結。實爲胃中虛寒之候。或見腸鳴。食泄。非特
胃中有寒。且移寒於二腸矣。蓋熱泄則腸垢黃赤。寒泄則
驚漉清冷。此病機之最顯著者。可以明辨。況有脹而泄利
黃赤。此脹爲胃寒。陽氣不布之脹。泄爲腸熱便垢之泄。復
有消穀易飢。小腹脹痛之病。豈非胃中有熱。腸中有寒之
一驗乎。若此種種。苟未明仲景三瀉心湯。黃連湯。乾薑黃
芩黃連人參湯。厚朴生薑半夏甘草人參湯。乾薑人參半
夏丸等法。必不可以語至治也。

痰留於肺。大腸不固。或時渴。或時不渴。或多或少。或痰也。必弦滑。其人神色不祥。二陳加蒼朮木香。或探吐之更佳。腹痛甚而不泄。泄後痛減者。食積也。保和丸消導之。餐泄者。史記名迴風水穀不化。淫兼風也。風邪干胃。木來賊土。清氣在下。升陽除溼湯。若飲食下瀉。而輒出不留者死。○泄泄者。汚積粘垢。淫兼熱也。黃芩芍藥湯加香連。○驚瀉者。中寒。糟粕不化。色如鴨糞。所以澄澈清冷。小便清白。淫兼寒也。附子理中湯。○洞泄者。即名濡泄。體重軟弱。瀉下多水。淫自盛也。胃苓湯。○水液去多。甚而轉經血枯。故筋急也。升陽除溼湯。○滑泄者。久下不能禁。淫勝氣脫也。四柱飲。不應用六柱飲。○熱瀉。黃色赤黃。彈響作疼。糞門焦痛。糞出穀道猶如湯熱。煩渴小便不利。五苓散。瀉水多者亦必用之。若去桂即不

醫通卷之七

泄瀉

思得堂藏

効。○寒瀉。腹脹泄注。食即嘔吐。理中湯加肉桂。詞子升麻。○食久窘迫。大便色白。腸鳴切痛。脈沉遲。身冷不渴。溲清。或綿綿腹痛。附子理中湯加肉果。○夏暑暴瀉。如水。周身疼痛。汗出。脈弱少氣。甚者加吐。此名霍亂。漿水散。○盛暑逼於外。陰冷伏其中。非逆理湯不可。氣虛而瀉。四君子加升柴肉果。詞子。○傷食泄瀉。必噤氣如敗卵臭。保和丸。虛者。治中湯加減。○積滯泄瀉。腹必絞痛。方泄者是也。平胃散加磨積藥。○傷酒瀉。葛花解酲湯。○痰瀉。則頭暈惡心。胸腹迷悶。或時瀉甚。或時不瀉。二陳湯加海石香附星香。連。薑汁調。神麴糊丸。○有人患早起泄瀉。或時有血。午後仍便結實。能食善飲。此是酒積作瀉。二陳加炮薑酒炒川連紅麴。陳酒麴糊丸。烏梅湯下。有血去半。夏加磨少許。晨夕各一服。○日間無事。將

肺腹脹。一夜腸鳴。不得寬泰。次早洞泄。此名煩瀉。是脾虛淫盛也。胃苓湯加木香砂仁。虛者。理苓湯加木香。○氣泄。腸鳴。失氣。胸膈痞悶。腹脹而痛。瀉則腹下稍安。須臾又急。亦有腹急氣塞而不通者。此由中脘停滯。氣不流轉。水穀不分所致。致木香調氣散。○水瀉。入胃。名為溢飲。滑泄。渴能飲水。水下復泄。泄而大渴。茯苓甘草湯。五苓散。疳積大推。三五壯立已。乃督脈之病也。○泄而口渴。引飲。小便短濇。此為津液內亡。錢氏白朮散。○腎水不足之人患泄。或過服分利之劑。而瀉者。加減八味丸。失治必致小便不利。水腫脹滿等證。成矣。○凡大便泄。服理中湯。小便不利。大便反泄。不知氣化之故。本肺不傳化。以純熱之藥治之。是以轉泄。少服則不止。多服則愈熱。所以不分。五苓散。加入參炙甘草。名春澤湯。經云。膀胱者。

醫通卷之七

泄瀉

五

思得堂藏

州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。○瀉而腹熱。脈滑堅者。屬實。當與消導。不應是食積發熱也。如香連。更不應加大黃。微下之。○瀉而經年不止者。屬寒積。備急丸神効。○泄瀉惡心欲吐。或水土不伏。或感山嵐瘴氣。而瀉。藿香正氣散。○脾胃虛弱。內挾風冷。泄瀉注下。水穀不化。臍下疳痛。腹中雷鳴。乃積寒久利。腸滑不禁。木香散。若藥與食入口。即瀉下者。名直腸瀉。難治。本方加入參白朮。用伏龍肝湯煎服。○憂思太過。脾氣結而不能升舉。陷入下焦。而成泄瀉者。逍遙散去歸。加升麻木香。或越鞠枳朮相和服。不應用補中益氣加木香。○久瀉穀道不令。或脫肛。乃元氣下陷。大腸不行。收令而然。補中益氣加詞子肉果五味。烏梅肉為丸。或四君子加防風升麻。○老人消運不及。而瘳服作瀉。九味資生丸加木香。善

飲者加澤瀉肉桂。凡渴多因於溼。分利小水為上。若老人氣虛下陷。又宜風藥以勝之。如補中益氣加羌防之類。或升陽除溼湯升舉脾胃。所謂下者舉之。溼寒之勝以風平之是也。大渴氣脫而不知入口。眼俱閉。呼吸欲絕。急灸氣海穴。大進參附輩溫補之。稍遲即不可救。

五更渴是腎虛失其閉藏之職也。經曰。腎司開闔。腎開於二陰。可見腎不但治小便。而大便之開闔皆腎操權也。今腎既衰。則命門之火熄。而水獨治。故令人水瀉不止。其渴每在五更。天將明時。必渴泄二三次。以腎旺於亥子五更之時。故特甚也。惟八味丸以補其陰。則腎中之水火既濟。而開闔之權得宜。況命門之火旺。則能生土。而脾亦強矣。有用六味丸加沉香砂仁。以山藥末打糊代蜜為丸。以攝火歸源而愈者。

醫通卷之七

泄瀉

六 思得堂藏

有用六味丸加遠志益智。兼調脾胃而愈者。有用六味丸七分。雞二神丸三分。服之而愈者。有用五味子煎湯送四神丸者。有用二神丸加五味子山茱萸肉桂茴香。陳米飲糊為丸服者。亦有屬酒積食積者。蓋一日進取之物。至此時皆下大府而急奔也。但食積之瀉。其腹必脹滿。瀉後則頓減。瀉下皆足稀糞。酒積瀉下。都是稀沫。或有兼血積者。與腎瀉之純清水液迥乎不同也。審係何積。即以何積治之。不煩曰。泄瀉諸治法頗詳。何獨不及虛損之泄瀉也。蓋腎藏真陰。虛則火邪勝。火邪上升。必傷肺而為欬逆。真陽虛則水邪勝。水氣內溢。必漬脾而為泄瀉。既嗽且泄。上下俱病。先後天之氣並傷。故虛損關振全係乎此。余嘗用理中丸加五味子以治下泄。異功散加細辛以治上欬。每每獲効。若服之作

服發熱者。終難挽回。不可以其欬瀉俱緩。輕許其治也。診。內經云。脈細皮寒。氣少。泄利前後。飲食不入。是謂五虛。死。其漿粥入胃。泄注止。則虛者活。泄而脈大者難治。大便赤。其漿泄脈小者。手足寒難已。食泄脈小。手足溫者易已。脈經云。泄注脈緩。時小結者生。浮大數者死。又洞泄食不化。脈微小。留連者生。緊急者死。脈滑按之虛者。必下利。腎脈小甚。為洞泄。脾脈小為泄瀉。仲景云。下利日十餘行。脈反實者。為洞泄。而滿。四肢清。診其脈。洪大者死。腹大脹。四肢清。脫形。泄甚。不及一時而死。下則泄瀉。上則吐痰。皆不已。為上下俱脫。死。

醫通卷之七

泄瀉

七

思得堂藏

滑伯仁治一人。年老色蒼。夏月與人爭辨。冒雨勞役受。且犯房事。夜半忽病。發熱惡寒。上吐下瀉。昏悶煩躁。頭身俱痛。因自發汗。汗遂不止。脈皆洪數。蓋吐瀉內虛。汗多表虛。兼之脈不為汗衰。瀉減法在不治。姑以大劑參耆。兼白朮乾薑甘草。伏苓。陳皮。水煎不時服。至七劑。見面赤。四肢發出紅斑。凡斑證自吐瀉者。吉。謂邪從上下出也。但傷寒發斑。胃熱所致。今之發斑。由胃虛而無根之火遊行於外。可補不可泄。可溫不可涼。若用化斑升麻黑參之類。則死生反掌矣。仍服前方十餘劑而愈。又治一人。每日早起大瀉。或時腹痛。或不痛。空心服熱藥不効。令至晚食前服即効。以煖藥一夜在腹。可勝陰氣也。與酒客溼泄。服湯藥不効。服九散即効。同意。石頑治總戎陳孟庸。渴利腹脹作痛。服黃芩白芍之類。屢愈。愈甚。其脈洪盛而數。按之則濡。氣口大三倍於人。迎此

淫熱傷脾胃之氣也。與原朴生薑甘草半夏人參湯二劑。痛止脹減而渴利未已。與乾薑黃芩黃連人參湯二劑。渴利止而飲食不思。與半夏瀉心湯二劑而安。

痢

內經云。賊風虛邪者。陽受之。飲食不節。起居不時者。陰受之。陽受之。則入六府。陰受之。則入五臟。入六府。則身熱不時臥。上爲喘呼。入五臟。則腹滿閉塞。下爲發泄。久爲腸澼。賊風不云實邪。而言虛邪者。以邪之所湊。其氣必虛也。設陽氣充盛。雖有賊邪。莫能爲害也。起居不時者。非特勞役失宜。而飲食失節。亦在其中矣。陽受之。則入六府者。言六府之經氣受邪於外。則營衛氣塞。而身熱不時臥。上爲喘呼者。邪併於氣之象也。陰受之。則入五臟者。言五臟之神氣受傷於內。則水穀不能充運。留於腸胃。而腹滿發泄也。久爲腸澼者。言積氣久滯。不能統運津液。乃至移於二腸。而爲澼積。迫此。則陰氣受傷所致也。

腸澼。便血。身熱則死。寒則生。

腸澼。爲腸胃受病。不當更見表熱。表熱則內外俱困。陽無所依。故云熱則死。寒則生耳。

腸澼。下白沫。脈沉則生。浮則死。

腸澼。下白沫。爲裏氣不守。反見脈浮。中官無主。安得不死。腸澼。下膿血。脈懸絕則死。滑大者生。腸澼之屬。身不熱。脈不懸絕。滑大者生。弦濇者死。以藏期之。

懸絕。弦濇。皆氣血殆盡之脈。故主死。滑大爲邪實可攻之象。故主生。

脾脈外鼓沉。爲腸澼。久自已。肝脈小緩。爲腸澼。易治。

脾脈外鼓沉。言氣口脈盛。而按之有力。雖久可治。肝脈小緩。謂人迎脈而不大。無客邪乘脾之候。故易治。

聚水附湯證也

東垣云飲食一傷起居不時損其胃氣則上升清陽之氣反下降而為痰泄久則太陰傳少陰而為腸澼寒冷之物傷於中腹滿而脹傳為痰泄宜溫熱以消導之淫熱之物傷於中而下膿血者宜苦寒以疏利之風邪下陷者升舉之淫氣內盛者分利之裏急者下之後重者調之腹痛者和之洞泄腸鳴脈細微者溫之收之膿血稠粘數至而閉而不能便脈洪大有力者下之寒之此治痢之大法也

張介賓曰腸澼一證即今之所謂痢疾也其所下者或赤或白或膿或血有痛者有不痛者或裏急後重者有嘔惡脹滿者有噤口不食者有寒熱往來者雖其變態多端然總不外乎表裏寒熱而於虛實之辨尤為切要凡邪因表者必有表

醫通卷之七

痢

主思得堂藏

證但兼其表而行散之表邪解則痢自愈如無表證則必由口腹悉屬內傷但傷於內者極多因於表者則間或有之此內外之不可不辨也以寒熱言之則古以赤者為熱白者為寒至劉和問而非之曰如赤白相兼者豈寒熱俱甚於腸胃而同為痢乎至丹溪則因之曰赤痢乃是小腸來白痢乃是大腸來皆淫熱為本自二子之言出則後世莫敢違之者愚見則有不然夫痢起夏秋淫蒸熱鬱本乎天也因熱求涼過吞生冷由於人也氣壯而傷於天者鬱熱居多氣弱而傷於人者陰寒為甚須知寒者必虛熱者必實更以虛實細詳之而寒熱愈明矣如頭疼身熱筋骨痠痛者實也脈滿惡食急痛拒按者實也煩渴引飲喜冷畏熱者熱也脈強而實者實也脈數而滑者熱也外此則靡非虛寒矣而相似之際尤當

審察如以口渴為實熱似矣不知凡係瀉痢必亡津液液亡於下則津涸於上安得不渴更當以喜熱喜冷分虛實也以

腹痛為實熱似矣不知痢出於內腸胃必傷膿血稠粘安得不痛更當以痛之緩急按之可否藏之陰陽腹之脹與不脹脈之有力無力分虛實也以小便之黃赤短少為實熱似矣不知水從痢去漫必不長漫以陰亡溺因色變更當以裏之熱與不熱液之涸與不涸色之澤與不澤分虛實也以裏急後重為實熱似矣不知氣陷則君虛不藏陰亡則門戶不閉更當以病之新久質之強弱脈之盛衰分虛實也至於治法須求何邪所傷何臟受病如因於淫熱者去其淫熱因於積滯者去其積滯因於氣者調之因於血者和之新感而實者可通因通用久病而虛者可塞因塞用皆是常法獨怪世之

醫通卷之七

痢

主思得堂藏

病痢者十有九虛而醫之治痢百無一補氣本下陷而再行其氣後重不益甚乎中本虛寒而復攻其積元氣不愈弱乎淫熱傷血者自宜調血若過欲推滯血不轉傷乎津亡作渴者自宜止泄若但與滲利津不轉耗乎世有庸工專守痛無補法且曰直待痛止方可補耳不知因虛而痛者愈攻則愈虛愈痛矣脈來微弱者可補形色虛弱者可補口腹素慎者可補胸膈寬快者可補病後而痢者可補因攻而劇者可補後重之可補者陷則升而補之熱則涼而補之腹痛之可補者滑泄則瀉而補之虛寒則溫而補之然而尤有至要者則在脾胃二臟如瀉而後痢脾傳胃為賊邪難療痢而後瀉胃傳脾為微邪易醫是知胃為胃關開竅於二陰未有久痢而腎不損者故治痢不知補腎非其治也凡四君子補中益氣

皆補脾虛。若病在火乘土位侮母。設非桂附大補命門。以復腎中之陽。以救脾家之母。則飲食何由而進。門戶何由而固。真元何因而復耶。若畏熱不前。僅以參朮補土。多致不起。大可傷已。

喻嘉言曰。內經云。下利發熱者死。此論其常也。仲景云。下利手足不逆冷。反發熱者不死。此論其暴也。蓋暴病有陽則生。無陽則死。故虛寒下利。手足不逆冷。反發熱者。或其人藏中真陽未竭。或得溫補藥後。真陽隨返。皆是美徵。此但可收拾其陽。協和其陰。若慮其發熱。反如常法。行清解之藥。鮮有不殺入者矣。金匱申下利發汗之禁。謂下利清穀。不可攻表。汗出必脹滿。蓋以下利一傷其津液。發汗再傷其津液。津液去則胃氣空。而下出之濁氣。隨勢上入胃中。遂成脹滿。求其

醫通卷之七

痢

五 思得堂藏

下利。且不可得。寧非大戒乎。傷寒厥利發熱。與下利發熱。迥然不同。傷寒厥而且利。為虛寒之極。所以反能食者則死。反發熱者不死。若痢證則能食者不死。發熱者多死也。周慎齋曰。凡生病處。皆為陰火。為陽氣不到。若陽氣所到之處。斷無生病之理。痢疾不發於夏。而發於秋者。蓋夏時陽氣盡發於表。太陰主裏。溼土用事。純陰無陽。或過食生冷。積而不化。積久成熱。痢之所由起也。不發於夏者。無陽則陰不運。發於秋者。陽氣入裏。攻之使然也。治法宜以苦寒之藥。燥溼滌熱。佐以辛熱助陽。開鬱達氣。故曰。行血則便紅自愈。調氣則後重自除。雖然。亦有虛實之辨。淺深之別。未可以藥治也。心者。血之主也。肺者。氣之主也。痰滯則傷氣。鬱熱則傷血。氣既病。則心肺亦病矣。而小腸者。心之合也。大腸者。肺之

合也。二經皆出納水穀。轉輸糟粕之官也。而胃又為大小腸之總司。肺移病於大腸。則氣凝滯而成白痢。心移病於小腸。則血凝滯而成赤痢。大小俱病。則赤白互下。胃土傳溼熱於大小腸者。痢色兼黃。如胃中先傷冷物。以致胃寒不能遊溢精氣。上輸於脾。脾即不能散精。以上歸於肺。則津液留滯於胃。即為胃家之積。其證嘔逆惡心。其狀色如桃膠而不臭。右關脈沉細而緊。宜用厚朴木香乾薑肉桂吳茱萸等。虛人可用附子理中湯。非大小腸積之可比也。至於色之黑者。分為二種。如焦黑之黑者。此熱極反兼勝已之化也。黃芩芍藥湯下香連丸。如漆黑之光者。此瘀血凝久而然也。桃核承氣湯。丹溪謂仲景可下者。悉以承氣下之。大黃之寒。其性善走。佐以芒硝。下之。滯氣緩以甘草之甘。飲以湯液。湯滌腸

醫通卷之七

痢

五 思得堂藏

胃。滋潤輕快。積行則止。局方例用熱藥為主。瀉藥為臣。用之於下利。清白者猶可。其裏急後重者。皆屬於火。又加以溫熱之藥。非殺而何。大凡熱利。仲景雖有用大承氣者。然皆指傷寒熱邪傳裏致痢。非滯下之謂。蓋大黃專攻溼熱。在所必需。芒硝專攻燥結。滯下總有裏急後重。其積滯已足下注。故無復用芒硝之理。若係寒積。又須薑桂吳萸以溫之。以寒積多屬於虛也。至於通因通用。原有兩法。有酒蒸大黃。有蠟丸巴豆。分析甚明。況滯下多因寒滯鬱熱而成。世俗恆用薑茶煎赤倍芽茶。白倍生薑。往往獲效。豈可偏執為熱哉。積有新舊之分。舊積者。氣血食痰所化也。新積者。舊積已去。未幾而復生也。然舊積宜下。新積禁下。其故何也。蓋腸胃之熱腐水穀。轉輸糟粕者。皆營衛濕陳於六府之功。今腸胃有邪。則營

衛運行之度。為之阻滯。不能施化。故衛氣鬱而不舒。營血滯而不行。於是飲食結聚。停於胃。稍柏留於腸。與氣鬱血滯之積相挾而成滯下矣。必當下之以通其壅塞。既下之後。升降仍不行。清濁仍不分。則衛氣復鬱。營血復滯。又成新積。烏可復下手。但理衛氣和營血。以調順陰陽。則升降合節。積亦不滯而自化矣。然舊積亦有不可下者。或先因脾胃之虛。不能轉輸其食積。必當朝補脾胃。兼行氣之藥。俟虛回而利自止。世俗治痢。只守清熱破氣。攻積涼血利水等法。雖朝夕更醫。出入增減。不過如此。已瀕於危。猶曰血色依然。腹痛未減。誰收溫補。死無後悔。傷哉。○痢初起時。便見膿血者。宜調氣和血。氣分藥必不可少。若但見白膿。宜調氣消積。不可用血藥。引邪入於血分。必變膿血也。○白痢初起。裏急後重。頻欲登

醫通卷之七

痢

六

思得堂藏

圖及去而所下無多。纔起而腹中復急。皆淫熱凝滯所致。胃苓湯加木香砂仁。○血痢初起。腹痛迅迫。或脈數大。身有微熱者。先與小建中湯和之。中有肉桂。伐肝和營最捷。膿血稠粘。勢甚不可遏者。黃芩芍藥延胡索木香砂仁。腹痛少加肉桂以和之。血積稠厚。可用黃連。若暑見少血。或稀淡者。不可便用苦寒。戕犯胃氣。為害不淺也。○凡血色紫黯。屢服涼藥。而所下愈多。作冷痢治。故血色如猪肝。如紫草。如莧菜汁者。非炮薑不治。理中湯去參。加肉桂木香肉果烏梅。○純下血而色鮮濃厚者。此心脾伏熱也。大黃黃連湯心湯。有食積。枳朮丸加厚朴黃連木香延胡索。亦痢初起。宜加延胡。最散血積。小兒八歲已內者。作食積治。○風入腸胃。純下清血。或淫毒下血。胃風湯加枳殼枳實。○風入腸胃。下利青綠雜色。神

本湯。○下利腹痛。異常厥沉而緊。無脈證者。先以薑桂之類溫之。後理積滯。○裏急而致困反不能即出者。氣滯也。疏通為主。重則小承氣。輕則黃芩芍藥湯。○裏急而頻見污衣者。氣脫也。補中益氣去當歸加木香。○淫熱下利後重。升陽除溼湯。○虛滑而後重者。圓後不減。以得解愈。虛設也。養藏湯。○白痢初起。但腹痛後重。不能食。小便却清利者。為虛寒。二陳湯加炮薑焦朮厚朴木香砂仁。能滌除痰積。宜加用之。○後重本因邪壓大腸。下陷之故。宜升柴以升提之。積滯枳殼。痢後重不除。此脾氣鬱在大腸。腹痛後重。理氣藥中須加桔梗。皆當禁用。若肺氣鬱在大腸。腹痛後重。理氣藥中須加桔梗。以開之。亦有積已去。而過食厚味。生冷復重者。健脾胃消導為主。○痢如膠凍。或如鼻涕。或如魚腦。此為冷痢。先用木香

醫通卷之七

痢

七

思得堂藏

焦朮豆蔻砂仁厚朴。次用理中湯加木香。不應。更加訶子粟殼。○下利脈遲緊。腹痛未欲止。當溫消之。枳實理中湯。○下利清白。手足厥冷。腹痛不已。附子理中湯。○積久冷痢。少腹疼痛。結滯不與。及下久連年不止。千金溫脾湯。冷利去甘草加桂心。倍香附入參。熱利去桂心。加大黃一錢。薑附入參各減一錢。○久痢不癒。雖所下漸減。而津血枯槁。肛門滯滯者。千金羊脂煎。潤以導之。羊脂。本經專主下利脫肛。腹中絞痛。而世罕知用。惜哉。○暴下積日久不止。千金附子湯。○久痢虛冷滑脫。脈細皮寒。少氣畏食。不能言。或時發虛熱者。附子理中湯加肉桂肉果訶子。○下痢臍下攪痛。桃花丸。○下痢久脫。虛冷白帶。大桃花湯。○熱痢二三年不止者。厚朴湯。○久痢所食之物皆不化。四肢沉重。肌肉消瘦。椒艾丸。○下痢發熱。自

汗脈強者是伏邪所發。法當從表解散。食糜湯有一方。長切相染者。謂之時疫。亦宜倉廩湯。一種陰虛痢疾。切戒攻積之藥。凡見痢下五色。膿血稠粘。滑泄無度。發熱煩渴。臍下急痛。至夜轉劇而惡食。或下鮮血者。便屬陰虛。急宜救熱存陰為主。如駐車丸。阿膠丸。歸連丸。阿膠梅連丸。千金黃連湯。黃連阿膠湯。白頭翁加甘草阿膠湯等方。選用。下痢至夜發熱。煩渴引飲。為津液受傷。內水虧竭。燎原之火自焚。不得不引外水以濟。急切不可用香燥之藥。錢氏白朮散加烏梅。下利失氣者。當利小便。陰氣前通。則陽氣自化矣。五苓散加水香。利仍不止。以阿子厚朴橘皮等分丸服。下利大孔痛宜溫之。黃耆建中加木香當歸。利後大便秘滯。裏急後重。數至圊而不能便。或少有白膿。此為氣虛下陷。慎勿利之。

醫通卷之七

九思得堂藏

但舉其陽。則陰自降矣。補中益氣湯加防風。下痢後裏急後重不除。風邪傷衛。衛氣不行也。非三奇散不愈。蓋注毒痢血如雞肝。心煩腹痛者。茜根丸。虛人理中湯加黃連烏梅。不應。用烏梅丸。下痢後遍身浮腫。五苓散。用生朮肉桂加升柴。痢後虛浮。六君子加木香肉桂。初痢膿血稠粘。勢甚宜下者。一味大黃。酒蒸為丸。赤多用。溫酒下。百丸。白多用。淡薑湯下。七十丸。以奪其勢。然後調理則易愈。冷熱不調。下利赤白。兼冷食食積者。連理湯加枳實砂仁。下利乾嘔者。胃虛而寒熱錯雜也。外臺黃芩湯。先煎白朮。後變膿血者。戊己丸。先煎白朮。後變鮮血者。四物湯去地黃。加炮薑炙甘草木香。先煎膿血。後變赤白。青黑腹痛倍常者。駐車丸。先煎膿血。後變白沫白膿者。補中益氣加炮薑赤石脂。下利

日百度。精神委頓。反不痛者。此邪氣勝。正氣微。不能鼓激也。難治。有患痢晝夜不及數度。而反發熱。心下痞悶。不能食而嘔。其有晝夜不止百度。及脈靜身涼而能食。何也。曰。痢之邪客於下焦。由橫連竟傳大腸。原無反熱之理。以中焦無病。雖下利無度。不礙飲食。惟邪發於中焦。由橫連入胃。以胃受病。自不欲食也。凡風寒傷於骨節之中。則為癰。飲食傷於腸胃之內。則為痢。而世有癰後痢。痢後癰者。此則表氣不固。邪氣內犯而致也。若癰邪發泄已盡。必無復為痢疾。皆由元氣下陷。脾氣不能升舉。故風寒暑溼得以襲入而為痢耳。又有痢後似癰非癰。乃陰陽兩虛。陽虛則惡寒。陰虛則發熱。故寒熱交戰似癰也。又有癰痢齊發。癰止而痢甚者。皆是脾胃之氣虛陷所致。宜先與黃耆建中加木香厚朴之類。吹與

醫通卷之七

九思得堂藏

補中益氣加薑桂。若服後痢減而癰作。此陽氣得補而與陰爭也。再與補中益氣少加桂附。助陽祛陰則愈。凡久痢年高。與產後病後。諸虛損及渴後作痢。慎不可用攻伐之劑。宜醒脾崇土。補中益氣加炮薑木香。有血加烏梅芍藥。下利六七。日。經盡。當有結糞。若至十三日。再經。結糞不出者。此胃氣告匱也。慎不可更與攻剋之劑。惟培養正氣。庶有生機。下利以胃氣為本。胃失生長。故惡物而不欲食。但得思食。無分何物。與之遂獲愈者。此胃氣勝故也。凡痢下如魚腦。或如猪肝。皆半死半生。下如麝腐色。大孔開如竹筒不收者。或如屋漏水。或純下鮮血。及如赤豆汁。屑如硃紅者。皆不可治。石頑曰。腸澼之證。內經原有下血。下白沫。下膿血之異。推詳

脈證大抵以白沫屬寒其脈應沉脈血屬熱脈應滑大若見白沫而脈反浮見脈血而脈反弦瀉懸絕為脈不應病故皆主死其扼要尤在身熱則死寒則生為大關脈以腸胃受病不當更見表熱表熱則外內俱困將何所持而與攻救邪更詳藏府諸病咸以脈沉小為可治血溫身熱主死內經大義如此再推仲景論利以身熱手足溫為陽回可治厥逆不返為陽絕主死此蓋指傷寒陰證而言不可與夏秋腸澼並列而論也然下痢豈無身熱得生者凡按邪之痢與時行疫痢皆有身熱但當先撤表邪自然身涼痢止當知內經所言血溫身熱乃陰虛之本證此則兼并客邪耳及觀先輩論痢並以白沫隸之虛寒膿血隸之淫熱至守真乃有赤白相兼者豈寒熱俱甚於腸胃而同為痢之說丹溪從而和之遂有赤

醫通卷之七

痢

思得堂藏

痢從小腸來白痢從大腸來皆淫熱為患此論一出後世咸為痢皆屬熱恣用苦寒攻之蒙害至今未已即東垣之聖於脾胃者猶言淫熱之物傷於中而下膿血宜苦寒以疏利之膿血稠粘數至圓而不能便脈洪大有力者下之亦認足膿血為熱易知血色鮮紫濃厚者信乎屬熱若瘀晦稀淡或如瑪瑙色者為陽虛不能制陰而下非溫理其氣則血不清理氣如爐冶分金最為捷法設不知此舉行疏利之法使五液盡隨寒降而下安望其有寧止之日哉嘗見屢服黃連虛陽迫外而反發熱發斑者亦有虛陽內擾忽發除中反驟能食者有頻用大黃開腸洞泄甚至發呃吐就者有大黃下嚥反脹閉不通陰氣上逆而變中滿鼓脹水腫者凡此之類未遑枚舉夫天氣之熱四時之正令也因熱而恣傷冰水瓜冰是

逆其正氣府藏為寒物所傷而為患也以逆正氣之病又以逆病情之藥治之何怪變證百出乎雖是歲之熱較他歲倍常是以患腸澼者較他歲亦倍常其間總輕重不同所見之積一皆五色良由五藏之氣化并傷是以五色兼見按五色痢古人皆為腎病以腎為藏精之室所居之位最下最深溪者既病其淺而上者安有不病之理精室既傷安能任營藏之令乎仲景所謂五液注下腸築揪痛命將難全者是也夫以精室受傷五液不守之患不知益火消陰實脾限水兼分理其氣使失於氣化之積隨之而下未失氣化之津統之而安即口噤不食者亦不出乎此法蓋腸澼之屬皆緣傳化失職津液受傷而致奔迫無度豈可恣行攻伐以為不易之定法乎歷觀時師治痢無高下賢愚必用橘皮枳殼厚朴枳榔

醫通卷之七

痢

思得堂藏

之屬稍有赤沫即用李連芍藥水這不利便與木通車前口噤不食不出黃連石蓮況世所謂石蓮者皆粵中草實偽充大苦大寒與本草所言蓮子墮淤泥中經歲取出者迥異也凡遇五色噤口及瘀晦清血諸痢每用甘草乾薑專理脾胃肉桂茯苓專伐腎邪其効如鼓應特初起腹痛後重者則兼木香檳朴以泄之飲食艱進者則兼枳實焦朮以運之陰氣上逆乾嘔不食者則兼丁香吳茱萸以溫之嘔吐涎水者則兼橘半生薑以豁之膿血稠粘者則兼茜根烏梅以理之水道不通者則兼升柴以舉之身熱不除者則兼桂枝芍藥薑棗以和之陰虛至夜發熱痛劇者則兼熟地黃蒼朮歸芍以濟之若數日不已而腹痛後重轉甚者必須參朮升柴兼補而升之久痢噤口不食此胃氣告匱最為危候較之初起

口噤尚有濁氣可破積沫可驅迥乎不同。非大劑參朮佐以茯苓甘草薑香木香煨葛根之屬。大補胃氣兼行津液不能開之。但得胃氣一轉。飲食稍進。便且獨參湯。加橘皮或製香附。緩緩調補。兼疏滯氣。最為合劑。如茯苓之淡滲。木香之耗氣。葛根之行津。皆當屏除。即如久痢後重。用三奇散。取黃耆防風。以致開闢。枳殼以破滯氣。以為卓識不羣。然後重稍減。便當改用補中益氣。轉關妙用。全在乎此。若厚朴枳橘砂仁等耗氣之藥。皆戈戟也。凡脈見弦細小弱。或六部沉小。皆當準此。間有脈來滑大較實者。方可用芩連芍藥澤瀉之屬。挾熱後重煩渴者。當與白頭翁秦皮黃連白芍之類。誤用大黃。變成腫脹。若其人元氣未復。大劑人參桂附。散其濁陰。尚可救其一二。洞泄不止。服大劑參朮。不應。用養藏湯。亦不應。

醫通卷之七

新

思得堂藏

惟附子理中湯調亦石脂末。間有得生者。即發呃吐。尚有四逆參附。吳茱萸湯。乾薑黃芩黃連人參湯。烏梅丸等法。然非平日相信之真。縱有生機。亦勿許治。若至發斑發躁。久痢不食。忽發除中。從無救治之法也。嘗見痢久虛脫。六脈弦細。厥逆冷汗。煩渴躁擾。呢逆不寧。峻用理中四逆。白通通脈之類。雖日進人參二三兩。服之非不暫安。厥來微續。手足漸溫。稀糜稍進。去後亦稀。三四日後。必然驟變。此根氣已絕。燈盡復明之兆。切勿因其暫安。輕許以治。徒為識者都笑耳。至於婦人臨產下痢。最為危殆。鄭氏有胎前下痢。產後不止。七日必死之例。予嘗用甘草乾薑湯加厚朴茯苓木香。治妊娠白痢。千金三物膠艾湯。治妊娠血痢。連理湯加膠艾。治赤白相兼之痢。駐車丸。千金黃連湯。白頭翁加甘草。阿膠湯。胎前產

後五色諸痢。皆可選用。若胎前下痢。產後不止。勢莫挽回者。用伏龍肝湯。九隨證加減。未嘗不隨手獲效也。世醫治痢。專守通因通用。痛無補法之例。不知因氣病而腸中切痛。非溫理其氣。則痛不止。因氣陷而濁氣下墜。非升舉其氣。則後重不除。因氣傷而津液崩脫。非調補其氣。則積不已。因陰虛而至夜微熱腹痛。非峻補其陰。則痢痛不愈。世人見余用參朮。甚挂溫補氣血之藥。以為可駭。更有用黃耆地黃滋陰膩滯之藥。益怪甚矣。且有用石脂乾薑溫瀉固脫之藥。以為切劑。而大排之。不知內經中原有瀉因瀉用之法。蓋裏急後重。數至圊而不能便。非瀉而何。况因瀉而過用利氣。乃致滑脫不收。安得不用瀉以固之耶。更有不知調氣。但見下痢日久。便行止瀉。輕以粟殼訶子投之。聞其滯氣。迫痛愈加。愈刻愈甚。

醫通卷之七

新

思得堂藏

此與殺之無異也。痢不納食。俗名噤口。如因邪留胃中。胃氣伏而不宣。脾氣因而滯滯者。香連枳朴橘紅茯苓之屬。熱毒衝心。頭疼心煩。嘔而不食。手足溫煖者。甘草瀉心湯去大棗易生薑。此證胃口有熱。不可用溫藥。若陽氣不足。宿食未消。噎而不食。枳實理中加砂仁陳皮木香豆蔻。或山查麴蘖之類。肝寒脾者。戊已丸加木香肉桂。有水飲停聚者。心下必悸動不寧。五苓散加薑汁。有火炎氣衝者。黃連解毒湯去黃芩加枳殼木香。有胃虛挾熱而嘔逆者。連理湯。有積穢太多。惡氣薰蒸者。大黃黃連瀉心湯加木香。丹溪用人參川連石蓮子梗米薑汁煎湯。細細呷之神効。如吐再作服之。但得一呷下咽。便開。石蓮子真者。絕無。余常以藕汁煮熟。稍加糖霜類服。

兼進多年陳米稀糜。調其胃氣必効。此即石蓮之意也。○治
噤口痢。多有黃連者。此正治溼熱之藥。苦而且降。不能開
提。况非胃虛所宜。不可輕用。大抵初痢。噤口。為溼熱。胃口。故
宜苦燥治之。若久痢。口噤。則胃氣虛敗。即大劑獨參。理中。恐
難為力也。○久痢不止。諸藥不應。貧人無力服參者。烏梅大
棗。各數枚。煎服。屢効。

休息痢。此證多因光瀉太早。積熱未盡。加以調攝失宜。不
能節食戒慾。所以時止時作。補中益氣。加肉果木香。吞駐車
丸。亦有陰虛多火。不能勝任。升柴木香白朮者。只用駐車丸
加入參肉桂烏梅之類。有積可加枳實炮黑查肉。有服補中
益氣。數服不應。反下鮮紫血塊者。此久風成癰。泄風氣通於
肝。肝傷不能藏血也。三奇湯倍防風加羌葛升柴。其一切利
諸通卷之七

水破氣藥。皆為切禁。

蟻蟲痢。其證腹大。皮膚黃粗。循循戚戚。然得之於寒溼。寒
溼之氣。苑為不發。化為蟻蟲。此九蟲之一。其形極細。胃弱腸虛。
則蟻蟲乘之。或癢。或從穀道中溢出。倉公以芫花一撮。主之。
烏梅丸。黃連犀角散。亦主之。然蟻蟲之後。即用六君子加厚
角黃連。烏梅肉丸。服以補脾胃。兼清溼熱。庶不再發。若一味
攻蟲。愈攻愈盛。漫無止期也。

痢後風。因痢後不善調攝。或多行。或房勞。或感風寒。或受
溼氣。致兩脚痠軟。腫痛。用大防風湯。○痢後變成痛風。皆謂
攝失宜所致。補中益氣。加羌活續斷虎骨。
痢後呢噦。此乃胃氣虛寒之極。最為惡候。急宜橘皮乾薑
湯主之。○下痢而渴。誤食冷物。水果而噤者。理中湯加丁香

十五粒。柿蒂五枚。水煎熱服。兼寒熱往來者。小柴胡加丁香。
血痢。噤噦而渴。心煩不得眠。小便不通者。猪苓湯。白痢。噤噦
用五苓散。以中有肉桂。可通逆氣也。

診。下痢白沫。初起脈小滑。能食者易治。洪大惡疾。四肢厥
冷者難治。久痢脈微弱。小細者即愈。數實或虛大無根者危。
下痢膿血。初起脈小滑。或弦軟。身不熱者易治。數實滑大而
身熱者。勢難甚。猶或可治。若先不熱。五六日後。反發熱。脈大
者必死。久則脈宜芤遲虛細。不宜數盛滑實。或身熱不止。口
噤不食者皆死。久痢脈結代。反驟能食。為除中者必死。大抵
下利之脈。初起雖實大不効。六七日後。最忌強盛。凡下利脈
浮身熱。作風治。脈沉身重。作溼治。下利為腸胃病。雖頻瀉而
能食則吉。若噤口痢。初起脈數實。可治。久痢而反不能食。脈

諸通卷之七

痢症

五 思得堂藏

見有餘者死。惟小弱流利者。當作胃虛治之。

海藏治楊師履。大醉後。渴飲冷水。冰茶。後病大便鮮血甚
多。先以吳茱萸溫藥。次與胃苓湯。血止後。白痢。又與溫下
藥。四服乃止。或曰。何不用黃連之類。以解毒。反用溫熱之
劑。曰。血為寒所凝。漬入腸間。而便下。得溫乃行。若用寒涼。
即變證難療矣。

汪石山治一婦。痢兩半載餘。服四物香連愈劇。腹痛後重。
效。嗽煩熱。脈皆細弱。而數。以補中益氣去歸。加快苓芍藥。
為散。日用米飲調下。三次而安。

吳茱山治一婦。長夏患痢。痛迫下黃黑。曾服香薷枳殼黃
連愈劇。其脈兩尺緊瀉。此寒傷血也。問其由。乃行經時渴
飲冷水一碗。遂得此證。與桃仁承氣加延胡索。一服。次早

下黑血升許痛止。次用調解活血之劑而痊。此蓋經凝作痢。不可不察也。

李士材治也。田孫侍御夫人。久痢不止。口乾發熱。飲食不進。猶服香連等藥。完穀不化。尚謂邪熱不殺穀。欲進香連。數日不食。熱甚危迫。診之。脈大而數。按之極微。詢之。小便仍利。腹痛而喜手按。此火衰不能生土。內真寒而外假熱也。小便利則無熱。可知。服香連則虛寒立辨。急進附子理中湯。待冷與服。一劑而痛止。連進二十餘劑。兼進八味丸而康。

石頑治春榜項鳴先尊堂。下痢血色如莧汁。服消刺苦寒。香連大黃之類愈甚。不時發熱痞悶。六脈皆虛大。右關獨顯弦象。然按之則軟。此氣虛不能統血之候。與補中益

醫通卷之七

痢按

卷

思得堂藏

氣加炮薑肉桂四劑而安。

又治郭然明之室。患五色痢。晝夜數十次。兼帶下如崩。誤服大黃黃連之屬十餘劑。遂隔塞不通。口噤不食者半月。至夜必大發熱躁渴。六脈弦細而疾。此足三陰俱虛之候。與理中加桂苓木香烏梅以調其胃。次與加減八味作湯。道其陰火而痊。

刑部郎中申昂菴高年久痢。色如莧汁。服香連芍藥之類二十餘劑。漸加呃逆。乃切王勳中。邀石頑往診。六脈弦細如絲。惟急進辛溫峻補。庶合病情。遂疏理中加丁香肉桂。方諸醫咸謂血痢無用薑桂。人參之理。遲疑不敢服。仍囑香連芍藥。連進五日。病愈甚而燥然索粥。舉家及諸醫皆以能食為慶。復邀石頑相商。而脈至如循刀刃。此中氣告

竭。求救於食。除中證也。世人但知下痢能食為向愈。曷知其有除中之例乎。因表出以爲後學之鑑。

諸某水尊堂。深秋久痢。口噤不食者半月餘。但飲開水及瓜瓠汁。服後必嘔。服腸鳴絞痛不已。煩渴悶亂。至夜轉劇。所下皆膿血。晝夜百餘次。小水涓滴不通。諸醫束手告辭。始邀石頑。切其六脈皆弦細乏力。驗其積沫皆紫淡色。時詢其所服。皆香連檳朴之類。因謂之曰。所見諸證俱逆。幸久痢脈弱。尚宜溫補。姑勸一方。用理中加桂苓紫苑調之。服後小便即通。便得稍寐。三四日間糜粥漸進。痢亦漸減。更與理中倍參。伏龍肝湯泛丸。調理而痊。

又治同川春榜陳賴。腸熱錦旋抵家。即患河魚腹疾。半月已來。攻剋不効。遂噤口粒米不入。且因都門久食煤火。

醫通卷之七

痢按

卷

思得堂藏

肩背發熱。不赤不寒。陷伏不起。發呃神昏。勢日頹危。內外醫科互相推委。因命相邀石頑。就榻診之。六脈絃細欲絕。面有戴陽之色。所下之物。瘀晦如爛魚腸。證雖危殆。幸脈無旺氣。氣無喘促。體無躁擾。可進溫補。但得補而瘳。腫嗽發便可無虞。遂疏保元湯。每服人參三錢。生黃耆二錢。甘草肉桂各一錢。伏龍肝湯代水煎服。一服而稀糜稍進。再服而後重稍輕。三服而癰毒責起。另延瘍醫敷治其外。竊守前方。服十餘服而安。前後未嘗更易一味也。一大兵船上婦胎前下痢。產後三日不止。惡露不行。發熱喘脹。法在不救。有同道誤許可治。與藥一服。次早反加呃逆。計無所施。乃同兵丁托言貨船拉石頑往診。其脈三至一代。直以難治辭之。彼則留住前醫。不使上艇。方知其意。

原欲巧卸。恐余不往。故不明言其故。當此急迫之際。不與解圍。必致大傷體面。因謂之曰。此證雖危。尚有一線生機。必從常計。議庶可圖。治彼聞是言。始放其醫抵家。而求藥於余。遂與蓋一枚。錢數文。令買砂精。熬枯。白湯調服。既可治痢。又能下瘀。且不傷犯元氣。意與服之。彼欣然而去。其醫得脫。閉戶望家而遁。直至數日。大兵去後。寧家即過我而謝曰。若非金蟬脫殼。不免為螳臂所執也。

飛疇治朱元臣子。患五色痢二十餘日。胸膈脹滿。而粥飲不進。服藥罔効。別延兩醫診視。一用大黃。一用人參。元臣不能自主。因執治於予。予曰。用大黃者。因其脹滿。脹大也。用人參者。因其痢久不食也。痢久不食。大黃斷難施。膈滿作脹。人參亦難遽投。今擬伏龍肝為君。專溫土藏。用以

醫通卷之七

痢按

元一思得堂藏

濃煎代水。煎焦木茯苓甘草廣藿木香炒烏梅一劑。痢減食進。再劑而止。遂不藥調理而起。

大小便不通

經曰。脈盛皮熱。腹脹前後不通。督悶。此謂五實。夫脾胃氣滯。不能轉輸。加以痰飲食積。阻礙清道。大小便秘澀不快。二陳湯加升柴二米。數服。能令大便潤而小便長。○澤熱痰火結滯。脈洪盛。大小便秘赤。肢節煩疼。涼膈散。小承氣湯選用。○陰囊腫脹。二便不通。三白散。○大小便俱不通。小腹膨脹。乃勝肥滿。支撐迴腸。故升大便秘不得出。用二陳倍茯苓澤瀉木通。先利小便。迴腸得通。而大便隨出矣。○風閉。用燒皂角灰為末。粥清調下。或燒湯蒸下部良。○冷閉。用連根葱一二莖。帶土生薑一塊。淡豆豉二十一粒。鹽二匙。同研爛作餅。烘熱揷臍中。以帛紮定。良久於餅上灸之。○熱閉。用田螺搗爛。加麝香一分。冰片半分。入臍中。以帛束之。如人行十里。即通。

醫通卷之七

大小便不通

元一思得堂藏

石頑曰。肥人素多痰飲。淫熱結聚。因病每致大小便不通。腹滿不食。氣逆喘急。勢盛不得不下。有屢下不得通利者。有再三下而始通者。有下之遂利不止者。大抵淫熱素盛之人。大便不行。日數雖多。結糞甚少。所下不過清黃垢膩。甚至驟下不可遏者。多有熱去寒起。正氣隨脫。即變呃逆之證。以此本屬淫熱。溫補仍助本病。苦寒徒乏胃氣。每至不可救藥。若始先知其淫熱痰積。用導痰湯多加薑汁竹瀝。下痰痰丸。甚則下控涎丹。方為合法。若遲則淫熱上湧。勢劇。胃中津液盡變濁穢。雖有合劑。不能取効也。凡大便不通。而腹中常鳴者。下之必無結糞。蓋肥人下後。多有脫泄不止之虞。瘦人汗後。每多乾熱不止之患。不可不知。

丹溪治一老人。因內傷挾外感。自設發汗。脈浮數。年高誤

汗必有虛證。乃與參朮歸苓甘草陳皮等。自言從病不曾更衣。今虛進痛不堪。欲用利藥。朱謂非實秘。氣因誤汗而虛。不得充腹。無力可努。仍用前藥。間與肉汁及瑣陽湯。濃煎葱椒湯。浸下體。下軟塊五六枚。脈大未斂。血氣未復。又與前藥。二日小便不通。小腹滿悶煩苦。仰臥則點滴而出。朱曰。補藥未至。倍參朮服。二日小便通。半月而愈。又治一婦人脾寒。後患大小便不通。此是痰膈中。腕氣聚上焦。二陳加木通。初服探吐。再服而愈。汪石山治一婦人。因憂懼勞倦。小腹脹痛。大小便秘結不通。醫以硝黃三下之。隨用隨秘。反增胸腹胃脘脹痛。自汗食少。汪診之。脈皆濡細而數。曰。此勞倦憂懼傷脾也。蓋脾失健運之職。故氣滯不行。前藥但利血而不能利氣。遂用人

參二錢。歸身錢半。陳皮枳殼黃芩各七分。煎服而愈。喻嘉言治一人。大小便俱不通。因新秋病瘧。三五發後。用藥截住。遂覺胸腹間脹滿日增。不旬日外。腹大胸高。上氣喘急。二便全無。食飲不入。能坐不能臥。能伸不能仰。屢服下藥不應。尚用大黃二兩作一劑。喻曰。此名何病。而敢放膽殺人耶。醫曰。傷寒腸結下而不通。惟有大下一法。何謂。胃乾結。故用下藥以開其結。然有不轉失氣者。不可攻之。戒正恐誤治太陰之腹脹也。此因腹中之氣散亂不收。津水隨氣橫決。四溢而作脹。全是太陰脾氣不能統攝所致。一散一結。相去天淵。再用大黃猛劑。大散其氣。若不脹死。定然腹破。遂以理中湯少加黃連。疾勢畧減。次日用五苓

散本方。藥纔入喉。病者即索穢桶。小便先去。大便隨之。腹中原是大黃推蕩之泄糞。其所以不出者。以膀胱脹大。厥內難容。將大腸撐緊。無隙可出耳。石頑治楊松齡。夏月感冒。會服發散藥十餘劑。大小便俱閉。瀉不通。更一醫用硝黃下之。少腹左畔遂脹起如鼓。不赤不熱。有時唧唧作聲。復延瘍醫。以敷藥治其外。以解毒利水藥治其內。藥未進而躁擾不寧。因延石頑診之。六脈緊細而駛。此過汗津液大傷。又與苦寒攻裏。致陰邪內結。膀胱不化。溺積不通。法在不救。幸胃氣有權。形神未竭。尚能稍進糜飲。姑許以治。因與濟生腎氣大劑。煎成入有嘴壺。託起其項。徐徐仰灌升許。頃令轉側。以驚鴛探吐。即時溲更如注。少復更平。更與十全大補調理而安。此證前後

患者四五人。或小便淋瀝。或遺溺不止。或形羸氣脫。皆立辭不治。

大便不通

經曰北方黑色入通於腎。開竅於二陰。可知大便閉結得自
血津液也。腎者燥惡食辛以潤之。常歸肉從
腎主五液。津液盛則大便如常。房慾過度精血耗竭。多致秘
結。或饑飽勞役損傷胃氣。或辛熱厚味。漸漬助火。伏於血中。
耗散真陰。津液虧少。致令大便結燥。尚年血不充。每患是疾。
故古人有胃實脾虛。風秘氣秘。痰秘。冷秘。熱秘。虛秘。實秘之
分。蓋設所當細察詳問也。○胃實而秘。善飲食。小便赤澀。麻
仁丸。○脾虛不能運化。倦怠懶於言動。補中益氣倍升柴當
歸煎成調生蜜麻油清氣一升。濁氣自降。有脾虛下秘者。以
此湯下麻仁丸。○風秘者。風入大腸。傳化失職。羌防蘇子。枳
殼麻仁。杏仁皂角灰煎服酒湯丸。○氣秘者。氣不升降。穀氣

醫通卷之七

大便不通

思得堂藏

不升。其人多噎。枳殼沉香。蘇子檳榔。烏藥陳皮煎服降氣散
或四磨六磨選用。○痰秘者。痰飲滯熱阻礙。氣不升降。頭汗
喘滿。胸膈痞悶。眩暈腹鳴。半夏茯苓。木香檳榔枳實。橘紅香
附白芥子。薑汁竹瀝。不應加大黃黃連。甚則控涎丹下之。○
冷秘者。六脈沉遲。面白或黑。疑陰固結。胃氣閉塞。腸內氣攻。
腹中喜熱惡冷。薑香厚朴。薑桂枳殼。陳皮生薑煎服半硫丸。
熱藥多秘。惟硫黃性緩而通。冷藥多泄。惟黃連厚腸止泄。如
陰寒秘結。常與陽藥冰冷服之。然數服中。間與清潤藥一服。
不令結秘。若病本虛寒。燥顯燥熱。亦宜助陽藥中。少加苦寒。
以去熱躁。躁止勿加。○熱秘者。六脈數實。面赤口乾。身熱腸
胃脹悶。時欲得冷。或口舌生瘡。二腸熱結。蘇子黃芩。生地芍
藥。杏仁枳殼煎服酒湯丸。或四順清涼飲。○虛秘者。不能飲

食。小便清白。或年高。或病久。或脾虛津枯。血少。歸身熱地。從

寒參黃。沉香。松子仁。桃仁。麻仁。蜂蜜。或麻仁枳殼。當歸人參。
蜜丸服之。瘦人血枯。火秘。通幽湯煎成。入蜜服之。老人津枯。
婦人產後去血過多。及發汗利小便。病後血氣未復。虛勞骨
蒸。皆能作秘。惟當益氣補水。養血不可用稍養利藥。巴豆。牽
牛。尤在所禁。有一種大便不通。腹中脹悶。求通不得。頻頻登
廁。努力太過。虛氣被奪。下注肛門。裏急後重。時不可忍。氣逆
嘔惡。渴而索水。飲食不能。呻吟不絕。欲與通利。則氣已下脫。
欲與升提。則氣已上逆。嘔惡難堪。人參枳殼。當歸煎服。加陳
香櫞皮。尤効。腎虛血虛。大腸風秘。生何首烏。搗自然汁一盞。
和白蜜。頓熱服之。六味丸加蜜調服亦通。固本丸作膏常服。
亦妙。古方治老人燥結。多用茯苓。不知胃氣虛者。下口即作

醫通卷之七

大便不通

思得堂藏

嘔吐。肥人胃中多有痰涎。尤非所宜。惟命門火衰。開關失職。
者。方為合劑。然須九服。若作湯。亦必作吐。以其味鹹氣濁也。
丹方治腎肝風秘。至夜微發寒熱者。用生何首烏兩許。頭煎
服之神應。若暴病熱邪固結。及中有留滯者。禁用。以其純陰
味澀。無養正祛邪之力也。○失血後煩渴。大便不通。一味生
地黃。搗汁服之。大病後不得寐。大便不通。一味熟棗仁。搗水
去滓。煮粥頻食。血枯燥結。恆用熟地黃。蜜煎常服。或熟黃亦
佳。○又老人血枯便閉。用生地黃。當歸身。鮮首烏。各四兩。廣
皮一兩。熬膏。頓熱服。半小杯。不過三五次効。○實秘者。能飲
食。小便赤澀。枳實。檳榔。木香。砂仁。蓬朮。大黃。皂角灰之屬。氣
滯腹脹。大便秘澀。六磨湯加大黃。○諸秘服藥不通。或虛人
畏服利藥者。宜蜜煎導。削薑黃導。分寒熱選用。其猪膽導。非

傷寒邪熱不可輕試。病人胃氣虛者。用之往往有呃逆之虞。不可不慎。

或問乾結之甚。硝黃亦可暫用否。曰。承氣湯用硝黃。乃傷寒邪熱入裏。胃液乾枯。腎水涸竭。故宜急下以救陰津。為勢若老人虛入。及病後腎水本虧。以致燥結。再用硝黃下之。是虛其虛。目下取快一時。來日復秘愈甚。欲再下之。雖鐵石不能通矣。倘遇此證。當勸慰之。緩圖奏効。切勿性急。自貽其咎也。診。陽結脈沉數。或促。陰結脈遲伏。或結。老人虛人便秘。服多沉伏而結促不勻。若見雀啄者不治。

醫通卷之七

大便不通

雷

思得堂藏

小便不通 閉塞

經云。三焦者。決瀆之官。水道出焉。膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。○下焦者。別迴腸。注於膀胱而滲入焉。故水穀者。常并居於胃中。成糟粕。俱下於大腸。而成下焦。滲而俱下。清泌別汁。循下焦而滲入膀胱焉。○膀胱之胞薄以懦。得酸則縮。澀約而不通。水道不行。故瘕。陰者。積筋之所終也。故酸入而走筋矣。○飲食入胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。

經云。至陰虛。天氣絕。至陽盛。地氣不足。夫腎肝在下。地道也。心肺在上。天道也。脾胃居中。氣交之分也。故天之陽絕。而不安於地者。則白露不下。在上之陽不交於陰。則在下之陰無以爲化。水道其能出乎。此上焦之氣化也。仲景曰。衛氣行。則小便宜通。又曰。脾病則九竅不通。此中焦之氣化也。東垣云。在下之陰虛。在上之陽盛。致腎氣不化。必宜其陽而舉之。則陰可得而平也。故丹溪云。以吐法通小便。上竅通而下竅之水出焉。然升提止可施於涓滴不通者。若溺瀉短少。或淋漓作痛者。非所宜也。由經言及諸論觀之。未有不主於氣化者。不審乎此。轉行疏利之劑。求功多見其不知量也。

醫通卷之七

小便不通

五 思得堂藏

東垣云。小便不通。皆邪熱爲病。分在氣在血而治之。以渴與不渴而辨之。渴而不利。或黃或瀉者。熱在上焦。氣分也。小便者。膀胱所主。若肺熱不能生水。是絕其寒水生化之源。宜清肺而滋化源。故當從肺分助其秋令。宜茯苓澤瀉車前木通之類。淡味滲泄之藥。水自生焉。如不渴而小便不通者。熱在下焦。血分。腎與膀胱受熱。閉塞其流。須知藥之類。苦寒氣味。

俱陰之藥。以除其熱。稍兼肉桂。辛溫散結之陽藥。以泄其閉。若服淡滲之味。則陽無以化。而陰愈閉塞不通矣。氣分熱渴。而小便閉。或黃或澀者。黃芩清肺飲。血分熱。小便閉而渴者。滋腎丸。不應併中焦亦有熱也。加連藥甘草。等分煎服。陰虛血熱入渴。而小便不通。或瀉痢淋瀝者。切禁五苓。燥劑。宜導赤散。津液偏滲於大腸。大便泄瀉。小便澀少。或水停心下。不能下輪膀胱者。五苓散。散泄之。若六府客熱。轉於下焦。而不通者。用益元散以清之。若氣迫閉塞。升降不通者。二陳湯去半夏。加木通滑石。柴胡升麻以提之。汗出過多。小便赤澀。此五內枯燥。慎勿用利水之劑。生脈散加黃耆當歸。若右寸獨數大。小便點滴而下者。此金燥不能生水。氣化不及。則都生脈散去五味子。易大劑紫苑。可一服而愈。

醫通卷之七

小便不通

思得堂藏

小便不通。腹下痛悶難忍。如覆枕者。為實。亦分在氣在血。氣壅於下者。四磨六磨選用。血汚於下者。代抵當丸。有火虛者。非與溫補之劑。則水不能行。如金匱腎氣丸。元氣下陷而水道不通者。補中益氣湯加木通車前。升清以降濁也。小便不利。審是氣虛。獨參湯少加廣皮如神。凡小便不通。用獨蒜全勝法。以獨蒜一枚。梔子三枚。鹽少許。搗爛。攤紙貼臍。良久即通。未通。塗陰囊上立効。或用食鹽半觔。炒熱布包。敷之。天行熱病。小便不通。用蚯蚓泥升許。以水浸澄清。渴即與飲。不應用地龍數枚。同蘆根搗汁飲之。

則遺溺遺溺則補之。閉癰則瀉之。然遺溺閉癰。不取膀胱愈者。蓋膀胱但藏溺。其主出溺者。皆從三焦及肝與督脈也。閉者。合而言之。一病也。分而言之。有暴久之殊。蓋閉者。暴病為溺。點滴不出。俗名小便不通是也。可用疏通利竅之劑。甚則用吐法。以提其氣自通。若補中益氣二陳五苓。俱可探吐也。癰者。久病為溺。淋瀝點滴而出。一日數十次。名淋病是也。惟宜滋養真陰。兼資氣化。如六味生脈之類。亦可合用。若疏泄利氣之藥。皆為戕賊矣。夏秋熱傷癰閉。以滑石調水飲之。即通。但陰虛泉竭者。禁用。

醫通卷之七

閉癰

卷

思得堂藏

淋

金匱云。淋之爲病。小便如粟狀。小腹弦急。痛引臍中。跌陽脈數。胃中有熱。卽消穀引食。大便必堅。小便卽數。

小便不利者。有水氣。其人苦渴。栝蒌瞿麥圓主之。○小便不利。蒲灰散主之。滑石白魚散。茯苓戎鹽湯並主之。○渴欲飲水。口乾舌燥者。白虎加人參湯主之。○脈浮發熱。渴欲飲水。小便不利者。猪苓湯主之。○淋家不可發汗。發汗則便血。

金匱論淋證四條。一曰小便如粟狀。痛引臍中。此肝移熱於膀胱。因肝熱甚。失其疏泄之令而然也。一曰胃中有熱。消穀引食。大便堅。小便數。此因胃熱熾甚。消燬津液。腸胃膀胱之源俱涸也。一曰有水氣。其人苦渴。此膀胱氣化不行。水積胞中爲患也。一曰小便不利。用蒲灰散等治。此因

醫通卷之七

淋

八

思得堂藏

膀胱血病。血屬陰。陰病則陽亦不能施化也。其用栝蒌瞿麥丸者。蓋緣肺氣不化。膀胱不通。致水漬則津液不行。而胃中燥渴。故用栝蒌根以生津。薯蕷以補肺。茯苓疏肺氣下行。瞿麥逐膀胱瘕結。然欲散下焦之結。又需陽藥始得開通。故少加附子爲使。必水積而腹中冷者。方可用之。若雖有水氣。而腹中不冷。卽當效五苓之法。以桂易附。或因積熱閉塞。又當改附子爲知母。其蒲灰散等三方。悉治膀胱血滯。氣不化。而小便不利之證。蒲灰滑石者。蒲灰治瘀血。滑石利氣也。亂髮滑石白魚者。髮灰消瘀血。白魚去水氣也。茯苓戎鹽者。鹹潤走血。佐茯苓淡滲利小便。白朮兼利腰臍間血也。三方亦有輕重。亂髮爲重。蒲灰次之。戎鹽又次之。至於渴欲飲水。口乾舌燥。明係熱在上焦。故用

白虎以蕩滌膈上之熱。加入參以救津液也。渴欲飲水。小便不利。乃熱結膀胱。津液固結之候。而見脈浮發熱。太陽熱邪循經發外也。故用猪苓湯以導熱滋燥。慎勿因其發熱而與發汗。重傷其陰。必致便血。故爲切戒。

諸淋所發。皆腎虛而膀胱生熱也。水火不交。心腎氣鬱。遂使陰陽乖舛。清濁相干。畜在下焦。故膀胱裏急。膏血砂石從水道出焉。於是有淋瀝不斷之狀。甚者窒塞其間。令人悶絕。凡小腸有氣。則小便脹。小腸有血。則小便澀。小腸有熱。則小便痛。制劑之法。並宜流行滯氣。疏利小便。清解熱邪。其於平調心火。又三者之綱領焉。心清則小便自利。血不妄行。最不可用補氣之藥。氣得補而愈脹。血得補而愈澀。熱得補而愈盛。水實不行。加之穀道閉遏。未見其有能生者也。雖然。腎氣虛

醫通卷之七

淋

九

思得堂藏

弱囊中受寒。而成淋瀝者有之。其證先寒慄而後澀血。蓋冷氣與正氣交爭故也。又有胞系轉戾不通者。其證臍下急痛。小便不通。凡強忍小便。疾行走馬。或忍尿入房。使水氣逆上。氣迫於胞。故屈戾而不得舒張也。胞落則殂。石淋者。臍腹隱痛。小便難痛。不可忍。澀如砂石。或黃赤。或渾濁。色澤不定。正如湯瓶久受煎熬。底結白礞。宜清其積熱。滌其砂石。如麥冬。葶藶。木通。葵子。滑石。車前。連翹。瞿麥。知母。瀉痛甚者。爲膀胱畜血。加琥珀肉桂大黃辛溫以散之。加味葵子茯苓散專治石淋之聖藥。紫雪亦佳。○勞淋者。遇勞卽發。小便淋瀝不絕。如水滴瀝而不斷。有脾勞腎勞之分。勞於脾者。補中益氣加車前澤瀉。勞於腎者。六味九加麥冬五味。○血淋者。雖主實主血。而與小腸爲表裏。然須看血色。分冷熱。

色鮮紫者爲小腸實熱。小腸熱甚而血滲胞中。與溲俱下。大劑生牛膝爲主。兼車前山梔生地紫菀。犀角桃仁。蘆根汁生。補節汁。血虛而熱。用生地黃三兩。黃芩阿膠各半兩。柏葉少許。水煎服之。此千金法也。若色赤淡者。屬腎與膀胱虛冷。生料六味九加肉桂。蘆根搗水煎。候冷服。若兩尺脈沉弦而數。必有瘀血停蓄。犀角地黃湯加紫菀牛膝。若琥珀麝香。當歸川芎。草薢木通。白朮木香。香燥破血利水。耗氣之類。切禁。○氣淋者。氣化不及。州都胞中氣脹。小腹滿堅。溺有餘瀝。宜沉香肉桂。茯苓澤瀉。佐以木通瞿麥。葵子山梔石葦之類。實則氣滯不通。附下妨悶。加香附木香。不應加硝黃。溺後疼痛。去石葦木通。瞿麥葵子山梔。加秋石生甘草梢藕汁。氣淋服利水藥不能通者。沉香降氣四磨湯選用。○膏淋者。假若脂膏。或便中有如蟬蛸之狀。此名肉淋。乃精濁俱出。精塞溺道。故便欲出不能而痛。宜茯苓秋石沉香。海金沙澤瀉滑石。如不甚痛者。須固瀘其精。慎勿誤與通利。鹿角霜肉苁蓉。兔絲子。蓮鬚。芡實山藥之類。或桑螵蛸。龜絲子等分。澤瀉減半。蜜丸服。後以六味九合。聚精丸調補之。○冷淋者。寒氣客於下焦。水道不宜。滿於胞內。淋瀝而白。先發寒慄。而後便數。成淋。宜金匱腎氣丸。加鹿茸沉香。戴氏云。進冷劑愈甚者。此是冷淋。牛膝半兩煎湯。加麝少許。下八味丸。冷淋小便閉澀。數起不通。緩中苦痛。憎寒凜凜。或因煩渴飲水過多。水積胞中。不行。生附子散。不應用枯萆薢麥湯。○熱淋者。心肺蘊熱。不能滋其化源。小便赤澀如血而少。煩渴引飲者。導赤散加黃芩。躁熱不渴者。滋腎丸。或淡竹葉煎湯調辰砂益元散。○凡人服

金石大毒。以助入房。敗精流入胞中。及飲食痰積滲入者。則皆成淋。或忍精不泄。停凝作痛。而致淋者。木通車前牛膝澤瀉。茯苓滑石甘草。或湯或丸俱効。有骨蒸太過。食積成痰。流注爲淋。宜尿浸山查。川連丹皮。海石玄明粉之類。○小便艱澀如淋。短而不作痛者。虛也。六味九加鹿茸肉苁蓉。如莖中不痛而癢者。此屬精虛。八味丸。○小便淋瀝。莖中痛不可忍。相引腸下痛。參茸琥珀散。○有服五苓散不効。用生料鹿茸丸却愈。此皆下元虛冷之故。○胞痺小便淋瀝。滿痛。腎虛膀胱積熱也。腎瀝湯。○胞痺不得小便。小腹痛。若沃以湯。則小便雖清而暑渴者。此膀胱虛寒也。茯苓九虛寒甚者。已戟丸。○老人精氣已衰。猶不絕慾。小便淋瀝。小腹脹閉。而牽引穀道。或溺血梗痛。腎氣丸加牛膝。○熱極成淋。莖中痛。五苓散減桂大半。加滑石木通生甘草梢。○口苦咽乾。小便赤澀。或欲成淋。清心蓮子飲。○伏暑成淋。五苓和益元散。虛人生尿散。不時服之。○小便自清。後有幾點血者。五苓散加牛膝熟地紫菀。○有因怒而致淋者。非青皮沉香山梔木通不能已也。○有因思慮成淋者。歸脾湯和五苓散並進。○汗多而小便痛。暑月常有之。盛暑冷飲既多。上停爲飲。外發爲汗。津液不通。小腸閉塞。五苓散加入參甘草。名春澤湯。最爲冷劑。○老人氣虛下陷成淋者。補中益氣加木通澤瀉。以升麻柴胡升九地之陰。木通澤瀉降九天之陽。服之殊驗。○心脾血虛。歸脾湯。辰砂炒香散選用。○淡秋石治血淋莖中熱痛。降火最捷。但元氣下陷。小便多者禁用。○血淋服諸藥不効。一味慈以根搗汁服之。○血淋每日用黃蘗絲二兩。煮湯飲之。七

日必効。留絲蝦灰存性。蜜丸服之。并主婦人血崩。又生雞子黃。每日清晨沸湯調服二枚。其血自清。牛膝三兩。煮成入麝少許。頭服。名地筋湯。此治血淋。要劑。但淋久不止。元氣下陷者。又為切禁。且虛人能損胃氣。及崩淋下血不止者。皆不宜服。以其滑精故也。朴硝雪白者。治痛淋殊効。每服二錢。血淋用冷水下。氣淋水通湯下。石淋炒研用溫水下。石骨火煅。同琥珀滑石。乃石淋之要藥。然須實壯初起者宜之。老人絕慾太早。成淋。生菴豆水浸。搗汁服之。然不若淡扶石。搗水飲之。其効如神。一坊淋濁。屬實熱者。應手獲効。稍涉陰虛。甚於祖鰲。不可不慎。診。少陰脈數。婦人則陰中生瘡。男子則氣淋。盛大而實者。生。虛小而濡者死。

醫通卷之七

淋

聖思得堂藏

薛立齋治一人。素腎梁。小便赤數。口乾吐痰稠粘。右寸關數而有力。此脾肺積熱。移於膀胱。先用黃芩清肺飲。清理脾肺。次用滋腎丸六味丸。以滋腎水而安。

又治一僑者。發熱飲水不絕。每如廁。小便澹痛。大便牽痛。此精竭復耗所致。用補中益氣。送都黍丸而安。

石頑治內閣文湛持。夏月熱淋。醫用香薷飲。益元散。五日不應。淋瀝轉甚。反加心煩不寐。乃弟廣文彥可。相邀往診。見其唇赤齒燥。多汗喘促。不時引飲。脈見左手微細。右手虛數。知為熱傷元氣之候。遂疏生脈散方。頻進代茶。至夜稍安。明日復苦澀便滿數。然其脈已向和。仍用前方。不時煎服。調理五日而痊。

又治太史沉韓倬。患膏淋。小便頻數。晝夜百餘次。晝則滴

漚不通。時如欲解。痛如火燒。夜雖頻進。而所解倍常。漫中如脂如涕者甚多。先曾服清熱利水藥半月。餘其勢轉劇。而色瘰黃。飲食艱進。延石頑診之。脈得弦細而數。兩尺按之益堅。而右關滿大少力。此腎水素虧。加以勞心思慮。肝木乘脾所致。法當先實中土。使能隄水。則陰火不致下瀦。清陽得以上升。氣化通而疼痛瘳矣。或云邪火亢極。反用參芪補之。得無助長之患乎。曷知陰火乘虛下陷。非開提清陽不應。譬諸水注。塞其上孔。傾之涓滴不出。所謂病在下。取之上。若用清熱利水。則氣愈陷。精愈脫。而溺愈不通矣。遂疏補中益氣方。用人參三錢。服二劑。痛雖稍減。而病者求其速効。或進四苓散。加知母。門冬。沙參。花粉。甫一服。徹夜痛楚倍甚。於是備服補中益氣。兼六味丸。用紫河車

醫通卷之七

淋

聖思得堂藏

熱膏代蜜調理。補中原方。服至五十劑。參盡筋餘而安。

小便不禁

小便頻數

王節齋曰小便不禁。或頻數。古方多以爲寒。而用溫瀉之藥。殊不知陰虛屬熱者多。蓋火邪妄動。水不得寧。故不能禁。而頻數也。是以老年人多頻數者。是膀胱血少。陽火偏旺也。治法宜滋腎水。真陰補膀胱津液爲主。而佐以收瀉之劑。六味丸加麥冬五味之類。不可用溫藥也。

戴氏云小便多者。乃下元虛冷。腎不攝水。以致滲泄。宜八味丸。生料鹿茸丸。若小便常急偏數。雖多而所出常少。放了復急。不瀉痛。却非淋證。亦有小便畢。少頃將謂已盡。忽再出些少者。多因從忍尿行房事。而然。宜生料五苓散加阿膠。吞加減八味丸。小便不禁而淋瀝瀉痛者。此真陽不固而下滲也。固脬丸不應。用加減桑螵蛸散。甚甚者。爲陽虛。補中益氣

醫通卷之七

小便不禁

思得堂藏

加熟附子。夜甚者。爲陰虛。八味丸。脬氣不足。小便頻數。晝甚於夜者。縮泉丸。或時清利過多。或時頻數赤瀉者。舊用草薢分清飲。多不應。改用加減八味丸。効。若夜起小便多者。八味丸加五味子。數而少。爲實熱。宜滲之。五苓散。桂枝加滑石甘草。數而色黃。虛熱也。宜滋陰。六味丸。數而多。色白。體羸。爲真陽虛。升氣少而降氣多。須補右腎相火。八味丸加補骨脂鹿茸。病後服苦寒泄利藥太過。小便不禁。或如稠消色者。加減八味丸。

小便頻數。勞而益甚者。屬脾氣虛弱。補中益氣湯加山藥五味。若小便清利。之益甚者。乃膀胱熱結也。赤芍赤茯苓。黑山梔。生甘草。木通。滑石。淡竹葉。目白睛黃。加茵陳。有血。加常歸。延胡索。脈滑數盛。加大黃二錢。芒硝一錢。大便通。小便亦

利也。其脾肺氣燥。不能化生者。黃芩清肺飲。膀胱陰虛。陽無以生者。滋腎丸。腎與膀胱俱虛。或肺氣不化。水泉瀉數者。六味丸加麥冬五味。○若小便瀉瀉。或莖中痛。屬肝腎溼熱。龍膽瀉肝湯。

遺溺。經云。督脈生病爲遺溺。肝所生病爲遺溺。膀胱不約爲遺溺。仲景云。下焦不歸則遺溺。天寒則腠理閉。氣溼不行。水下流於膀胱。則爲溺與氣。故多溺而寒也。至於不禁。虛寒之甚。非八味丸。固脬丸。加減桑螵蛸散不効。然亦有熱客腎部而遺尿者。經曰。淫氣遺溺。痺聚在腎。此係熱證。其證發熱作渴。或時閉瀉。或時自遺。或陰挺不能約制。午前小劑補中益氣。加黑山梔。午後大劑生料六味丸。加五味子。常服自効。○夏月暑病遺尿者。白虎加人參湯。一服即應。○有先因病

醫通卷之七

小便頻數

思得堂藏

淋服利藥太多。致溺不禁者。補中益氣少佐熟附子。○有所傷損。汚血蓄於胞中。亦令遺失。鹿角屑炙黃爲末。和桃仁泥等分。酒調三錢。○欬而遺溺。屬膀胱。茯苓甘草湯。不應。五苓散。○小兒胎中受冷遺尿。一味補骨脂炒研。臨臥紅酒調服。即不遺。○孕婦及產後遺尿。見婦人門。

石頑治吳興閔少江。年高體豐。患胞痺一十三年。歷治罔効。一日偶述其證於張涵高。涵高曰。此病隱曲難明。非請正於石頑張子。不能測識也。少江素忝交知。因是延余。倍陳所患。凡遇勞心。嘔吐。或飲食失宜。則小便頻數。滴瀝瀉痛不已。至夜暑得交睫。溺即滲漉而遺。覺則阻滯如前。十三年來。服人參鹿茸。紫河車。無算。然皆平穩無礙。獨犯牡丹白朮。即服痛不禁。五犯五劇。究竟此屬何疾。余曰。病名

胞痺惟見之於內經其他方書不載是以醫不加察并未聞其病名此皆高梁積熱於上作強傷精於下溼熱乘虛結聚於膀胱之內胞也素問云胞痺者小腹膀胱按之內痛者沃以湯濡於小便上為清涕詳此節經文則知膀胱虛滯不能上吸肺氣肺氣不清不能下通水道所以滯滯不利得湯熱之助則小便澀滯微通其氣循經蒸發肺氣暫開則清涕得以泄也因舉腎瀝湯方服之其効頗捷但原其不得寐寢則遺溺知肝虛火擾而致魂夢不寧疎泄失職所以服牡升疎肝之藥則服者不勝其氣之瀉以牽動陰火也服白朮補脾之藥亦脹者不勝其味之濁以壅滯溼熱也服人參鹿茸河車溫補之藥平穩無礙者虛能受熱但補而不切於治也更擬加減桑螵蛸散用羊

腎湯泛丸服庶有合於病情然八秩年高猶特體豐不遠房室藥雖中欸難保前證不復也

又治徽友黃元吉年六十餘因喪明畜妾而患小便淋瀝春間因顛仆昏憤遺尿此後遂不時遺溺或發或止至一陽後其證大劇晝日苦於溺瀉不通非坐於熱湯則涓滴不出交睫便遺之不禁因求治於石頑其脈或時虛大或時細數而左關尺必顯弦象此腎氣大虧而為下脫之兆也乃與地黃飲子數服溺瀉稍可遺亦少間後與八味丸去丹皮澤瀉加鹿茸五味巴戟遠志調理而痊

又治陝客元仁軒年壯色蒼體豐善飲患胞痺十餘年諸省名醫俱藥之不應亦未有識其病名者癸丑夏泊吳求治其脈軟大而澀滯不調不時踣踣於地以手揉其莖囊

則沒從穀道點滴而滲必以熱湯沃之始得稍通寐則有時而遺其最苦者中有結塊如橘核之狀外裹紅絲內包黃水雜於脂膩之中與向所治高恭議田孟先無異此因恣飲不禁酒溼乘虛襲入髓竅故有是患因令堅戒煙草火酒溼芎藭桂枝糟醋雞豕炙焙等味與半夏茯苓等澤瀉草薢犀角竹茹作湯四劑不應省其故以西北人慣食等味不能戒口所以不効乃令其堅守勿犯方與調治仍用前藥四劑勢減二三又與腎瀝湯加草薢數服水道遂通洩亦不痛但覺食不甘美後以補中益氣加車前木通調之而安此與高恭議田孟先證雖同而治稍異高則因遠遊恣樂妓館致病故用腎瀝湯加減八味丸收功田由陰虛多火故用腎瀝湯生脈散合六味丸收功若草薢分

清滲水傷精之味咸為切禁此則肥盛多溼故先與清胃豁痰之藥然後理腎調脾為治不得不異耳

又治御前侍衛金漢光年逾花甲初夏懷飲新酒致病前有淋瀝瀉痛後有四痔腫突此陰虛熱陷膀胱也先與導赤散次進補中益氣勢漸向安惟庭孔瀉痛未除或令服益元散三服遂致遺溺不能自主投劑不應直至新秋脈漸栗弱因採腎瀝之義以羯羊腎製補骨脂羊脂製菟絲子濃煎桑根皮汁製桑螵蛸甫進三日得終夜安寢涓滴靡遺矣

小便黃赤

內經曰諸病水液渾濁皆屬於熱。夫小便黃赤有四。一屬肝熱。經曰肝熱病者小便先黃是也。二屬胃熱。經曰胃足陽明之脈氣盛則身已前皆熱消穀善饑渴色黃是也。三屬肺虛。經曰肺手太陰之脈氣虛則肩背痠寒則少氣不足以息。渴色變是也。四屬腎虛。經曰冬脈者腎也冬脈不及則令入於中。清脊中痛少腹滿小便變是也。○汗多而小便赤澀夏月多有此證。盛暑汗既多膀胱閉滯則水不運下。四君子合五苓散或五苓合生脈或生脈合保元或消暑丸清燥湯選用。○有小便赤短體倦食少缺盆痛此脾肺腎俱虛也。補中益氣下六味丸滋其化源自愈。誤用礞利必危。已經分利或病後有此屬脾肺氣虛不能施化。補中益氣加麥冬五味。○尺脈數大陰火上炎而小便赤少者六味丸加麥冬五味。○肝熱者煩欲解而赤澀梗痛時覺燥煩或發寒熱六味丸多加牛膝脈盛氣實者龍薈丸。○胃熱者口中乾淡引飲肌膚壯熱竹葉石膏湯。○膀胱熱甚者滋腎丸。

醫通卷之七

小便黃赤

思得堂藏

遺精

經曰怵惕思慮則傷神。神傷則恐懼流淫而不止。○腎者主封藏之本精之處也。

五藏主藏精者也。傷則失守。謂一藏之真不得其正。則一藏之病作矣。厥氣客於陰器則夢接內厥陰主筋故諸筋統繫於肝也。腎為陰主藏精肝為陽主疏泄故腎之陰虛則精不藏肝之陽強則氣不固。若遇陰邪客於其數與所強之陽相感則精脫而成夢矣。所謂陽強者乃肝藏所寄之相火強耳。故治以腎肝為主。亦有不在腎肝而在心肺脾胃之不足者。然必傳於腎肝而後精方走也。治法若從他藏而起則以初感病者為本。腎肝聚病者為標。若由腎肝二藏自得者獨治腎肝陰陽離決水火不交通者則既濟之陰陽不相抱負者。

醫通卷之七

遺精

思得堂藏

則調和之陽虛者補其氣陰虛者補其血陽強者瀉其火有正治反治從少從多隨其攸利。○夢與入交接為夢遺相火之強為患不因夢感而自遺者為精滑心腎之傷居多。○因思想無窮所願不得而為白淫者治法有五。神氣浮游宜補中益氣湯加菖蒲下珠砂安神丸。○思久成痰迷於心竅宜先服四七湯以豁其痰後用猪苓丸威喜丸調之。○思想傷陰八味丸去附子加酒黃藥以滋養之。○用心太過心不攝腎以致失精者遠志丸。○因思慾不遂則耳聞目見其精即出。名曰白淫。辰砂妙香散。○色慾過度下元虛憊滑泄不禁六味丸加鹿茸五味龍骨。○失精夢泄亦有因鬱火而得故壯年火盛多有流淫者若以虛冷用熱劑則精愈失滋腎丸加生地茯苓神藥仁菖蒲。○夢遺為肝熱膽寒以肝熱則火淫。

於外魂不內守。故多淫夢失精。或時心悸。肥人多此。宜清肝。不必補腎。溫膽湯加入參。扶神。東仁蓮肉。遺精腰疼。六味丸加杜仲五味。兔絲。莖。蓉。中年已後。還少丹。精氣不足。吸短氣。遺精盜汗。濟生鹿茸丸。斷喪太過。滑泄不禁。氣心脾氣虛。飲食少進者。金鎖玉關丸加參。著。脾腎俱虛。敗精失道。精滑不固者。九龍丹去當歸。加革。薤。五。味。然不若萃仙丸尤妙。所謂敗精失道者。非敗精不泄。而有所畜滯也。以精竅屢閉。不能開密。失其常度。而流溢不止。故宜止瀉之劑。小便過多。而便後常有滑精者。補中益氣湯下縮泉丸。痛而小便頻數者。禁用縮泉。以益腎壯火。烏藥。耗氣。非陰虛多火人所宜。遺精夢中。而水道不禁。是陽虛有火。加減八味丸。脾虛不能化水。水虧不能制火者。聚精丸加參。朮。芡。實。逆發五味。常服有効。大抵夢遺多是陰虛。火氣用事。苟非確係陽虛。桂附鹿茸等助陽之藥。慎勿輕用。非確係氣虛。參朮遠志。益氣之味。不可漫施。試觀夢遺。必在黎明。陽氣發動之時。其為陰虛。陽撥可知矣。凡身有熱。而脈洪滑。皆因於熱。犀角山梔。麥冬。茯苓。竹葉。木通。猪苓。生地。連肉。凡屬鬱滯積熱等證。貴在疏泄。醫者不知。但用固澀。反增其疾矣。宜滋腎丸。猪苓丸。清利之。肥盛之人。遺濁液。痰丸下之最妙。○脾胃溼熱之人。及飲食厚味太過。與酒客。輩。痰火為殃。多致不夢而遺泄。宜二陳。二朮。加厚朴。黃。檳。升。柴。使清升濁降。脾胃從而遺泄止矣。○仲景治失精夢交。少腹弦急。脈虛遲。或扎動微緊。用桂枝龍骨牡蠣湯。及手足煩熱。咽乾口燥。或悸或衄。此陽上升而不降。陰獨居內而為夢。用小建中湯和

之。此世俗所昧也。陸麗京曰。遺精之源有三。有斷喪太過。腎氣不藏。無夢而遺者。當益精以壯火。如鹿茸丸。安腎丸。聚精丸。九龍丹。金鎖玉關丸之類。有勞心太過。心腎不交。酣卧而遺者。當實土以睨水。如歸脾湯。妙香散。遠志丸。補中益氣湯。殊砂安神丸之類。有思想無窮。所願不得。妄夢而遺者。當瀉火以寧水。如滋腎丸。威喜丸。本事猪苓丸。清心蓮子飲之類。三者其源各異。若當清利而反補。滋滋。愈甚。當補瀉而反清利。陽氣愈微。當升補而反滋陰。元氣愈陷。不可不求其故。而為施治也。丹溪治一人。二十餘歲。功舉子業。四鼓猶未就枕。於卧間。玉莖但着。被與股。便夢交接。脫精。飲食日減。倦怠。少氣。此用心太過。二火俱起。夜不得睡。血不歸肝。腎水不足。火乘陰虛。入客下焦。鼓其精房。則精不得聚藏而欲走。因玉莖著物。猶厥氣客之。故作接內之夢。於是上則補心安神。中則調理脾胃。升舉其陽。下則益精生陰。固陽。不三月而痊。沈明仲治王雨泉。壯年氣弱。溺後精水淋漓。不斷。服六味丸不應。易八味丸。反加瀉瀉。兩尺脈數。而氣口虛大。此土虛不能化水也。與補中益氣加麥冬五味。十劑而痊。宗伯學士韓慕廬三公。郎祖昭。素稟清癯。宿有精滑不禁之恙。邀石頑診之。脈得微弦而數。尺中畧有不續之象。此不但腎氣不充。抑且氣秘不調。愈不能司封藏之令耳。為疏六味丸。去澤瀉。加鱉膠。五味。畧兼沉香。於補中寓宣法。雖如此。但久滑疲疏。難期速應。毋怪藥之不効也。

赤濁白濁

白濁

濁之爲證。莖中熱痛如火灼刀割。澀溺自清。惟凝端時流穢濁如膿。淋瀝不斷。初與澀溺不相混溫。時醫不知其故。多以利水之劑。雜投不它。因而增劇者。往往有之。蓋由敗積瘀腐者。十中六七。由溼熱下注。與脾虛下陷者。十常三四。必先補中氣。兼升舉之。而後分其藏府氣血。赤白虛實以治。與夫他邪所傷者。因在濕熱補虛。設胃氣虛甚。或火熱亢極者。則不宜純用寒涼。必反佐治之。在達人觀變耳。色白如泔。或如腐花腐漿。而馬口不乾結者。爲溼色黃赤而馬口乾掩者。爲火。此皆爲濁。胃中溼熱下流也。又濁而清者。爲溼。痛者。溼兼熱也。有溺時結塊阻滯作痛。塊中內蓄水泡者。此必醉酒使內酒溼乘虛襲入精竅也。○粘膩如膠。或心動軌遺。或溺後遺

醫通卷之七

赤濁白濁

五三 思得堂藏

下者。皆精病。與濁無干。○肥人白濁白帶。多是胃中溼熱。濁痰下流。滲入膀胱。謂之便濁。與腎絕不相干。雖溺後便出濁塊。却不牽臍。用二陳加川草薢澤瀉。薑汁炒黃蘗。濁物中有水泡者。二陳倍半夏。加猪苓澤瀉。滑石麝香。赤小豆竹瀝薑汁之類。赤者去半夏。加琥珀延胡索。赤芍藥椿根皮。若腎虛淫火易動。精離其位。而成精濁者。其精牽臍如管。雖不便溺。亦常有之。用九龍丹收攝之。若忍精不泄。流入竅隧。而患白濁。用五苓散。赤濁用猪苓湯。並加麝少許。小便頻數。莖中痛。調下益元散。赤者少加硃砂。甚者屬上焦燥熱。氣化不行。益智烏藥。皆不可用。宜清心蓮子飲。虛者妙香散。二方選用。○心經伏暑而赤濁者。五苓散減桂合生脈散。○肥人溼痰成濁。二陳加二朮黃蘗神麴。○黑瘦人脈洪數。五心煩熱。類

赤脣乾。小便赤濁。龍膽瀉肝湯。○曾見白濁入服涼藥不効。

一味生白果。卽愈者。以其專祛溼濁汚邪故也。○脾虛下陷者。補中益氣加半夏茯苓。○有小便如常。放流濁物。兩尺脈沈弱。足膝痿弱。白濁頻數。凝白如油。光彩不定。旋脚澀下如膏糊。六味丸加車薢麥冬。○莖中大痛。便赤口渴。脈來滑數者。宜與清熱利水。津液自行。四苓散加生地麥冬。苓梔知朮之類。丹方治白濁。用拘杞一錢五分。兔絲車前。韭子各一錢。蓮子去心二十一粒。入猪猪尿。臍內養一伏時。加葱酒。噉汁并食猪尿。蓮子連服二三次効。

醫通卷之七

白濁

筋病

五三 思得堂藏

當歸內補建中湯加黃耆。筋痠者。莖中作痛。筋急縮。或作癢。或腫。或筋緩不收。白物如精。隨溺而下。此腎不虛。而肝經溼熱火旺也。龍膽瀉肝湯。診。○濁證脈大而滿。按之無力。可微細。或沉緊而滿。爲虛。動滑爲實。尺脈虛浮。急疾者。皆難治。遲者易治。

前陰諸疾

前陰所過之脈有二。一曰肝脈。二曰督脈。經云足厥陰之脈入毛中。過陰器。抵少腹。是肝脈之所過也。又云督脈者起於少腹。以下骨中央。女子入繫廷孔。循陰器。男子循莖下至纂。與女子等。是督脈之所過也。

陰縮陰縱。經曰足厥陰之筋。傷於寒。則陰縮入。傷於熱。則挺縱不收。治在行水清陰器。陰縮謂前陰受寒入腹內也。本虛。四逆湯加人參肉桂。扶表邪發熱。黃耆建中加熟附三。五分。扶食。枳實理中湯加熟附五七分。發熱面赤戴陽。稍加黃連三四分。陰縱者謂前陰受熱挺縱不收也。小柴胡湯加酒黃蘗。淫熱。龍膽瀉肝湯。強中有肝火盛。強有金石性。發其證並盛不衰。精出不止。多發消渴癰疽。若因下焦伏火。

醫通卷之七

陰縮陰縱

五五 思得堂藏

宜用知母生地。麥冬。黃芩。黑參。甜桔梗。黃連。栝蒌根。地骨皮。石膏。生甘草。大豆。猪腎之類。以解毒為主。若因腎虛肝熱。宜用熟地。龜版。丹皮。茯苓。黑參。沙參。天冬。麥冬。澤瀉。五味之類。以補陰為主。夏子由奇方。治玉莖長硬不痿。精出。捏之則脆。癢如刺。鍼方用補骨脂。家韭子各一兩。為末。每服三錢。水煎服。

前日三

陰痿。當責之精衰。斷喪太過所致。經云足厥陰之經。傷於內。則不起。是也。仲景八味丸。特妙。甚者加人參鹿茸。或加巴戟。茯苓。鎖陽。枸杞。然亦有鬱火甚而致痿者。經云壯火食氣。譬人在夏暑而倦。忌遇冬寒而堅強。予嘗治腎經鬱火。令服滋腎丸而効。故須審察。不可偏認火衰也。薛立齋云。按陰莖。屬肝之經絡。若因肝經淫熱而患者。用龍膽瀉肝湯。以清肝。

火導淫熱。若因肝經燥熱而患者。用六味丸。以滋腎水。發肝血。而痿自起。陰痿弱而兩丸冷。陰汗如水。小便後有餘滴。腥氣。尻腐并前陰冷。惡寒而喜熱。膝亦冷。此肝經淫熱。宜龍膽瀉肝湯。柴胡。勝濕湯選用。腎脈強盛。右尺尤甚。此相火盛而反痿。宜滋腎丸。六味丸。

婦人陰冷。肥盛者。多是淫痰下流所致。二陳加二朮。羌防。男子外腎冷。兩解樞陰汗。前陰痿弱。陰囊淫癢。腥氣。柴胡。勝濕湯。

陰腫痛。乃風熱客於陰經。腎虛不能宣散而腫。發軟疼痛。宜桂枝湯。加羌防。荆芥。當歸。細辛。通草。但腫而不痛者。是淫熱。防已。茯苓。湯。加羌活。澤瀉。但痛而不腫者。瘀積火滯。舒筋三聖散。加歸尾。赤芍。生甘草。梢。婦人產後受風。多有此證。芍歸。

醫通卷之七

陰痿陰冷

五五 思得堂藏

羌防。荆芥。乳香。沒藥。煎湯薰洗之。陰中癢。亦是肝家淫熱。小柴胡湯下滋腎丸。瘦人燥癢。屬陰虛。六味丸。三錢。滋腎丸。一錢。和服。外用蛇床子煎湯洗之。丹方治婦人陰癢。甘蔗查燒灰。入冰片。擦之立止。尺脈數。婦人陰中生瘡。下部惡久之有蟲。用猪肝煮熱。切長條。煎鶴虱末。印天名。納陰中。引蟲出。乃殺蟲要藥。婦人癢聚。陰中腫痛。不可忍。有物如茹。妄出。與男子之症無異。因淫熱者。柴胡。清肝散。龍膽瀉肝湯選用。外以枳實。切。碎。炒。熱。帛包。熨之。冷再易。但是陰癢。俱効。

痛

經云。任脈為病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。○從少腹上衝心而痛。不得前後為衝疝。○邪客厥陰之絡。則卒疝。○厥陰之陰盛。脈脹不通。為癰瘰疝。○肝所生病為狐疝。○腎脈大急沉。肝脈大急沉。皆為疝。○心疝。心痛引少腹。上下無定。漫便難者。取厥陰。

金匱云。腹痛。脈弦而緊。弦則衛氣不行。即惡寒。緊則不欲食。邪正相搏。即為寒疝。寒疝。遠臍痛。若發則自汗出。手足厥冷。其脈沉緊者。大烏頭煎主之。

寒疝。遠臍痛。其脈陽弦。陰緊。陽弦。故衛氣不行而惡寒。陰緊。故胃中寒盛不殺穀。今寒入營中。與衛相搏。則遠臍腹痛。自汗出。手足厥冷。陽微陰盛。其候危矣。故用烏頭之溫。

醫通卷之七

疝

五十二 思得堂藏

合蜜之甘。入胃以建其中。而緩其痛。使營中之陽旺。則衛中之邪自不能留。亦不使虛寒自下上之微旨也。

寒疝。腹中痛。及脇痛裏急者。當歸生薑羊肉湯主之。

寒積迫於厥陰。衝脈。故用當歸。以通衝脈之急。生薑以散中外之寒。羊肉以補精血之虛也。

寒疝。腹中痛。逆冷。手足不仁。若身疼痛。灸刺諸藥不能治。抵當烏頭桂枝湯主之。

腹中痛。乃少陰與任之寒證。逆冷。手足不仁。身疼痛。營衛之氣亦不調矣。灸刺諸藥不効者。邪不在經。而在腎與任脈也。故用烏頭蜜煎。以溫少陰任脈之經。合桂枝。以調營衛之氣。方後有云。知者如醉狀。管衛得溫而氣行也。得吐者為中病。陽氣內復。則陰邪無容息之地而上出矣。

巢氏所叙厥疝癰疝。寒疝氣疝。盤疝附疝。狼疝。戴人又立寒疝水疝。筋疝。血疝。氣疝。狐疝。癰疝之名各七。然皆謬立多名。殊非切要。大抵疝之為證。受熱則緩縱不收。受寒則牽引作痛。受溼則腫脹累垂。虛者亦然。三者之間。分其孰多孰少。而為施治。在血分者不移。在氣分者多動。往往有左丸偏服而移於右丸者。亦有右丸偏服而移於左丸者。皆是氣分之病。若積年痛發。不脹大而不能動移者。方是血分之病。屢發屢更其處者。當是厥陰風木為患。腫極而不甚痛者。當是太陰溼土為患。又上引者。宜用桂枝吳茱萸茴香等辛熱治之。下墜者。宜用川棟黃蘗蒼朮香附苦燥治之。又痛處熱而不欲入按者。溼熱也。痛處寒而喜入按摩者。寒積也。以此明辨。萬無差誤矣。○丹溪云。累丸連小腹急痛。或有形或無形。或有聲

醫通卷之七

疝

五十二 思得堂藏

或無聲。皆以為經絡有寒。收引則痛。不知始於溼熱壅遏在經。又感外寒。溼熱被鬱。不得疎散。故作痛。若只作寒論。恐為未備。蓋大勞則火起於筋。醉飽火起於胃。房勞火起於腎。大怒火起於肝。火鬱之久。溼氣便盛。濁液凝聚。并入血隊。流入厥陰。肝性急速。為寒所束。宜其痛甚。當用枳實桃仁。山梔吳茱萸。山查生薑。溼勝成癰。疝。加荔枝核。痛甚加鹽炒大茴香。痛處可按者。加桂枝。此亦前人未備之旨也。○古方治疝。多用溫劑。丹溪獨用涼劑。然更有寒熱兼施者。如烏頭梔子湯。治疝。少腹緩急。痛處按之則減。因其人素有溼熱。外束寒邪。故用黑山梔。川烏頭。等分為末。薑汁糊丸。川烏治外束之寒。梔子治內鬱之熱。殊有奇効。元氣衰弱者。加入參白朮。佐以木香砂仁。○臍下撮急。周身皆痛。小便數而清。諸脈洪緩。獨

腎脉弦急無力。此邪客於腎。名曰腎疝。酒黃當歸丸。凡疝氣帶下。皆厥陰風木之病。全蠍治風之要藥。川棟茴香皆入小腸。當歸延胡活血止痛。疝氣帶下。皆寒邪積聚於小腸。總登化為熱。非附子不能開之。丁香木香為引導也。若有瘀血結滯作痛。又當以桃仁赤芍導之。

衝疝者。氣上衝心下。二便不通。乃寒淫之邪。固結於內。鬱積為熱。加以客寒觸之而發。天台烏藥散。加鐵鑪水調服。甚則禹功散。加炮薑枳實青皮下之。○衝疝歲久不除。漸成衝心疝氣。證與蠱脹無異。誤用攻伐。服必轉劇。惟辛溫健運。庶為合宜。然亦取効良難。至於調理。尤宜詳慎。每見食填中脘。濁陰之氣上逆。頃刻告變。業嘗見之。此與衝心脚氣不殊也。狐疝者。卧則入腹。立則出腹。仲景云。陰狐疝氣。偏有大小。時

醫通卷之七

疝

思得堂藏

時上下。蜘蛛散主之。若寒束熱邪。疝瘕攻痛。酒黃當歸丸。蠱疝者。少腹控卵。腫急絞痛。靈樞刺節篇。所為去爪是也。畢囊腫大。如斗如栲栳。甚者與身齊等。而不作痛。中藏穢液甚多。此淫邪也。最為難治。但覺微痛者可治。桂苓九加蒼朮厚朴黃檗川烏。

水疝。腎囊腫痛。陰汗如流。囊如水晶。小腹內按之作聲。得之飲酒使內。更感風寒。淫留囊中。所致。五苓散換蒼朮。加棟實藥皮。

水腎。則陰丸腫大作痛。頑痺結硬。皆嗜慾內成。腎經虛憊。淫熱凝滯其間。故頑痺結硬。腫大作痛。二妙散加肉桂吳茱萸。半夏枳實生薑。○荆芥穗一兩。朴硝蘿蔔各二兩。葱七莖煎湯淋洗。

厥疝者。厥氣上衝心腹。肝經素有火邪。加以寒氣外鬱。實鑑當歸四逆湯。若陰疝牽引小腹痛。房勞痛不可忍者。此肝經素虛挾熱。而外挾風寒也。烏頭梔子湯。加葱白二三莖。煎成入紅酒調服。痛定。用八味丸加茴香。

瘕疝。脾傳之腎。少腹冤熱而痛。出白。即巢氏之瘕疝。子和之筋疝也。丹溪所謂內鬱濕熱者。與此疝相似。龍膽瀉肝湯去生地。加橘核桃仁吳茱萸。

偏墜初起。香橘散加穿山甲。或穿山甲茴香二味為末。酒調下。乾物壓之。患久藥之不効。或一核縮入少腹。痛不可忍。用手按捺。方得還舊者。木香棟子散。外用牡蠣灰良薑等分為末。唾津調塗。腫大一邊。須臾如火熱。痛即安。○陰虛偏墜。一味敗龜版為末。茴香湯。或溫酒調服。不應。風入厥陰也。加醋

醫通卷之七

疝

思得堂藏

炒蠍梢三分。小腸氣者。小腸經為病。小腹引墜。九連腰脊而痛。蓋小腸虛則風冷乘間而入。厥而上衝肝脈。控引墜丸上而不下。痛衝心肺。病名控墜。天台烏藥散。○小腸氣及腎虛腰痛者。鳴起丸。○若淫熱內鬱。小便不通。為膀胱實熱。加味通心散。

膀胱氣者。膀胱經為病。小腹腫痛。不得小便是也。宜五苓散加川棟子葱白茴香煎成入鹽少許熱服。○疝因食積為患。者必因飲食而發。痛處有塊梗起。宜立効散。○疝因瘀血為患。者必因奔馳受寒而發。痛處手不可拊。按之刺痛如錐。宜酒黃當歸丸去丁香加桃仁。○疝因風與溼熱而發者。必連陰囊腫痛。九味蠅葱散。○疝急作痛者。用黃藥酒炒為君。醋炒青皮延胡索益智桃仁為臣。蒼朮香附茴香俱鹽水炒為

在附子甘草爲使。研末作湯服。後一痛過更不再作。○七疝
痛不可忍。灸大敦穴。穴在足大姆指聚毛處。去甲一韭葉。灸
七壯。屬厥陰井也。須用厚蒜瓣襯。不可貼肉。貼肉則傷指甲。
○一種因肺氣不化。膀胱爲熱邪所滯。而小便不通。小腹與
臍脹痛。一味沙參。大劑煎服。肺氣化而小便通。一服即愈。但
小便不閉者不可服。○寒疝用茴香一觔。生薑二觔。搗絞自
然汁。浸一夜。收盡。入青鹽二兩。炒燥爲末。酒九。空心酒或葱
湯下二錢。小腸疝氣。用四製香附鹽炒茴香等分爲末。空心
酒下三錢。婦人陰腫堅硬。青橘皮一觔。炒燥爲末。分二分。絹
包焙熱熨。頻頻易之。○寒疝引急。痛連小腹。及罩九偏縮者。
以胡椒十餘粒爲細末。搽黑膏上烘熱。貼陰囊片時。其痛即
止。若罩九偏縮者。貼偏小半邊。蓋縮即寒。而墜則熱也。○患
疝之人。每浴時忍小便不去。入湯揉令腸中和暢。出浴即去。
小便。使所鬱寒溼。乘熱發泄。又有疝氣入湯。致逼上升者。此
奔豚證也。人常有之。而俗醫不能辨耳。○小兒啼哭不止。動
於陰器。結聚不散。則陰核腫大而成疝。用桂枝湯加細辛當
歸木香蠅尾。○小兒啼哭。陰囊腫大。丹方用全蠍一分。連皮
核桃肉十分。蜜九彈子大。日服一丸。米湯化下。屢効。
石頑曰。疝證多用辛散苦降。以解寒熱鉛絲之邪。然厥陰一
經內藏龍火。稍涉辛溫。如烏頭桂枝。肉桂茴香之類。每致溼
熱鬱發。而爲囊癰腫潰者多矣。因爲拈出。以警將來。
診脈數而弦者。當下其寒。脈緊大而遲者。必心下堅。脈大
而緊。陽中有陰也。可下之。○脈弦急搏皆疝。弦數宜清熱。弦
緊宜溫經。兼浮宜兼汗。兼實宜兼下。弦細爲寒溼。弦滿爲溼。

熱也。

交腸

交腸之病。大小便易位而出。或因醉飽。或因大怒。遂致藏氣乖亂。不循故道。法當宣吐以開提其氣。宜五苓散加木香以探之。肥盛多痰者。二陳湯加枳實木香以探之。使關門清利。得司泌別之職則愈矣。

石頑曰。交腸證。雖見於方書。而世罕見。緣石山詹石匠之婦。產後五六日。惡露不行。腹脹喘滿。大便從前陰而出。省其故。緣平昔嗜嗜烟酒。所產之兒。身軟無骨。因而驚駭。遂患此證。余以芎歸湯加我朮肉桂。妙黑山查一服。惡露通而二便如常。又陸聖祥之女。方四歲。新秋患血痢。而稀糞出於前陰。作冷熱不調食積治。與五苓散服香連丸二劑而愈。又錢吉甫女。年十三。體肥痰盛。因鄰居被盜。發熱頭痛。嘔逆面青。六脈

醫通卷之七

交腸

空一 思得堂藏

弦促。而使溺易位。此因驚氣亂。痰襲聚諸所致也。與四七湯下礞石滾痰丸。開通痰氣而安。

腸鳴

內經腸鳴有五。一曰脾虛。經云。脾虛則腹滿腸鳴。餐泄食不化。枳實理中湯加木香。二曰中氣不足。腸為之苦鳴。六君子湯加木香。三曰邪在大腸。經云。腸中雷鳴。氣上衝胸。邪在大腸。半夏瀉心湯。四曰土鬱。經云。土鬱之發。腸鳴而為數後。是也。平胃散加半夏木香茯苓。五曰熱勝。經云。少陰在泉。熱淫所勝。病腹中腸鳴。氣上衝胸。葶藶散。○金匱云。腹中寒。氣雷鳴切痛。胸腹逆滿。嘔吐。附子梗米湯。○東垣云。如胃寒泄瀉。腸鳴。於升陽除溼湯中加益智半夏各五分。生薑大棗和煎。○丹溪云。腹中鳴者。病本於胃。乃火激動其水也。二陳加苓連山梔。不應。用胃苓湯加減。○肺移寒於腎。為涌水。涌水者。按腹不堅。水氣客於大腸。疾行則鳴濯濯。如囊裏漿。水

醫通卷之七

腸鳴

空一

思得堂藏

之病也。葶藶丸加木香。

腸癰

金匱云腸癰之爲病。其身甲錯。腹支急。按之濡如腫狀。腹無積聚。身無熱。此爲腸內有癰。膿以附子敗醬散主之。

詳腸癰始發。證未昭著。但以腹之支急。按之如腫。或身有塊壘。便爲真候。若腹無積聚。身無熱。詢爲沉寒固結。雖下無濟。故用意以附子敗醬散。專以破散沉寒爲務也。周禹載云。附子辛散以破結。敗醬苦寒以排膿。務令膿化。仍從水道而出。將血病解而氣亦開矣。

腸癰者。少腹脹痛。按之則痛如淋。小便自調。時時發熱。自汗出。復惡寒。其脈遲緊者。膿未成。可下之。當有血。脈洪數者。膿已成。不可下也。大黃牡丹湯主之。

詳上條用薤白附子敗醬散。是主寒沫初搏於腸。未鬱爲

醫通卷之七

腸癰

思得堂藏

熱。腹滿。而脈不洪數。身無熱而甲錯如鱗。故當用辛熱以散其結。卽內經腎移寒於脾。則爲癰。膿是也。若癰已成。又非此方所宜。觀次條言脈遲緊。膿未成。可下之。當有血。則知膿未成時。其脈尚帶遲緊。便當下而不可溫矣。下法用桃核承氣。可不言而喻。至於脈洪數者。膿已成。不可下也。大黃牡丹湯主之。夫既曰不可下。而仍用大黃者。何也。蓋癰膿既成於內。不下。毒從何泄。以意逆之。非謂藥不可下也。必得排膿破瘀之劑。始爲合宜。但戒泛用下藥耳。病者脈數無熱微煩。然欲臥汗出。初得之三四日。目赤如鳩。服七八日。目四眇黑。若能食者。膿已成也。赤小豆當歸散主之。

脈數而煩熱邪之徵也。何反無熱耶。脈法有云無故脈數。

必生癰疽。今癰發於內。故無熱。亦畜於內。故汗出。初得三四日。毒邪內盛。勢必上蒸。故目赤如鳩。服至七八日。膿成而滯。未得下泄。故四眇黑。毒勢方張。故默默不欲食。毒邪將化。故漸能食。方用赤小豆令芽出。以通滯分之熱。毒當歸以散腸胃之積血。用散不用湯者。取有質之物。以迅掃在下之膿血也。金匱此條。向在狐惑例中。并治腸癰便毒。及下部惡血諸疾。

千金云。卒得腸癰。而不曉其病候。愚醫治之。錯則殺人。腸癰之爲病。小腹重而強。抑之則痛。小便數似淋。時時汗出。復惡寒。其身皮皆甲錯。腹皮急如腫狀。其脈數者。已有膿也。其脈遲緊者。未有膿也。甚者腹脹大。轉側聞水聲。或透臍生瘡。或膿從臍中出。或大便出膿血。一羽軍官婦病。醫脈之知

醫通卷之七

腸癰

思得堂藏

腸中有膿。下之卽愈。何以知之。曰寸口脈滑而數。滑則爲實。數則爲熱。滑則爲營。數則爲衛。衛數下降。營滑上升。營衛相干。血爲濁敗。小腹痞堅。小便或澀。或復汗出。或復惡寒。膿已成。設脈遲緊。卽爲瘀血。血下卽愈。腸癰下血。腹中疝痛。其結發熱惡寒。欲驗其證。必小腹滿痛。小便淋瀝。反側不便。卽爲腸癰之確候。無論已成未成。俱用大黃牡丹湯。加厚角惡服之。小腹痛。若腫滿不食。小便不利。膿壅滯也。用薤白丹皮桃仁。薤仁。煎服以排之。若至反側作水聲。此膿已成熱也。千金托裏散。下太乙膏。若膿從大便出者。爲直腸癰。可治。若從臍中出者。爲盤腸癰。多不治。經云。腸癰爲病不可。驚則腸斷而死。

脫肛 殺道癰疽

難經云出者為虛。門之脫。非虛而何。况大腸與肺為表裏。肺藏蘊熱則閉。虛則脫。須升舉而補之。慎不可用墜氣之藥。○產育及久痢用力過多。小兒氣血未壯。老人氣血已衰。故多患此疾。是氣虛不能約束禁固也。大劑補中益氣湯為主。升麻須用醋炙。○瀉痢後大腸氣虛。肛門脫出。不腫不痛。屬氣血虛。補中益氣加伏龍肝。赤腫有痛。宜兼涼血祛風。加羌防芍藥。表惡下重有膿血。加木香烏梅。○大腸熱甚而脫。升麻湯加羌防。連。腸風下血而脫。人參胃風湯。○老人虛人用力過度而脫者。十全大補湯。○腸胃燥滯。大便秘結。努掙太過。因而脫肛者。人參固本丸。加槐角涼補以潤之。○有腸頭作癰。即腹中有蟲。丈夫因酒色過度所致。大腸者傳道之

醫通卷之七

脫肛

卷六 思得堂藏

官。腎者作強之官。蓋腎虛則泄母氣。肺虛則大腸不收。故成脫肛。治法。內服黃連犀角散。外用朴硝煎湯洗之。○大腸虛而挾熱。肛門紅腫。槐花槐角等分。羊血拌炙熟為末。以酒送下。○大腸受熱則赤腫。受寒則白滑。皆能脫出。當審其因證。寒者以香附荆芥胡荽煎湯洗之。熱者以五倍子朴硝白礬煎湯洗之。風熱以荆芥薄荷朴硝煎湯洗之。○排赤腫痛。不可用熱湯薰洗。尤忌五倍子等酸澀收斂。湯氣蒸發。則愈腫愈痛。宜熊膽磨水點之。或田螺去殼入冰片少許。埋地一宿。化水點之。○病旁人脫肛。骨肉相失。聲散喘血。陽事不禁。夢寐交侵。呼吸不相從。晝夜熱者死。唾膿血者亦死。其脉不數而有根蒂。及頻不赤者生。○小兒脫肛。龍頭燒灰塗之。殺道癰疽。多因淫熱生蟲。欲成痔瘻。宜以雄黃入艾綿燒烟

熏之。○治殺道癰。赤腫或癢或痛。用杏仁搗作膏傅之。或炒令黃。以綿蘸塗殺道中。○外臺治下部蟲。密杆挑葉一斛。蒸之。令極熟。內小口甕中。坐定薰之。蟲立死。○治肛門腫痛。用木髓子肉四五枚。研極細。沸湯泡洗。另用少許塗患處。

醫通卷之七

殺道癰疽

卷六 思得堂藏

痔

內經曰。因而飽食。筋脈橫解。腸痔為痔。又曰。督脈生病。瘡痔。或醉飽入房。精氣脫舍。其脈空虛。酒毒乘之。流注於脈。或淫極而強忍不泄。前陰之氣歸於大腸而痔。或以藥固精。停留不化。流著纂間。從其所過。肛門而為痔也。其證有七。肛邊發露肉珠。狀如鼠乳。時出膿血。妨於更衣者。曰牡痔。肛邊腫痛。生瘡突出。腫五六日自潰。出膿血者。曰牝痔。肛邊生瘡。類類發痛。癢而復痛。更衣出清血者。曰脈痔。腸內結核。痛而有血。寒熱往來。雙酒脫肛者。曰腸痔。因便而清血。隨下不止者。曰血痔。每遇飲酒。發動。瘡痛流血。曰酒痔。憂恐鬱怒。立見腫痛。大便艱難。強力肛出而不收。曰氣痔。名色種種。各當審其因。而治之。其形有知蓮花雞冠核挑。或如牛乳雞心鼠乳櫻桃。

醫通卷之七

痔

思得堂藏

之狀。或藏肛門之內。或突出於外。久而不瘥。變為癰也。潰有血膿。都為熱甚。至若潰出黃水。則為淫熱矣。久而不愈。血氣衰弱。以致穿穴成漏。又無痔而肛門左右。別有一竅。流出膿血者。俱當戒酒遠色。少勞茹淡方妙。○立齋云。瘡痛二便秘。宜清熱涼血。潤燥疎風。若寒涼損中者。調養脾胃。滋補陰精。若漏而穿。穿腸者。宜養元氣。補陰精。大便秘者。潤燥養血。肛門墜下。作痛。湯火除淫。或作瘻者。祛風勝濕。腫痛小便不通。湯肝導滯。若疝與痔俱患。用六味丸。補中益氣。並進。○痔證之方不一。東垣雖分淫熱風燥四治。大都不離蕩滌痰熱之藥。如蛻皮皂角。檳榔。大黃。桃仁之類。在所必用。兼風毒則加羌防升柴。甚則麻黃。桑本汗之。兼燥氣則加秦艽。當歸。黃耆。淫勝則加蒼朮。黃藥。澤瀉。茯苓。兼熱甚則加芩連。郁李生。

地。膿血則加甲片。歸尾。酒痔則加葛根。赤小豆。地芍。苓。半。氣痔則加枳。橘。木。香。紫。蘇。食。積。則加黃連。枳。實。麩。藥。痛。極。則加乳。沒。血。多。則加髮。灰。氣。虛。則加參。耆。血。虛。則加膠。艾。不。必。拘執。古。方。也。惟。血。痔。諸。藥。不。應。石。煤。槐。花。空。心。烏。梅。湯。服。神。効。

○陳。毓。仁。云。諸。痔。欲。斷。其。根。必。須。枯。藥。當。實。其。效。必。戒。房。勞。百。日。方。妙。凡。治。內。痔。先。用。通。利。藥。蕩。滌。腸。府。後。以。喚。痔。散。填。入。肛。門。其。痔。即。出。欲。用。枯。痔。散。先。以。蠶。痔。膏。圍。護。四。邊。好。肉。然後。上。之。上。枯。藥。後。色。黑。堅。硬。裂。縫。則。以。落。痔。湯。洗。之。脫。落。後。孔。竅。不。收。者。以。生。肌。散。摻。之。至。於。穿。腸。久。漏。者。另。有。胡。連。追。毒。丸。黃。連。閉。管。丸。主。之。諸。痔。及。五。癰。六。瘤。凡。帶。小。而。頑。大。者。俱。用。黃。線。方。治。之。○洗。痔。法。用。生。蚌。劈。開。取。水。點。即。用。煮。湯。熏。洗。効。○痔。厥。赤。腫。痛。以。真。熊。膽。研。水。點。之。腫。痛。自。消。○

醫通卷之七

痔

思得堂藏

點。痔。用。大。蠅。螺。一。個。挑。去。掩。入。麝。香。冰。片。少。許。過。一。宿。化。水。點。之。又。法。用。大。蠅。牛。一。箇。去。殼。生。銀。杏。肉。一。枚。同。研。爛。入。冰。片。半。分。研。勻。點。上。即。收。漏。○經。云。陷。脈。為。癰。留。連。肉。膜。因。瘡。穿。膿。汁。不。盡。復。感。七。情。四。氣。而。成。近。則。常。淡。紅。或。微。腫。或。小。枝。久。則。上。而。橫。白。內。而。黑。爛。淫。蟲。惡。臭。生。焉。治。法。宜。補。氣。生。血。外。以。黑。附。子。為。末。唾。津。和。作。餅。如。錢。厚。以。艾。灸。之。隨。漏。大。小。作。炷。但。灸。微。熱。不。可。使。漏。乾。則。易。困。倦。則。正。來。日。再。灸。直。至。內。平。為。効。仍。須。補。藥。常。服。○丹。方。治。痔。漏。以。積。年。琉。璃。洗。淨。油。膩。火。煨。研。細。以。紅。酒。服。四。錢。不。過。七。日。其。管。自。去。○丹。方。以。蠶。膠。一。味。炒。研。為。散。日。用。一。錢。匙。砂。糖。調。服。服。久。痔。自。枯。落。一。法。以。降。藥。紙。條。搥。進。黑。膏。掩。之。自。脫。以。乾。漆。灰。搥。進。亦。脫。或。生。漆。食。人。亦。脫。

以漆能破瘀血也。大抵漏瘡孔中多有惡穢之物。以露蜂房白芷苦參煎湯。無風處薰洗。日三次。良。有得漏人。每日侵晨食狗肉。勿令間斷。取其性溫益腎。腎主二便。百日中管自消不藥而愈。又法外用土壅燒赤。投瘡中以亂髮燒烟。日薰一三次。無論新久痔漏。日漸管脫焦枯而愈。

張氏醫通卷之七終

思得堂藏

張氏醫通卷之八

清 長洲石頑張

聯路玉

男 以柔安世 恭訂

日本 大泉長菴前田安宅子仁

男 典子守 再訂

七竅門

目疾統論

內經曰。五藏六府之精氣。皆上注於目。而為之睛。睛之窠為眼。骨之精為瞳子。筋之精為黑眼。血之精為絡。其氣之精為白眼。肌肉之精為約束。裹攢筋骨。血氣之精而與脈并為系。上屬於腦。後出於項中。後世五輪八是故瞳子黑眼法於

醫通卷之八 目疾統論

思得堂藏

陰白眼赤脈法於陽。陰陽合傳而精明也。東方青色。入通於肝。開竅於目。藏精於肝。人卧則血歸於肝。肝受血而能視。心合脈。諸脈皆屬於目。目者宗筋之所聚。上液之道也。泣不止則液竭。液竭則精不灌。精不灌則目無所見矣。氣脫者目不明。目眦外決於面者為銳眦。眦少近鼻上為內眦。上為外眦。眦太下為內眦。眦陽。赤脈從上下者太陽病從下上者陽明病。從外走內者少陽病。邪客陽蹻之脈令人目痛。從內眦始。東垣曰。經云。諸脈皆屬於目。目得血而能視。又云。心火事煩。飲食失節。勞役過度。故脾胃虛弱。心火大盛。則百脈沸騰。血脈逆行。邪害空竅。夫五藏六府之精氣。皆稟受於脾土。而上貫於目。目者血之宗也。故脾虛則五藏之精氣皆失。所司不

能歸明於目。心者。若火也。主人之神。宜靜而安。相火代行其令。相火者。胞絡也。主百脈。皆榮於目。既勞役運動。勢乃妄行。及因邪氣所并。而損其血脈。故諸病生焉。凡醫者。不理脾胃。及養血安神。治標不治本。不明正理也。

子和云。口不因火。則不病。如氣輪變。赤火乘肺也。肉輪赤腫。火乘脾也。黑水神光。被腎火乘肝與腎也。赤脈貫目。火自甚也。能治火者。一句可了。故內經云。熱勝則腫。治火之法。在藥則微寒。吐之下之。在鍼則神庭上星。顙會前項百會。血之醫者可。使立退。痛者可。使立已。昧者可。使立明。腫者可。使立消。惟小兒不可。刺顙會。為肉分淺薄。恐傷其骨。然小兒水在上。火在下。故目明。老人火在上。水不足。故目昏。內經云。血實者宜決之。又云。虛者補之。實者寫之。如雀目不能夜視。及內障。

醫通卷之八 目疾統論 二 思得堂藏

暴怒大憂之所致也。皆禁出血。止宜補肝養腎。目暴腫。隱澹難開者。以三稜鍼刺前項百會穴。出血大妙。宜淺勿深。深則傷骨。惟後項強間腦戶風府四穴。不可輕用鍼灸。以多忌犯故也。○目忽盲不見物。此相火也。太陽陽明氣血俱盛。乃刺其鼻中攢竹穴。與頂前五穴。大出血立明。他經出血。其病轉劇。故曰。刺太陽陽明。則目愈明。刺少陽陽明。則目愈昏。近世有以光明草。於上下胞打出血。絲往復。即三稜鍼刺血之法。惟可施之於有餘暴發耳。外障屬風熱上壅。上下胞肉。皆磨磨蕩其睛。久之生翳。蔽其睛明。當消風散熱。外用點藥退之。內障屬虛挾氣。黑水神光。皆腎外似好眼。而不能照物。不痛不癢。惟不能睹。須分氣血脾胃治。

銀海精微曰。夫眼者。乃五藏之精華。如日月麗天。昭明而不可掩者也。其首尾赤皆屬心。其滿眼白睛屬肺。其烏睛裏膜屬肝。其上下肉胞屬脾。而中間一點黑瞳。如漆者。腎實主之。是隨五藏各有證。然論所主。則瞳子之關係重焉。何以言之。目者肝之外候也。肝取木。腎取水。水能生木。子肝母腎。焉有子母而能相離者哉。故肝腎之氣充。則精彩光明。肝腎之氣乏。則昏朦眩暈。烏輪赤暈。刺痛浮漿。此肝熱也。眼生新淚。枯黃連睛。此肝虛也。瞳神開大。淡白偏斜。此腎虛也。瞳神緊小。或帶微黃。此腎熱也。一虛一實。以此驗之。凡熱衝發於眼。皆當清心補肝。又不可拘執其水生木之說。折而論之。則拘急牽連。瞳胞白癢而清淚不赤。不痛。是謂風眼。烏輪突起。胞硬紅腫。淚淚淫漿。裏熱刺痛。是謂熱眼。眼昏而淚。胞腫而軟。

上壅。酸澀微赤。是謂氣眼。其或風與熱并。則癢而浮赤。風與氣薄。則癢而昏沉。血熱交聚。故生淫膚粟肉。紅縷偷鍼之類。氣血不至。故有眇視胞垂。惟以目障之形。淡紫而隱紅者。為虛火。鮮紅而嫩赤者。為實熱。兩皆暴露。生努肉者。此心熱血旺。白膜紅膜如拘輪者。此氣滯血凝。熱證瞳神肉壅。白睛帶淫。色浮而赤者也。冷證瞳神青綠。白睛枯槁。氣沉而濁也。眼熱經久。復有風冷所乘。則赤爛眼中不赤。但為痰飲所注。則作痛。肝氣不順而挾熱。所以羞明。肝熱畜聚而傷胞。所以胞令。此外證之大槩。然而五藏不可缺一。脾與肺獨無預何也。曰。白睛帶赤。或紅筋者。其熱在肺。上胞下瞼。以目胞間如赤點者。其熱在脾。脾主味也。五味榮養諸中。則精神發於外。肺主氣也。水火升降。營衛滿轉。非氣孰能使之。前所云五。

醫通卷之八 目疾統論 三 思得堂藏

藏各有證應於此又可推矣。雖然眼之為患多生於熱其間用藥大抵以清心涼肝調血順氣為先。有如腎家惡燥設遇虛證亦不過以清肝地黃輩潤養之。輕用溫藥不可也。至於退腎一節尤關利害。凡腎起肺肺家受熱輕則朦朧重則生翳如珍珠如神米者易散。腎狀如梅花者難消。雖自熱生然治法先退腎而退熱若謂熱極生腎先去赤熱則血為之冰而胃不能去矣。其有赤眼涼藥與之過多又且滌之以冰不反掌而水凝矣。眼持一團水且水性澄清尤不可拘拘於點洗。喜怒失節嗜慾過度窮役眼力泣涕過多凌寒衝風當屏酒熱不避煙火飲啖熱多此皆患生於熱府者也。端事點洗可乎。有能靜坐澄神愛護目力故懷息慮心逸日休調和飲食以養之對酌藥餌以平之明察秋毫斷可必矣。

醫通卷之八

百病統論

四 思得堂藏

五輪八廓所屬五輪者肝屬木曰風輪在眼為黑睛心屬火曰血輪在目為二青脾屬土曰肉輪在目為上下胞其上屬脾而下屬胃肺屬金曰氣輪在目為白仁腎屬水曰水輪在目為瞳神此為眼目之根本又藉血為之胞絡也逮夫八廓有名無位。膽之府為山廓又名清淨廓大腸之府為天廓又名傳送廓膀胱之府為澤廓又名津液廓肝之府為風廓又名養化廓腎之府為水廓又名會陰廓命門之府為火廓又名抱陽廓脾胃之府為地廓又名木穀廓小腸之府為雷廓又名關前廓此雖眼目之源派而實無關於治療也五藏或蘊積風熱或有七情之氣鬱結不散上攻眼目各隨五藏所屬而見或腫而痛流淚多淚或生冷瞖障膜昏暗失明治之須究其源風則散之熱則清涼之氣結則調順之切不可輕

用鍼刀鉤割倘得其愈出乎僥倖倘或不然終身之害又目不可過用寒涼恐冰其血凝而不流亦成癰疾當量入之老少氣體虛實用藥又有腎虛者亦令入眼目無光或生冷瞖當煖腎經北方之人患眼皆是目冒飛沙夜卧熱炕二氣交蒸治宜多用涼藥裏氣與南方不同也又痘疹之後毒氣鬱於肝氣不能湧發於眼目傷於瞳神者素無治法也

開導說

開導之法蓋由陰虛火盛經絡鬱滯不得通暢而設其處有五謂迎香內明上星耳際左右兩太陽穴也內明正隊之衝鋒也其功雖遲漸收而平順兩太陽擊其左右翼也其功次之上星穴絕其嚮道也內迎香抵賊之巢穴也成功雖速乘隙而征耳際擊其遊騎耳道遠功卑智者不取此實極危之險

醫通卷之八

開導說

五 思得堂藏

點服藥說

病有內外治各不同內疾已成外證若無點之何益外有紅絲赤脈若初發乃微邪退後乃餘賊點亦可消服之猶愈內病始盛而不內治只泥外點者不惟徒點無功且有激發之患內病既成外病已見必須內外夾攻點服並行奈何人多愚拙有喜服而長點者有喜點而畏服者不知內證既發非服不除外疾既成非點不退外障服而不點者病初發浮嫩未定者亦退既已結成者服雖不發不長所結不除當內外

夫攻方盡其妙

鈎割鍼烙說

鈎割鍼烙四者。猶斬刈之刑。剪戮兇頑之法也。如鈎。先須識定何處。皮肉筋脈浮淺。而手力亦隨病輕重行之。如鍼。先須識定內障證候。可鍼歲月已足。氣血寧定者。方與之鍼。庶無差誤。鍼後當照證內治其本。或補或瀉。各隨其證之所宜。若止治其標。不治其本。則氣不定。不久復為害矣。割。如在氣血肉三輪者。可割。而大皆一塊紅肉。乃血之英。心之華也。若誤割之。則目盲。傷重者死。有割傷因而惹風。則為燥為潰。爛為漏。為目枯。凡障若掩及風輪之重厚者。可割。如攀睛努肉。難冠。規肉。魚子。石榴。赤脈。虬筋。肉。脾。粘輪等證。可割。凡鈎割見血。及鍼犯血絡。須以綿漬墨水。裹之。餘病及在風輪之淺者。

醫通卷之八

鈎割鍼烙說

六

思得堂稿

誤割之。則珠破而目損矣。烙能治殘風潰敗。瘡爛溼熱。久不愈者。輕則不須烙。而能自愈。若紅障血分之病。割去者。必須烙定。否則不久復生。在氣分之白者。不須用烙。凡鍼烙皆不可犯及烏珠。雖有惡障厚者。鈎割亦宜輕淺。淺者。去外邊其內邊障底。只點藥緩伐。久自潛消。若割到風毒流毒。瘀血等證。當以活法審視。不可拘於一定。鍼瞳神發白。一切內障。在心融手巧。輕重得宜。須口傳目見。非筆下可形容也。

金鍼開內障論

張飛鸞曰。內障一證。皆由本虛邪入。肝氣衝上。不得外越。凝結而成。故多患於躁急善怒之輩。初起之時。不痛不癢。視物微昏。或朦朧如輕烟薄霧。次則空中常見黑花。或如蠅飛。蟻走。暗一成二。瞳神漸漸變色。而至失明。初時一眼先患。次則

相牽俱損。能睹三光者可治。若三光已絕。雖龍樹復出。亦難挽回。古人雖立多名。終不越有水無水之辨。若有水而光澤瑩徹者。易明。無水而色不鮮明者。難治。忽大忽小。收放如氣蒸動者。鍼之立明。若久視定而不動者。為死證。縱水未枯。治之亦難全復。腎色白或帶青。或如爐灰色。糙米色者。易明。若真綠正黃色者。不治。凡腎不拘何色。但有稜角。撥即難落。腎狀破散。及中心濃重者。非撥可除。若猶能視物者。其腎尚嫩。不可便鍼。俟腎老。然後鍼之。又一種腎色雖正。水縱不枯。目珠壞塌者。此必不治。不可輕用金鍼。如一眼先暗。而三光已絕。其後眼續患。亦難鍼治。若夫瞳神散大。或緊小。或渾黑。或變色。而無障。至不睹三光者。此內水虧乏。不在證治。倪仲賢所云。圓腎水腎。滑腎。瀉腎。散腎。浮腎。沉腎。橫腎。與花腎。白

醫通卷之八

金鍼開內障論

七

思得堂稿

腎黃心黑。水凝。驚振內障等證。金鍼撥之。俱可復明。但鍼後數日中。宜服磁珠消腎等藥。後則常服補腎調養氣血之劑。以助其光。其腎狀龍木論中。已悉不暇再述。姑以鍼時手法言之。若江西流派。先用冷水洗眼。使腎凝定。以開鋒鍼。先刺一穴。續進圓鍼。撥腎。或有開孔。撥腎。俱用鴨舌鍼者。云龍樹真傳。但鍼粗穴大。每至痛極欲暈。余所用毫鍼。細而尖銳。取穴輕捷。全無痛楚。然必擇吉日。避本命對沖日。閉破日。尻神在頭日。風雨陰晦日。酷暑嚴寒日。令病人先食糜粥。不可過飽。少停向明端坐。一人扶定其首。禁止傍人喧雜。及左右輕率。孝服不潔之人。醫者凝神澄慮。慎勿膽怯手顫。以左手大次二指。按開眼胞。使其轉睛向鼻。睜目如努。出狀右手大次中三指。捻正金鍼。據處之上。看準穴道。從外皆一邊。雖

黑珠約半米長許。平對瞳神。下鍼最便。必須手準力完。一鍼即進。切勿撓動。使之畏忍。所以開單臂。須遮蔽好眼。方可進鍼。進鍼之後。以下唇唇抵鍼柄。輕輕移手於鍼柄盡處。徐徐撚進。第一宜輕。稍重則痛。俟鍼進約可撚至瞳神時。以名指曲附大指次節。承其鍼柄。虛虛拈著。向上斜回。鍼鋒至瞳神內。夾道中。貼腎內面。往下撚之。腎即隨落。若不落。再如前手法。從上往下撚之。倘三五撚不下。須定穩念頭。輕輕撚去。自落。惟死腎撚之不動者。忌撚。有撚落而復起者。當再撚之。其腎隨鍼撚於黑珠之下。畧頓起鍼。緩緩撚出。但元氣虛人。鍼後每多作嘔。以托養神膏者。屬胃氣也。須預備烏梅之類。勿使其嘔。為妙。嘔則防腎復上。上則一兩月後復鍼。腎既盡。不可貪功多撚。多撚則有傷損神膏。嘔動胃氣之害。凡腎嫩如

醫通卷之八

金鍼開內障論

八

思得堂藏

藥。不沾鍼首。而不能撚下。或撚下而復泛上。滿珠者。服補養兼消腎藥。自明。先與千金磁珠丸七服。次與皂莢丸。生熟地黃丸。並進。否則候凝定。再鍼。不可限以時日。有種腎難撚落。圓滑而撚下復滾上者。必畧縮鍼頭。穿破其腎。撚之自下。不下。亦如前用藥。自消。或有目珠難於轉內者。鍼內皆亦得。此名過梁鍼。取穴較外皆稍遠一線。鍼法與外皆無異。但畧覺拘手。然鼻梁高者。難於轉鍼。不可強也。若鍼右眼外皆下鍼之後。換左手轉鍼。撥腎手法。亦須平日演熟。庶無失誤。出鍼之後。令病者垂垂閉目。用綿紙五七重。量紙厚薄。及天時寒暖。封固。更以軟帛裹黑豆數粒。以線繫定。鎮眼。使目珠不能動。移動則恐腎復上。是以軟嗽之人。不宜用鍼。亦是此意。又所虛八時有淚出。勿用黑豆。宜以決明子代之。則無眼壓珠

痛之患。然覺緊則宜稍鬆。覺寬則宜稍收。以平適為主。封後靜坐時許。然後輕扶高枕仰臥。不須飲食。若饑則不妨少與。周時後。以糜粥養之。戒食震牙之物。及勞動多言。不可扳動。露風。露風則疼痛。疼痛則復暗。不可不慎。過七日。方可開封。看物。切勿勞視。亦有鍼時見物。開封時反不見者。本虛故也。保元湯。六味丸。補養自明。鍼後微有咳嗽。難用黃耆者。以生脉散代之。若形自氣虛者。大劑人參。以補之。肥盛多痰。淫者。六君子加歸身。以調之。一月之內。宜美味調攝。毒物禁食。不得高聲叫喚。及洗面勞神。百日之中。禁犯肩勞惱怒。周年勿食五辛。酒麪等物。若犯前所禁諸條。致重喪明者。不可歸罪於醫也。其有進鍼時手法遲緩。目珠旋轉。鍼尖割損白珠外膜之絡。而見血。及傷酒客輩。目中紅絲血縷者。雖為小過。切

醫通卷之八

金鍼開內障論

九

思得堂藏

勿驚恐。如法鍼之。所謂見血莫驚。休住手是也。又進鍼後。解著黃仁。而血灌瞳神。急當出鍼。而服散血之藥。所謂見血莫鍼。須住手是也。法雖若此。醫者能無吝乎。又年高衛氣不固。鍼時神膏微出者。即與保元湯調補之。開封時自睛紅色。勿許以封固氣閉。勢使然也。其用鍼未熟者。量鍼穴與瞳神相去幾許。以墨點鍼上。庶指下無過淺過深之惑。凡初習鍼時。不得以入目輕試。宜鍼羊眼。久久成熟。方可治人。諺云。羊頭初試。得其輕重之宜。正初習金鍼之要法。不可以其鄙而忽諸。

造金鍼法。用上赤不脫金。抽作金絲。粗如底鍼。約長三寸。敲作鍼形。以小光鐵槌。在鍼上緩緩碾之。令尖圓。若補鍼狀。亦不可太細。細則易曲易斷。如覺柔軟。再碾令堅。不可銼擊。

恐脆則有傷。斷入目中。爲害不淺。緣金銀之性。經火則柔。挫擊則堅。務令剛柔得宜。以堅細中空。慈竹三十作柄。則輕便易轉。且滑指。柄中以蠟入滿。嵌入大半。留鋒寸餘。銀根用銀銀好。無使動搖。銀鋒以銀管護之。先用木賊草擦令圓銳。更以羊川石磨令滑澤。穿膚不疼。則入目不痛。方可用之。造成後。亦宜先鍼羊眼。試其柔脆。庶幾無失。

飛鸞治齒師吳文玉。母年五十四。失明數年。諸治罔効。余偶見之。曰。此內障眼。可以復明。何棄之也。曰。向來力能給藥。治而不靈。今縱有仙術。可回力莫支也。予曰。無汝費。但右眼之腎尚嫩。遲半載可撥。遂先與鍼左眼。鍼入撥時。其腎下而珠尚不清。封後因與磁珠丸七日。開封視物模糊。又與皂莢丸服而漸明。其後自執都見。謂一眼復明。已出

醫通卷之八

丙障按

十 思得堂藏

望外。若命犯帶疾而全療之。於壽有阻。遂不欲更治右眼。雖是知足。誠亦愚矣。

又治孫鵠年七十。茹素五十餘年。內障失明四載。余用金鍼先鍼左眼。進鍼時外膜有血。鍼入微有膏出。觀者駭然。余於膏血中進鍼。撥去腎障。次鍼右眼。出鍼兩眼俱明。遂與封固。用黑豆包繫。鎮眼。因向來肝虛多淚。是夕淚溼豆脹。不敢寬放。致右眼痛而作嘔。明晨告予。令稍寬其繫。先以烏梅止其嘔。用六味丸調服。以補其肝。遂痛止安。穀至七日開封。其右眼因嘔而暫復止。侵掩瞳神之半。視物已灼然矣。許其來春復撥。以收十全之功。但鍼時有神膏漏出。稱而不粘。知壽源無幾爲惜耳。

又治徐天錫。內障十五年。三載前曾有醫鍼之。其腎撥下

復上如是數次。皆不能下。委之不治。乃甥周公來。見余鍼吳之策。內障兩眼俱一撥而明。因詳述其故。予曰。此圓腎也。遂同往與鍼。其腎撥下。果復滾上。即縮鍼穿破其腎。有白漿灌滿風輪。因謂之曰。過七日其漿自澄。設不澄。當俟結定再鍼。則腎不復圓也。過七日開封。已能見物。但瞳神之色不清。其視未能了了。令多服補腎藥。將三月而視清。又沈仙若年二十五。患內障年餘。腎狀白濁而正。能辨三光。許其可療。臨時見其黑珠不定。鍼下覺輒。遂止鍼不進。曰。風輪動。是肝虛有風。目珠軟。是神水不固。辭以不治。病者惻然曰。予得遇龍樹。許可復明。今辭不治。則終爲長夜之人也。免慰之曰。汝姑服藥。俟元氣充足。方可用鍼。後聞一聲不辨而與鍼治。腎。初不能撥下。終屬無功。胡似不鍼

醫通卷之八

丙障按

十一 思得堂藏

之爲上也。

又治楚商馬化龍。患內障三月。色含淡綠。白珠紅赤而頭痛。究其根。是舟中露臥。腦受風邪而成。因其腎色低。不欲與鍼。復思本風而致。青綠有之。且證未久。猶爲可治。遂先與疎風。次與清肝。頭痛止。目赤退。然後鍼之。其腎難落。稍用力始開。內泛黃綠沙於風輪。似屬難愈。服補腎養正藥兩月。腎色變正。再撥而明。

又陳彥錫夫人。內障何字昭。內障。李能九內障。陳順源內障。俱年遠一撥即明。但服磁珠消腎藥。後之謂治各異。彥錫夫人多鬱不舒。散鬱養神爲主。字昭肥白多痰。理脾滲淫養神爲主。能九勞心沉默。宜達補血養神爲主。順源善飲性暴。開封時風輪紅紫。瞳神散潤。視物及不若鍼時明。

丁此火盛燔灼瞳神散漫平肝降火飲神爲主。凡此不能
枚舉總在臨證變通非執成見之可獲全功也。

又治趙婦內障進鍼一撥藥泛風輪全白兩目皆然服消
腎藥一月後能視此屬包漿內障與圓翳似同而別并識
以曉未經歷者。

目痛

目痛有二一謂目背白眼痛一謂目珠黑眼痛蓋目背白眼
痛屬陽故晝則疼甚點苦寒藥則効經所謂白眼赤脉法於
陽是也目珠黑眼痛屬陰故夜則疼甚點苦寒藥反劇經所
謂瞳子黑眼法於陰故也。

婁全善云夏枯草散治目珠痛至夜則疼甚者神効血熱本
方加當歸芍藥虛人四物湯換生地加羌活香附下咽則疼
醫通卷之八

天行

思得堂藏

滅風熱腫痛甚濁青丸洗肝散選用

白眼痛多有赤脈若惡寒脈浮爲在表選奇湯脉實有力大
府閉爲在裏濁青丸加薄荷甘草亦有不腫不紅但沙清昏
痛者乃脾肺氣分隱伏之淫熱秋天多有此患故俗謂之稻
芒赤濁青丸加黃耆甘草

大行赤熱證。目赤痛或眼腫頭重怕熱羞明涕淚交流。至

甚老幼相傳治法前後不可割洗只用童子小便煎黃連溫

洗日三五遍更用官菊二連白菊雄黃共研細調薑汁點大

背通其惡淚其痛立止先服洗心散一劑次用洗肝散一二

服此證只氣候瘴毒之全屬外因雖有赤絲亂脈赤腫痛

甚終不傷損瞳神也二七日不愈必犯本虛之故防他變證

暴露赤眼證。此證與天行赤熱眼同而天行能傳染此但

患一人而無傳染天行雖痛腫而無翳此則痛而生翳爲不
同耳切不可割洗亦不可用補先宜酒煎散發散次與大黃
常歸散流通血氣洗以黃連當歸赤芍滾湯泡乘熱薰洗冷
即再溫日三五次

暴風客熱證。卒然而發其證白仁壅起包小烏睛疼痛難
忍此肺經受毒風不散熱攻眼中致令白睛浮腫雖有腫脹
治亦易退非若腫脹如杯之比宜服湯肺湯腫甚者稍加
麻黃三四分赤腫甚者加黃連半錢生地黃一錢

火脹大頭證。目赤痛而頭目浮腫夏月多有此患有溼熱
風熱溼熱多淚而脾爛風熱多脹痛而增寒普濟消毒飲隨
證加減若失治則血滯於內雖得腫消而目必變也

羞明怕熱證。熱亮之處則目痛滴畏避不能開火鬱於上

醫通卷之八

天行

思得堂藏

也病在心肝脾三經火燥血熱偏在陽分蓋已之精光弱而

不能敵彼之光者生料六味丸換生地山茱加決明羌活

芩連若風氣攻注眩暈羞明蜜蒙花散風痛日久漸變作火

而羞明畏熱頭目脹痛若以風藥與之則火愈熾此風火相

煽選奇湯倍加葱白怕熱皆有餘證羞明有不足證患久不

已此風從火化也還睛丸若目不赤痛而羞明者乃血不足

膽汁少也神効黃耆湯今人皆稱怕日羞明俗傳音近之誤

驗硬睛疼證。不論有障無障但或頭痛者尤急乃風熱痰

火及頭風夾攻血滯於脾內所致先用香油調薑粉擦之稍

頓翻脾開導若堅硬之甚其服日高雖治不退不頓此頭風

欲成毒也石膏散加羌活全蠍不應用通肝散若有障膜絳

障膏石燕丹選用

金夏夫以不讀書上之シレテ是具不夕言ス邪哉予滿洲

者。春雪膏。麝仁膏。選用。并用。碧雲散。吹鼻。○目赤腫。足寒者。

必用時時溫洗其足并詳赤脈處屬何經治之。○王節齋云
眼赤腫痛古方用藥內外不同在內湯散用苦寒辛涼之藥
以瀉火在外點洗用辛熱辛涼之藥以散邪故點藥莫要於
冰片而冰片大辛大熱因其性辛甚故借以拔出火邪而散
其熱氣世俗不知冰片為劫藥誤認為寒常用點藥遂致積
熱入目昏暗瞖瞤又不知忌寒涼而妄將寒涼藥搥洗常
致昏暗者比比皆是。○赤眼腫痛脾虛不能飲食肝脈盛脾
脈弱用涼藥治肝則脾愈虛燥藥燥脾則肝益甚惟於平和
藥中倍加肉桂殺肝而益脾一舉兩得經云木得桂而枯更
以芍藥製之散熱存陰之捷法也。○人乳點眼久病昏暗極
効以乳即血液同源目得血而能視也。○凡赤而腫痛者當
散淫熱赤而乾痛者當散火毒赤而多淚者當散風邪赤而

醫聖卷之八

思得堂藏

不痛者當利小便先左赤而傳右者為風熱挾火散風為主
勿兼涼藥涼能鬱火也先右赤而傳左者痰淫挾熱瀉火藥
中必兼風藥風能勝溼也凡赤甚腫痛於上睥開出惡血則
不傷珠

瘀血灌睛證。○此證為病最毒若人偏執已見不用開錄者
其目必壞初起不過紅赤次後紫脹及後則白珠皆脹起在
睥則腫脹如杯在珠則白輪湧起失治必有青黃爛出標凸
之禍凡見白珠赤紫睥腫虬筋紫脹傳點不退必有瘀滯在
內可翻睥內視之若睥內色暈泛浮椒瘡或粟瘡者皆用導
之道後服宜明力

血灌瞳神證。○因毒血灌入金井瞳神水內也清濁相混時
痛溢紅光滿目濃濛如隔絹看物若烟霧中此證有三若肝

腎血熱灌入瞳神者多一眼先患後相牽俱損最難得退有
撞損血灌入者雖甚而退速有鍼內障失手撥者黃仁瘀血
灌入者三證治法頗同用大黃當歸散有醫退腎活法治之
赤脈貫睛證。○不論粗細多少但貫到風輪經過瞳外接連
氣輪者最不易治細者稍輕粗者尤重貫過者有變證絲粗
及有傍絲此亂者有變證凡各障外有此等脈罩者雖在易
退之證亦退遲也貫雖未連而侵入風輪皆不易退起於大
背脊心之實火也宜洗心散筋脈大者用小鋒鍼挑撥起於
小背脊心之虛火也宜導赤散不必挑又有暴橫瞖酒之人
赤脈灌睛乃生相也不在此例

赤絲亂脈證。○病生在氣輪白珠上有絲脈縱橫或稀密粗
細不等有痛不痛有淚無淚羞明不羞明但常常如是久而

醫聖卷之八

思得堂藏

不愈也非若天行客風暴壅赤脈貫睛之比當驗其大脈從
何部分而來或穿連某位即別其所患在何經絡以治之治
外者細脈易退大脈虬紫者退遲必須耐久去盡庶無再來
之患不然他日犯禁其病復發凡絲脈沿到風輪上者病最
重而能變凡見絲脈虬紫內服外點點時細縮不點即脹久
久亦然及因而激動病變者殊難不紫睥雖不腫亦有積滯
在絡中幽淡之處揭開上睥滋處看之其內必有不平之色
在焉畧畧導之不可過過則有傷真血水虧膏滿目力昏弱
之患點以石燕丹服用大黃當歸散酒煎散之類

白睛黃赤證。○人有白睛漸漸黃赤者皆為酒毒脾經滯傷
肝膽邪火上溢肺經故也五苓散加茵陳甚則黃連解毒加
山梔膽草

目青

目之白睛變青藍色者。病在至深。蓋氣輪本白。被鬱邪蒸。走散珠中膏汁。遊出在氣輪之內。故色變青藍。瞳神必有大小之患。羌活除腎湯。去麻黃川椒薄荷荆芥。加升麻川連。甘草桔梗。然當各因其病而治其本。如頭風者。風邪也。因毒者。毒氣所致也。餘倣此。

目腫脹

腫脹如杯證。○水火之邪。傳脾土而為炎燥之病。其珠必疼。而脾方急硬。若暴風客邪作腫者。必然淚多而珠疼稍緩。然風熱外感。治之易愈。若水火內自攻擊。重則疼閉。塞血灌睛中。而變證不測矣。輕則敷治而退。重則必須開導。敷治不遇。開導不消。消而復發。痛連頭腦。而腫愈高。脾愈實者。此風

醫通卷之八

思得堂藏

熱欲成毒也。洗肝散。龍膽飲。選用。服有胞服珠服不同。胞服多屬淫勝。治其淫熱為主。珠服多屬火淫。治當去火為先。故治珠服。雖挾風邪。不宜輕用麻黃木賊之類。恐有烏珠服裂之患。不可不慎。

形如蝦座證。○有半邊眼起者。有通珠俱被脹起。蓋定烏珠者。又有大背內近鼻柱處。脹出一片。如皮如肉。狀似蟹者。乃血脹從額中落來。不可割。為血英在此處。誤割者。為漏為管。不可不辨。急宜開導。血漸去而皮漸縮小。皆服出如蟹者。亦然。在肺部最重。久則移傳於肝。而風輪有害也。宜明丸狀如魚肝證。○氣輪勞服。不紫不赤。狀如魚肝。乃氣分之證。金火相搏所致。不用刺導。惟以清涼自消。湯肺湯。若有微紅及赤脈者。畧畧於上。睥開之。若頭痛淚熱。及內炭而赤脈多。

者。防有變證。宜早導之。庶無後患。

傷眼凝睛證。○此驟然而起。五藏皆受熱毒。致五輪壅起。頭疼面赤。目服不能轉動。若驚之。乃三焦陽邪九極之害。先用香油調蠶粉汁。於額腋項上摩擦。急服酒煎散。覆蓋出汗。其眼即活動。而用燈火燒斷風路。其迎香太陽兩脾上星等要隘處。並舉而初治之。此證多是小兒急驚。大人少有此患。因風成毒證。○初發時。乃頭風淫熱。瘀血灌睛。眼硬睛疼等病。失於早治。或治不得其法。遂至邪盛。搏夾成毒。睥與珠服出如拳。連珠帶腦。痛不可當。先從烏珠爛起。後爛氣輪。有爛治上下臉并腦。及額上肉盡空而死。若患頭疼。腫脹珠凸等證。治退復發。再治再發。痛服如前者。即成此患。若已成者。雖治之。服少退。痛少止。決又發。發時再治。至於數四。終當一發。

醫通卷之八

因風成毒

施瀘泛起丸

思得堂藏

不復退矣。惟初起時。急用石膏散。加羌活細辛。川芎薄荷赤芍。若至珠爛。治無及矣。

旋旋泛起證。○氣輪自平。水輪自明。惟風輪泛起也。或半邊泛起者。亦因半邊火盛。火鬱風輪。故隨火脹起。服用涼膈散。點用石燕丹。非旋旋突起。已成證而頂尖俱凸。不可醫治之比也。

旋螺突起證。○烏珠高而旋起。如螺。為肝熱盛。必有瘀血。急宜石燕丹絳雪膏點之。或調歸血點尖處。若年久須用針氣。對瞳神量淺深橫入。放出惡水。紙封避風。忌口數日。先服守真雙解散。後以六味丸加知母。急救少陰伏匿之邪。若初起失於正治之法。則痰雖退而氣定。膏不復平矣。神珠自脹證。○此陰峻利害之證。因五藏毒風所蘊。熱極充。

眼與旋螺突起不同。初起麻木疼痛淚出。其勢莫測。急投大黃當歸散。宜退五臟熱毒。搗葱艾敷五輪之突起。洗以白芷細辛。麻黃防風羌活。未可與點。或突起高寸許者。須鋒鐵鉞出惡水。方得止。

珠突出眶證。此烏珠忽然突出眶也。與鵝眼證因滯而漫。漫眼出者不同。有因精華衰敗。癢極揩擦而出者。其人不久必死。有酒醉怒甚。及嘔吐極而旋出者。有因患火證熱盛。關格亢極而眼出者。有因打撲而出者。凡此雖離兩眼。而脉皮未斷者。乘熱捺入。雖入脉絡損動。終是光損。須用清涼膏。若突出閉在眼中而含者。易入。尤不損。若離眼。脉絡皮俱斷者。不救。

目癢

醫通卷之八

珠突出眶

目癢

二十

思得堂藏

目癢因風寒者。薑粉和白蜜點之。風熱四生散。或黃耆防風。痰熱羌活。蟬蛻黃芩甘草之類。因火者。於赤痛條求降火之劑。因血虛而癢者。四物湯加羌防。痰熱黃耆。

癢若蟲行證。乃癢不可忍。非若常時之小癢也。為病不一。如有障無障。皆有癢極之患。病源非一。有風邪之癢。有血虛氣動之癢。有虛火入絡。邪氣行動之癢。有邪退火息。氣血得行。脈絡通暢而癢。大凡有病之目。不治不治而自作癢者。癢一番則病重一番。若醫治後而作癢。病必去速。若癢極難當。自覺低陷者。命亦不久。急宜溫補。庶或可圖。若癢而候多者。血虛夾火。大抵癢屬虛火。治宜薑粉枯礬礬砂。津唾調如米。大時將一九納大背及鹽湯蒸洗。不應於大小背旁。去一韭葉許。各後七壯。其癢立止。如蟹睛黑翳如珠等證。作癢俱可。

用灸。但痛甚者。皆屬實火。不可誤用艾灼。反增其劇也。

外障

外障在睛外遮睛。凡赤脉。初起從上而下者。屬太陽。以太陽主表。其病必連睛項痛。治宜溫之散之。赤脉。初從下而上。或從內眥出外者。皆屬陽明。以陽明主裏。其證多熱。或便實是也。治宜寒之下之。赤脉。初從外眥入內者。屬少陽。以少陽主半表半裏。治宜和之解之。赤脉。初從內眥入內者。屬少陰。或斑入眼。此肝氣盛而發在表也。腎膜已生。在表明矣。宜發散而去之。若反疏利。則邪氣內陷。為腎益深。邪氣未定。謂之熱腎。而浮邪氣已定。謂之冰腎。而沉邪氣牢而深者。謂之陷腎。當以熾發之物。使其邪氣再動。腎膜乃浮。佐之以退腎之藥。自去。病人者不能速效。以歲月除之。新腎。東垣羌活。

醫通卷之八

外障

二十

思得堂藏

除腎湯。有熱萬應。蟬花散。加犀角白茯苓木賊。熾發陷腎。用保命集羚羊角散。腎盡。至其年月日期復發者。有留積也。皂莢丸。

倪仲賢云。風熱不制之病。曰腎。如雲霧如絲縷。如秤星。或一二點。多至數十點。如蠟蓋。為病久不去。治不如法。服寒涼藥過多。脾胃受傷。生氣不能上升。以漸而致也。羌活勝風湯。專主風熱去腎。自內眥而出者。加蔓荊。自銳眥而入者。加膽草。藥本自上而下者。加黃連。倍柴胡。自下而上者。加木通。熱甚者。兼用治溼熱之藥。搗碎。雲散。大抵如開鍋法。搗之。隨勢然力少而銳。宜不時用之。去星。用阿魏搗鼻法。又論奇經客邪之病。經曰。邪客於足陽蹻之脉。令人目疼。從內眥始。故陽蹻受邪者。內眥即赤。生脈如縷。俗呼攀睛是也。撥雲退腎。

九萬應蟬花散選用。外用點藥。如春雪膏。雞仁膏。專祛風熱。暴腎。如去老腎。則以石燕丹。絳雪膏。熊膽膏。選用。若宿腎冰。凝者。當以煎水丹。嗽散助之。

石頑曰。外障諸證。雖殊。究其本。不出風火淫熱內蘊。故必以。滌熱消腎為務。然初起者。但於除風熱藥中。尋兼消腎。其腎。自去。若去宿障。自當專力攻腎。但必兼助脾胃。行其藥力。始。克有濟。諸觀外障內治之藥。雖多。咸以神消散。皂莢丸。二方。為主。外治之藥。不一。莫如石燕丹為最。今之專於此者。能識。斯意。守是法而行之。亦可以為中工矣。

血醫包睛證。此乃心經發熱。肝虛受邪。致令眼赤腫痛。淚。出。常時舉發。久則赤筋結厚。遮滿烏睛。服瀉心火破血涼肝。之劑。痛時用破血藥。兼消黃下之。

醫通卷之八

外障

二

思得堂藏

紅霞映日證。眼赤滿腫。痛年深。有紅管於烏睛上。淚淚如。紅霞映日之狀。乃肝風熱上攻所致。治宜去風散血清涼。之劑。

黃膜上衝證。在風輪下際。神膏之內。有黃色黃。與凝脂。同。一氣脈。但凝脂。在輪外生。點藥可去。此在膏內。邪熱蒸。起。點藥所不能除。若漫及瞳神。其珠必損。此經絡阻塞。極甚。三焦關格。火土邪實。故大便秘。小便澀。而熱蒸膏內。作膿也。失治者。有爛凸之患。神消散。皂莢丸。選用。請外障。俱可用石。燕丹吹之。絳雪膏點之。碧雲散搽之。

黃膜下垂證。此脾胃熱結。血凝氣滯。膏脂壅塞。故生是證。發歇無時。痛滿淚出。漸生黃膜下垂。發則膜長遮滿瞳神。甚。至滿目皆黃。不辨人物。治宜蟬花散。加石膏。膽草。大黃。點以。

石燕丹。有淚者退易。無淚者退遲。厚者宜挑剪。

赤膜下垂證。初起甚薄。次後甚大。有赤脈貫白輪而下。烏。珠上。半邊近白際起障一片。仍有赤絲牽絆。障大將粗。此赤。淚滿。珠疼。頭痛者。病急而有變。絲細少。色微赤。珠不疼。頭不。痛者。緩而未變。或於障邊絲下。仍起星數點。此星亦足凝脂。之類。皆火內滯之患。其病尚輕。蓋無形之火。潛入膏內。故作。是疾。非比有形血熱之重也。若障上有絲。及星生於絲。皆。是退遲之病。腎薄細絲。亦不甚者。只用善逐之。甚者不得已。而開導之。若貫過瞳神者。不問粗細。聯斷皆退遲。此淫熱在。腦。幽隱之火。深潛在絡。一有觸動。則其患迸發。輕者消散。重。者開導。此定法也。內服神消散去二蛇。加皂莢石決明。外點。絳雪膏。次用皂莢丸。

醫通卷之八

外障

三

思得堂藏

凝脂。在風輪上。有點初起如星色白。中有線如銀刺。傷。後漸長大。變為黃色。線亦漸大。為窟者。有初起便帶黃色。或初起便成一片如障。又於障內變出一塊如黃脂者。或先。有痕。後變出凝脂一片者。所變不一。禍則一端。大法不問。星障。但起時能大色黃。善變速長者。即此證也。甚則為窟。為。漏。為蟹睛。內潰精膏。外為枯凸。或氣極有聲。淚出稠水而破。者。此皆變過之極。蒸燥肝膽二絡。不遇旬日。損及瞳神。若四。圍見有滲漏者。因血阻道路。清汁不得升運之故。若四圍不。見瘀赤者。其內絡深處。必有阻滯之故。此證當急用神消散。皂莢丸。晚夜。之。若遲待長大。蔽滿烏珠。雖救得珠。完。珠上。必有白障。終身不得脫。凡有此證。但是頭疼珠痛。二便燥。瀉。即是惡之極。甚若二便通暢。禍為稍緩。

花腎白陷證。因火燥絡內而膏液蒸傷。凝脂從白輪之際生來。四圍高中間低。此金剋木之禍也。或就於脂內下邊起一片黃膜。此二證夾攻尤急。亦有上下生起。名順逆障。此火土鬱之禍也。亦有細條如蟹。或細顆如星。四散生起。長大牽連。此木火禍也。以上三者。必有所滯。輕則消涼之。重則開導之。若漫及瞳神。不甚厚重者。速救亦可挽回。但終不得如舊。止可救其微凸而已。能脂飲去黃連。加赤芍藥。

蟹睛證。具珠膏損。凝脂腎破。環風輪。神膏凝出。黑顆小如蟹睛。大則如黑豆。甚則損及瞳神。至極則青黃凸出者。此證與黑腎如珠。狀類而治不同。夫黑腎如珠。源從膏內生起。此因破而出。中挾虛火。所以時時奇癢。或時掣痛。癢瀉古法用小鋒鍼。鍼出惡水。流盡即平。以爐甘石散。不用腦麝點之。內

服防風瀉肝散。次用六味丸。加茯苓車前調之。然終未免癢磨之患。

斑脂腎證。其色白中帶青黑。或焦黃微細。有細細赤絲絆者。則有病發之患。結在風輪邊傍。大則掩及瞳神。雖有神手不能除去。治者但可定其不垂不發。亦須神消散。皂莢丸。石燕丹。絳雪膏。內外夾攻。得氣血定久。癥結牢固。無不再發。若治不固。或即縱犯。則斑迹發出細水泡。時起時隱。甚則發出大泡。起而不陷。又甚則於本處作痛。或隨絲生障。或蟹睛再出矣。

黃油證。生於氣輪。狀如脂而淡黃浮嫩。乃金受土之溼熱也。不腫不疼。目亦不昏。故人不求治。畧有目疾發作。則爲他病之端。揭開上睥。氣輪上有黃油者。是溼熱從腦而下。先宜

開導上睥。即與神消散。皂莢丸之類。有頭風證者。石膏散。皂莢丸。若癰風。目上有此者。最重。當從癰風證治。狀如懸膽證。有膏從上而下。貫及瞳神。色青或斑。上失下大。薄而圓長。狀如懸膽。蓋脂有瘀熱。肝膽膏損。變證急來之候。若眼帶細細赤脈。紫脈者。最急。頭疼者尤惡。內必有滯。急向四圍尋其滯而導之。庶免損壞之患。服用石膏散。皂莢丸。點以石燕丹。

玉粒分經。生於氣輪者。燥熱爲重。生於睥者。溼熱爲重。其形圓小而顆堅。淡黃如白肉色。初起不疼。治亦易退。亦有輕而自愈者。若恣酒色。嗜辛辣。多忿怒。及久而不治。因而積久者。則變堅大而疼。或變大而低潰。如爛瘡相似者。尚輕。宜神消散去。二晚。如皂莢丸。決明。燥熱去者。木加當歸杏仁。若復

不知禁忌。且犯戒者。則爛深而變爲漏矣。不可誤認爲粟瘡。銀星獨見。烏珠上有星獨自生也。蓋人之患星者。由火在陰分而生。故不能大。若能長大者。必是各障之初起也。即如凝脂一證。初起白顆小而圓嫩。儼然一星。不出一二日間。漸漸長大。因而觸犯。遂至損目。若誤認爲星。則謬矣。大凡見珠

上有星一二顆。散而各自生。至二三日。看之不大者。方是。若七日而退者。火散盡也。若連萃貫串相生。及能大者。皆非是也。凡星見青色者。爲風。其人必頭痛。蟬花散去者。水。加白茯苓。穀精草。并用碧雲散。去風爲主。星久不退。恐其成翳。阿魏搗鼻法。每夜搗之。星見陷下者。或小點亂生者。爲腎虛。其人

必因夢泄。或房勞之故。宜生料六味丸。加穀精草。白茯苓。車前子。凡去星之藥。非穀精不應也。

聚開障證。其障或圓或缺或厚或薄。或如雲似月。或數點如星。痛則見之。不痛則隱。聚散不一。來去無時。或月數發。或年數發。乃腦有濕熱之故。大約治法。不出鎮心火。散瘀血。消痰飲。逐淫熱而已。

聚星障證。烏珠上有細顆。或白色。或微黃。或聯綴。或團聚。或散漫。或頓起。或漸生。初起者易治。生定者退遲。白者輕。黃者重。聚生而能大作一塊者。有凝脂之變。聯綴四散。傍風輪白際而起。變大而接連者。花腎白陷也。若兼赤脈絆者。或星翳生於絲盡頭者。退遲。此證多由痰火之患。能保養者庶幾斷。喪犯戒者。變證生焉。先服羚羊角散。後服補腎丸。

垂簾障證。生於風輪。從上而下。證有數般。緩急各異。一努肉初生。一僂月侵睛。一亦膜下垂。治各不同。此只白障漫生。

醫通卷之八

外障

六 思得堂藏

自上而下。為混障。間有微紅。因其觸犯。搏動其火。方有變證。其病從上而下。本當言順。何以逆稱。蓋指火而言。火本炎上。今反下垂。是謂逆矣。生熟地黃丸。羚羊角湯選用。虛者兼進補腎丸。

湧波障證。障從輪外自下而上。故曰湧波。非黃膜上衝。從內向上。急甚之比。白緩赤急。亦有微犯。變出黃膜。宜涼膈散先去上衝。後以四物換生地赤芍。加犀角甘草丹皮治之。

逆順障證。色赤而脹及絲脈赤亂。見於風輪際處。由白珠而來。粗細不等。周圍侵入黑睛。障起昏濇者。卽此證。必有瘀滯在內。滯於左則從左而來。滯於右則從右而來。宜先導去惡血。後用皂莢丸。生熟地黃丸。點用石燕丹。若色浮嫩能大或微黃者。乃花腎白陷也。若燥濇甚者。則下起一片。變為黃。

膜上衝。若頭疼珠痛脹急者。病尤重而急。陰陽障證。烏珠上生二障。俱白色。一中虛。一中實。兩障連串。如陰陽之圖。若白中畧帶焦黃色。或有細細紅絲絆者。皆不能盡去。內服礪花散。皂莢丸。外點石燕丹。熊膽膏。此證非心堅耐久。不能得効。

瑪瑙內傷證。其障如瑪瑙之雜色。是雖生輪外。實是內傷肝膽真氣清液受傷。結成此障。皂莢丸。絲雪膏。久久耐心醫治。方得減薄。終不能除盡也。

連珠外障證。與聚星相似。蓋聚星在可治之時。此則凝定之證。雖妙手久治。難免跡滯如冰。瑕之患。

冰瑕翳證。或片或點。生於風輪之上。色白而薄。如冰上之瑕。時常淚出。路滿瞼蔽。瞳神發散。往來風輪有痕。概如凝脂。

醫通卷之八

外障

七 思得堂藏

聚星等證。初發點服不得盡去。或點片。腦過多。皆為此證。與魚鱗障不殊。雖治不能速去。內與六味丸。加鬼絲子。白茯苓。外點石燕丹。必須堅守。久而方退。

圓翳外障證。薄而色白。大小不同。間有厚者。亦非堆積之比。又名遮睛障。以其光滑深沉。病最難治。治與冰瑕翳證不殊。雖堅心久治。亦難免終身之患。

水晶障證。清瑩見內。但高厚滿珠者。看雖易治。得効最遲。乃初起膏傷時。內服寒涼太過。外點冰片太多。致精液凝滯。結為此病。若傍斜細看。則白透瑣障內。陰處與日中看。其形不同。治法須分新久。若有進退。紅腫有淚。發歇未定。用石燕丹。則眼淚帶藥流出。此翳必能漸退。若發年久。無進退紅腫。縱有撥雲墜翳聖藥。終不能取効也。服藥與冰瑕同。

風輪釘腎證。乃勞傷肝經所致。其證赤澹難開。病牽頭腦。淚出羞明。釘腎日深。接引黃仁。根派不移。治宜退熱去風散。血頭痛發以葱艾。外以琥珀龍腦硃砂玄明粉點之。避風戒房室。不痛者不治。

魚鱗障證。色雖白而不光亮。狀帶欹斜。故號魚鱗。乃氣滯膏凝。結如凝脂。病已甚。不得已。大用寒涼。及多用冰片點者。往往結為此也。用青鹽黃泥固濟。煨熟研細。以羽毛蘸點。一日一次。內服退腎之藥。

馬蝗積證。兩頭尖薄。中間高厚。肉紅色。若馬蝗狀。橫臥於中。乃血分之病。久久方成。難去易來。風疾人每多此患。必先

醫通卷之八

外障

八

思得堂藏

須平治。不然外雖平而內必發也。

勞肉攀睛證。多起於大眦。如膜如肉。漸侵風輪。甚則掩遮瞳神。初起可點而退。久則堅韌難消。必用鉤割。以針從上邊。勞肉中透挑起穿過。先揭起風輪邊。後揭至大眦邊。鉤定。沿背割去。留則復長。過則傷背。適當為要。若血出。用軟紙蘸墨。泥之則止。勞肉四沿雖枯。中則浮也。有用線穿掛割。亦能去之。但延緩為累。去後用點藥消其根。內服和血清火之劑。肺癆證。由大眦而起。貫過氣輪。如皮筋橫帶風輪。甚則掩及瞳神。初起如薄薄黃脂。或赤脈數條。後漸大厚。赤者少。白者多。雖赤者亦是白者所致。蓋先有白而不忌火毒辛熱。故傷血而赤。必須殺伐用殺伐之法。一割即烙。免其再發。大抵眼科鉤割一法。惟此最為得効。

雞冠蜆肉二證。形色相類。經絡相同。治亦一法。多生脾腎之間。然後害及氣輪。而遮掩於目。治須用割。亦用烙定方好。宜三黃丸加芒消膏化。外用絳雪膏。去翳加阿魏點之。其目大眦內有紅肉一塊。如雞冠蜆肉者。乃心經血部之英華。若誤割者。輕則損目。重則喪命。慎之。

魚子石榴二證。經絡不異。治法亦同。其狀生肉一片。如榴子綻露於房。障滿神珠。血部瘀實。自疾之惡證。治用割。割後見三光者可治。服用皂莢丸。點以絳雪膏。若三光眼黑者。內必瞳神有損。不治。

醫通卷之八

外障

八

思得堂藏

者吹點自消。若有貫接者。必絡中有血灌來。向所來之處尋有。量輕重導之。

睛中一點似銀星證。白點一顆。如星光滑。常睛中蓋定。雖久不大。傍視瞳神在內。乃目痛時不忌房事。及服滲泄下焦寒涼之藥過多。火雖退而腎絡受傷。所至於身之患也。

五花障證。生於神珠之上。斑斑雜雜。蓋三焦經絡間之氣。俱傷結為此疾。其色猶糊。取難不一。若有一點黑色者。乃腎絡氣傷。雖治不能盡去。此狀與斑斑點點。內傷形界相似。斑斑點點。乃破而結成。那痕不能去者。理至乃傷。乃小而清。未掩瞳神之輕者。此則高厚顯大。生在膏外。可退。故不同耳。宜神清散。皂莢丸。并用點藥。

苦一種白睛光赤而後癢痛迎風有淚閉塞難開或時無事不久亦發年深則睛變成碧色滿目如凝脂亦露如橫赤絲此毒風積熱所致也宜服補肝調血之劑血行則風自息外用吹點則醫漸退

黑腎如珠證○非瞳睛水疳之比。瞳睛因破流出此則肝氣有餘欲泛起之患故從風輪際處發起黑泡如珠多寡不一其火實盛者痛麻緩者不痛治法用小鋒鍼逐箇橫穿破其黑腎中有惡水流出即平挑後用爐甘石散去脂膜點之先服羚羊角飲子去五味加赤芍藥次用六味丸後服補腎丸設若不識此法服涼劑點涼藥鮮能奏効也

內障

內障在睛裏昏暗與不患之眼相似惟瞳神裏有隱隱青白

醫通卷之八

內障

辛

思得堂藏

者妻全善曰內障先患一眼次第相引兩目俱損者皆有腎在黑暗內遮瞳子而然今詳通黑睛之脈者目系也目系屬足厥陰足太陰手少陰三經蓋此三經藏府中虛則邪乘虛入經中鬱結從目系入黑睛內為腎龍水論所謂脂膜流下作腎者即足太陽之邪也所謂肝氣衝上成腎者即足厥陰之邪也治法以鍼言之則當取三經之命穴以藥言之則當

補中疏通此三經鬱結使邪不入目系而愈

倪仲賢云心者五臟之專精目者其竅也又為肝之竅腎主骨骨之精為神水故肝木不平內挾心火乘勢妄行火炎不制神水受傷上為內障此五臟病也勝腕小腸三焦膽脈俱上循於目四府一衰則精氣盡敗邪火乘之上為內障此六府病也初起時視覺微昏常見空中有黑花神水淡綠次則

視岐視二成二神水淡白可與沖和養胃湯益氣聰明湯有熱兼服黃連羊肝丸久則不靨神水純白永為廢疾也內障小背青白腎大背亦微顯白腎腦痛瞳子散大上熱惡熱大便瀉難遇熱暖處頭疼時脹日沒後天陰暗則昏六味丸加麥冬五味

石頑曰內障諸證其腎皆生於烏珠裏面故宜金鍼撥之撥後用滋養之劑以助其光如六味丸磁珠丸之類氣虛者佐以八珍湯神効黃耆湯若腎嫩不可撥者只與用藥治法縱各不同大意不出乎皂莢丸生熟地黃丸其間虛實寒熱輕重隨證出入活法在心非筆可盡有肝腎陰虛絕無腎膜者惟宜滋養具陰切勿誤與消腎等藥也有偏正頭風久而生翳以蛇蛻炙脆為末每服一錢黑豆炒香淋酒一盞入葱白

醫通卷之八

內障

辛

思得堂藏

三莖同煎去葱和滓日服効

青風內障證○視瞳神內有氣色昏蒙如晴山籠淡煙也然自視尚見但比平時光華則昏朦日進急宜治之免變綠色變綠色則病甚而元沒矣陰虛血少之人及竭勞心思憂鬱忿恚用意太過者每有此患然無頭風痰氣夾攻者則無此證病至此危在旦夕急用羚羊角湯

綠風內障證○瞳神濁而不清其色如黃雲之籠翠岫似藍靛之合脈黃乃青風變重之證久則變為黃風雖曰頭風所致亦由痰淫所致火鬱憂思忿怒之故此病初患則頭旋兩額角相牽瞳神連鼻內皆痛或時紅白花起或先後而發或兩眼同發肝受熱則先左肺受熱則先右肝肺同病則齊發

羚羊角散

黑風內障證。與綠風相似。但時時黑花起。乃腎受風邪熱。攻於眼。宜先與去風熱藥三四劑。如荆防羌活木賊蒺藜甘菊之類。後用補腎磁石丸。

黃風內障證。瞳神已大。而色昏濁為黃也。病至此十無一人可救。

銀風內障證。瞳神大成一片。雪白如銀。其病頭風痰火。人偏於氣急。怒鬱不得舒而傷真氣。此乃痼疾。金丹不能返光也。

絲風內障證。視瞳神內隱隱然。若有一絲橫經。或斜經於內。自視全物。亦如有碎路者。乃絡為風攻。鬱遏真氣。故視亦先盡有損。宜六味丸加細辛白茯苓。間與皂莢丸。延久變重。內證為矣。

醫通卷之八

內障

思得堂藏

烏風內障證。色昏濁壅滯氣。如暮雨中之濃烟重霧。風痰人嗜慾太多。敗血傷精。腎絡損而膽汁虧。真氣耗而神光墜矣。

偃月內障證。瞳神內上半邊。有隱隱白氣一灣。如新月覆垂而下。乃內障欲成之候。成則為如銀腎。腦漏人及腦有風寒。陰氣拂鬱者。患之先與辛湯。後與消內障丸劑。此與偃月侵睛在輪膜中夾者不同。

仰月內障證。瞳神下半邊。有白氣隱隱一灣。如新月仰而從下向上也。久而變滿。為如銀內障。乃水不足。木失培養。金反有餘。故津液虧。乃火氣鬱滯於絡而為病也。補腎丸。補腎磁石丸等選用。

如銀內障證。瞳神內白色如銀。輕則一點白亮如星。重則

瞳神皆白。一名圓翳。有仰月偃月變重為圓者。有一點從中起而漸變大。失明者。乃淫冷在腦。鬱滯傷氣。故陽光為其閉塞。而不得發現也。非銀風內障。已散大而不可復收之比。血氣未衰者。撥治之。先服羚羊補肝散。次用補腎丸。庶有復明之理。

如金內障證。瞳神不大不小。只是黃而明瑩。乃淫熱傷元氣。因而痰淫陰火攻激。故色變易。非若黃風之散大不可治者。神消散皂莢丸。羚羊補肝散主之。

綠映瞳神證。瞳神乍看無異。久之專精熟視。乃見其深處隱隱綠色。自視亦漸覺昏眇。病甚始覺深綠。蓋痰火淫熱。害及清純之氣也。先服黃連羊肝丸。後與補腎磁石丸。皂莢丸之類。久而不治。為如金青盲等證。其目映紅光處。看瞳神有

醫通卷之八

內障

思得堂藏

綠色。而彼自視不昏者。乃紅光燦於瞳神。照映之故。不可誤認為綠風。此但覺昏眇。而瞳神綠色。明處暗處看之。皆同氣濁不清者。是此證也。

雲霧移睛證。自見如蠅飛花墮。旌旆條環。空中撩亂。或青黃黑白。仰視則上。俯則下也。乃絡間津液耗瀉。鬱滯清純之氣。而然。其原皆屬膽腎。黑者膽腎自病。補腎磁石丸。或白或黃者。因痰火傷肺。脾清純之氣也。皂莢丸。

圓翳內障證。黑睛上一點圓。初患之時。但見蠅飛蟻垂。薄烟輕霧。先患一眼。次第相牽。若油點浮水中。日中看之。差小。陰處看之。則大。或明或暗。視物不明。醫者不曉。以冷藥治之。轉見黑花。此因肝腎俱虛。而得先與皂莢丸。合生熟地黃丸。次與羚羊補肝散。補腎丸。

水腎內障證。如水凍堅實。傍觀透於瞳神內。陰處及日中看之。其形一同。疼而淚出。此因膽熱攻腦而然也。皂莢丸合生熟地黃丸。

滑腎內障證。有如水銀珠子。但微含黃色。不疼不痛無淚。遮遮瞳神。皂莢丸生熟地黃丸。

濁腎內障證。如赤色。或聚或開。而傍微光。瞳神上有凝脂色。時復滿痛而無淚出。皂莢丸生熟地黃丸。

散腎內障證。形如鱗點。乍青乍白。或瞼下起粟子而爛。日夜痛楚。瞳神最疼。常下熱淚。或生散腎。形如爛綿。皂莢丸生熟地黃丸。

浮腎內障證。上如冰光。白色環遮瞳神。初生目小。背頭至黑珠上。細看方見。不癢不疼。無血色相混。皂莢丸生熟地黃丸。

九

醫通卷之八

內障

世

思得堂藏

沉腎內障證。白藏在黑水下。向日細視方見。或兩眼相傳疼痛。則早輕夜重。間或出淚。皂莢丸生熟地黃丸。○右圓腎以下七證。雖有治法。然皆難於奏效。惟金鍼撥之為善。

假月侵睛證。風輪上半。氣輪交際。隱隱白片。薄薄蓋下。其色粉青。從膜中而來。為害最遲。每每忽之。乃腦有風溼鬱滯。火激脂脂滴下而成。羚羊補肝散。

劍脊腎證。亦名橫腎。色白或如糙米色。者。或微帶焦黃色。但狀如劍脊。中高邊薄。有似鋒芒。橫於風輪之外。厚薄不等。厚者雖露上下風輪。而瞳神被掩。視亦不見。薄者瞳神終是被掩。視亦昏眵。縱色嫩根浮者。亦有癢痕。若微微紅絲罩絆者。尤為難退。非需之歲月。必無功耳。皂莢丸生熟地黃丸。○薄甚而白。起於風輪。從白膜之內。四圍環布而

醫通卷之八

內障

世

思得堂藏

來。雖有花鋸齒之說。實無正形。初患時。微有頭旋眼黑。時時癢痛。凡性躁急。及患痰火。傷酒溼熱之人。多有此證。久則始有目急乾澀。昏花不爽之病。犯而不戒。則瞳神細小。火入血分。昏淚亦痛者。亦在變證例。宜皂莢丸生熟地黃丸。○白腎黃心證。四邊皆白。中心一點黃。大小皆頭微赤。時不瀾淚。團團在黑珠上。乃脾肺相傳。停留風熱。皂莢丸合生熟地黃丸。

黑花腎證。又名黑水凝腎。初患時。頭旋眼滿。見花黃黑不定。其腎凝結青色。大小皆頭滿。頻頻下淚。口苦。不喜飲食。蓋肝受風寒所致。羚羊角散。皂莢丸生熟地黃丸。

五風變成內障證。○初患時。頭旋偏腫。痛甚。或一目先患。或因嘔吐。雙目並暗。瞳神結白如霜。却無淚出。乃毒風腦熱所

致先與除風湯。次用皂莢丸。生熟地黃丸。

瞳神散大

瞳神散大者。風熱所為也。火性散。挾風益熾。神光怯弱。不能支。亦隨而散漫。猶風起而水波也。亦有過服辛散而致者。治宜苦宜酸宜涼。如四物去川芎。加蒼連甘草五味。或六味丸加五味石決明。大忌辛熱。當瀉木火之邪。飲食中常知此理。尤忌食冷水大寒之物。能損胃氣也。藥中不可用羌葯青箱。川芎芫荽之類。以味辛反助火也。當歸味亦辛甘。而不去者。以其和血之聖藥也。又有瞳神散大。而風輪反窄。甚則一周如線者。乃邪熱鬱蒸。風溼攻激。以致神膏走散。若初起收放不常者。易斂。緩則氣定膏散。不可復收。未起內障。止是散大者。直收瞳神。而光自生。散大而有內障起者。於收瞳神藥內。

量加攻內障藥。如補腎磁石丸。補腎丸。千金磁珠丸之類。大抵瞳神散大。因頭風攻痛者多。乃水中伏火之發。最難收斂。如他證傷寒。痰火等熱邪。蒸壞神膏。內障來遲。而收亦易斂。若風攻則內障即來。且難收斂。而光亦損耳。亦有常人因勞役。或觸熱。而偶然瞳神散大者。勿誤呼為散大也。

瞳神緊小

瞳神漸漸細小。如蒼脚。或如芥子。又有神水外圓。相類蟲蝕。漸覺肥腫。羞澀視。尚有光極難調理。早治可以挽住。經久則難因。病目不忌淫慾。相火強搏腎水。肝腎俱傷。元氣衰弱。不能升運精汁。以滋於瞳。瞳中之精有虧。所輪亦乏。故瞳神亦日漸耗損。甚則陷沒。俱無而終身疾矣。治當抑陽緩陰。先與黃連羊肝丸。數服。次與六味地黃丸。換生地加二冬。兼進滋

腎丸。不愆。加熊膽。亦有頭風熱證。攻走。蒸稠津液。而細小者。皆宜早救。以免墜睛之悔也。

瞳神散大

瞳神散大。謂瞳神歪斜。或如杏仁。或如桃核。三角半月。此肝腎灼燥。水竭火炎。而耗損瞳神。宜六味丸加茯苓。當歸。及清火藥。若輪破損。神膏流淚。而散側者。瞳神將盡矣。急宜補腎。若輪外有翳睛者。翳睛雖平。瞳神不得復圓。外有脂翳。終身不脫。

目昏

經曰。肝虛則目眩。眩無所見。又曰。腎足少陰之脈。是動則病。坐而欲起。目眩。眩無所見。又曰。少陰所謂起。則目眩。眩無所見者。陰內奪。故目眩。眩無所見也。此目疾。而犯房勞所致。大率於房勞後。尤甚。夜光椒紅丸。○倪仲賢云。經曰。足厥陰肝

主目。在志為怒。怒甚傷肝。傷肝則目眩。眩無所見。又曰。少陰所謂起。則目眩。眩無所見者。陰內奪。故目眩。眩無所見也。此目疾。而犯房勞所致。大率於房勞後。尤甚。夜光椒紅丸。○倪仲賢云。經曰。足厥陰肝

主目。在志為怒。怒甚傷肝。傷肝則目眩。眩無所見。又曰。少陰所謂起。則目眩。眩無所見者。陰內奪。故目眩。眩無所見也。此目疾。而犯房勞所致。大率於房勞後。尤甚。夜光椒紅丸。○倪仲賢云。經曰。足厥陰肝

主目。在志為怒。怒甚傷肝。傷肝則目眩。眩無所見。又曰。少陰所謂起。則目眩。眩無所見者。陰內奪。故目眩。眩無所見也。此目疾。而犯房勞所致。大率於房勞後。尤甚。夜光椒紅丸。○倪仲賢云。經曰。足厥陰肝

主目。在志為怒。怒甚傷肝。傷肝則目眩。眩無所見。又曰。少陰所謂起。則目眩。眩無所見者。陰內奪。故目眩。眩無所見也。此目疾。而犯房勞所致。大率於房勞後。尤甚。夜光椒紅丸。○倪仲賢云。經曰。足厥陰肝

主目。在志為怒。怒甚傷肝。傷肝則目眩。眩無所見。又曰。少陰所謂起。則目眩。眩無所見者。陰內奪。故目眩。眩無所見也。此目疾。而犯房勞所致。大率於房勞後。尤甚。夜光椒紅丸。○倪仲賢云。經曰。足厥陰肝

主目。在志為怒。怒甚傷肝。傷肝則目眩。眩無所見。又曰。少陰所謂起。則目眩。眩無所見者。陰內奪。故目眩。眩無所見也。此目疾。而犯房勞所致。大率於房勞後。尤甚。夜光椒紅丸。○倪仲賢云。經曰。足厥陰肝

主目。在志為怒。怒甚傷肝。傷肝則目眩。眩無所見。又曰。少陰所謂起。則目眩。眩無所見者。陰內奪。故目眩。眩無所見也。此目疾。而犯房勞所致。大率於房勞後。尤甚。夜光椒紅丸。○倪仲賢云。經曰。足厥陰肝

燥厥之人。每有此疾。治其淫痰則愈。五苓散加茵陳膽草。甚則梔子檳皮湯之類。

暴盲

暴盲者。條然盲而不見也。致病有三。曰陽暴。曰陰暴。曰神暴。乃否塞開格之病。病於陽傷者。緣忿怒暴悖。恣酒嗜熱。久病熱病。痰火入得之。則煩躁秘渴。病於陰傷者。多嗜色慾。或悲傷哭泣之故。患則類中風中寒之起。傷於神者。因思慮太過。用心罔極。憂傷至甚。驚恐無措者得之。患則其人如癡。病至之狀。屢見陰虛水少之人。因頭風痰火眩暈發後。醒則不見。能保養者。亦有不治自愈。氣大虛者。急服大劑人參膏。血虛者。大劑黃耆當歸煎湯。調服人參膏。患淫者。白朮為君。黃耆茯苓陳皮為臣。附子為佐。三者治目暴盲。皆為氣病。故用

醫通卷之八

百首

思得堂藏

青盲

青盲有二。須詢其為病之源。若傷於七情。則傷於神。獨參湯或保元湯加神砂磨香。門冬歸身。若傷於精血。則損於膽。六味丸加棗仁柴胡。皆不易治。而失神者尤難取效。能保其真者。屢有不治而愈。若年高及病後。或心腎不充者。雖治不愈。世人但見目盲。便呼為青盲者。謬甚。夫青盲者。瞳神不大。不

雀盲

小。無缺無損。仔細視之。與好眼一般。只是自看不見。方為此證。若瞳神有何氣色。即是內障。非青盲也。

雀盲俗稱也。亦曰雞盲。本科曰高風內障。至晚不見。至曉復明也。方書以為木生於亥。旺於卯而絕於申。至酉戌之時。木氣衰甚。故不能睹。至日出於卯之時。木氣稍盛。故復明。蛤粉丸。煮肝散。決明夜靈散。効後常服六味丸。加當歸沙參。永保終吉。按內經云。目得血而能視。血虛肝失所養。則不能視。夜屬陰。人之血屬陰。陰主靜而惡躁擾。陰虛則火必盛。弱陰不能勝強火。故夜轉劇。昏暗而不能睹。天明以陽用事。陽主動。火邪暫開。故稍明。治以補氣養血為主。食以牛猪之肝。即愈。益見其元氣弱而陰不足也。

真睛膏損

真睛膏損。乃熱傷其水。以致神膏缺損。其狀風輪有證。或痕或癢。長短大小不一。或極小如鍼刺傷者。或極大如蒼脚刺

醫通卷之八

金日典

思得堂藏

傷者。或痕如指甲刻傷者。或風輪周圍有痕長甚者。凡有此等。皆肝膽絡分有鬱滯熱蒸之甚。燥壞神膏之故。並宜六味丸加當歸石決明白蒺藜。及八珍補中之類。急須早治。勿使添陷為漏。為蟹睛突出。為翳滿如冰瑕等患。必久服峻補之劑。方得水清膏復。若治間怠。則白暈終身難免。

膏傷珠陷

膏傷珠陷。謂珠覺低陷而不鮮綻也。非若青黃凸出諸漏之比。所致不一。有恣色而竭腎水者。有嗜辛燥而傷津液者。有因風痰淫熱久鬱而蒸損睛膏者。有不當出血而誤傷經絡。及出血太多。以致膏液不得滋潤。而養者。有哭損液汁而致者。大抵皆元氣弱而膏液不足也。治當溫養血氣為主。慎不可用清涼之劑。凡人目無故而自低陷者。死期至矣。若外有

惡證內損睛者不治。

神水將枯

神水將枯。視珠外神水乾。滿不潤。如螭蚬之光。乃火氣鬱蒸。膏澤內竭之候。凡見此證。必成內障。若失調理。久久瞳神緊小。內結雲翳。漸成腎疾。蓋瞳神小者。肝熱腎虛。瞳神大者。肝虛腎熱。此為肝熱腎虛。初起珠頭隆痛。大皆微紅。猶見三光者。六味地黃丸加麥冬五味。切忌吹點。若小兒素有疳證。兼如鴨漚而目疾。神將枯者。死。熱結勝脫證。神水將枯者。蓋下水熱蒸不消。故上亦不消。澄其源而流自清矣。

轉轉轉關

目病六氣不和。或有風邪所擊。腦筋如拽。神珠不得轉運。而自暴然察上。暴然察下。下之不能上。上之不能下。或左或右。

醫通卷之八

神水將枯 轉轉轉關 思得堂藏

條易無時。輕則氣定脈偏而珠歪。如神珠將友之狀。甚則翻轉而為瞳神反背矣。治用薑汁調香油。摩擦目脾。及迎香上星。風池風府太陽等穴。若暴起者。宜用養藥。兼升補即愈。如神効黃耆湯。補中益氣湯。並加羌活。風熱勢盛。通肝散。

神珠將友

神珠將友者。謂目珠不正。雖欲轉而不能轉。乃風熱攻腦。筋絡牽急。邪偏神珠。是以不能運轉。甚則其中自開。耶耶有聲。如響。石膏散通肝散。選用血分有滯者。目赤腫痛。酒煎散加五靈脂。失治有反背之患。

瞳神反背

瞳神反背者。因風熱搏擊其珠。而斜翻轉側。通肝散加全蠍鉤藤。或黃耆建中加羌活歸身蠍梢。虛則神効黃耆。補中益氣。

氣皆可取用。或云。即是瞳神發白。北人聲韻相似也。蓋發白。即是內障。故宜金鐵撥之。昔前所言。即神珠將友之暴者。非真反背也。安有目系內繫。而能反背之理。醫者審之。

青黃凸出

青黃凸出者。風輪破。內中膏汁綻出也。有自破而服出不取者。有因外障。以寒涼逐退。內火外失平治。而凸起者。縱有妙手。不復可救。但用皂莢丸入。礪砂少許。免其橫凸而已。

珠中氣動

氣動者。視瞳神深處。有氣一道。隱隱曩曩而動。狀若明鏡。遠照一縷清煙也。患頭風痰火。入鬱久火勝。則搏擊其絡中之氣。遊散飄忽。宜以頭風例治之。動而定後。尤其者。內證成矣。

倒睫拳毛

醫通卷之八

青黃突出 珠中氣動 思得堂藏

倒睫拳毛者。由目緊皮縮所致也。久則亦爛。神水不清。以致睛結。流淚淚出之苦。人有拔去剪去者。有醫以竹板夾起上。脾七日。連皮脫下者。得効雖速。殊不知內病未除。未幾復倒。譬之草木枯槁。則枝葉萎垂。即朝摘黃葉。暮去枯枝。徒傷其本。不若培益水土。則黃者翠而垂者榮矣。此證內伏火熱。而陰氣外行。當瀉其熱。眼皮緩。則毛自出。醫膜亦退。用手法板出。內臉向外。速以三稜鍼出血。以左手爪甲迎其鋒。立愈。又目眶赤爛。亦當以三稜鍼刺目眶。瀉其淫熱。後服防風引子。搗鼻雲散。亦宜兼用。起倒睫法。以木髓一枚。為末。綿裹塞鼻中。左塞右。右塞左。一夜其毛自直。若內邊另出一層短毛。擦於珠上者。鑷去。以蠶血塗。則不復生矣。

脾急緊小

脾惡繁小。謂眼楞緊縮。乃倒睫。毛之漸也。若不因治而漸自縮小者。乃膏血津液消耗。筋脈緊急之故。若因治而愈小者。多因脾寬倒睫。屢次火去。上脾失於內治。或不當割導。而頻數開導。致血液耗而累小者。當乘時滋養。神効黃耆湯。小角偏緊。去陳皮。加連翹。生地當歸。若絡定氣滯。雖治不復愈矣。○婁全善云。陽虛則眼楞緊。陰虛則瞳子散大。故東垣治眼楞緊。用參耆補氣為君。佐以辛味疎散之。而忌芍藥五味之類。酸收故也。治瞳子散大。用地黃補血為君。佐以酸味收斂之。而忌羌蔚子青柏子之類。辛散故也。

醫通卷之八

脾病

脾病

脾病

思得堂藏

思得堂藏

胞肉膠粘證。○兩脾粘附。夜臥尤甚。必得潤而後可開。其病重在脾肺。淫熱當以清涼滋潤為主。雖有障在珠。亦是淫熱內滯之故。非障之愈。久而不治。則有翳爛之變。脾翻粘臉證。○乃脾翻轉貼在外臉之上。此氣滯血壅於內。皮急系吊於外。故不能復轉。皆由風溼之滯所致。故風疾人患此者多。宜用剝剔開導之法。風牽出臉證。○乃脾胃受風毒之證。臉受風而皮緊。脾受風而肉壅。淚出水漬於臉。而淫爛。此土陷不能隄水也。治法先用香油調薑汁粉。摩散風邪。翻轉臉皮。烙三五度。若眼有紅筋貫上。黑睛有昏膜者。吹以丹藥。嚼斜者。灸頰夾耳門。開口取之。太陽人中承漿。嚙右灸左。嚙左灸右。近患者易退。年久者難愈。又大風人面部所牽。多受是病。難以調治。

血瘀脾泛。○謂脾內之肉。紫瘀浮泛。甚則如細泡無數。相連成片。蓋脾絡血滯。又不忘火毒燥脈。致積而不散。或猝脾出血。胃風所致。宜活血為主。并用開導。脾虛如球。○謂目脾浮腫如球也。以兩手掌擦熱拭之。少頃復如故。可見其血不足。而虛火壅於氣分也。補中益氣湯。去升麻加葛根。木通澤瀉。

風沿爛眼

風沿眼系。上膈有積熱。自飲食中挾怒氣而成。頑痰痞塞。濁氣不降。清氣不升。由是火益熾而水益降。積而久也。眼沿因膜積而腫於中生細小蟲絲。遂年久不愈。而多癢者是也。服柴胡飲子點藥仁膏。

迎風赤爛證。○目不論何風。見之則赤爛。無風則否。蓋赤者

醫通卷之八

脾病

脾病

脾病

思得堂藏

思得堂藏

木中火證。爛者土之淫證。此專言見風赤爛之患。與後見風淚出諸證不同。川芎茶調散。皆赤爛證。○謂口爛惟背有之。目無別病也。赤勝爛者多火。乃勞心憂鬱。忿悖無形之火所傷。爛勝亦者淫多。乃恣燥腎酒風熱。煎熬有形之淫所傷。病屬心絡。甚則火盛水不清。而生瘡於背邊也。洗肝散加麻黃蘇葉川連。并用赤芍防風五倍子川連煎湯。入鹽輕粉少許洗之。點用爐甘石散。及晚薰沙香油浸月餘。重綿濾過點之。

目淚不止

經云。風氣與陽明入胃。循脈而上。至目內眥。其人肥則風氣不得外泄。則為熱中。而目黃。人瘦則外泄而寒。則為寒中。而泣出。其目黃。熱淚出。屬寒也。明矣。

東垣云水乘木勢上為眼。瀉為眵。為冷淚。此皆由肺金之虛而肝木寡於畏也。○凡目見西北二風則瀉痛淚出。乃肝虛受剋之病。止淚補肝散。并灸睛明二穴。見東南二風則瀉痛淚出。乃肝自病。菊花散。若不論何風。見則流冷淚者。乃肝腎經中有伏飲。血液不足。竅虛風入。因邪引邪之患。夜光椒紅丸。或四物換赤芍生地。加防風肉桂羌活木賊。又不論何風。見則流熱淚。乃肝腎經中有伏火。虛竅不密。曰風引出其淚。川芎茶調散菊花散選用。

龍安常云頭風冷淚。用菊花決明白朮白芷細辛羌活荆芥煎服并洗。○若目赤不痛。苦無別病。不因見風。亦時常流出冷淚。甚則視而昏眇。乃肝膽氣弱。腎水不足。入味九用椒製地黃加苒歸。產後悲泣太過者。十全大補加川椒細辛。若

醫通卷之八

思得堂藏

熱淚不時常流。乃內火激動其水。因肝腎精血耗竭。陽火易動而傷其液也。六味丸加川椒製熟地。倍丹皮。哭泣太傷者。八珍湯加川椒五味。又肺藏久冷。不時治淚。積於淚堂。此淚通於肺。難治。久流令人目昏。又有脾內如痰。白稠膩甚。拭之即有者是。痰火上壅。脾肺溼熱所致。故好酒嗜燥。悍鬱者。每患此疾。逍遙散去柴胡陳皮加羌防菊花。若覺脾腫及有絲脈。此赤者必滯入血。分防瘀血。灌睛等變。

目瘡疣

實熱生瘡。有痛癢輕重不同。重則堆積高厚。紫血膿爛而腥臭。如瘡瘡之證。皆淚水濁。每每流於脾。皆成瘡。血散而瘡白。除別無痛癢證者。輕而無妨。若火盛瘡生。堆重帶腫痛者。又當悉治。恐濁氣沿入而病及於珠也。治宜瀉心火。解熱毒。有

瘡處仍用開導洗點。椒瘡生於脾內。紫紫如椒。紅而堅者。是也。有則砂礫難開。多淚而痛。今人皆呼為粟瘡。誤矣。粟瘡亦生在脾。但色黃軟而易散。此則堅而難散。醫者卒以龍須出血取效。甚則累葉連片。從諸不平。不得已而導。中病即止。若退而復來者。乃內有痰滯。必須再導。更服祛風熱藥以治其內。○粟瘡生於兩脾。細顆黃而軟。若目病頭疼者。必有變證。是濕熱鬱於土分。須服退濕熱藥。○若脾生痰核者。乃痰因火滯而結。生於上脾者。多屢有不治自愈者。有嗜嗜辛辣熱海酒色。斷喪之人。久而變為癰漏重疾者。有之。

五疳證

木疳證。○生於風輪者多。其色藍綠青碧。有虛實之別。虛者大而昏花。實者小而瀉痛。非比蠟睛因破而出。乃自然生者。

醫通卷之八

目瘡疣 五疳證

思得堂藏

大小不一。隨其變長也。實者湯青丸。虛者通肝散。火疳證。○生於脾背及氣輪。在氣輪者。火邪克金。為害尤急。初起如椒。瘡瘡于一顆。小而圓。如小赤豆。次後漸大。痛者多。不痛者少。不可誤認作輪上一顆。如赤豆。為易消之證。此則從內而生也。三黃湯導赤散。分虛實治之。

土疳證。○謂脾上生毒。俗呼榆錢眼。有一目生。又一目者。有止生二目者。有邪微不出。膿血而愈者。有犯辛熱燥膩。風沙烟火。為漏為疳者。湯黃散。初起以聯入大背內。透淚堂。數中擦之。淚出即消。無不立愈。

金疳證。○初起與玉粒相似。生於脾內。必礙珠。瀉痛以生障。障生於氣輪者。則有珠痛淚流之苦。子後午前陽分氣升之時。則重午後入陰分。則病畧寧。久而失治。遂成友朋者。有變

漏之患。漏肺湯。

水疳證。○忽然一珠。生於脾背氣輪之間者多。若在風輪。必破損。有虛實大小之殊。實者小而痛甚。虛者大而痛緩。狀如黑豆。亦有積長而圓者。頭風人多有此患。清空膏。神膏丸。選用此證。與木疳相似。但部分稍異。色亦不同。黑者屬水。青綠藍碧者屬木。久而失治。必變為漏。以風鬱久勝。精膏走散。隨其所傷之絡。結滯為疳。淫熱相搏。而為漏矣。

漏睛

漏睛者。皆頭結聚生瘡。流出膿汁。或如涎水粘睛。上下不痛。仍無管膜。此因風濕停留。眼中所致。久而不治。致有烏珠墜落之患。

大背漏證。○大背之間生一漏。時流血水。紫暈腫脹而痛。病

腎通卷之八

漏睛

四十六 思得堂藏

在心火實毒。金花丸加羌活蠅尾。

小背漏證。○小背間生一漏。時流血色鮮紅。病由心胞絡而來。相火橫行之候。導赤散加透風清熱藥。

陰漏證。○不論何部生漏。但從黃昏至天曉。則痛脹流水。作

青黑色。或腥臭不可聞。日間則稍可。乃幽陰中有伏火為患。四物加細辛香附連翹之類。

陽漏證。○不論何部生漏。但日間脹痛流水。其色黃赤。遇夜則稍可。乃陽絡中有淫熱留著所致。人參漏蘆散去當歸加羌防生甘草。

正漏證。○生於風輪。或正中。或畧偏。為肝腎風熱伏陷所致。若初發破淺。則流出如痰白膏。日久而深。則流出青黑膏汁。瞳神已損。急用湯肝藥如龍膽羌活。生地大黃之類。下奪之。

偏漏證。○生於氣輪。痰淫流於肺經而成。較正漏為害稍遲。其流如稠粘白水。重則流膿。急用湯肺藥。如貝母桔梗。桑皮生甘草。黃芩山梔之類。涼解之。久而失治。水泄膏枯。目亦損矣。

外漏證。○生於兩脾之外。或流稠膿。或流臭水。服痛則流出。不脹則畧止。先與人參漏蘆散。後用千金托裏散加葱白。竅漏證。○乃目傍竅中流出薄稠水。如膿腥臭。拭之即有。久則目亦模糊也。嗜燥射酒。痰火淫熱者。每多患此。竹葉瀉經湯。千金托裏散。先後收功。久不治。亦有暗傷神水。耗損神膏之患。

不能近視

東垣云。能遠視不能近視者。陽氣有餘。陰氣不足。少年窮役。腎通卷之八

不能近視 不能遠視

四十七 思得堂藏

眼神所致也。○海藏云。目能遠視。知其有火。不能近視。責其無水。法當補腎。加減地芝丸。或六味丸加減。○秘要云。陰精不足。陽光有餘。病於水者。故光華發見。散亂而不能收。欲近視治之。在心腎。若貪淫恣慾。饑飽失節。形體甚勞。過於悲泣。皆斷喪陰精。精虧則陽火熾。火性炎而發見。陰精不能制伏。挽回故越於外。而遠照不收。治之而反觸激者。有內障之患。

不能遠視

東垣云。能近視不能遠視者。陽氣不足。陰氣有餘。此老人桑榆之象也。○海藏云。目能近視。知其有水。不能遠視。責其無火。治當補心。加味定志丸。八味丸。早暮間服。○秘要云。此證非謂稟受生成近視之病。乃平昔無病。素能遠視。而忽然不能者也。蓋陽不足。陰有餘。病於火者。故光華不能發越於外。

而俱欲近視耳。治之在膽腎。若就酒嗜燥。頭風痰火。忿怒暴悖者。必傷損神氣。陰陽偏勝。而光華不能發達矣。

目妄見

素問云。夫精明者。所以視萬物。別黑白。審長短。以長為短。以白為黑。如是則精衰矣。人之目者。心之使也。心者神之舍也。故精神亂而不轉。卒然見非常處。精神魂魄散不相得。故曰惑也。如神光自見。則每如電閃。黑夜精明。則晦冥之中。倏忽見物。視正反邪。則物本正。而目見為邪。視定反動。則物本定。而目見為動。視物顛倒。則視物皆振動。倒植視一為二。則一物而目視為二。視瞻有色。則常見螢星雲霧。及大片青綠藍碧之色。視赤如白。則視物却非本色。或視粉牆如紅如碧。或看黃紙似綠似藍之類。光華量大。則視日與燈燭。皆生紅暈。

醫通卷之八

目妄見

思得堂藏

而大。此陰精虧損。陽光飛越之候。總補養為主。如加減駐景丸。益氣聰明湯之類。久而不治。不無內障之虞。

報國澄和尚患眼疾二年。服祛風清熱藥過多。致耳鳴嘈嘈不止。大便常苦燥結。近來左眼上有微翳。見燈火則大如斗。視月光則小如螢。嘗詢諸方家。俱莫能解。因以質之石頑。石頑曰。此水虧而陰火用事也。試以格物之理。參之如西洋玻璃眼鏡。人但知宜於老人。不知原為望氣者而設。其最精者。咸以十二鏡編十二支為一套。無論老少。其間必有一者。能察秋毫。則知人眼有十二種偏勝。故造眼鏡者。亦以十二等鉛料配之。取鉛以助陰精。料以助陽氣也。少年氣血本旺。原無藉此。若鉛料之輕重。與眼之偏勝。不相當。則得之反加障礙矣。老人氣血皆衰。但借此以籠

住其光。不使散漫。不必論其鉛料之孰重孰輕也。即如所言視月甚小者。月乃至陰之精。真水內洞。不能泛濫其光。所以視之甚小。設加之。以鉛重者。則視月必大矣。見燈火甚大者。燈本然有之。焰專擾乎陰。不能勝其灼燥。所以見之甚大。設加之。以料重者。燈火必愈大矣。合脈參證。知為平昔勞傷心脾。火土二藏過燥。并傷腎水。真陰也。遂疏天王補心丹與之。他如中翰徐燕及見日光。則昏翳如蒙。見燈火。則精彩倍常。此平昔恆勞心腎。上盛下虛所致。蓋上盛則五志聚於心包。暗侮其君。如權案在位。蒙蔽九重。下虛則相火失職。不能司明察之令。得燈燭相助其力。是以精彩勝於常時。此與嬰兒胎寒夜啼。見火則止之義。不殊。未識專事眼科者。能悉此義否。

醫通卷之八

目閉不開

目為物所傷

思得堂藏

目閉不開

尼太陽之筋。為目上綱。足陽明之筋。為目下綱。熱則筋縱。目不開。助陽和血。湯然又有淫熱所逼者。則目胞微腫。升陽除淫。防風湯。真陽不能上升者。則喜暖怕亮。補中益氣湯。肝虛者。則閉目不欲見入。金匱腎氣丸。各求其本而治之。

目為物所傷

被物撞損者。或打跌撞破。傷胞臉也。積血紫青。撞破白仁。傷其硬殼。此不為害。惟撞破黃仁。風輪血灌。瞳神與水輪混雜。最為利害。或雖不破。而淚多苦。如藥汁者。難治。急宜酒煎散去。防已牛旁。加羌活木賊。以葱艾護以清涼膏。或專以生地黃。搗爛作餅。烘熱貼太陽穴。及眼胞上一日一換。以散其血。如無生地黃。用芙蓉葉。搗爛烘貼。乾者用雞子清調之。若

眼眶青黑。搗生萊菔。貼切宜。避風忌口。痛甚酒煎散。加沒藥。漸生。醫障者。犀角地黃湯。換赤芍。加大黃。當歸。柴胡。連翹。甘草。若至血散。變生白。醫不痛。為不治也。

驚振外障證。○日被物撞。觸而結為外障也。與傷在膏上急者不同。初撞目時。亦有珠疼。瀉服之苦。為其傷輕。而瘀自潛消。故痛雖止。而不戒禁。有所觸發。其火致水不清。氣滯絡澀。而生外障者。神消散去。若尤加石決明。兼早萊菔。凡外障結而珠疼。致頭疼及腫脹者。皆是惡證。防變急宜治之。

驚振內障證。○因病目再被撞打。變成內障。日夜疼痛。淹淹障生。赤膜遮目。不能視三光。亦如久病內障。皂莢丸合生熟地黃丸。

物損真睛證。○謂被物觸打在風輪。傷有大小。色有黃白。黃者害速。白者稍遲。若觸膏及破者。必有膏汁。或青黑。或白如痰者。流出為患最急。縱然急治。瞳神雖在。亦難免缺側之患。

如草木刺金石屑。苗葉尖銳。刺在風輪。必曉夜疼痛難當。急宜取出。遲則結成黃白翳。如粟瘡銀星之狀。緣膏水結滯。而障生。先去物而治障。若傷在氣輪皮內。取遲者必有瘀血。灌睛。取去物而先導之。後治餘證。若視昏者。瞳神有大小。缺側之患。久而失治。目必枯凸。大凡此病。不論大小。黃白。但有淚流赤脈等證者。急而有變。珠疼頭重者。尤急。素有風熱。痰火。斷喪之人。病已內積。因外傷激動。其邪乘此為害。痛甚便潰者最凶。

飛絲入目證。○謂風颺游絲。偶然觸入目中。而作痛也。若野蠶蜘蛛木蟲之絲。思尚遲。若遇金蠶老鸚絲。其目不出。三日

逆裂。○治飛絲入目。方用頭垢點入眼中。○栝樹漿點過。綿裹著頭。蘸水於眼上。綴拭涎毒。○火麻子一合。杵碎。井水一碗。浸攪。却將舌浸水中。涎沫自出。神效。一方用茄子葉碎。杵如麻子法。亦妙。○飛絲入目。目脹如珠。痛澁不開。鼻流清涕。用京墨濃磨。以新筆塗入目中。閉少時。以手張開。其絲自成一塊。看眼白上用線輕輕捲下。未盡再塗。

物偶入睛證。○謂偶然被物落在目中。而痛也。切不可乘躁便擦。須按佳性。待淚來滿而擦。則物潤而易出。如物性重。及有芒刺。而不能出者。急令人取出。不可揉擦。擦則物愈深入。而難取。至若入深。輕翻上。取出。不取。則轉運阻礙。氣滯血凝。而病變。芒刺金石稜角之物。失取。礙久。及擦重者。則壞損輪膏。如痕癢凝脂等病。輕則血瘀水滯。為痛為障等病。有終

醫通卷之八

飛絲入目

傷寒愈後之病

思得堂藏

不得出而結於脾內者。必須翻之。尋看。因其證而治之。

眯目飛揚證。○因出行間。風吹沙土。入目。頻多揩拭。以致氣血凝滯。而為病。初起。淚出。急滴。漸重。結為障。醫當辨形證。施治。○初起。將綿捲。擦脚。擦擦出塵物。久者。翻轉。脾驗。看有積處。刺洗至平。不須吹點。○物落眼中。用新筆蘸微出。○治稻麥芒入眼。取蟬蟬以新布覆目上。待蟬蟬從布上摩之。其芒出。著布上。又法。以鴨倒懸。取涎滴入目中。其芒自出。

傷寒愈後之病

傷寒。病愈後。或有目復大病者。以其清陽之氣不升。餘邪上走空竅也。其病癰滿赤脈。生翳羞明。頭腦骨痛。當助清陽上出。則愈。最忌大黃芒硝。苦寒通利。犯之不可復治。

經逆赤腫

女人逆經血。滿腫神。滿眼赤。滿者。乃血熱經閉。過期不行。則血逆行於上。如有努肉。切不可鉤。只用四物加行氣破血。通經藥。經行則血自退。勢甚必加酒大黃。下奪其勢。去火所以存陰。正為肝血虛少。不得不以退火為急。務火不下。奪則凌燥其陰。陽愈亢而陰愈竭矣。人但知四物之補血。孰知大黃為補血哉。若因其虛而用補藥。非徒無益。真是抱薪救焚矣。

妊娠目病

妊娠目病。須分氣分血分。氣分則有旋暈。泛起。瞳神散大。等證。血分則有瘀血凝脂等病。蓋其陰陽滯滯。與常人不同。內伐恐傷胎泄氣。不伐則病又不除。然必善施內護外切之法。則百發百中矣。

經通卷之八

產後目病

妊娠目病

至

思得堂藏

產後目病

產則百脈皆動。邪易以乘。肝部發生之氣甚弱。而膽失滋養。精汁不盛。則目中膏液皆失化源。所以目病者多。皆內不足所致。大抵產後病宜早治。莫待其久。久則氣血定而病深。治亦不易。其外證易知。若人皆知。皆而早治。其內證皆緩者。人多忽之。比其成也。悔無及矣。

痘疹餘毒證

痘疹入眼。其痘疹初生。眼閉不開。眼上即有痘疹。點在黑睛上者。急取益母草煎湯洗。日三度。更以鱗血點之。忌口及夜啼。乳母亦忌口。須痘疹痊。可其眼漸開。眼中之痘亦愈矣。○初起痘疹入眼。決明散。蜜蒙散。痘疹入眼。成腎者。殺精散。神功散。選用丹方。用望月砂末生雞肝研爛。飯上蒸熟。每日

空心食之。効。○大抵治之早。則易退。而無變。遲則遲。至今人但見痘後目疾。便謂不治。不知但瞳神不損者。縱久遠。亦有可治之理。惟久而血定精凝。障障沈沈。滑滑損者。為不治耳。○倪仲賢云。痘疹餘毒所害者。與風熱不制之病。稍同而異。總以羚羊散主之。便不硬者。減硝黃。未滿二十一日而病者。當消毒化斑為主。斑後風熱。腎膜氣暈。遮睛。瀉青丸瀉之大効。○痘疹癢癢。落盡。肌體肥壯。眼中忽然紅色。乃餘毒鬱結而發出。此證最劇。失治多能害目。只用車前草。搗水。頻頻灌之。潌却肝經之熱毒。洗以益母草。點以鱗魚血。

胎風赤爛證。○此證有三。一為血露入眼。洗不乾淨。而赤爛。生藥服鴉汁點之。一為在母腹中時。其母多食壅毒辛熱。生後百日而赤爛。犀角地黃湯加黃連。母子俱服。一為乳母壯盛。乳頭服滿。乳汁酒射兒眼中。而赤爛。黃連湯拭淨。一味蝦過爐。沽石吹點。

經通卷之八

痘疹餘毒證

胎風赤爛

至

思得堂藏

小兒疳眼證。○皆由過食傷脾。腹脹。午後發熱。至夜方退。日久髮稀。作渴。渴甚則渴。食積發熱。既久。則肝膽受傷。白仁紅色。漸生。腎膜遮睛。黑珠突起。如黑豆。如香菰之狀。決明雞肝散。或半肝。煎夜明沙食。或綠若一兩。饅頭去。留裏煨。外黑盡。內通紅。取出用蜜陀僧煨。夜明沙等分。為末。煮棗肉。搗丸。黍米大。每服二三十九。量兒大小。空心米湯下。切宜忌口。膜用人乳。頻點自去。若至聲啞。口乾。脚手俱腫。十難救一。

因風證

因風者。謂患風人病目也。風在五行為木。在臟為肝。在竅為目。本乎一氣。故患風人。未有目不病者。然必因其故而發。有

目淺而睛未深。爲偏側歪斜者。有入脾而脾反溼勝赤爛者。有血虛筋弱而振搖者。有不禁而反傷精神及恣燥嗜熱。蘊鬱而爲內障者。有風盛血滯。結爲外障。如努肉等證者。各因其證而伐其本。內外治法不同。大抵風病目者。當去風爲先。風不去。目病終無不發之理。

因毒證

因毒者。謂人生瘡瘍腫毒累及目病也。若病目在病毒之時。治毒愈而目亦愈。若毒愈而目不愈者。乃邪入至高之深處。難以自退。當滯其本。澄其源。因而觸激甚者。有瘀滯之變。

因他證

因他證而害及目。所致不同。如傷寒陽證熱鬱。蒸損瞳神內證也。熱盛血滯。赤痛淚清者。外證也。陰證脫陽目盲。內證也。醫通卷之八

因毒證 因他證

思得堂藏

服蓋附溫熱之劑多。而火燥赤濁者。外證也。瘡疾之熱損瞳神內證也。火滯於血而赤濁外證也。湯利後昏眇爲穀氣乏氣傷不能發生。內證也。山嵐瘴氣目昏者。邪氣蒙蔽正氣。外證也。蠱脹中滿赤痛者。陰虛難制陽邪。內證也。氣證多鬱弱證多昏花。皆內證也。痰證之膩沫。火證之赤濁。皆外證也。當尋其源而治。

時復證

目病不治。忍待自愈。或失其宜。有犯禁戒。傷其脈絡。遂至深入。又不治之。致積決。不得發散。至其年月如期而發。當驗其形證。絲脈別何部分。然後治之。

七竅門下

耳

經云。腎氣通於耳。腎和則耳能聞五音矣。狗蒙招尤。目冥耳聾。下虛上實。通在足少陽厥陰。甚則入肝。所謂耳鳴者。陽氣萬物盛上而躍。故耳鳴也。所謂浮爲聾者。皆在氣也。趙以德曰。耳者腎之竅。足少陰經之所主。然心亦寄竅於耳。在十二經脈中。除足太陽手厥陰外。其餘十經脈絡皆入於耳中。蓋腎治內之陰。心治外之陽。合天地之道。精氣無不變通。故清淨精明之氣。上走空竅。耳受之而聽斯聰矣。靈樞云。腎氣通於耳。腎和則耳聞五音矣。五藏不和。則七竅不通。故凡一經一絡有虛實之氣。入於耳中者。皆足以亂主竅之精明。而兼至聾聵。此言暴病者也。若夫久聾者。於腎亦有虛實之異。左腎爲陰。主精。右腎爲陽。主氣。精不足。氣有餘。則聾爲虛。其人瘦而色黑。筋骨健壯。此精氣俱有餘。固藏閉塞。是聾爲實。乃高壽之兆也。此皆稟賦使然。不須治之。又有乍聾者。經云。不知調陰陽。七損八益之道。早喪之節也。其年五十體重。耳目不聰明矣。此亦無治也。惟暴聾之病。與陰陽隔絕之未甚。經脈欲行而未通。衝擊其中。鼓動聽戶。隨其氣之微甚。而作嘈嘈風雨諸聲者。則可隨其邪以爲治。外此又有耳聾風邪與氣相擊。其聲嘈嘈。眼如見火。謂之風鳴。熱氣乘虛。隨脈入耳。聚熱不散。膿汁出焉。謂之膿耳。人耳間有津液。輕則不能爲害。若風熱搏之。津液結凝。成核塞耳。亦令暴聾。謂之聾耳。前是數者。腎脈可推。風則浮而盛熱則洪而實。虛則清而濡。風爲之疎散。熱爲之疎利。虛爲之調養。邪氣竝退。然後

醫通卷之八

耳

思得堂藏

以通脈調氣安腎之劑治之

羅謙甫云夫暴聾者由腎虛風邪所乘。搏於經絡。隨其血脈。上入耳。正氣與邪氣相搏。故卒聾也。○風虛耳聾。排風湯桂辛散。○腎藏風虛。黃耆丸。兼氣虛。去附子。加肉桂。人參。○肝腎虛。火藍蠟散。○風熱耳聾。犀角飲子。○厥逆。經云。暴厥而聲聞閉塞不通。內氣暴薄也。復元通氣散。去白牽牛。加全蠍。石菖蒲。川芎。生薑。葱白。吞養正丹。○凡治耳聾。皆當調氣。肝氣逆。則頭痛耳聾。煩腫。四物湯加肉桂。吞龍膏丸。降火。及復元通氣散。調氣。○耳聾有溼痰者。滾痰丸下之。○耳聾面頰黑者。為精脫腎虛。燒腎散。○耳聾多恐者。為肝虛。溫膽湯下。養正丹。○外治用通神散。草麻丸。一方用地龍三枚。鹽少許。同入葱管內。化水滴耳中。三五日効。一法用磁石豆大一塊。

醫通卷之八

耳

耳得堂藏

陵經甲三片。燒存性。綿裹塞耳中。口銜生鐵少許。覺耳中如風雨聲。即愈。

耳鳴。○經云。耳者。宗脈之所聚也。故胃中空。則宗脈虛。虛則下溜。脈有所竭。故耳鳴。又云。液脫者。腦髓消。筋疲耳數鳴。凡此皆耳鳴之屬虛者也。經云。太陽所謂耳鳴者。陽氣萬物盛上而躍。故耳鳴也。又云。厥陰之脈。耳鳴頭眩。又云。少陽所至為耳鳴。治以涼藥。凡此皆耳鳴之屬實者也。○王汝明曰。耳鳴如蟬。或左或右。或時閉塞。世人多作腎虛治。不効。殊不知此是痰火上升。鬱於耳中而鳴。鬱甚則閉塞矣。若平昔飲酒厚味。上焦素有痰火。清痰降火。為主。大抵此證。先因痰火在耳。又感惱怒。而得。則氣上少陽之火。客於耳也。若腎虛而鳴者。其鳴不甚。其人多慾。常見虛勞等證。○喻嘉言曰。凡治

高年腎氣逆上而耳鳴。當以磁石為主。以其重能達下。但性主下吸。不能制肝木之上吸。更以地黃膠膠。牽陰之藥。輔之。五味山萸之酸。以收之。令陰氣自旺於本宮。不上觸於陽竅。由是空曠無礙。豈更艱於遠聽哉。丹溪取通聖散。治飲酒過度而耳鳴。亦無確見。惟滾痰丸一方。少壯用之多効。以黃芩大黃沈香之苦。最能下氣。礞石之重。墜。大約與磁石相倣也。○薛立齋云。若血虛有火。用四物加山梔柴胡。若中氣虛弱。補中益氣加山梔丹皮。若因怒便聾。而或耳鳴。屬肝膽氣實。小柴胡加芎歸山梔。若午前甚者。陽氣實熱也。小柴胡加黃連山梔。午後甚者。陰血虛也。四物加白朮茯苓。若腎虛火動。耳中聞闐然。是無陰也。加減八味丸。○腎虛耳中潮聲。蟬聲。無休止時。妨害聽聞者。當墜氣補腎。正元散下黑錫丹。開進。

醫通卷之八

耳鳴

耳痛

耳得堂藏

安腎丸。○腎藏虛風耳鳴。夜間睡著。如播戰鼓。四肢掣痛。耳內覺有風吹。奇癢。黃耆丸。四生散選用。

耳腫痛。屬少陽相火。犀角飲子。加腦麝為丸。經云。少陽之勝耳痛。治以辛寒是也。○耳內痛生瘡。用鼠粘子連翹歸芍苓連。甘桔生地。桃仁黃耆。柴胡草龍膽之類。○耳溼腫痛。用涼膈散。加羌防荆芥。外用龍骨黃丹等分。枯礬減半。加麝少許。吹入。或龍骨黃丹乾麝脂為末。亦佳。或用五倍子燒灰。同枯礬吹之。

耳疹。○耳瘡。屬少陽三焦。或足厥陰肝經血虛風熱。或怒動肝火而致。若發熱癢痛。屬三焦厥陰風熱。用柴胡清肝散。梔子清肝散之類。慎不可專治其外。復傷氣血也。有因腎虛風熱作癢。空傷成瘡者。六味丸加白蒺藜。

耳中癢腎家有風四生散每作時服二三劑即瘥

耳癢者。淫熱聚於耳中也。復元通氣散如前加減。外以五倍子全蠍枯礬爲末。入麝少許吹入。或棉皮燒灰存性。入麝少許。先以綿拭耳內膿淨吹之。如壯盛之人。積熱上攻耳中出膿水不瘥。涼膈散湯之。

耳中聾耳鳴耳聾內有汚血。外用萊菔搗汁。研麝少許滴入。餘法與耳聾相參治之。

蟲入耳中。將生薑擦貓鼻。其尿卽出。取尿滴耳中。蟲卽出。或用妙芝蘇枕之。蟲亦出。耳中有物不可出。以弓弦或錢串繩。剪令頭散。蘇好膠著耳中。使其物粘之。徐徐引出。効。

薛立齋治一男子。每交接耳中癢痛。或水出。以銀簪探之。甚喜陰涼。此腎經虛火用加減八味丸而愈。

醫通卷之八

耳鳴

耳鳴

又治一婦因怒發。每經行兩耳出膿。兩大陽作痛。以手按之痛稍止。怒則胸脇乳房脹痛。或寒熱往來。小便頻數。或小腹脹悶。皆屬肝火血虛。加味逍遙散十劑。諸證悉退。以補中益氣加五味而痊。

鼻

經曰。肺開竅於鼻。肺氣通於鼻。肺和則鼻能知臭香矣。○五氣入鼻。藏於心肺。心肺有病。而鼻爲之不利也。○西方白色入通於肺。開竅於鼻。藏精於肺。○肺主臭。在竅爲肺。在竅爲鼻。○陽明之脈。挾鼻絡目。○膽移熱於腦。則辛頰鼻淵。

經云。其宗氣走於鼻。而爲臭。夫宗氣者。胃中生發之氣也。因饑飽勞役。損其脾胃。則營運之氣不能上升。邪塞孔竅。故鼻不利。而不聞香臭也。麗澤通氣湯。時值寒月。必須發散。或加麻黃細辛之類。於升麻湯內。春夏可用葱白白芷之屬。佐以枯荳蘇葉。多加桔梗爲舟楫。庶或成功。已經發散。未得全開。脈洪有力。口乾鼻燥者。君以辛涼清之。酒荳蔻子薄荷之屬。仍佐荊防升芷。不可驟用寒涼也。○丹溪云。鼻爲肺竅。肺家

醫通卷之八

鼻

鼻

有病。而鼻爲之不利也。有寒有熱。暴起爲寒。久鬱成熱。寒傷皮毛。氣不得利。而壅塞。然壅塞清道。氣不宣通。先以葱白白芷香豉羌防紫蘇細辛辛荳之屬。表散後。以酒炒荳連薑汁炒黑山梔生甘草石膏薄荷川椒之屬。清火自愈。○近世以辛荳仁治鼻塞。不聞香臭。無問新久寒熱。一槩用之。殊不知肺胃陽氣虛衰。不能上透於腦。致濁陰之氣。上千清陽之位。而室塞者。固宜辛荳之辛。溫香竅以通達之。若淫熱上蒸。蘊釀爲火。而室塞者。非山梔仁之輕浮清燥。不能開發也。至於風寒鼻塞。重則麗澤通氣。輕則葱白香豉。細辛羌活。薄荷荊芥之屬。隨寒熱輕重而施。可不審權度而混治哉。○王汝言曰。鼻塞不聞香臭。或遇冬月多塞。或暑感風寒。鼻塞。不時舉發。者。世俗皆以爲肺寒。而用解表通利辛溫之藥。不効。殊不知

蓋煎成入鹽少許服有惡物下即効外用草烏燒灰麝香等分研極細以少許傅瘡上

鼻乾無涕宜犀角黃著木通杏仁麥冬炙甘草升麻葛根桑皮石膏硃砂積熱加牙硝大黃

鼻痛○風火鬱於上則痛初宜升麻葛根葱白白芷散之有氣道壅塞而痛宜川芎葛根甘草苦梗山梔薄荷薑黃葱白痛久服藥不應時痛劇時向安或兼兩額紫赤此為溼熱瘀滯宜犀角玄參連翹山梔丹皮赤芍生甘草之類○肺受風面枯色頰時赤皮膚乾燥鼻塞乾痛此為虛風白藜皮麥冬茯苓杏仁桑皮白芷細辛石膏煎服○卒食物從鼻中縮入腦中中介脂不出以牛脂或羊脂如指大納鼻中以鼻吸取脂入須臾脂消則物隨脂俱出也

醫通卷之八

鼻乾無

鼻痛

室

思得堂藏

鼻赤○俗名酒齕鼻乃血熱入鼻也多飲酒人邪熱薰蒸肺竅伏留不散故見於鼻或肺素有風熱雖不飲酒其鼻亦赤也宜用枇杷葉拭去毛生煎濃湯候冷調消風散食後臥服或服瀉青丸或同薑汁炒黑山梔杏仁泥等分蜜丸服之并用白鹽時時擦之外治以生白礬硫黃玄明粉等分為散入麝少許擦之或用硫黃入大菜頭內煨礬塗之或用生礬研末每塗鼻上或用硫黃入大菜頭內煨礬塗之或用生礬研末每洗面時置掌中滴酒擦患處數日即白或用硫黃一兩輕粉白礬各五分為末用燒酒一碗入酒盞將藥盛絹囊中懸空盞內熱湯浸盞慢火頓一二時取出放冷日用燒酒塗夜用洗底藥末敷

鼻紫黑○諸陽皆聚於頭則而為陽中之陽鼻居面之中央

而陽明起於頰中為至清至精之分多酒之人酒氣熏蒸面鼻得酒血為極熱熱血得冷為陰所搏結滯不行故先紫後黑當用山梔仁薑汁浸炒黑二兩入乾薑炮黑二錢連翹仁一兩為末蜜丸臨臥燈心湯服二錢半以清肺家血中之熱也

江應宿治一人鼻塞氣不通利潤涕稠粘屢藥不効已經三年其脉兩寸浮數曰此火鬱也患者曰向作腦寒主治予何懸絕經云諸氣膜鬱皆屬於肺越人云肺熱甚則出涕乃熱鬱滯氣壅塞不通也投以升陽散火湯數劑而病如失

醫通卷之八

鼻紫黑

室

思得堂藏

口者脾之所主。胃與大腸脈之所挾。經云脾氣通於口。脾和則口能知五味矣。此脾之主於口也。又云胃足陽明之脈。挾口下交承漿。又云大腸手陽明之脈。挾口交人中。此胃與大腸之脈挾於口也。○脾熱則口甘。肝熱則口酸。心熱則口苦。肺熱則口辛。腎熱則口鹹。胃熱則口淡。○口甘。經云有病口甘者。此五藏之溢也。名曰脾痺。治之以蘭。除陳氣也。蘭香飲子。若脈弦滑兼嗜雜。屬痰火滾痰丸。此指實火而言。○平人口甘或渴。或小便亦甜而濁。俱屬土中溼熱。脾津上聚。久之必發癰疽。須斷厚味氣脂。服三黃湯加蘭葉白芍生地。燥渴甚者。為腎虛。日服加減八味丸。可保無虞。○中消。脾液上乘。口甘者。蘭香飲子。老人虛人。脾胃虛熱。不能收斂津液。而口

醫通卷之八

思得堂藏

甘者。當滋補脾氣。補中益氣。去升柴。加蘭香煨葛根。○口苦。經云有病口苦。名曰膽痺。夫膽者。中精之府。五藏取決於膽。咽為之使。此人數謀慮不決。故膽虛氣上溢。而口為之苦也。龍膽瀉肝湯。或小柴胡加參冬。棗仁。不應。本方加川連。膽草。○口酸。肝膽實熱也。佐金九加神龜草。龍膽。○口辛。肺氣上溢也。生脈散加桑皮。地骨皮。黃芩。○口鹹。腎液上乘也。六味地黃九加五味。烏鰂骨。○口淡。為胃熱。而有虛實。實則甘露飲加廣藿香。病後胃虛。口淡。六君子加黃耆當歸。○口澀。肝邪逆於肺氣。虛火旺也。黃芩葛根。防風薄荷。括蕪。茯苓。○口瘡。經云。膀胱遺熱於小腸。腸陽不便。上為口瘡。蓋小腸者。心之府也。此舉邪熱之一端耳。心屬君火。主五藏六府之火。故諸經之熱。皆應於心。心脈布舌上。脾脈布舌下。二經之火。為

病皆當用寒涼施治。但有凝者。兼取其凝。若元藏虛冷。上攻頭熱。足冷。口瘡。用附子理中湯。連理湯。併用當歸附子蜜煎。含嚙。有用生附子。未全脚心者。若此之類。皆是治龍火之法。陰邪上迫。心脾之陽。不得下降。故用溫熱主治。或散於上。或散於下。隨其依利。○胃中有熱。脈洪大而實者。服涼膈散。金花丸。并用黃蘗一味。蜜炙含之。忌犯酒醋。犯之難愈。○又好飲酒。入多有此證。易老用五苓散。導赤散。和治之。○服涼藥不愈者。此酒色過度。勞役不睡。舌上光滑而無皮。或因憂思損傷中氣。虛火泛上。無制。必用理中湯。甚者加附子。并用蜜煎附子嚙之。○口瘡以甘草半寸。白礬錢許。含化。熱津。○口瘡久不愈。以五倍子末。搽之。或煎湯漱。或煎湯泡。白礬漱。蓋酸能收斂也。○口瘡甚者。含焰硝礬砂。勿開口。并用南星

醫通卷之八

思得堂藏

未醋調貼。足心湧泉穴。以引熱下行。○又方。五倍子一兩。蜜炙。黃蘗滑石各半兩。銅綠三錢。麝香少許。為末。搽之。○舌瘡。口破。疼痛。以巴豆半枚。生研。和米飲一豆大。并和貼印堂。對額間。約半刻許。覺紅就去。不可泡起。小兒減半。隨即痊愈。○戴復庵云。下虛上盛。致口舌生瘡。宜用鎮墜之藥。以蘇子降氣湯。或鹽湯。下養正丹。○口臭。年高水弱。奉養太過。厚味及服食補陽藥。口瘡臭不可近。甘露飲加犀角。茵陳。及濃煎香薷汁。含之。徐徐嚙下。口中如膠而臭。知母地骨皮。桑皮。山梔。麥冬。甘草。食鹽。煎湯。嚙下。壯盛之人。涼膈散甚佳。痰壅氣濁而臭。宜鹽湯探吐之。

子和治一男子。二十餘歲。病口中氣出。臭如登廁。夫肺金本主腥。金為火所乘。火主臭。應使如是也。久則成腐。腐者

腎也。此亢極反兼水化也。病在上宜湧之。以瓜蒂散湧而去其七分。夜以神祐丸。滿川散下五七行。比旦而臭斷。但藥性穢悍。不宜輕用。

齒 諸症 骨槽風

齒統屬足少陰腎經。分上下。上齦屬足陽明胃經。下齦屬手陽明大腸經。男子八歲腎氣實。髮長齒更。三八真牙生。五八齒稿。八八則齒髮去。女子以七為數。蓋腎主骨。齒乃骨之餘。齒之所養。故隨天癸之盛衰也。○東垣云。齒者腎之標。口者脾之窠。諸經多有會於口者。下齦乃手陽明大腸脈之所過。惡熱飲而喜寒。上齦乃足陽明胃脈之所貫。喜熱飲而惡寒。牙者腎之標。實則堅牢。虛則浮動。熱則祖動。作痛不已。其痛不一。有惡熱而作痛者。有惡寒而作痛者。有惡寒又惡熱而作痛者。有牙齒動搖而作痛者。有齒袒而作痛者。有齒齦為疳所蝕。缺少血出而作痛者。有齒齦腫起而作痛者。有脾胃中有風邪。但覺風而作痛者。有胃中氣少。不奈於寒。袒露

共齒作痛者。有為蟲蝕色變而作痛者。有牙齒疼痛而臭穢之氣不可近者。痛既各異。豈可一藥而盡之哉。

薛立齋云。淫熱甚而痛者。承氣湯下之。上下牙痛不可忍。牽引入腦。或喜寒惡熱。脈洪數有力者。涼膈散倍酒蒸大黃瀉之。大腸熱而齒齦腫痛。清胃散火鬱而痛者。越鞠丸解之。腎經虛而痛者。六味丸加骨碎補。腎經虛寒而痛者。八味丸加細辛。其屬風熱者。羌獨荊防芎辛薄荷生地之類。水煎漱。嚥不愈。齒陳散。風毒及熱壅上攻。牙齦痛。或齦縫有紅肉弩出。消風散。臨臥半漱半服。風寒入腦者。羌活附子湯。○牙痛用清涼藥更甚者。從治之。華撥川椒薄荷細辛龍腦青鹽。為末擦之。○得熱而痛。得涼則止者。小承氣湯加甘草川連。○凡齒痛。遇勞即發。或午後甚者。皆脾胃虛熱。補中益氣下六味

煎人青鹽少許。如上且漱且嚥服之良。○牙疳腫痛作痛人
中白青鹽冰片玄明粉爲散搽之。小兒好食糖霜生疳。治之
不愈者。以石蜜不時嚼之。糖因煎煉而助溼熱。石蜜不經火
熬其性木寒。故能化疳。專取同氣之相感也。

鰓蛙○鰓蛙數年不愈。當作陽明畜血治。桃核承氣爲細末。
煉蜜丸如桐子大服之。好飲者多此。屢服有効。○局方引涎
止痛方。川椒露蜂房微炙。等分爲末。水煎入鹽少許。乘熱頻
漱。冷即吐出。或用蟾酥銀珠搽和爲丸。如菜腹子大。每用一
丸搽患處。便不疼。至三九吐涎涎數口即愈。○又用不蛀皂
角一莢。去皮子。於皂子處安巴豆一粒。鹽泥固濟。燒灰研細
末。用刺耳子抄少許。填入蛀孔內。白芷細辛煎漱。或溫米醋
漱。出蟲自愈。或用食鹽之滴酒漱二三次。以搦其虛陽。其痛

即止。但可暫用。以其能損齒也。
牙齒動搖。還少丹常服。或六味丸加骨碎補。陰虛內熱者。甘
露飲。外用五倍子散。烏金散。長春牢牙散。○齒間肉壅。口不
能開。水漿難入。以牙硝煎湯漱之。一法用皂白二礬湯漱之。
一法用五倍子煎湯漱之。一法以熱醋漱之。
骨槽風。生於耳前。頰痛引筋骨。寒熱如癰。牙關緊閉。不
能進食。不待腐潰而齒便脫落。此風毒竄入骨槽所致。初則
堅硬難消。急宜艾炙其外。鍼刺齒齦以泄其毒。用冰硼玄明
粉爲散吹搽內服。降火化痰消腫之劑。久則瘡口難合。非參
耆歸芍補托兼肉桂冬味之類。不能破結斂肌。其治法外科
正宗頗詳。痼醫宜參究之。若腐腫不消。虛熱不退。形焦體削
者不治。

髮

經云。腎者封藏之本。精之處也。其華在髮。○多食甘。則骨痛而髮落。○髮黃者。多熱多氣。白者少血多氣。黑色者多血少氣。美眉者。太陽多血。通耳極弱。少陰多血。美鬚者。陽明多血。○髮黃白。七寶美髯丹。○髮白。髮黃。髮落不生。脈弦。皮毛枯槁。是營衛氣衰。黃耆建中下六味丸。髮脫落。及臍下痛。是脾腎氣衰。不能生長。與陰。四君子加熟地。○染髮用烏金散。烏金丹。亦金散。皆不傷髮。而極効。一法。棟上好茄。擇留初生第一枚茄子。傍蒂上面挖去一塊。放入水銀三分。仍以挖下者掩上。釜好。餘花摘去。勿令結子。久之茄中悉化為水。取貯錦囊中。以水浸確之半。勿令乾。顏稍一沾。全鬚盡黑。

醫通卷之八

髮

七

思得堂藏

唇

唇屬足太陰陽明脾胃。又屬手少陰太陰心脈。挾口。統屬衝任二脈。上唇挾口。屬足陽明。下唇挾口。屬手陽明。○唇燥則乾。熱則裂。風則瞶。寒則揭。若唇腫起。白皮。微裂如蠶繭者。名曰繭唇。有唇腫如繭如瘤者。或因七情火動傷血。或因心火傳脾。或因厚味積熱傷脾。大要審本證。察兼證。清胃氣。生津。或兼滋腎。則燥自潤。火自降。風自息。腫自消。若患者忽畧治者。不察。盲用消熱清毒之藥。或用藥線結去。反為翻花敗證矣。○腎虛唇。時出血水。內熱口乾。吐痰體瘦。六味丸去更加麥冬。不應。用加減八味丸。○肝經怒火。風熱傳脾。唇腫裂。或患繭唇。柴胡清肝散。○胃火血燥。唇裂為繭。或牙齦潰爛作痛。清胃散。○風客於脾經。唇燥裂無色。犀角升麻湯去白附子。加枳殼石斛。○婦人鬱怒。肝脾受傷。多有此證。逍遙歸脾小柴胡選用。○唇燥口乾。生瘡年久不愈。外用橄欖燒灰研末。豬脂調塗。○治唇裂生瘡。青皮燒灰敷之。○唇者肉之分也。唇反者。肉先死。唇青者。為筋死。石頑曰唇青。有二。若唇與爪甲俱青。而煩渴引飲者。為熱伏厥陰。竹葉石膏湯。若唇青厥冷而畏寒。振振欲擗地者。為寒犯少陰。真武湯。唇淡為脫血。宜十全大補輩。唇赤中帶黃色。為脾熱。黃芩芍藥湯。唇赤而腫厚。深澤然者。雖曰心火亢盛。實脾胃中有溼熱。當從清胃散加減治之。

醫通卷之八

唇

七

思得堂藏

舌

張三錫曰。心開竅於舌。心火盛。則舌乾或破。脈洪實有力者。黃連湯。心湯加減。右脈虛大。四肢倦怠。而舌潰破不愈。屬勞役過度。虛火上炎為患。補中益氣湯。口舌唇疼有瘡。皆心火炎盛。涼膈散。舌瘡風熱。口中乾燥。舌裂生瘡。甘露飲。酒客胃梁。積熱內盛。上焦痰實。舌服腫。涼膈散瀉之。須脈實有力。氣壯乃可。舌強硬如豬肝。以鍼刺舌兩邊大脈。血出即消。勿刺中央。令人血不止。此病人多不識。失治則死。凡舌腫。舌下必有如蟲形。有頭有尾。可燒釘烙頭即消。上焦痰熱壅遏。勢挾相火。則病速而危。毒氣結於舌下。復生一小舌。名曰子舌。服但服大而強。無小舌者。名曰木舌。大都痰火為患。緩者用辛涼利氣化痰藥。重者破去其血。即平。勞神不睡。

醫通卷之八

舌

思得堂藏

口舌破者。自當安神養心。作心虛治。心之本脈。係於舌根。脾之絡脈。係於舌傍。肝脈絡於舌本。少陰脈係舌本。風寒傷於心脾。憎寒壯熱。齒浮舌腫痛。全沸草散漱口。吞一半。吐一半。經驗方。治舌腫大。塞口不能飲食。用真蒲黃一味。煎刷舌上。甚則加乾薑末從治之。若能服藥。即以川連一味煎濃汁。呷之。以瀉心火。甚者加乾薑從治。舌上有數出血不止。炒槐花末摻之。病熱極者。多舌出血。有病愈而血不止者。蝦人中白和冰片。摻舌即止。舌暴脹大出外。蓖麻子油。煎作餅。燒烟薰之即消。七情所鬱。則舌脹滿不得息。宜舒鬱。清上焦。外用川烏。南星。乾薑末。搗手足心。心熱則裂而瘡。木舌重舌。宜三黃丸及生蒲黃摻之。舌出不收。心經熱甚。及傷寒熱毒攻心。與傷寒後不調。攝往往有之。宜珍珠末冰。

片。火燉人中白敷之。舌暴腫出口。用巴豆霜。以紙卷內鼻中。舌自收。此取辛烈開竅散火。引毒流散之意。與小兒口疳貼。頗同法。平人舌上稠黑胎垢。拭之不淨。經久不退。且口甜氣穢。便是胃脫發癰之候。與傷寒暴痢。府邪內實迥異。急宜涼膈散下之。

醫通卷之八

舌

舌

思得堂藏

面

靈樞云十二經脈三百六十五絡其血氣皆上於面而走空
竅其精陽氣上走於目而爲睛其別氣走於耳而爲聽其宗
氣出於鼻而爲臭其濁氣出於胃走唇舌而爲味其氣之津
液皆上熏於面而皮又厚其肉堅故天氣甚寒不能勝之也
○風邪入皮膚疲飲積府藏則面野黯脾肺二經風澤搏而
爲熱溼故面生瘡○面腫曰風兩頰赤腫其狀如癰酒調消
風散食後服之或用羌活防風升麻白芷牛旁子之屬甚則
涼膈散生薑葱豉汗之外許杏仁和膏加玄明粉硫黃敷之
○風熱面腫而痛升麻湯加犀角黃連白芷川芎薄荷荆芥
○風熱面腫痛或咽不利者犀角升麻湯○虛風證能食
麻膏牙關急搥目內眵助胃中有風故面獨腫升麻胃風湯

醫通卷之八

思得堂藏

面熱面寒○飲食不節則胃病胃病則氣短精神少而生大
熱有時火上行而獨燦其面鍼經云面熱者足陽明病調胃
承氣湯加犀角川連○脈數實有力精神茂澤升麻湯加川
連甚者涼膈散○欬逆倚息不得臥面熱如醉此爲胃熱上
衝熱其面桂苓五味甘草湯加大黃利之○左半邊面及耳
熱耳鳴覺從少腹左腸衝上者屬肝火實則當歸龍薈丸虛
則加減八味丸虛甚地黃飲子○面寒爲陽虛陰寒鬱遏所
致升麻湯加熟附子甚者附子理中湯○陽明經虛面熱而
赤者補中益氣加熟附子二三分○面赤爲邪氣怫鬱在經
宜表不宜下○面戴陽下虛也傷寒用四逆湯雜證用地黃
飲子○面白善噦脈緊者寒也羌活防風甘草藁朮四味湯
足太陽少加附子以通其脈悲恐者更加桂附○面目浮腫

醫通卷之八

思得堂藏

或紫黑或風刺癢癢消風散加減○面上風癢或如火丹或
枯子散不應加人參一錢數服即効○面部生瘡或鼻膿赤
風刺粉刺百藥不効及面上細瘡常出黃水者或宜硫黃膏
塗之○上焦風熱則面生小瘡通聖散脾胃虛或吐瀉後面
目浮腫者服必緩弱或氣口虛大六君子湯加減○面青肝
虛面白肺虛面黃脾虛兩頰紅陰虛○面如漆柴手足少陰
氣俱絕爲血先死若面黑而不至於枯者六味丸○面墜脫
色爲肝木失榮人參養營湯○面色忽黑乃因臭氣所衝而
成或頭痛或腹痛或嘔吐或腹脹一味香附末淡鹽湯下三
錢○面上豆痕或斑點壓蜜陀僧唾調搽之○面上赤斑癰
上雀斑白丁香鷹屎白蜜陀僧唾調搽之○面上赤斑癰
角灰豬脂調塗○指爪破面輕粉研細生薑汁調敷無癰痕
調之○

咽喉

經云。咽喉者。水穀之道也。喉嚨者。氣之所以上下者也。會厭者。音聲之戶也。懸雍者。音聲之關也。○咽與喉會厭與舌。此四者同在一門。而其用各異。喉以納氣。故喉氣通於天。咽以納食。故咽氣通於地。會厭管於其上。以司開闔。掩其厭則食下。不掩其喉。必錯以舌抵上腭。則會厭能閉其喉矣。四者交相為用。缺一則飲食廢而死矣。○凡經言喉痺者。謂喉中呼吸不通。言語不出。而天地閉塞也。云咽塞。云咽痛者。謂咽喉不能納唾與食。而地氣閉塞也。云喉痺咽咽痛者。謂咽喉俱病。天地之氣。竝閉塞也。○咽喉二數。同出一脫。異途施化。喉在前。主出。咽在後。主吞。喉系堅空。連接肺本。為氣息之路。主出而不納。咽系柔空。下接胃本。為飲食之路。主納而不出。當

醫通卷之八

咽喉

七十一 思得堂藏

食言語。則水穀乘氣。送入喉腭。遂噎而飲矣。經云。足少陰所生病者。口渴舌乾。咽腫上氣。咽乾及痛。其證內熱。口乾面赤。痰涎湧上。尺脉必數。而無力。蓋緣腎水虧損。相火無制。而然。須用六味丸。加麥冬五味。大劑作湯服之。又有色慾過度。元陽虧損。無根之火。遊行無制。客於咽喉者。須八味腎氣丸。大劑煎成。冰冷與飲。引火歸源。庶幾可救。○乳蛾。經喉。二種不同。腫於喉兩傍者。為雙蛾。腫於一邊者。為單蛾。治法。用鷺翎蘸米醋。搗喉中。去盡痰涎。後以鷺翎探吐之。令着實一咯。咯破喉中紫血。即愈。或玉樞丹磨服。盡甚不效者。上以小刀刺出紫血。即愈。古法有刺少商穴甚好。刀鍼刺血。急則用之。然但腫不痛者。切不宜用。蓋有形而無痛者。陽之類也。當緩補其陰。若刺之反傷陰血。必死。○繼喉風。證先兩日頭目眩暈。

胸膈緊塞。氣息短促。蕩然咽喉腫痛。手足厥冷。氣閉不通。飲食不下。痰毒壅盛。為繼喉風。其證最急。又有兩塊結於喉傍。甚則大如雞卵。氣塞不通。痰湧不止者。為鎖喉風。其證更劇。慎勿破。忌用土牛膝。選粗者兩許。勿經水。勿犯鐵。折斷搗汁。和米醋半盞。雞翅毛蘸攪喉中。如牙關緊閉者。蘸攪兩腮。自開。開後喉中頻攪。以通其氣。若喉兩傍有塊者。涎出自消。後以人中白煨過。入冰片少許吹喉中。日吹一次。不過三四日愈。或硼砂丹湧去頑痰。或荔枝草搗汁。和醋含漱。或天名精搗自然汁。鷺翎掃入去痰。或用馬鞭草搗汁灌漱。倘腫塞不得下者。灌鼻取吐。以奪其勢。然不若土牛膝汁最捷。若兩塊湊合。喉中痰鳴。懸壅上縮。不見氣塞不通。神丹不可救矣。用土牛膝醋攪後。以拇指捺其脊上七節兩傍。知疼痛者易

醫通卷之八

咽喉

七十一 思得堂藏

已。甚者以膝膝其當背。以手抄兩脇下。向上扳兩缺盆。令胸前凸起。則氣伸而得上泄。若出涎後。涕淚稠粘者。風熱也。無涕淚者。風寒也。胸中有結塊者。宿食也。隨證治之。此證雖係時毒邪氣。多有因跌蹠飲食停滯而起者。宜用荊防甘桔連翹牛旁薄荷黑參山查。內解其毒。蓋山查能消食散血。破結塊。中火。與消風散中厚朴同意。又有喉疼忽愈。毒攻胸膈。痛不可忍。氣促身熱。不能臥者。牛旁子貝母。醋炒升麻。黃藥子。乾浮萍。黑參生甘草。蜜丸嚥化。七日以後。毒深喘甚。手足指甲紫者。難治。吹藥用紫口蛤蚧七枚。撒攪枝七枚。文火煨過。研細入枯礬一錢。以大青魚膽一枚。置鐘內晒乾。再加膽汁三磨為度。加冰片吹之。然須戒茶百日。後無復發之虞。○一切喉痺腫痛。及重舌木舌等證。烏龍膏。急者惟鍼刺血。最為

上策○咽喉腫痛作渴飲冷大便秘結六脈俱實涼膈散下之○喉痺脈浮惡寒發熱多是暴寒折熱表邪勢盛非但寒涼藥食能凝閉毒邪即礪砂白礬白梅等酸收之品及膽礬點喉俱不可犯惟當輕揚開發其表以泄火毒急投患處并刺少商出血最為要訣○走馬喉風若有頭痛發熱先與一味香豉濃煎加葱涕探吐後用荊防牛旁甘桔連翹薄荷犀角之類如口不開者以牙皂末吹鼻取嚏方可下藥○鎖喉風證有用牙皂煎湯涌吐頑痰每至皮毛脫落大傷胃氣甚至激動其痰鎖住不能吐出頃刻立斃者其走馬喉痺有用巴豆綿裹塞鼻每至厥發其鼻不可不慎○乳驚用礪砂白梅應手拔効然性最辛烈雖假酸收終是以火濟火每令不時舉發人皆未省其故也○時氣咽腫普濟消毒飲去苓連

諸哽在喉當審何物以所勝能制者治之如鷓鴣橄欖治魚哽狗涎治骨哽鷓鴣涎治稻芒哽鴨涎治螺螄哽磁石治鐵哽水銀灰治金銀哽要在變通○諸物哽塞芋麻根杵爛丸如彈子大將所哽物煎湯吞下○吞釘鐵金銀銅錢等物用炸銀確中炭為末銀匠油槽內油調服即出并多食肥肉助其潤下○錢哽學養生嚼多食効或加淡茹汁不應用羊脰骨煨存性學醫汁調服自化○諸哽用雞白煮半熟以綿縛定手執線頭少嚼雞白嚥度雞至哽處便牽引哽即隨出又法用熟綿一小團如上法亦妙○誤吞魚釣以晶串嚥下拽之有線在外者以綿紙剪數百層穿綿上徐徐嚥下少頃引之上出

羅謙甫治征南元帥七旬至楚上因過飲腹痛腸鳴自利日夜約五十行咽噎腫痛耳前後腫舌本強涎唾稠粘欲吐不能以手拽之方出言語艱難反側悶亂夜不得臥其脈浮數按之沉和而弦先以砭刺腫上出紫黑血頃時腫勢稍減遂用桔梗甘草連翹鼠粘子酒黃芩升麻防風水煎令熱漱冷即吐出勿驚恐傷脾胃也再漱而涎清腫散語聲自出後以辛熱丸劑以治中寒化宿食而燥脾胃取丸之不即施行而不犯其上熱至其病所而後化乃治以緩也不數服利止痛定後胸中閉塞作傳而痛復以異功散加升麻溫養脾胃升順正氣而愈

張氏醫通卷之九

清

長洲石頌張

瑤路玉父

登徒少

男

俾飛聲

日本

大泉長菴前田安宅子仁

男

典子守

瘡瘍

癰疽

癰疽一科。自有專擅其術者。以是手醫。醫通獨畧此門。然有兼患內證。醫不能指指者。因取醫案金匱明之新甫等數條。列之木門。諸凡治例。未遑遍述。庶免瘡環同類之誦云。

醫通卷之九

癰疽

恩得堂藏

癰疽云。夫血脈管衛周流不休。上應星宿。下應經數。寒邪客於經絡之中。則血泣。血泣則不通。不通則衛氣歸之。不得復反。故癰腫。寒氣化為熱。熱勝則肉腐。肉腐則為膿。膿不瀉。則爛筋。筋爛則傷骨。骨傷則髓消。不當骨空。不得泄瀉。血枯空虛。則筋骨肌肉不相榮。經脈敗漏。無於五藏。藏傷則死矣。癰發於喉中。名曰猛疽。猛疽不治。化為膿。膿不瀉。塞咽。半日死。其化為膿者。寫則合家膏。冷食三日而已。發於頸。名曰天疽。其癰大以赤黑。不急治。則熱氣下入淵液。前傷任脈。內熏肝肺。十餘日而死矣。陽留大發。消腫留項。名曰腦癰。其色不黑。項痛如刺。以針刺心者死。發於肩及臑。名曰疵癰。其狀赤黑。急治之。此令人汗出至足。不害五藏。癰發四五日。逞熾之。發於腋。下赤堅者。名曰米疽。治之以砭石。欲細而長。疎殺之。澄

醫通卷之九

癰疽

恩得堂藏

以豕膏。六日。勿養之。其癰堅而不潰者。為馬刀抉癰。急治之。發於胸。名曰井疽。其狀如大豆。三四日起。不早治。下入腹。不治。七日死。發於背。名曰肝疽。色青。其狀如穀實。載常苦寒熱。急治之。去其寒熱。半燒死。死後出膿。發於脇。名曰敗疵。敗疵者。女子之病也。灸之。其狀大癰。膿治之。其中乃有生肉。大如赤小豆。剉薤葉草根各一升。各發連根。以水一斗六升。煮之。竭。為取三升。則強厚衣。坐於釜上。令汗出至足。已發於股。名曰股癰。其狀不甚發。而癰膿傳骨。不愈。治三十日死。發於尻。名曰銳疽。其狀赤堅大。急治之。不治。三十日死。發於股陰。名曰赤疽。不急治。六十日死。在兩股內。不治。十日死。當死。發於膝。名曰疵癰。其狀大癰。色不變。寒熱如堅石。勿石。石之者死。須其柔。乃石之者生。諸癰疽之發於節而相應者。不可治也。發於陽者。百日死。發於陰者。三十日死。發於脛。名曰兔齧。其狀赤至骨。急治之。不治。害人也。發於內踝。名曰走癰。其狀癰也。色不變。數石其輪。而止其寒熱。不死。發於足上。下。名曰四淫。其狀大癰。不急治。百日死。發於足傍者。名曰厲癰。其狀不大。初如小指。發急治之。去其黑者。不消。輒益。不治。百日死。發於足指。名曰脫癰。脫癰一名其狀赤黑。死不治。不赤黑。不死。不哀。急斬之。不則死矣。營氣稍留於經脈之中。則血泣而不行。不行則衛氣從之。而不通。壅遏而不得行。故熱大熱不止。熱勝則肉腐。肉腐則為膿。然不能陷。骨體不為焦枯。五藏不為傷。故命曰癰。熱氣深。其下陷肌膚。筋骨枯內連五藏。血氣竭。當其癰下筋骨良肉皆無餘。故命曰疽。疽者。上之皮天以堅。上如牛領之皮。踰者。

其皮上薄以澤。此其候也。病有形而不痛者。陽之類也。無形而痛者。陰之類也。無形而痛者。其陽完而陰傷之也。急治其陰。無致其陽。有形而不痛者。其陰完而陽傷之也。急治其陽。無致其陰。陰陽俱動。乍有形。乍無形。加以心煩。命曰陰勝其陽。此為不表不裏。其形不久。○身有五部。伏兔一。腓二。膝三。膕四。背三。五藏之俞四。項五。此五部有瘡疽者。死。○喜怒不測。飲食不節。陰氣不足。陽氣有餘。營氣不行。乃發為癰。陰陽不相通。兩熱相持。乃化為膿。○其白眼青。黑眼小。是一逆也。內癰而喘。是二逆也。腹痛渴甚。是三逆也。肩項中不便。是四逆也。音嘶色脫。是五逆也。除此五者為順矣。

醫通卷之九

癰疽

三

思得堂藏

而後腫者。氣傷形也。先腫而後痛者。形傷氣也。金匱云。諸浮數脈。應當發熱。而反洒淅惡寒。若有痛處。當食其癰。師曰。諸癰腫。欲知有膿無膿。以手掩腫上。熱者為有膿。不熱者為無膿。

發熱而脈見浮數。諸脈相應也。脈見浮數而反洒淅惡寒。是火鬱不得發越。若有痛處而飲食如常。必發癰腫之候。腫熱未甚。尤可消散。腫熱已劇。癰膿已成。後世用溼紙貼腫上。候其癰腫之頭。亦不出乎此意。

浸淫瘡。從口流向四支者。可治。從四支流來入口者。不可治。浸淫瘡。黃連粉土之方。缺。

病機微要云。癰癰者。結核是也。或在耳後。或在耳前。或在耳下。連及頤頰。或在頸下。連及鎖。皆謂癰癰。或在胸之側。或在

兩脇。皆謂之馬刀。手足少陽主之。此本膏粱丹毒火熱之變。因虛勞氣鬱所致。止宜補形氣。調經脈。其瘡當自消。蓋不待汗之下之而已也。其不詳脈證。經絡受病之異者。下之先犯病禁。經禁。故致失手。且有染痰兼氣。兼血。兼陰虛等證者。病本不同。治當求責。○瘡瘍者。火之屬。須分內外。以治其本。內之外者。其脈沉實。發熱煩躁。外無癰。赤痛深於內。其邪氣深矣。故疏通藏府以絕其源。外之內者。其脈數。癰腫在外。形證外顯。恐氣極而犯內。故先托裏也。內外之中者。外無癰。惡之氣。內亦藏府宜通。知其經。當和營衛也。用此三法之後。雖未愈。必無變證。亦可使邪氣峻減而易愈。

外科精要云。熱發於皮膚之間。浮腫根小。至大不過二三寸者。為癰。六府積熱。騰出於肌肉之間。其發暴盛。腫皮肉光軟。

醫通卷之九

癰疽

四

思得堂藏

根脚廣大為癰。五藏風毒積熱。攻煇肉骨。風毒猛暴。初生一如蓐。形自焦枯。觸之應者。乃疽也。夫五善七惡者。動息自寧。飲食知味。一善也。便利調勻。二善也。膿稠腫消不臭。三善也。神采精明。語聲清爽。四善也。體氣平和。五善也。煩躁時嗽。腹痛渴甚。或泄利無度。小便如淋。一惡也。膿血大泄。腫煇尤甚。膿色敗臭。滿不可近者。二惡也。喘急短氣。恍惚嗜臥。三惡也。目視不正。黑睛緊小。白睛青赤。腫子上視者。四惡也。肩背不便。四肢沉重。五惡也。飲食不下。服藥而嘔。食不知味。六惡也。聲嘶色敗。唇鼻青。而目四肢浮腫。七惡也。五善見三則瘡。七惡見四則危。然則病有源同。七惡者。乃皮緊急而知善也。病有源同。五善者。乃皮緩虛而知惡也。是豈凡醫所知哉。凡八初見發背。欲結未結。赤熱腫痛。先以溼紙覆其上。立視

候之。其紙先乾處。卽是結癰頭也。取大蒜切成片。如三錢厚。薄安於頭上。用大艾炷灸之。三壯卽換一蒜片。痛者灸至不痛。不痛者灸至痛。時方佳。最要早覺。早灸。爲上。一日二十灸。十日活。三日四日。六七活。五六日。三四活。過七日則不可灸矣。若有十數頭作一處生者。卽用大蒜研成膏。作薄餅鋪頭上。聚艾於蒜餅上燒之。亦能活也。若背上初發赤腫一片。中間有一片黃粟米頭子。便用獨蒜切去兩頭。取中間切三錢厚。正安瘡上。著艾灸十四壯。多至四十九壯。此謂癰疽初發。宜灸之也。然諸瘡患久成漏者。常有膿水不絕。其膿不臭。內無反肉。尤宜用附子浸透。切作大片。厚三分。於瘡著艾灸之。仍服內托之藥。隔二三日再灸之。不五七次。自然肌肉長滿矣。至有膿水惡物漸清根深者。郭氏用白麝硫黃大蒜三

也。宜調營衛。癰疽大痛。或麻木不痛。邪氣凝滯也。外用隔蒜灸。內服活命飲。或歸善飲。尤効。無問何部分。但赤腫者必消。若煩躁飲冷。亦痛發熱。二便不通者。火熱內熾也。用四味清涼飲。或活命飲加大黃尤善。若微腫微痛。或不痛。陽氣虛弱也。參耆內托散。微點微赤。或不赤。或惡寒而不作膿。或膿熟而不潰者。陽氣虛寒也。以用千金托裏散。如此則未成者自能消。已成者自能潰。尤當別其屬陰屬陽。或半陰半陽而治之。若泥於腫毒禁。用辛熱之說。不分受證之因。象證之經。藥行敗毒。泛援諸經。誅伐無過。以致不能起發。或不能潰腐收斂。變證莫能枚舉。癰疽論云。腫瘍內外皆壅。宜以托裏散散爲主。但見腫痛。各之脈證虛弱。便與兼補。氣血無虧。可保終吉。若腫瘍之際。治失其法。必致潰瘍之變證。此推內經之微旨。而生乎之微驗者。尤當觸類而長。愚矣庸贊。

潰瘍。潰瘍者。以瘡瘍膿潰而言也。膿潰而腫消痛止者爲順。若膿潰腫痛。或發寒熱者。氣血虛也。十全大補湯。膿潰欲少食。脾胃虛弱也。六君子加炮薑。手足並冷者。脾氣虛寒也。六君子加薑桂。不應急加附子。膿潰而仍痛。或二便秘澀者。熱毒未解也。清熱消毒湯。熱退而渴。不退津液不足也。八珍加黃耆。參多山茱萸。熱止而小便頻數。腎虛也。加減八味丸。料若熱不止。或腫痛反甚。虛熱內作也。保元湯加清心涼血之劑。或熱退而肌肉不生者。氣血俱虛也。十全大補湯。瘡色天白。或陷下不斂。寒氣所襲也。五味異功散。佐以豆豉餅。膿血過多。煩躁不安。乃亡陽也。急用獨參湯尤當。審其腫之頑硬。飲食冷熱。與膿之稠稀多少。肉之赤色青黯。及瘡口之

收斂遲速而投托裏消毒調補之劑庶無變證。癰疽論云潰瘍內外皆虛宜以托裏補接為主蓋潰瘍之變證由於膿瘍之勝治失其宜。願損元氣所致治者可不慎歟。

作痛不止。○瘡瘍作痛。當審邪之所在。證之所因。如寒熱而痛邪在表也。人參敗毒散。便毒而痛邪在裏也。清熱消毒湯。加白蜜。腫脹而痛。血凝滯也。活命飲。作脹而痛者。托裏消毒散。排膿膜而痛者。鍼之。膿潰而痛者。補之。氣虛而痛。四君子加歸者。血虛而痛。四物湯加參者。大抵形傷痛。氣傷腫。不知此數者。徒以乳香沒藥為止痛之方。則非所以為法矣。仍審五藏相勝相兼之證而治之。後倣此。

作嘔不止。○丹溪云。腫瘍時嘔。當作毒氣攻心治之。潰瘍時嘔。當作陰虛補之。此論其常耳。如腫赤嫩痛而嘔者。熱毒甚。當通之九。

也。活命飲。作脹而嘔者。血氣虛也。六君子加歸者。便毒而嘔者。熱在裏也。清熱消毒湯。去生地金銀花。加檳榔木香寒藥服多而嘔者。胃氣傷也。六君子加枳殼柴胡。有肝氣乘脾而嘔者。有胃虛停痰而嘔者。有鬱結傷脾而嘔者。皆由脾胃虛弱。毒氣蓄聚。治宜調補中氣。則正氣復而邪氣去矣。出血不止。○瘡口出血。有因五藏相勝。陰陽不調。而血不止者。有因六淫七情之氣不平。而血妄行者。若因肝火內動。四物如山梔丹皮。肝經血虛。六味丸。心虛不能統血。四物加參朮丹皮酸棗仁。脾虛不能統血。四君子加山梔丹皮。脾虛鬱滯。歸脾湯。脾肺氣虛。補中益氣湯。氣血俱虛。十全大補湯。腎氣不足而肝火內動。六味丸。梔子清肝散。加五味。大凡失血過多。而見煩熱發渴等證。勿論其脈。不問其證。急用獨參湯。

以補其氣。經云。血生於氣。若非參耆歸朮甘溫之藥。決不能愈。若發熱脹大者。多不冷。

肌肉不生。○肌肉乃脾胃所生。收斂皆氣血所主。二者相濟以成者也。若肌肉不生而色赤。血熱也。四物如山梔丹皮。瞋熱內熱。血虛也。四君子加歸地丹皮。膿木消種。氣血虛也。十全大補湯。食少體倦。脾氣虛也。補中益氣湯。煩熱作渴。起居如常者。胃熱也。竹葉黃耆湯。煩熱作渴。小便頻數者。腎虛也。六味丸。肉腐而不潰者。烏金膏。若肉潰而不斂者。六君子湯。外用珍珠散敷之。臭穢膿膜洪大而作渴。乃真氣虛而邪氣實也。此為難治。大凡瘡瘍久而不愈者。皆元氣不足。或因邪氣凝滯於患處。苟能調補脾胃。則元氣自足。元氣既足。則邪氣自消。死肉自潰。新肉自生。而瘡自斂矣。若不保其本。而槩敷

生肌之劑。是反助其邪。後更潰爛耳。發熱不止。○瘡瘍發熱。初患乃毒氣所聚。已成乃內嫩作膿。已潰乃血氣虧損。不可誤行攻毒。以傷元氣。蓋未成者。當分邪之在表在裏。將成者。當分邪之可攻可補。已成者。當分膿之作與未作。膿已成者。當分膿之淺深高漫。膿已潰者。當分痛之止與不止。若作痛而發熱者。活命飲。作脹而發熱者。托裏消毒散。膿出而發熱者。八珍加黃耆。午前發熱者。陽氣虛也。補中益氣湯。發熱作渴。小便頻數者。腎氣虛弱也。加減八味丸。膿血多而熱者。陽無所附也。十全大補湯。日將竭而熱者。氣血虛也。八珍湯。若無脈而熱者。內補黃耆湯。煩躁者。血脫也。當歸補血湯。自汗而熱者。胃氣虛也。四君子湯。惡寒發熱者。肺氣虛也。補中益氣湯。或四君子加黃耆。當歸。亦有五

痛相勝。來食來寒。六淫七情所致者。不能備述。願詳之。
大便不通。瘡瘍大便不通。初起則審所致之因。所見之證。
而行內疏外表之法。已潰則分氣血虛實傳變之證。而用托
裏滋補之法。不可泛用苦寒疎導之劑。恐復傷真氣。則腫者
不能消散成膿。潰者不能生肌收斂。故丹溪云。腫瘍內外皆
壅。宜托裏表散為主。潰瘍內外皆虛。宜托裏補接為主。治者
審之。

小便不通。瘡瘍小便不通。其因不一。當分經絡虛實而藥
之。若潰而惡寒發熱。氣血虛也。八珍湯。手足並冷。陽氣虛寒
也。四君子加炮薑升麻。手足不冷。乃脾氣虛弱也。四君子加
升柴半夏。寒熱往來。氣血虛也。十全大補湯。大便了而不了。
脾氣虛而下陷也。補中益氣湯。切不可輕用疎導之劑。復傷

醫通卷之九

大便不通 小便不通 九 思得堂裁

元氣。致腫者不能復起發腐潰。潰者不能生肌收斂。須認證
制宜而治。庶無誤矣。

作渴不止。瘡瘍作渴。當分經絡所屬。及血氣虛實而治。若
嫩痛發熱便利調和者。邪在表也。清熱消毒湯。腫痛發熱大
便秘滯者。邪在裏也。涼膈散。嫩痛熾盛。邪在經絡也。活命飲。
右關脈洪數有力。胃火消燥津液也。竹葉石膏湯。右關脈數
無力。胃虛津液短少也。補中益氣湯。飲食失度。胃氣內傷而
止津液者。參苓白朮散。膿血出多。而氣血虛弱者。八珍湯加
五味。裏腎不足。而津液短少者。加減八味丸。餘當臨證制宜。
自汗不止。瘡瘍潰後多汗。衛虛元氣外泄。大非所宜。其裏
質肥盛者。淫熱外泄。猶無大患。若形槁色枯。胸中多氣。血液
衰少者。乃火熱亢極。為害彌甚。故治肥盛之人。潰瘍多汗。則

宜托裏消毒散加減。氣虛形盛者。則宜六君子為主。酒客則
加藿香澤瀉之屬。形瘦之人。潰瘍多汗。則宜保元湯加歸芍
或生料六味加桑仁。救其津液。庶免火氣內燔。咽燥噎塞。煩
燥喘嗽之患。大抵潰瘍多汗。一切苦寒傷胃。厥滑寒食。辛熱
耗氣之藥。皆當切禁。

下痢不止。瘡疽潰久。瘡口不收。膿水清稀。而見泄利。驚涕。
皆為脾氣衰弱之候。理中補中。四柱六柱。二神四神。並可選
用。如下痢白沫。此脾氣下陷。補中益氣。加薑桂吳萸木香之
類。若見膿血下痢。須詳血色之鮮晦。鮮者則宜連理湯之薑
連並進。以和其中。晦者則宜理中湯稍加桂附以溫其下。赤
白兼下如瑪瑙色者。亦宜上法。倘數服不應。又當補中益氣
加辛溫之品。兼升舉其陽。若下利清血。則加茜根烏鰂骨烏

醫通卷之九

下利不止 十 思得堂裁

梅白芍。苟非夏秋淫熱下注。則黃連厚朴枳殼檳榔澤瀉等
藥皆為戕賊也。

數寒涼藥。瘡瘍數藥。當分陰陽虛實而用內治之法。不可
舉數寒涼之藥。若腫痛熱渴。脈滑數有力。其證純陽。宜內服
解毒之劑。外敷寒涼之藥。則熱毒自消。痰滯自散。若似腫非
腫。似痛非痛。似赤非赤。似潰非潰。脈洪數無力者。證屬半陰
半陽。宜內服助胃托裏兼行解毒。外敷寒涼藥中兼辛熱藥
一分。則營逆自從。血鬱自散。若微腫微痛。色黯堅硬。肉色如
故。久而不潰。脈按之沉細。舉指虛浮者。其證屬陰。宜內服回
陽之劑。外敷辛熱之藥。則陰毒自解。陽氣自復。凡陽氣虛寒
不能消散腐潰。或潰而腫不消。口不斂者。必內服溫補藥。外
用生附子。參。瘡口。則及肉自去。新肉方生。若陰寒之證。而用

寒涼之藥。則腠理閉塞。氣血凝滯。毒氣益深。良肉反死。瘡口不斂。惡證蜂起。不可復救矣。蓋治病必求其本。假如腫痛熱渴。大便秘結者。邪在內也。疏利之。腫癰作痛。寒熱頭疼者。邪在表也。發散之。癰腫痛甚者。邪在經絡也。和解之。漫腫微痛而不潰者。血氣虛弱也。惡補托之。色黯微痛而不潰。或潰而不斂者。陽氣虛寒也。溫補之。如是則五臟自和。六腑自調。氣血自生。瘡毒自解矣。

用刀鍼法。○瘡瘍用鍼。當審經絡表裏之虛實。部分肌肉之厚薄而施之。夫腫高而軟者。發於血脈也。腫硬而堅者。發於肌肉也。肉色不變者。發於骨也。瘡未成者。解散以消其毒。已成者。托裏以速其膿。膿已成者。當膿其生熟淺深而後鍼之。以指輕按便痛者。膿淺也。重按方痛者。膿深也。按之不起者。

醫通卷之九

用刀鍼法

上

思得堂藏

膿未成也。按之即痛者。膿已成也。若膿初生而即鍼。則腐潰益深而不能收斂。若瘡深而鍼淺。則內潰不出。外血反傷。若瘡淺而鍼深。則其膿雖出。良肉亦傷。蓋瘡之證。氣血已傷。肌肉已壞。當隨決其毒。不可拘泥人神部分。其膿一出。諸證自退。若膿出反痛。或煩躁嘔逆者。皆胃氣虧損。急宜托裏調補。凡膿已成者。急刺去。以紙蘸熱油。塗瘡內。以膏藥貼之。如瘡反覆未痊。多是厚味七情火動而然。當審所因而調治。亦有膿清不斂。乃胃氣虛弱之故。又當兼飲食調補之。若小兒患瘡。腫中加漏蘆。令母服之。乳中藥過。兒瘡自愈。陳執仁曰。腫瘍初起。頂高拔活。色赤發熱。癰腫疼痛。日漸高腫者。順。已成癰腫。皮薄光亮。飲食如常。二便調勻。身溫和者。順。已潰膿稠。色鮮不臭。腐肉自脫。癰腫易消。身輕者。順。潰後

膿厚稠黃。新肉易生。瘡口易斂。飲食漸進者。順。初起頂平。膿散。色黯漫腫。不熱不痒。身體倦怠者。逆。已成腫堅。色紫不作。膿不腐潰。口乾多煩躁者。逆。已潰皮爛肉堅。不腐腫。仍不消。痛仍不減。心煩者。逆。潰後膿水清稀。腐肉雖脫。新肉不生。瘡口如凍。色敗臭穢者。死。○治法初起。毋論陰陽表裏。知痛不知痛。起發不起發。但未成膿者。俱宜灸之。既灸不知痛者。明灸之。癰亦發熱疼痛。有時脈來浮數。無便秘者。宜藥托之。身體拘急。脈緊惡寒。飲食就暖者。邪在表也。宜汗之。腫硬痛。口乾便秘。身熱脈實者。邪在裏也。宜下之。癰勢甚。煩躁飲冷。古乾口燥者。火在上也。宜清之。腫痛堅硬。背如負石。惡心乾嘔。邪毒在內。宜解拔之。腫痛日深。內膿不出。瘡肉壅塞。瘡口者。急開導之。輕漫不作。膿不腐潰。及潰後瘡口散大。不生

醫通卷之九

瘡疽

思得堂藏

肌肉者。陽氣虛也。壯脾助胃。以溫補之。身涼自汗。手足並冷。六脈虛細。便泄腸脫者。急溫之。遲則不救。○西航曰。凡癰腫須觀氣血調治。惟癰瘡結毒。非專力不應。但癰病人身。上有塊。不時掣痛者。即為癰毒無疑。當與三白丹疎滲之。元氣虛寒者。加味三白丹最妙。虛甚不勝三白丹者。五寶丹亦能療之。腫處用精豬肉貼之。若更發熱頭疼。或手足顫振。筋脈縮急者。此復感風寒。癰發經中變毒也。先與萬應丹三服。汗之。次用調和血氣之劑。俟胃氣稍復。然後用三白五寶治之。有用三白丹後。餘毒未盡者。此胃虛不能行其藥力也。仍與調和氣血之劑。俟能飲食起居。更與五寶丹。無不愈者。此因銀粉切劑。致成結毒。非仍用水銀。不能拔去病根也。用藥豬肉貼者。豬為水獸。取其通達腎氣而無癰痕之患。

診○身重脉緩為濕勝。身熱脉大。心躁時熱。乍來乍去。當逐熱。諸痛眩暈動搖。脉弦宜去風。氣滯氣滯。乾燥亡津液。脉瀼瀼。須調氣補血。寒勝則浮。食不得入。便溺多。惡寒。脉緊細。應於水中補火。凡癰疽初起。脉浮數者易治。洪大急疾者難治。弦緊沉細者危。膿成脉洪滑者易治。虛大瀼瀼者難治。弦小沉瀼者不治。已潰膿水未盡。脈緩滑者易治。數盛弦。鞭者難治。瀼數不調。及虛大者危。膿盡後。脉小弱緩滑者易治。遲瀼虛細者難治。反洪盛或弦急者不治。潰久不愈。有反肉乾膿。脈緩滑流利者易治。弦細小弱者難治。反數盛急疾。或虛大瀼者不治。

雜門

汗

經云。陽氣有餘。為身熱無汗。陰氣有餘。為多汗身寒。○飲食飽甚。汗出於胃。驚而奪精。汗出於心。持重遠行。汗出於腎。疾走恐懼。汗出於肝。搖體勞苦。汗出於脾。○腎病者。寢汗出。憎風。○津脫者。汗大泄。○汗出偏沮。使人偏枯。○飲酒中風。則為漏風。入房汗出中風。則為內風。景岳全書曰。汗出一證。有自汗者。有盜汗者。自汗者。藏藏然無時而動作則益甚。盜汗者。寐中通身汗出。覺來漸收。諸古法云。自汗者。屬陽虛。腠理不固。衛氣之所司也。人以衛氣固其表。衛氣不固。則表虛自汗。而津液為之發泄也。治宜實表。神陽。盜汗者。屬陰虛。陰虛者。陽必湊之。故陽蒸陰分。則血熱。

血熱則液泄而為盜汗也。治宜清火補陰。此其大法。然自汗亦有陰虛。盜汗亦多陽虛者。如遇煩勞大熱之類。最多自汗。如飲食之火起於胃。勞倦之火起於脾。酒色之火起於腎。皆能令人自汗。若此者。非陽盛陰衰而何。又若人之寢寐。總由衛氣之出入。衛氣者。陽氣也。人於寐時。則衛氣入於陰分。此其時非陽虛於表而何。然則陰陽有異。何以辨之。曰。但察其有火無火。則或陰或陽。自可見矣。蓋火盛而汗出者。以火燥陰。陰虛可知也。無火而汗出者。以表氣不固。陽虛可知也。知斯二者。則汗出之要。無餘義矣。○汗由血液。本乎陰也。經曰。陽之汗。以天地之謂之。其義可知。然汗發於陰。而出於陽。此其根本。則由陰中之營氣。而其啟閉。則由陽中之衛氣。故凡欲疎汗。而不知營衛之盛衰。欲禁汗。而不知素衛之牝牡。

吾知其不敗不已也。○汗證有陰陽。陽汗者。熱汗也。陰汗者。冷汗也。人但知熱能致汗。而不知寒亦致汗。所謂寒者。非曰外寒。正以陽氣內虛。則寒生於中。而陰中無陽。陰中無陽。則陰無所主。而汗隨氣泄。故凡大驚大恐大懼。皆能令人汗出。是皆陽氣傾瀉。真元失守之兆。至其甚者。則知病後產後。或大吐大瀉失血之後。必多有汗出者。是豈非氣去而然乎。故經曰。陰勝則身寒。汗出身常清。數極而寒。寒則厥。厥則腹滿。死。仲景曰。極寒反汗出。身必冷如冰。是皆陰汗之謂也。故凡治陰汗者。但當察氣虛之微甚。微虛者。畧扶正氣。其汗自收。甚虛者。非甘薑桂附速救。元氣不可。

自汗雖由衛氣不固。胃中之津液外泄。而實關乎藏府蒸發。使然。心之陽不能衛外而為固。則自汗出。包絡之火鬱發也。

醫通卷之九

汗

五

思得堂藏

腎之陰不能退藏於密。則盜汗出。陰火乘虛蒸發也。肺氣衰則表不能衛而自汗出。必喘乏少氣。胃虛水穀氣脫散者。汗自出。必氣虛少食。○陰虛者。陽必洩。故發熱自汗。當歸六黃湯。陽虛者。陰必乘。故發熱自汗。黃耆建中湯。甚者少加附子。營血不足。自汗。黃耆建中加當歸。甚者加熟地。衛外之陽不固而自汗。著附湯。脾中之陽衰微而自汗。木附湯。腎中之陽浮遊而自汗。參附湯。○身冷自汗。陰虛欲坐泥水中。脈浮而數。按之如無。經云。脈至而從。按之不鼓。諸陽皆然。此陰盛格陽。真武湯冷服。○肺氣虛者。固其皮毛。玉屏風散。○脾虛者。壯其中氣。補中益氣湯。○心虛者。益其血脉。當歸補血湯。○肝虛者。理其疎泄。逍遙散。○腎虛者。助其封藏。都氣丸。○火氣炎上。胃中之溼亦能作汗。可用涼膈散。○脾胃不和。外挾

風溼。身重汗出。羌活勝濕湯。○風溼相搏。時自汗出。防己黃耆湯。○惡風自汗。桂枝湯。○又有漏風。一名酒風。不論冬夏。額上常有汗出。此醉後當風所致。經曰。有病身熱懶惰。汗出如浴。惡風少氣。病名酒風。治之以澤瀉朮各十分。麴蘗五分。合以三指搗為飯。又曰。飲酒中風。則為漏風。漏風之狀。多汗。常不可以單衣。食則汗出。甚則身汗喘急。惡風。夜常濡口乾善渴。不能勞事。先宜五苓散。熱服取汗。後與黃耆建中。加白朮澤瀉。○汗出日久。用參耆朮附等藥。不効。汗乾仍熱。此風邪伏於經絡。曾與參蘇飲。病已止。服此反治也。○汗出不止。名曰亡陽。以附子理中加黃耆。外用溫粉撲之。○痰證汗自出。痰消汗自止。二陳加桂枝枳椇香附貝母。○多汗惡風。食則汗出如油。久不治。必成消渴。玉屏風散。少加煨牡蠣。

醫通卷之九

汗

六

思得堂藏

○病餘氣血俱虛而汗。服諸止汗藥不應。用十全大補湯半劑。加熟棗仁五錢。若胸膈煩悶。不能勝陰藥者。生脈散加黃耆二錢。當歸六分。熟棗仁三錢。一服即驗。○別處無汗。獨心胸一片有汗。此思傷心也。其病在心。名曰心汗。歸脾湯倍黃耆。或生脈散加當歸棗仁。痞心湯煎服。○汗出不治證。○汗出而喘甚者不治。○汗出而脈脫者不治。○汗出而身痛甚者不治。○汗出髮潤至額者不治。○汗出如油者不治。○汗出如珠者不治。○汗出如膠。膠粘如珠之類。及淋漓如雨。揩拭不逮者。皆不可治。○盜汗。○金匱云。男子半人脈虛弱。微細者。善盜汗出。蓋平人脈虛弱微細。是衛虛不能鼓其脈氣於外。所以不能約束津液。當衛氣行陰。目眠之時。血氣無以固其表。腠理開則汗醒。

則行陽之氣復散於表。則汗止矣。名曰盜汗。亦名寢汗。此屬木虛。與傷寒邪在半表不同。先與當歸補血湯加炒棗仁半兩。散服後與都燕丸調補之。酒客睡中多汗。此淫熱外蒸也。二妙散加白朮防風牡蠣。○血熱盜汗。當歸六黃湯為專藥。虛人多加參耆。減芩連。身熱加地骨皮。肝虛加棗仁。肝實加龍膽草。煩心加竹葉。辰砂麥冬。脾虛去芩連加白朮芍藥。○傷寒陽明少陽證盜汗。柴胡葛根證主。治溫熱三陽合病。目合則汗。白虎湯。

頭汗。○頭為諸陽之會。額上多汗。而他處無者。淫熱上蒸使然。或畜血結於胃口。迫其津液上逆所致。○畜血頭汗出。劑額而還。犀角地黃湯。○頭汗小便不利而渴不能飲。此瘀畜胸臍也。桃核承氣湯。○胃熱上蒸額汗發黃。小水不利者。五

醫通卷之九

頭汗

陰汗

名曰思得堂藏

苓散加茵陳。甚則茵陳蒿湯微利之。○傷寒脇痛耳聾寒熱口苦。頭上汗出。劑額而還。屬少陽。小柴胡加桂枝芍朮和之。凡頭汗。服和營衛逐淫邪。發熱散鬱。或發寒熱。下體得汗者。為營衛氣通。日漸向愈之機也。○食滯中宮。熱氣上炎。亦令頭汗。生料保和丸。倍用薑汁炒川連。○病後產後。悉屬陽虛。誤治必死。傷淫額上汗出。下之微喘者死。下後小便不利者亦死。傷寒陰毒等證額汗。見緒論。

手足汗。○脾胃淫蒸。傷達於四肢。則手足多汗。熱者二陳湯加川連白芍。冷者理中湯加烏梅。弱者十全大補去芍加五味子。

陰汗。○陰間有汗。屬下焦淫熱。龍膽瀉肝湯加風藥一二味。風能勝溼也。或當歸龍薈丸。及二妙散俱効。陰囊溼者。以鹽

甘石煨過撲之。蜜陀僧末亦佳。

半身汗出。○夏月止半身出汗。皆氣血不充。內挾寒飲所致。偏枯及天之兆也。大劑十全大補。人參湯。大建中湯。加行經絡藥治之。若元氣稍充。即間用小續命湯一劑。以開發其表。或防己黃耆湯加川烏。以散其淫。此證雖屬血虛。不可用四物陰藥。以其閉滯經絡故也。

石頑曰。汗之源不一。有因於衛氣疎者。有因於營氣熱者。有因於營衛不和者。蓋風邪于衛。則腠理疎。營氣乘虛而外泄。則自汗。治當散邪為急。宜從仲景桂枝湯小建中湯。遲則營氣外亡。邪氣內入。必變府實潮熱矣。又宜三承氣湯選用。此皆外感自汗也。若鬱熱內蒸。亦必從空竅發泄。或從腸胃下奔。或從皮毛外達。則鬱熱得散。然外泄輕於下奔。蒸熱勝

醫通卷之九

半身汗出

名曰思得堂藏

於乾熱。以此驗營衛之枯與不枯也。當從內傷虛損例治之。至於邪正交加。非汗不解。故少陽挾熱。或為盜汗。或腋汗。脇汗。須知從陰陽交互時。及陰陽交互處發泄者。皆陰陽不和。半表半裏證。小柴胡通達散。皆合劑也。及手挾風邪痰淫之類。亦多有之。至如頭汗。或為淫熱上攻。或為於血內結。亦屬陰陽不和。其於陰汗。股汗。又為肝家淫熱下滲之徵。豈可一槩施治乎。

診。○汗家腠理疎豁。其脈必緩。兼浮則為風。兼滑則為痰。兼大則為熱。兼弱為衛虛。兼孔為失血。兼遲為氣虛。兼細為陰虛。經云。肺脈收而散者。當病泄汗。肺脈緩甚為多汗。尺瀉脈滑。謂之多汗。病風人脈緊數。浮沈有力。汗出不止。呼吸有聲者死。不然則主病氣。

東垣治一人二月陰雨寒溼。又因勞役所傷。病解之後。汗出不止。沾濡數日。惡寒重添。厚衣心胸間時煩熱。頭目昏憤。上壅食少。此乃胃中陰火熾盛。與外天雨之濕氣相合。而汗出不休。遂用羌活勝濕湯。以風藥去其濕。甘寒瀉其熱。一服而愈。

滑伯仁治一婦。暑月自汗。口乾煩躁。欲坐水中。脈浮而數。按之豁然虛散。得之食生冷乘涼所致。以真武湯一進。汗止。再進歸退三進全安。

飛時治陳子厚婦。八月間因產不順。去血過多。產後惡露稀少。服益母草湯不行。身熱汗出。產科用發散行血更劇。自用焦糟酒一碗。遂周身絡脈垂楚。難堪。惡露大下。昏沉戴眼。汗出如浴。但言心痛不可名狀。此血去過多。心失其

醫通卷之九

汗後

九

思得堂藏

養故肅肝主筋。為藏血之地。肝失其榮。故絡脈筆楚不堪。且汗為產後之大禁。若非急用人參。恐難保其朝夕也。用四君合保元。加白芍五味。一劑汗止。因其語言如祟。疑為瘀血未盡。更欲通利。予曰。離怯無神。此屬鄭聲。且腹不疼痛。瘀何從有。此神氣散亂不收之故。前方加入棗仁龍齒。諸證漸平。後服獨參湯。至滿月而安。

不得卧 多卧 怠惰嗜卧

靈樞云。衛氣不得入於陰。常留於陽。留於陽則陽氣滿。陽氣滿則陽盛。盛不得入於陰。則陰氣虛。故目不瞑。衛氣行於陽則其常也。失其常則不得寐。壯者之氣血盛。其肌肉滑。氣道通。營衛之行不失其常。故晝精而夜眠。老者之氣血衰。其肌肉枯。氣道滯。五臟之氣相搏。其營氣衰少。而衛氣內伐。故晝不精。夜不眠。素問云。陰虛故目不瞑。補其不足。瀉其有餘。調其虛實。以通其道。而去其邪。飲以半夏湯一劑。陰陽已通。其卧立至。病新發者。覆杯則卧。汗出則已矣。久者三飲而已也。

○胃不和則卧不安也。卧則喘者是水氣之客也。

不寐有二。有病後虛弱。有年高入血衰不寐。有痰在膽經。神不歸舍。亦令人不寐。虛者六君子加棗仁。痰者靈樞半夏湯。

醫通卷之九

不得卧

九

思得堂藏

○虛勞煩熱不得眠。酸棗湯。或酸棗仁一兩炒研。水煎絞取汁。下米二合煮。以生地五錢搗汁入。更煮過。時服之。○大病後虛煩不得眠。竹葉石膏湯。○水停心下不得眠。茯苓甘草湯。○婦人肥盛多鬱不得眠者。吐之從鬱結痰火治。大抵膽氣宜靜。濁氣痰火擾之則不眠。溫膽湯用猪膽汁炒半夏。加柴胡三錢。炒棗仁一錢五分。立効。蓋驚悸健忘失志。心風不寐。皆是痰涎沃心。以致心氣不足。若涼心太過。則心火愈微。痰涎愈盛。惟以理痰順氣為第一義。導痰湯加石菖蒲。○有寐中覺現。魂飛驚悸。通夕不得安眠。是肝虛受邪也。其人易怒。魂不歸肝。是以飛揚。獨活湯珍珠母丸。次第服之。○喘不得卧。以喘法治之。蘇子橘紅甘草桔梗竹茹。○厥不得卧。以脾氣法治之。牛膝丹皮木通沉香觀桂。○虛勞欬

嗽形脫不得卧。不可治。○煩不得卧。諸藥不効者。施于鼓湯下。硃砂安神丸。不應用。益元散加牛黃。更不應。虛火因事也。神中益氣湯下。硃砂安神丸。間進六味丸。恆服方効。有病久餘熱不止。久不得卧者。六味丸滋其真陰。自然熱止安卧矣。○脉數滑有力不眠者。中有宿滯痰火。此爲胃不和則卧不安也。心下硬悶。屬宿滯。半夏白朮茯苓川連枳實。○病後及汗下後。與痰滯不得眠。屬虛。人參茯苓炒棗仁。陳皮麥冬。圓眼肉爲主。有火脉數口乾。加知母川連。竹茹。心煩用炒黑山梔。

石頑曰。平人不得卧。多起於勞心思慮。喜怒驚恐。是以舉世用補心安神藥。鮮克有効。易知五志不伸。往往生痰聚飲。飲聚於膽。則膽寒肝熱。故魂不歸肝而不得卧。是以內經用半

夏湯滌其痰飲。則陰陽自通。其卧立至。一少年因惡慮。月

不得卧

思得堂藏

不卧。服安神補心藥無算。余與溫膽湯。倍半夏。柴胡。一劑頓卧。兩晝夜。竟爾霍然。復有一人。遺精煩擾不得卧。與六味丸料加棗仁。數服而安。寢如常。更有一人。癰瘍久不收斂。而不得卧。瘍醫不能療。令用大劑十全大補而安。大抵因病不得卧。當詳所因。亦不專主膽病也。

多卧。○經云。卒然多卧者。邪氣客於上焦。上焦閉而不通。已食若飲湯。衛氣久留於陰而不行。故卒然多卧焉。○膽虛不眠。寒也。酸棗仁一兩炒爲末。醇酒調服。膽實多卧。熱也。酸棗仁一兩生爲末。茶清調服。

略卧。○東垣云。脉緩怠惰。四肢不收。或大便泄瀉。此淫勝從胃苓湯。○食入則困倦。精神昏胃而欲睡者。脾虛也。六君子

加麴藥山查。○時值秋燥。怠惰嗜卧。兼見肺病。澀浙惡寒。不皆食者。此陽氣不伸也。升陽益胃湯。

醫通卷之九

多卧 嗜卧

思得堂藏

不能食 飢不能食

經云人之善饑而不嗜食者精氣耗於脾熱氣留於胃胃熱則消穀故善饑胃氣逆上則胃脘寒故不嗜食也

東垣云太陰所謂惡聞食臭胃無氣故惡食臭也胃中元氣盛則能食而不傷過時而不傷脾胃俱旺則能食而肥脾胃俱虛則不能食而瘦故不能食皆作虛論若傷食惡食自有本門不在此例○病人脈緩怠惰四肢重者或大便泄瀉不食此溼勝也胃苓湯○病人脈弦氣弱自汗四肢發熱或大便泄瀉不食皮毛枯槁髮脫黃者建中湯加減○病人脈滑氣口盛於人迎或滯滯不調其人痞滿嘔逆不食此有宿食保和丸枳朮丸消導之○病人脈虛氣弱脾胃不和或兼惡心不食六君子枳實理中選用有痰用導痰湯○虛而有痰

醫通卷之九

不能食 飢不能食

思得堂藏

用人參四兩半夏一兩薑汁浸一宿曬乾為末麴糊丸食後生薑湯下

許學士云有人全不進食服補脾藥皆不効投以二神丸服之頓能進食五更腎瀉尤宜此病不可全作脾氣治蓋腎氣怯弱真元衰削是以不能消化飲食譬之釜底無薪水穀不能腐化也

惡食○惡食有虛實之分實則心下悶痛惡心口苦二陳加黃連枳朮虛則倦怠色萎黃心下軟舉功散加砂仁木香有痰惡心六君子加香砂

饑不能食○此證有二一屬胃中虛熱六君子加薑汁炒川連一屬陰火乘胃六味丸加赤桂五味○又熱病後餘熱未盡脈虛洪不實者人參白虎湯

石頑曰胃主出納脾司運化故不食皆為中土受病然胃之土體陽而用陰脾之土體陰而用陽胃實則痞脹胃虛則飲食不甘胃熱則饑不能食胃寒則脹滿不食胃津不布則口淡無味胃中火盛則消渴易饑有痰則惡心嘔逆脾虛則食後反飽脾津不藏則口甘畏食脾挾肝熱則吞酸吐酸此皆中土受病也至於腎藏陽虛不能腐熟水穀又當歸重於命門火為土母故也

喻嘉言治一人病後胃中隱隱作痛有時得食則已有時得食轉加大便甚難小便不暢蓋因脾中津液為邪火所燥津液未充火勢內蘊易於上燎所以得食以壓其火則安若食飲稍過則氣不能轉運其食而痛亦增是火不除則氣不復氣不復則胃中清濁混亂不肯下行而痛終不

醫通卷之九

不能食按

思得堂藏

免也於是為訂降火生津下氣止痛方為常用之藥務先收攝腎氣不使外出然後濁氣之源清而膀胱得吸引上中二焦之氣以下行矣

石頑治孝廉徐侯齋尊聞不得寐不能食心神恍惚四肢微寒手心熱汗至晚則喉間熱結有痰兩耳時如充塞服安神清火藥罔効遂石頑診之六脈索索如蛛蜘蛛絲而微顯弦數之象此中氣久鬱不舒虛火上炎之候也蓋侯齋素居關上自鼎革三十年來肅定杜門館粥不繼乃悶克相夫志力竭神勞所致本當用歸脾湯以補心脾之虛奈素有虛痰痰火不勝醫治之端木香之燥遂以五寶異功畧加歸芍肉桂以和其陰導其火不數服而食進寐寧諸證釋然矣

不能語

人有一生不能言者。此肺痰窒塞。腎氣不能上通於咽。如管
鑰之閉。閉其痰。不能通呼吸之氣也。若因病而不能語者。惟
中風傷寒。暴病有之。近有顧允祥之婦。熱怒傷食。喘脹嘔逆
不止。醫者候認風邪。而與表藥。遂昏憤目。雖不語。呼之不省。
乃求救於石頑。其脈六部滑伏。知為痰因氣閉所致。本當因
勢利導。探吐以通其痰。緣病家畏其吐劇。遂與導痰湯加葛
蒲遠志。一吸便能語言。更與前藥加續命散。得下而安。門
人問曰。此病既當探吐。何下之亦能取效。因謂之曰。治病貴
乎圓活。但得開通經絡。管鑰自空。設用橘皮濃煎亦可探吐。
參蘆濃煎亦可灌吐。薑汁竹瀝亦可取吐。在豐稔之家。局方
至寶丹。牛黃丸。蘇合香丸。皆可取用。奚必拘於何藥方為合

醫通卷之九

不能語

思得堂藏

劑耶

消痺

經云。二陽結。謂之消。二陽者。陽明也。手陽明大腸主津。病消
血熱。則消。消者。消其血中之熱。則津自足。是津不足也。足陽明胃主
精。精者。津液不足。精而不利。皆燥熱為病也。○釀成消中。
心移熱於肺。傳為消渴。肺氣不化。小便反多。而善消。○心移寒
於肺。肺消者。飲一溲二。死不治。○君火失政。則陰火乘之。
於肺。肺消。肺消者。飲一溲二。死不治。○君火失政。則陰火乘之。
而下焦。真陽失守。液。○大腸移熱於胃。善食而瘦。謂之食亦
便。及多故死。不治。○胃移熱於脾。脾移熱於胃。則消。○腎
於外也。若胃移熱於脾。而食亦消。則有煩熱。口苦之患。○腎
熱病者。先腰痠。肝酸。苦渴。數飲。身熱。○有口甘者。病名脾瘅。
五味入口。藏於胃。脾為之行。其精氣。津液在脾。故令人口甘
也。此人必數食甘美而多肥。肥者。令人內熱。甘者。令人中滿。
故其氣上溢。轉為消渴。治之以鹹。除陳氣也。○熱中消中。不
可服膏粱芳草石藥。石藥發癩。芳草發狂。芳草之氣。美。石藥

醫通卷之九

消痺

思得堂藏

之氣悍。二者其氣急疾堅勁。非緩心和入。不可以服。○熱氣
留於小腸。腸中痛。痺熱焦渴。則堅乾。不得出。故痛而閉不通
矣。○消痺脈實大。病久可治。脈懸小。堅病久不可治。
金匱云。男子消渴。小便反多。以飲一斗。小便一斗。腎氣丸主
之。

腎主藏精。以施化。若精泄無度。火動不已。則肺氣傷燥。而
思水。水入於胃。不得肺氣之化。不復上歸下輪。腎病則氣
不約束。調布。豈不飲一斗。而出一斗乎。故用腎氣丸。全賴
桂附之辛溫。蒸發津氣。以潤藏府百骸。豈云專補其腎哉。
脈浮小便不利。微熱消渴者。宜利小便發汗。五苓散主之。

此言水氣不化之渴。與渴欲飲水。水入即吐。名曰水逆之
渴。證雖稍異。而水氣阻礙津液。則一故並宜五苓以輪散

之水散則津液灌漑而渴自已耳
渴欲飲水不止者文蛤散主之

文蛤治傷寒冷水濕漑意欲飲水反不渴者是治表之水
寒今治裏熱而渴飲水不止者亦取其鹹寒退火有益水
潤燥之功一味而兩得之若心移熱於肺傳為消渴者
尤宜

趙養葵云。上消者舌上赤裂大渴引飲並謂心移熱於
肺傳為消渴者是也。以白虎加人參湯治之中消者善食而
瘦自汗大便硬小便數。瘕成爲消中者是也。以調胃承氣湯
治之下消者煩躁引飲耳輪焦乾小便如膏此腎消也。六味
九治之。古人治三消之法詳別如此。余又有一說焉人之水
火得其平氣血得其養何消之有。其間調攝失宜水火偏勝

醫通卷之九 消渴 忍得堂藏

津液枯槁以致龍雷之火上炎熬煎既久腸胃合消五臟乾
燥令人四肢瘦削精神倦怠故治消之法無分上中下先治
腎爲急惟六味八味加減八味隨證而服降其心火滋其腎
水則渴自止矣。白虎與承氣非其所治也。總之是下焦命門
火不歸元遊於肺則爲上消遊於胃即爲中消以八味腎氣
丸引火歸元使火在釜底水既濟氣上薰蒸肺受溼潤而
渴疾愈矣。或曰人有服地黃湯而渴仍不止者何也曰心
肺位近宜制小其服腎肝位遠宜制大其服如上消中消可
以用前九緩治若下消已極大渴大燥須加減八味九料一
斤肉桂一兩水煎六七碗意欲冰冷服之熟睡而渴病如失
矣。處方之制存乎人之變通耳。有等渴欲引飲但飲水不
過一二口即厭少頃復渴飲亦不過若此但不若消渴者之

飲水無厭也。此是中氣虛寒寒水泛上逼其浮遊之火於咽
喉口舌之間故上焦一段欲得冰救若到中焦以水見水正
其所惡也。治法如面紅煩燥者理中湯送八味丸

俞嘉言曰消渴之患常始於微而成於著始於胃而極於肺
腎始如以水沃焦水入猶能消之既而以水投石水去而石
自若至於飲一洩一飲一洩二則燥火劫其真陰操立蓋之
勢而成禍禍矣內經有其論無其治全賈有論有治也而集
書者採傷寒論厥陰經消渴之文濫入後人不能決擇斯亦
不適於用也蓋傷寒傳經熱邪至厥陰而盡熱勢入深故渴
而消水及熱解則不渴且不消矣豈難證積漸爲患之比乎
謹從內經擬議言之經謂消消瘵什擊偏枯痿厥氣滿發逆
肥貫人則骨梁之疾也此中消之所由來也肥而不實食弗

醫通卷之九 消渴 忍得堂藏

給於鮮實而不肥食弗過於饕肥而且貴醇酒厚味孰爲限
量哉久之食飲醲成內熱津液乾涸求濟於水然水入尚能
消之也愈消愈渴其膏梁愈無它而中消之病成矣夫既癰
成爲消中隨其或上或下火熱熾盛之區以次傳入矣上消
者胃以其熱上輪於肺而子受母累必復以其熱移之於肺
而金受火刑金者生水而出高源者也飲入胃中遊溢精氣
而上則肺通調水道而下今火熱入之高源之水爲暴虐所
逼令外飲之水建瓶而下飲一洩二不但不能消胃水且耗
素醲水精竭絕而盡輪於下較大府之暴注暴泄尤爲甚矣
故死不治也至於胃以其熱由關門下傳於腎腎或以石藥
耗其真女勞竭其精者陽強於外陰不內守而小洩渾濁如
膏飲一洩二腎消之病成矣故腎者胃之關也關門不開則

水無輪泄。而為腫滿。關門不開。則無底止。而為消渴。消渴。腎一證。金匱原文未脫。其曰。飲一斗。溲一斗者。腎氣丸主之。於此。蒸動精水。上承君火。而止其下入之陽光。此正通天手。張子和。輒敢詆之。既詆仲景。復諷河間。謂其神考。以黃芩。味苦入心。牽牛。大黃。驅火氣而下。以滑石。引入腎經。以入坎。真得黃庭之秘。顯倒其說。何私所好。識趣卑陋。若此。何足以入仲景之門哉。何柏齋。消渴論中。已辨其非。吾觀。人吐下。諸按中。從無有治消渴一案者。然以承氣。治壯火之理。施之消渴。又無其事矣。故以下消之火。水中之火也。下之則愈。燔中消之火。竭澤之火也。下之則愈。傷上消之火。燎原之火也。水從天降。可滅。徒攻腸胃。無益。反損天地氣上為雲。然後天氣下為雨。是故。雨出地氣。地氣不上。天能雨乎。故。愚

醫通卷之九

消渴

先思得堂藏

升地氣。以慰三農。與亟蒸腎水。以溉三焦。皆事理之必然者耳。○內經曰。心移熱於肺。傳為肅消。戴人謂。肅消猶未及於肺。至心移寒於肺。乃為肅消。如此。泥文害意。非能讀內經者也。要識心肺同居膈上。肺為嬌藏。移寒移熱。總之易入。但寒邪入而外束。熱邪入而內傳。均一肺消。而治則有分矣。腎消之病。古曰。強中。又謂內消。多因慾色慾。或餌金石。腎氣既衰。石氣獨在。精備失養。故常發虛陽。不交精出。小便無度。脣口乾焦。加減八味丸。用生脈散下。○千金云。有人苦熱不已。皆由服石所致。種種服餌。不能制止。惟朴硝煎。可以定之。○男子消渴。飲一斗。溲一斗者。腎氣丸。飲一溲二者。難治。○渴家誤作火治。涼藥亂投。促入生命。宜多服生脈散。滋養之。○上焦蘊熱消渴。小便赤澀。清心蓮子飲。○心膈有熱久

則引飲為消渴。名曰。肅消。引精煩心。津液短少。宜明麥門冬。飲子。○老弱之人。大渴。易老。門冬飲。○消中能食。而口舌乾枯。大渴。引飲自汗。大便秘燥。小便頻數。黃散。○煩熱大渴。引飲不止。脈大滑實。甘霖飲子。○胃熱口臭。煩渴引飲。面赤。脣乾。氣口脈短滑者。瀉黃散。○食已如瀉。胃熱消穀。陽明脈盛。心火上。行面黃肌瘦。胸滿脇脹。小便赤澀。七味白朮散。○心膈有熱。消渴。咽乾。面赤。生料固本丸。加黃芩。甘草。石解。澤瀉。枇杷。○脈浮。小便不利。微熱。消渴。或渴飲水多。停畜不散。心下轉輒有聲。小便不利者。並宜五苓散。若熱渴不止。加入參。○三消久而小便不利。反作甜氣。此脾氣下脫。為病最重。七味白朮散。有濁。桶中浮在而上。如猪脂。澀在桶邊。或如柏油者。此腎虛不能約制。脾胃之膏液下流。用白朮散。腎

醫通卷之九

消渴

先思得堂藏

氣丸。可救十之一二。○脾消之證。飲食入腹。如湯沃雪。隨小便而出。出於溲。碎薄。皆旋結如白。肌膚日消。用熱藥則愈。甚用涼藥則愈。虛不能起。精神恍惚。口舌焦乾。或陽強興盛。不交而泄。不久當斃。孫真人云。消渴之人。愈與未愈。常須思慮有大難。何者。消渴之人。必於大骨間發癰疽。而卒。所以專慮發大癰也。診○石頑曰。經言。消瘴。脈實大。病久可治。脈懸小。堅。病久不可治。見消證。脈顯實大。為證。脈相符。雖久可治。若見懸小而堅。不但脈不應病。且真藏發露。其可療乎。設消證。脈小而不至。於虛懸。堅。又當從仲景。腎氣丸。正治矣。然歷診消瘴之脈。無有不帶數象者。但須察消數沉數。在左在右。尺甚寸甚。及有餘不足。兼見何脈。而為審治。又須詳南北風土之強弱。

病人氣之厚薄。合脈象而推之。庶幾無虛虛之誤矣。大抵北人消癰。脈多沉石滑數。以北方寒水司權。且素食煤火。腎氣多厚。故用劉張寒濕之法。往往獲効。然間有恃力作強。以水為事。乃致虛陽不守。封藏不固。而見右尺數大。為下消者。亦有真陰耗竭。腎氣不升。肺藏枯燥。而見寸口數盛。為上消者。又有竭力房室。服食燥悍。火土太強。恣意飲嗽。而見氣口動滑。為中消者。又不可限以風土。悉須導火壯水。除陳氣等法。若大江已南。木火始生之界。患消癰者。從無沉石之脈。即有滑數。按之必濡。多有尺內見弦。及氣口命門大數。或兩寸浮滑者。以東南水土厚薄。虛陽易動。腎水易虧。當確遵金匱東垣養法。猶恐不及。况可效劉張之法乎。至若東嶺而南。消癰之脈。亦絕無沉石之候。多見浮大數盛。外示有餘。中實不足。以其陽氣泄而不藏。腎氣溢而不滿。故其治。僅可用辛涼以清其熱。甘寒以滋其陰。若辛熱導火。苦寒瀉氣等藥。總無於預也。至於臨病審察。又當隨左右尺寸之太過不及。而為決斷。太過見於寸口。多為氣病。不及見於尺內。多為腎虛。又在左偏弦。為精髓受傷。右偏旺。為虛陽發露。然其邪皆自內發。故表證脈絕少。即金匱五苓散一條。亦是水氣不化。津液不行而渴。故脈浮小便不利。微熱消渴之證。見消癰雖有浮脈。亦是客邪為患。非此證之本脈。故特表而出之。石頑治太學趙雪訪。消中善食。日進膏粱數次。不能飲。其饑勢。丙夜必進二食。食過即昏昏暗。或時作酸作甜。或時夢交精泄。或時澀日不飲。或時引飲不飲。自言省試勞心所致。詢其先所服之藥。屢用安神補心。滋陰清火。俱

不遇。延至麥秋。其證愈劇。始求治於石頑。察其聲音。濁而多滯。其形雖肥。盛色著。而肌肉棉更。其脈六部皆洪滑而數。惟右關特甚。其兩尺亦洪滑。而按之少神。此腎氣不充。痰淫挾陰火。泛溢於中之象。遂與加味導痰加蘭香。數服其勢大減。次以六君子合佐金。枳實湯。泛九服。後以六味九去地黃。加膠膠。養熱。平調兩月而康。又治潮客白小樓。中消善食。脾約便數。察其形。瘦而質堅。診其脈。數而有力。時喜飲冷氣酒。此酒之淫熱內蘊為患。遂以調胃承氣三下。破其蘊熱。次與滋腎九數服。潑其餘火而安。又治粵客李之藩。上消引飲。時當三伏。觸熱到吳。初時白汗發熱。煩渴引飲。漸至溲便頻數。飲即氣喘。飲過即渴。察

令服生料六味。稍加桂附以通陽氣。其左右視。咸謂夏暑不宜桂附。另延一醫。峻用人參附子。月餘飲食大進。猶謂參附得力。恣餌不徹。遂至日食豚蹄雞鴨七八食。至夜預治熟食。聽其飽食二次。如此又兩月餘。形體豐滿。備常。但苦時時嘈雜易餓。常見青衣羣鬼。圍遶其側。徧禱不靈。復邀石頭診治。其脈皆滑數有力。而右倍於左。察其形色多滯。且多言多笑。而語多不次。此味痰壅塞於中。復加辛熱助其淫火。始本陰虛。未傳中消之患也。不意祛滯必為狂癲之病。為製涌吐之劑。遲疑不進。未幾忽然大叫發狂。妄言妄見。始信余言之非謬也。

痰火門

石頭曰。痰火一證。方書罕及。近惟邵中梁仁甫國醫宗旨。專為立言。然皆從引屑辭。且所用方藥。專事降泄。暑無功於病。情殊非指南之謂。夫所謂痰火者。精隨枯涸於下。痰火憑鬱於上。有形之痰。無形之火。交固於中。良由勞思傷神。嗜慾傷精。加以飲食不節。血肉之味。醞釀為痰。為火。變動為痰。為喘。其在平居無恙之時。所積窠囊之中。或時有所觸發。則衝膈透膜。與潮宗之泛濫無異。觀其外觀之狀。頗有似乎哮喘。察其內發之因。反有類乎消中。消中由陰邪上僭。攝之可以漸解。哮喘由表邪內陷。溫之可以暫安。此則外內合邪。兩難分。何怪時師之茫無統緒乎。予由是而因病製宜。特立玉竹飲。

子一方。為是證之專藥。臨證以意增減。庶幾欬治病情。其有兼扶客邪者。又須先微標證。然後從本而施。自然信手合。如因感風寒而發。則香蘇散為至當。暑加細辛以開肺氣。香豉以通腎邪。散標最捷。蓋香蘇性降。可無升舉濁垢之虞。他如麻黃桂枝。柴防升葛。羌獨川芎等味。能鼓動痰氣。藉荷荊芥橘皮蘇子等味。能耗散真氣。岑連知母。赤白芍。枳實。枳木。膏等味。能飲閉邪氣。皆宜遠之。因飲食而發。祇宜金匱枳木湯。隨所傷之物而為藥。用穀傷。麴藥。酒傷。煨葛。肉傷。炮姜。麩。麥。傷。加草果。雞。鴨。卵。傷。加杏仁。痰食交結。則加橘半。食積發熱。必加黃連。黃連與枳實同用。善消痞滿。半夏與白朮同用。專運痰濕。然須生用力能豁痰。痰去則津液流通。熱渴自解。升若木南星。燥烈傷津之比。因惱怒而發。沈香降氣散和洋。

前服不但理氣化痰亦可消運食滯其或兼胃微風另煎香蘇散以協濟之原其觸發之因不出風食氣三者為甚然皆人所共知惟是觸感風熱而發者世所共賦蓋寒傷形而不傷氣氣本乎肺肺氣受傷致嗽喘滿勢所必致而寒客皮毛皮毛為肺之合邪從皮毛而入傷於肺致嗽喘滿亦勢所必致何怪舉世醫師一見喘嗽舉以表散為務良由不辨內因外因之故耳易知外因從表而傷有形之津證屬有餘故一欸其痰即應而痰沫清稀內因從肺而傷無形之氣證屬不足故屢欸而痰不得出欸刺則喘此不但肺病而胃亦病矣是予玉竹飲子方中茯苓甘草為胃家預立地步也至於標證散後餘火未清人參未宜遽用玉竹飲子尤為合劑病勢向衰即當滋養肺胃異功散加麥冬取橘皮為宣通氣化

醫通卷之九

痰火

恩得堂藏

之報使氣虛不能宣發其痰又需局方七氣湯倍肉桂為熱因熱用之嚮導若其人形體雖肥而色白氣虛則以六君子湯加竹瀝薑汁即有半夏亦無妨礙食少便溏者竹瀝又為切禁宜用伏龍肝湯代水煎服脾氣安和津液自固可無傷耗之慮矣痰人陰虛多火六味地黃去澤瀉合生脈散使金水相生自然火息痰降去澤瀉者以其利水傷津也若命門脈弱真火式微或不時上衝頭面悶熱又須六味地黃加肉桂五味子以攝火歸陰陰平陽秘精神通治須知治痰先治火治火先養陰此為治痰治火之訣然後有真氣浮散之極草根木實無濟於用又須金石以鎮固之予嘗借服食方中靈飛散取靈母以攝虛陽鍾乳以通肺竅菊石化以清旺氣兼天冬地黃人參之三才以固精氣神之根本即修內丹不

外乎此所謂知其要者一言而終不知其要流散無窮敢以此言質之梁子

梁仁甫云病痰火者或吐血或衄血或喉疼身熱渴黃皆熱證也庸醫妄投苦寒瀉火之劑不知苦寒能瀉脾胃脾胃土也乃人身之本也今火病而瀉其土火未嘗除而土已病矣土病則胃虛因而飲食減少甚至泄瀉肌肉消瘦不可救藥矣世俗謂病痰火者服重便最好余治痰火每禁服重便益童便降火雖速而損胃多矣故治火病以理脾為主此真訣也

診○痰脈沉弦細滑大小不勻皆痰氣為病左右手關前脈浮大而實者膈上有稠痰也關上脈伏而大者清痰也丹溪云人得清脈痰飲膠固脈道阻滯卒難得開必費調理

醫通卷之九

痰火

恩得堂藏

黃蘗 目黃

經云。身痛而色微黃。齒垢黃。爪甲上黃。黃疸也。安臥小便黃赤。脉小而滿者。不嗜食。○溺黃亦安臥者。曰黃疸。食已如饑者。曰胃痺。目黃曰黃痺。

金匱云。諸病黃家。但當利其小便。假令脉浮。當以汗解之。宜桂枝加黃耆湯主之。

黃家一證。大率從水溼得之。治溼之法。當利小便為第一義。然脉浮者。知溼不在裏而在表。又當以汗解之。設表溼乘虛入裏。而作癰閉。又當利其小便也。故下條云。黃疸病茵陳五苓散主之。活法在心。可拘執乎。

黃疸病。茵陳五苓散主之。夫病酒黃疸。必小便不利。其候心中熱。足下熱。是其證也。

醫通卷之九

黃蘗

卷一 思得堂藏

酒黃疸者。或無熱。消言了。腹滿欲吐。鼻燥。其脈浮者。先吐之。沉弦者。先下之。○酒疸心中熱。欲吐者。吐之愈。酒黃疸。心中懊憹。或熱痛。梔子大黃湯主之。

此即枳實梔子豉湯之變名也。大病後勞復發熱。服枳實梔子豉三味。覆令微汗。使餘熱從外而解。若有宿食。則加大黃從內而解。此治酒疸之脈沉弦者。用此方以下之。其脈浮當先吐者。則用梔子豉湯。可不言而喻矣。蓋酒疸傷胃發黃。無形之溼熱。故宜梔子豉湯之與穀疸之常用茵陳蒿者。溼溼自殊。即此湯亦自治酒食並傷之溼熱。故可用下。觀枳實梔子豉湯之加大黃。亦是因宿食而用也。更有梔子燧皮湯。治身黃發熱一證。又以苦燥利其滲道也。合此比例而推治黃之法。無餘蘊矣。

酒疸下之。久久為黑疸。目黃而黑。心中如噉蒜齏狀。大便正黑。皮膚爪之不仁。其脈浮弱。雖微黃。故知之。金匱治酒疸。用或吐或下之法。言雖錯出。後實一貫。蓋酒之積熱入膀胱。則氣體不行。必小便不利。積於上焦。則心中熱。積於下焦。則足下熱。其無心中足下熱者。則消言了。而不神昏。但見腹滿欲吐。鼻燥三證。可知其病上與腹中。陰陽交病。須分先後治之。當辨脈之浮沉。以定吐下之先後。若但心中熱。欲嘔吐。則病全在上焦。吐之即愈。何取下為哉。其酒熱內結。心神昏亂。而作懊憹。及痛楚者。則不可不下。故以梔子香豉。皆治其心中懊憹。大黃湯滌源熱。枳實破結。逐去宿垢也。但以此切病之法。不可久用。久久下之。必脾肺之陽氣盡傷。不能統領其陰血。其血有日趨於敗。而變黑耳。然酒疸之黑。非女勞疸之黑也。女勞疸之黑。為腎氣所發。酒疸之黑。為敗血之色。因酒之溼熱傷脾胃。脾胃不和。陽氣不化。陰血不運。若更下之。久久則運化之用愈耗矣。氣耗血積。敗腐瘀濁。色越肌而為黑。味變於心。咽作嘈雜。心辣如取蒜齏狀。營血衰而不行。痺於皮膚。爪之不仁。輪於大腸。便如漆黑。其目黃與脉浮弱。皆病血也。仲景於一酒疸。臚列先後次第。以盡其治。其精而且詳如此。

醫通卷之九

黃蘗

卷一 思得堂藏

酒疸下之。久久為黑疸。目黃而黑。心中如噉蒜齏狀。大便正黑。皮膚爪之不仁。其脈浮弱。雖微黃。故知之。

金匱治酒疸。用或吐或下之法。言雖錯出。後實一貫。蓋酒之積熱入膀胱。則氣體不行。必小便不利。積於上焦。則心中熱。積於下焦。則足下熱。其無心中足下熱者。則消言了。而不神昏。但見腹滿欲吐。鼻燥三證。可知其病上與腹中。陰陽交病。須分先後治之。當辨脈之浮沉。以定吐下之先後。若但心中熱。欲嘔吐。則病全在上焦。吐之即愈。何取下為哉。其酒熱內結。心神昏亂。而作懊憹。及痛楚者。則不可不下。故以梔子香豉。皆治其心中懊憹。大黃湯滌源熱。枳實破結。逐去宿垢也。但以此切病之法。不可久用。久久下之。必脾肺之陽氣盡傷。不能統領其陰血。其血有日趨於敗。而變黑耳。然酒疸之黑。非女勞疸之黑也。女勞疸之黑。為腎氣所發。酒疸之黑。為敗血之色。因酒之溼熱傷脾胃。脾胃不和。陽氣不化。陰血不運。若更下之。久久則運化之用愈耗矣。氣耗血積。敗腐瘀濁。色越肌而為黑。味變於心。咽作嘈雜。心辣如取蒜齏狀。營血衰而不行。痺於皮膚。爪之不仁。輪於大腸。便如漆黑。其目黃與脉浮弱。皆病血也。仲景於一酒疸。臚列先後次第。以盡其治。其精而且詳如此。

發瘧之為病。寒熱不食。食即頭眩。心胸不安。久久發黃。為穀疸。茵陳蒿湯主之。

瘧。茵陳蒿湯主之。瘧。上微汗出。手足中熱。薄暮即發。膀胱急。小便自利。名曰女勞瘧。腹如水狀。不治。

瘧。上微汗出。手足中熱。薄暮即發。膀胱急。小便自利。名曰女勞瘧。腹如水狀。不治。

女勞之瘕。惟言額上黑。不言身黃。簡文也。然黑爲此方陰
晦之色。乃加於南方離明之位。以女勞無度。而脾中之濁
陰下趨入腎。水土互顯之色。乃至微汗亦隨火而出於額。
心之液且外亡矣。手足心熱。內傷皆然。日暮陽明則事陽
明主圖。收斂一身之濕熱。疾趨而下。膀胱其小便自利。大
便黑時。滯又是膀胱蓄血之驗。腹如水狀。實非水也。正指
蓄血而言。故爲不治。

黃家日晡所發熱。而反惡寒。此爲女勞得之。膀胱惡。少腹滿。
身黃。額上黑。足下熱。因作黑瘕。其腹脹如水狀。大便必黑。
時應此女勞之病。非水也。腹滿者難治。硝石礬石散主之。
此治女勞瘕之惡方也。夫男子精動。則一身之血俱動。以
女勞而傾其精。血必凝之。故因女勞而尿血者。其血尚行。

醫通卷之九

黃瘕

先

思得堂藏

猶易治也。因女勞而成瘕者。血瘀不行。非急去膀胱少腹
之瘀血。萬無生路。乃取皂礬以滌除瘀垢。硝石以破積散
堅。二味相資。銳而不猛。此方之妙用也。
黃瘕腹滿。小便不利而赤。自汗出。此爲表和裏實。當下之。大
黃硝石湯。

黃瘕最難得汗。自汗則表從汗解。故曰此爲表和裏實。方
用大黃硝石。解散在裏血結。黃瘕專在下焦。淫熱梘子輕
浮。能使裏熱從滲道而泄也。
諸黃。豬膏最煎主之。

詳此治瘕血發黃之緩劑。以諸黃雖多。淫熱然經脈久病。
不無瘀血阻滯也。用後方以此治女勞瘕。身目盡黃。發熱
惡寒。少腹滿。小便難。以大熱大寒女勞。交接入水所致。用

髮灰專散瘀血。和豬膏煎之。以潤經絡。腸胃之燥。較硝石
礬石散。雖緩意輕。重懸殊。散瘀之旨則一也。

瘕而渴者。其瘕難治。瘕而不渴者。其瘕可治。發於陰部。其人
必嘔。陽部。其人振寒而發熱也。

瘕爲濕熱固結。阻其津液往來之道。故以渴與不渴。證津
液之通與不通也。嘔爲腸胃受病。振寒發熱。爲經絡受傷。
於此可證其表裏陰陽而治也。

黃瘕者。色如熏黃。一身盡痛。乃淫病也。色如橘子黃。身不痛。
乃瘕病也。○瘕分爲五。黃汗。黃瘕。穀瘕。酒瘕。女勞瘕。○黃汗
者。其證兩脰自冷。從腰已上必汗出。下無汗。腰腹弛痛。如有
物在皮中狀。刺者不能食。身疼痛。煩躁。小便不利。此爲黃汗。
宜者。苦桂酒湯。苦熱加防風。夜熱加當歸。食少加白朮。茯苓。

醫通卷之九

黃瘕

四十一

思得堂藏

○黃瘕有乾有溼。乾黃者。肺燥也。小便自利。四肢不沈重。渴
而引飲。梘子藥皮湯。溼黃者。脾溼也。小便不利。四肢沉重。似
渴不欲飲者。麻黃連翹赤小豆湯。身黃如橘子色。小便不利。
腹微滿者。茵陳蒿湯。渴者。茵陳五苓散。○穀瘕者。食畢即頭
眩。心中拂鬱不安。遍身發黃是也。小柴胡去參。加白朮。炮薑。
臍草枳實。二便秘者。茵陳蒿湯。胃瘕食已如飢。胃熱消穀。面
黃瘦。胸滿脇脹。小便赤。補中益氣加豬膽汁。炒川連。酒黃
藥澤瀉。○酒瘕者。身自發黃。腹如水狀。心下懊懣而熱。不能
食。時時欲吐。足脛腫。小便黃。面發赤斑。此因饑中飲酒大醉。
當風入水所致。梘子大黃湯。酒瘕下之久。久爲黑瘕者。前方
去大黃。合犀角地黃。不應去地黃。加桂心。桃仁。穿山甲。○色
瘕者。身黃額上微黑。小便利。大便黑。此因房事過傷。血畜小

腹而發黃。故小腹連腰下痛。大黃附子湯去細辛加肉桂。若神思困倦。頭目昏重。脾氣不運。大便不實者。四君子湯下。石礬石九。○陰黃者。厥冷脈沉。或服寒涼過多。變為陰黃。因過食寒物而成。四肢皮膚皆冷。心下痞硬。眼澀不欲開。自利。睡臥茵陳附子乾薑湯。或茵陳四逆湯加白朮。冷食不化。腹中結痛。去甘草加枳實白朮。草豆蔻。小便不利。加桂苓澤瀉。○有瘀血發黃。大便必黑。腹脇有塊。或脹。脈沉或弦。大便不利。脈稍實而不甚弱者。桃核承氣湯。下盡黑物則退。○失血後崩後。一切病後。脾胃肺元氣大傷。面色痿黃。或淡白色。悉屬虛。從內傷治。不可誤認作瘧。○食勞瘵黃。俗名黃胖。夫黃瘵者。暴病也。瘵黃者。宿病也。至有久不愈者。溫中丸。瘵瘵丸。然此僅可治實人。及田家力作之輩。若膏粱柔脆之人。未

醫通卷之九

黃瘵

里

思得堂藏

可輕試也。戴氏云。食積發黃。量其虛實而下之。其餘但利小便。便清利則黃自退。○喻嘉言曰。夏月天氣之熱。與地氣之溼交蒸。人受二氣。內結不散。發為黃瘵。與蠱毒無異。必從外感汗吐下之法去其溼熱。然夏月陽外陰內。非若冬月傷寒人氣伏藏難動之比。其穀瘵酒瘵女勞瘵則純是內傷。與外感無涉。仲景補內經之闕。曲盡其微。至於陰瘵一證。仲景之方論已亡。千古之下。惟羅謙甫茵陳四逆湯一方。治過用寒涼。陽瘵變陰之證。有合往轍。此外無有也。今人但云陽瘵色明。陰瘵色晦。此不過氣血之分。辨之不清。轉足誤人。如酒瘵蠱瘵。女勞瘵額上黑。豈以其黑遂謂陰瘵。可用附子乾薑乎。夫女勞瘵者。真陽為血所壅閉。尚未大損。瘀血一行。陽氣即通矣。陰瘵則真陽衰微不振。一任溼熱與濁氣。敗血團聚

不散。必復其陽。固結始開。倘非離照當空。幽隱何由畢達耶。○黃瘵得之外感者。誤用補法是謂實實。得之內傷者。誤用攻法是謂虛虛。○陰瘵誤從陽治。變用苦寒者。皆醫殺之也。○在半陰半陽之證。其始必先退陰。復陽。陰退乃從陽治。若以附子黃連合用。況且有苦。奈何純陰無陽。輒用苦寒耶。石頑曰。黃瘵證中。惟黑瘵最劇。良由酒後不禁。酒溼流入髓。藏所致。土敗水崩之兆。始病形神未槁者。尚有溼熱可攻。為祛瘵之嚮導。若病久肌肉消瘦。此真元告匱。不能回榮於竭。澤也。中翰汪先于病瘵。服茵陳五苓不應。八月間。邀石頑診之。弦大而孔。腎傷挾瘀。結積不散所致。急乘元氣尚可攻擊。時用金匱硝石礬石散。兼桂苓丸之制。以洗滌之。遲則難為力矣。汪氏有某醫者。以為藥力太峻。不便輕用。旋值公郎鄉

醫通卷之九

黃瘵

里

思得堂藏

薦繼以公車。未免繁心。不及調治。迨至新正二日。復邀石頑相商。脈轉弦勁而革。真元竭盡無餘。半月以來。日服人參數錢。如水投石。延至正月下。漸遣內使竊問。予謂之曰。推至今日。小主場事。可無礙矣。其後安公聯捷。不及殿試。而返。信于言之不謬也。同時有伶人黑瘵。投以硝石礬石散作丸。晨夕各進五丸。服至四日。少腹收絞。小便先下。赤水。大便繼下。滑黑。至十一日。瘵盡。次與桂苓歸芍之類。調理半月而安。或問近世治瘵。多用草頭單方。在窮鄉絕域。猶之可也。城郭愚民。亦多效尤。仁人鑒此。豈不痛歟。嘗見有服商陸根。苦匏酒。通山龍。雪裏青。鹿葱等汁。吐利脫元而死者。指不勝屈。曾有孕婦病黃。誤用瓜蒂搗鼻。嘔逆喘滿。致胎息上衝。慘痛叫號。而斃。設當此際。得何法以救之耶。答言。是皆宿孽使然。與飛蛾

燭火無異。欲救之者。惟廣行刊布。垂誠將來。勿蹈前轍。庶不失仁人之用心。若欲手挽既覆之車。吾未如之何也。

目黃。目黃曰黃。亦有目黃而身不黃者。經云。風氣與陽明入胃。循脈而上。至目內眦。其人肥。則風氣不得外泄。則爲熱中。而目黃。煩渴引飲。宜明用青龍散。殊失經旨。合用越脾加木湯。桂枝二越脾一湯。選用病久屬虛者。理苓湯。倍用桂苓。凡黃痺目黃不除。或頭重。以瓜蒂散搐鼻。後用茵陳五苓散清利之。

診。脈沉渴欲飲水。小便不利者。皆發黃。脈洪大。大便利而渴者。死。脈微小小便利不渴者。生。凡黃家。候其寸口近掌無脈。口鼻氣冷。並不可治。漸毒入腹。喘滿者危。凡年壯氣實。脈滑便堅者。易愈。年衰氣弱。脈虛澀而便利者。難痊。

醫通卷之九

目黃

望思得堂藏

嗜雜 噯氣

嗜雜與吞酸一類。皆由肝氣不舒。木挾相火乘其脾胃。則穀之精微不行。濁液攢聚。爲痰爲飲。其痰亦從木氣化。酸肝木搖動中土。故中土擾擾不寧。而嗜雜如飢狀。每求食以自救。苟得少食。則嗜雜少止。止則復作。蓋土虛不禁木所搖。故治法必當補脾運痰。土厚戴物。則風木自安。不必用伐肝之劑。六君子湯爲專藥。火盛作酸。加吳茱萸川黃連。若不開鬱補子。務攻其痰。久久而虛。必變反胃泄瀉。痞滿眩暈等病矣。嗜雜或食後腐化酸臭。心中煩雜者。保和丸。○淫痰氣滯。不喜飲食者。保和丸二錢。越鞠丸一錢和服。○脈洪大者。火多。二陳加薑汁炒山梔川連。滑大者。痰多。導痰加芩連山梔。○脈弦細身倦怠者。六君子加撫芎者。未薑汁炒山梔。不應合。

醫通卷之九

嗜雜

望思得堂藏

佐金丸。又有用消尅藥過多。饑不能食。精神漸減。四君子加白芍陳皮薑汁炒川連。○心懸懸如飢狀。飲食之時。勿與飲食。常以枳朮丸三分。抑青丸一分和服。○中脘有飲則嘔。有宿食則酸。故常愛宿腐氣逆。噯酸水。亦有每晨吐酸水數口。日間無事。隔常如酸熱者。皆中宮不消所致。越鞠丸合佐金丸服最妙。○婦人悒鬱。多有此證。逍遙散下佐金丸。○腎肝陰虛。不能納氣歸元。而作嗜雜噯氣痞滿。脈必濡弱。服補中二陳諸藥不効者。臨臥用四神丸加川連。侵晨用六味丸加沉香。

噯氣。噯氣皆屬胃中窒塞。氣不宜通。上迫而出也。然有飲食太過。噯出如敗卵氣者。則當審所傷何物而消導之。亦有胃弱不能消化。而然者。此宜兼補兼消。不可純用尅伐也。

簡○胃中津氣枯稿則餉若平時飲食常餉者為反胃之漸不可不知

欠噦

經云。腎為欠為噦。○氣鬱於胃。故欠生焉。○胃足陽明之脉。是動則病振寒。善伸數欠。○二陽一陰發病。主驚駭。背痛。善噦。善欠。

胃為二陽。腎為一陰。以胃虛氣鬱於中。則為噦。腎虛經鬱於下。則為欠。內經雖以欠錢諸胃。然必由少陰經氣下鬱。不能上走陽明。胃氣因之不行。而頻呼數欠。以泄其氣。舒其經。若少陰氣不下。應胃氣雖虛。登上泄。則但呼而不欠也。

人之噦者。陽氣和利。滿於心。出於鼻。故為噦。

金匱云。夫中寒家善欠。其人清涕出。發熱色和者。善噦。○中寒其人下利。以裏虛也。欲噦不能。此人肚中寒。

中氣虛寒。不能上溫肺氣。則善呼。不能下引腎氣。則善欠。故呼欠。雖主胃氣不舒。實緣腎氣鬱伏所致。若中寒而加火迫津氣。或風激水液。皆清涕出。縱由土虛不能禦邪之故。設兼客邪發熱。而色和善噦者。此表氣尚強。逼邪上走空竅也。亦有裏虛不能拒邪而為下利者。知其人必有陳寒。無陽氣以發越其邪。故欲噦而不能也。

河間曰。噦者鼻中因癢而氣噴作於聲也。鼻為肺竅。發為火化。外風欲入而內火拒格。故發為噦。有噦則風邪隨氣而散。不能入傷於經。是以傷風有噦為輕。

石頑曰。內經金匱雖有噦欠之因。却無方藥主治。守真以傷風有噦為輕者。其人陽氣和利。雖有風邪。自能隨氣鼓散。可無藉於湯藥也。於此有人素體淫熱。加以客邪。鼻塞不聞香。

臭服細辛辛尖等藥百餘劑。每當微風卽嚏不已。三嚏之後。清涕如注。腦戶隱隱掣痛。諸治罔効。因思金匱中寒家清涕。善嚏之說。遂取鍾乳專溫肺氣之品。助以人參溫中。貴黃實。補虛茸固髓。黃牛腦和丸。空服服三十丸。餌及兩月。數年之病隨手而愈。

身重 解併

經曰。肝虛腎虛脾虛。皆令人體重煩冤。身重多屬於溼。宜用健脾行溼之劑。如除溼湯。滲溼湯。胃苓湯之類。虛人補中益氣加羌防茯苓澤瀉。隨其攸利。○仲景云。風溼脉浮身重。汗出惡風者。防己黃耆湯。○夏月中風溼。身重如山。不能轉側。消暑十全散加羌活蒼朮。○腎者身體重。甘薑苓朮湯。石頑曰。身重無非溼證。溼證多歸重於脾土。為脾病是矣。又腎為水藏。腎虛則邪水用事。故又主腎虛。至於肝虛。亦令人體重煩冤者。何也。蓋肝虛則不能勝土。土無風氣。亦必鬱熱上蒸而為病矣。然肝則重於煩冤。脾則重於腫重。腎則重於痿弱。不可不辨。

解併

尺脉緩濇。謂之解併。又云。腎脉太過則令入解併。腎氣鬱熱。精不運而解併。煩熱氣乏不欲言。此腎經虛熱有餘也。河間用利腎湯大謬。宜虎潛丸清燥湯之類。肥人夏月多此。皆溼熱為患也。

脫營失精

石頑曰嘗讀內經有脫營失精之病。方家罕言。近惟陳毓仁
癰疽圖形。僅見失營之名。究無方論主治。故粗工遇此。靡不
妄言作名。爲害不淺。夫脫營者。營氣內奪。五志之火煎迫爲
患。所以動輒煩冤喘促。五火交煽於內。經久始發於外。發則
堅硬如石。毓仁所謂初如痰核。久則漸大如石。破後無膿。惟
流血水。乃百死一生之證。是以不立方論。良有以也。其形著
也。或發膺乳腋脇。或發肘腕脛膝。各隨陰陽偏阻而聚。其
處久而不已。五氣留連。病有所并。則上下連屬。如流注然。不
可泥於毓仁之耳。前彼及項間。方目之爲失營也。以始發之
時。不赤不痛。見證甚微。是以病者畧不介意。逮至腫大硬痛。
蟄根錯節已極。豈待破後無膿。方爲百死一生之證哉。原夫

醫通卷之九

脫營

思得堂藏

脫營之病。靡不本之於鬱。若鬱於藏府。則爲癰隔等證。此不
在藏府。病從內生。與流注結核乳岩同源異派。推其主治。在
始萌可救之際。一以和營開結爲務。而開結全賴胃氣有權。
方能運行藥力。如益氣養營之製。專心久服。庶可望其向安。
設以攻堅解毒清火消痰爲事。必至腫破流血。津復外滲。至
此日進參耆。徒資淋瀝。其破敗之狀。有如榴子之裂於皮外。
連實之嵌於房中。與翻花齋形像無異。非若流注結核之潰
後尚可圍治。亦不似失精之筋脉痿痺也。詳脫營失精。經雖
並舉。而死生輕重懸殊。脫營由於營貴後賤。雖不中邪。精華
日脫。營既內亡。環外聚。補皆爲扼腕。良工無以易其情。
志也。失精由於先富後貧。雖不傷邪。身體日減。內雖凝結。外
無取聚。投劑畧無効驗。醫師得以施其令澤也。然二者之病。

總開情志。每每交加。而有同舟敵國。兩難分解之勢。故毓仁
以失營二字括之。惜乎但收其端。而肯綮示人之術。則隱而
不發。何怪粗工謬言爲道。妄用攻石。寧免五過四失之咎歟。

醫通卷之九

脫營失精

五十

思得堂藏

劉嘉言曰。夫人之身。陰陽相抱而不相離。是以百年有常。故陽欲上脫。陰下吸之。不能脫也。陰欲下脫。陽上吸之。不能脫也。卽病能非一。陰陽時有亢戰。旋必兩協其平。惟大醉大勞。亂其常度。使魂魄不能自主。精神上下離決矣。蓋上脫者。皆是思慮傷神。其人多汗。而如渥丹。妄見妄聞。如有神靈。閉目轉盼。覺身非己有。恍若離魂者。然下脫者。多緣房勞傷精。其入翕翕。少氣不能飲食。大便滑泄無度。小便清利倍常。或夢寐走泄。晝夜遺精。或精血弄脫。不能自主。復有上下俱脫者。良由上盛下虛。精華外脫。其入必嗜肥甘。好酒色。而體肥痰盛。往往有類中之虞。嘗見有壯歲無病。一笑而逝者。此上脫也。少年交合。一注而傾者。此下脫也。顛仆遺尿。喘鳴大汗者。

脫

五十一 思得堂藏

此上下俱脫也。治法要在未脫之先。尋其罅漏。臧固之。若不識病因。而搏搜以冀亡獲。雖日服人參。徒竭重資。究鮮實益。總不解陰陽離決之機。何藏使然。若能洞鑒隔垣。隨上下援救。使陰平陽秘。精神乃治。烏有暴脫之患乎。

石頑曰脫之一譚內經雖有精脫者耳。鑿氣脫者目不明難經又有風陽者見鬼。脫陰者目盲等說。咸非荀子所言之暴脫也。夫暴脫之患。每皆見於膏梁充飫之家。繫壺穀虞之輩。未之有也。其於百藝之中。惟鳴於醫者。殫心竭力以博虛聲。非他伎術。但勞形而神氣無傷之比。昔沉朗仲先生抱病赴高渡遊之招。歸即牖江而脫。兒科趙慈田。輕舟應鳴先項公之請。比及到岸。舟子呼之不應。脫然而逝。吳羽仁先生先予而侯如農姜公適予踵至。時方瘀血大下。氣亂脈喘。難以議。

與姑待平旦氣清之時診次庶無差誤握手言別切切囑予歸當謹察病機毋失氣宜訂期明晨早至共圖竭厥之治詰朝坐候吳子不至詢之姜使云是昨暮復過半塘坐脫肩輿之中因思所囑之言乃如仁人之用心直至形離神散而不自覺又安能於未脫之先尋嚀漏而爲緘固耶嗟予朽落一息僅存尚不能謝此顛勞因書以爲前車之鑒并爲同入保生之勸

醫通卷之九

肌

五十二

思得堂藏

過饒胃場

人賴水穀以生。水穀敷布。則五藏安和。水穀阻逆。則百病生。水穀廢絕。則性命傾危。以胃爲水穀之海。五藏之本也。是病邪糾結於胃。不能行出納之令者。切勿強與。以益病邪。以胃中邪熱蘊隆。痰食阻滯。故雖一句一氣不食。不足爲慮。非若無病之人。脾氣時時消磨。不可且晚。飲食也。故越人有平人不食水穀。七日則死之說。而最爲切禁者。傷寒之無汗。脈緊。爲寒傷營證。及汗不得出而煩躁之營衛俱病。其胃中營氣。爲寒邪所傷。既鬱遏而爲熱矣。若不奪其飲食。必轉助邪爲虐。爲害不淺。更有揮霍撩亂。胃氣反戾之證。誤進穀氣。腐不旋踵。至於自汗脈緩之風傷衛證。雖同感客邪。只傳經絡。不傳胃府。便無禁食之例。觀仲景桂枝湯後云。惡熱稀粥。醫通卷之九

過饒胃場

五三 思得堂藏

以助藥力。於此可見。不當槩爲禁止也。非特桂枝湯用熱稀粥。以助藥力也。卽寒傷營之尺中微弱者。用小建中。取膠飴之稼穡作甘。引桂枝之辛溫。留戀中焦。以助胃祛邪。卽是熱稀粥之變法。且釀去查滓。無質滯者。則不助邪熱。故寒傷營亦得用之。較熱稀粥之法。更進一層矣。仲景爲傷寒立法之祖。必無誕妄之言。欺誤後世之理。祇緣聖法久湮。故近世醫流。凡遇發熱頭痛。有似外感之類。無論病之虛實。證之表裏。熱之真假。槩以傷寒目之。必先禁止飲食。混與通套。疎風消煩之藥。在實壯氣。實人得之。雖未中病。稍借行表之勢。便可退身涼。安知胃氣有權者。感邪不深。雖不服藥。自能蒸發正汗。所謂壯者氣行則已也。苟元氣虛入。胃中津液本少。且復奪其飲食。藥雖中病。尚難作汗。况堪恣行表藥。重傷本虛

之胃氣乎。曷知脾胃之氣。全賴水穀資其轉運。與車輪運水不異。今以既病垂絕之胃。尚欲俟其胸膈開爽。始進穀食。猶埋輪旱麓。待水漲而後厚之。則苗之不槁也。幾希矣。縱使倖不死。元氣削伐。逮盡少年者。日漸尪羸。多成虛損。高年者。暗損元神。促其天年。皆由習俗好用攻伐。不顧正氣所致。蓋病之有發熱頭痛者。未必盡爲傷寒。假如內傷勞倦。陰虛火炎。藥以傷寒法治之。是速其夭札也。予素擅傷寒專科。六十年來。目擊誤奪飲食。至劇致斃者。未遑枚舉。嘗見餓久之人。脾氣不運。雖經旬累月。愈不思食。庸工不知。以爲尚有宿食。猛進寬胸破氣之藥。每每激其虛陽。上浮外泛。而致頭面不時烘熱。醫者復認表邪未盡。重與發散。硝黃柴葛枳橘之屬。恣無忌憚。不死不已。亦有腸胃久絕。穀氣大便枯竭不行。而欲

醫通卷之九

過饒胃場

五三 思得堂藏

妄議攻下者。此胃氣虛極。無論攻伐之藥。不能勝任。卽調補藥亦難勝任。但當頻與粥湯。微助胃氣。以俟津回。庶或可救。而餓久之人。粥食到口。雖極甘美。然多有食下作嘔者。或食下少頃作酸者。或腸間迷迷不爽者。或腹中隱隱作痛者。或腸中響響不已者。此皆三脫閉約。痰氣阻礙之故。病家不明此理。往往惑於師巫。及親朋左右之言。猶豫不敢進食。因循日久。終成不救者多矣。曷知胃氣久虛之人。卽有不時間熱。非助以穀氣。則虛火不除。則有胸膈痞滿。非助以穀氣。則大氣不運。卽有大便秘結。非助以穀氣。則津液不回。蓋新穀氣運。則宿滯始能下通。若能認定關頭。頻與稀糜。俟胃氣稍復。漸以獨參保元四君異功之類。調之。如此而獲保全者。亦頗不少。但不可猛進強進。及添水復熱者。擔塞一時。重傷衰竭

二月氣及歸咎於調治也。經云：藥入胃，則虛者活。所以往往令其勿藥，以收十全之功耳。

飛時治一婦，嘔惡胸滿身熱，六脈弦數無力，形色倦怠，渴不甚飲。云自遊虎丘，暈船吐後，汗出發熱，頭痛，服發散四劑，頭痛雖緩，但腹暈不食，復用消導三四劑，胸膈愈悶，嘔氣則嘔，因熱不退，醫禁粥食已半月。惟日飲清茶三四碗。今周身骨肉楚痛，轉側眩暈，嘔噦不已。當風嘔汗，外感有之，已經發散矣。吐則飲食已去，胃氣從逆，消劑則更傷脾氣，脾虛故腹甚，余無外感，可散無飲食，可消，脾絕氣，則嘔止。受水則暈，即使用藥，亦無胃氣行其藥力。惟與未飲，潑進稀糜，使脾胃有主，更議補益可也。因確守予言，竟不藥而愈。

藥蟲

藥之治病，不得已也。古人以不服藥為中醫，厥有自哉。嘗聞古聖垂誨，靡不反覆詳慎，至立方之下，每云中病即止，不必盡劑。其鄭重有如此者。近世豐裕之家，畧有小病，即從事於醫藥。元氣堅固者，無論治之中效與否，但得開通病氣，元神自復。若稟質素弱，及病後產後，亡血脫瀉之後，不能即愈，日以湯藥為務，多致輕者重，而重者劇。病氣日增，飲食日減，以致寒熱欬嗽，吐痰吐血，諸證百出，而猶以為藥力未逮，邪熱未除。日以清火消痰為務，遂成藥蠱之病矣。夫人之胃氣全賴水穀滋養，胃氣旺則諸病不生。縱有賊邪侵犯，氣復自己，原無急於調治也。嘗見世人不得盡其天年者，大都皆醫藥之誤耳。今既病之胃，轉為藥力所侵，不至四大分崩不已，未

流之挽。雖日事參苓耆朮，如以漏卮承漿，漫無盈滿之期，況堪克任偏勝性味乎。凡虛羸之疾，治之不能即應，當暫為休息，以俟胃氣之復。不特藥蠱為然也，其藥蠱之患有三：一者胃氣為藥所汨，飲食不為肌膚，而骨不支床；一者藥毒流於攻陷，少火不能內藏，而煩蒸髓極；一者脾傷不能散精，藏氣固結不舒，而羸瘦腹大。雖有脾胃之分，所重全在胃氣。胃為五藏之本也。此惟膏粱養者有之，在黎藿勞動之人，未之見也。其治藥蠱之病，當屏絕一切苦寒降泄辛熱升發氣味濃烈之藥，祇宜小劑參耆，甘溫養胃之品，庶為合宜。如獨參保元之類，以圖陽生陰長之功。若虛火僭逆，稍加秋石以引參耆之力，入於陰分，為止逆下氣之首藥，無寒涼傷胃，奪食作瀉之虞。若嘔然自汗不止，當歸補血六味地黃少少與之。

一為血虛發熱。一為陰虛發熱之專劑。勿以迂緩而忽之。貪功而妄行雜治。則與抱薪救焚不殊也。況有中氣公。德畏食泄瀉。或下利膿血。無論寒熱。補劑即獨參理中。必增煩劇。即宜屏除藥石。但血稀。發其胃氣。次以補其氣血。五穀為養。五肉為助。未嘗不為漸收要旨也。當知安穀者昌。安穀者過期。未開服藥。得以長生也。操司命之權者。何不思之甚耶。

臭毒

臭毒俗名發沙。皆由中氣素虧之故。蓋脾胃之所喜者香燥。惡者臭溼。今脾胃真氣有虧。或素多溼鬱。所以不能主持。臭惡之氣。得以直犯無禁。發則腹痛。不能飲食。或上連頭。俱痛。或下連腿及委中。俱痛。甚至有欲吐不吐。欲瀉不瀉。四肢厥逆。面青脉伏。或通體壯熱。面紫脉堅。此平昔火衰。盛之別也。有瀉死不知人。少間復蘇者。有腹痛不時上攻。水漿不入。數日不已者。欲試真否。但與生黃豆嚼之。覺香甜者。即是臭毒。覺腥者非也。舉世有用水搭肩背及臂者。有以草麻水溼刮之者。有以磁碗油潤刮之者。有以磁鋒鍼刺委中出血者。有以油紙點照。視背上有紅點處皆路之者。總欲使瘰理開通之意。又有以冷水嚙椒數十粒者。有以白礬生

研冷水調服二三錢者。然椒性辛散。誤餌無妨。礬性酸澀。苟非臭毒。為禍不淺。多有誤認食積。屢攻不愈。綿延十日半月而死者。常見有大飲冷水而變下痢者。亦有飲水停於肺中。而變水腫者。有誤服熱水。呃逆嘔噦不止者。有刺委中去血過多。移時而死者。亦有傷寒陰證腹痛。誤刺委中。及飲冷水而致不救者。又有內傷冷食腹痛。誤刺委中而致轉劇者。誠可憫也。按此腹痛。乃陰邪穢氣。鬱遏脾胃中伏火。兩邪相擊。而致每苦時常發。藥之不應。古法有初得病時。飲以艾湯。試吐。即是此證。有以蠶退紙泡湯飲之。溫覆取汗。蓋蠶性幣。痰祛風利。飲其紙已。經鹽過。而順下最速也。余嘗謂此證。既屬中土氣衰。穢氣內厥。便常用利氣藥。以散穢濁之氣。合用一味香附。並便浸晒為末。停湯頓服四五錢。立効。或越鞠丸。

沉香降氣散亦佳。又脾虛挾火。兼犯穢氣。則心腹擾痛。上下不通。俗謂之乾霍亂。近世謂之絞腸痧。以穢氣在外。固結不散。火邪在內。攻擊不開。故為證最急。急以鹽置刀頭燒紅。泮水中。攪勻。灌下。以升提鬱閉之氣。然後以藿香正氣散。放溫與之。曾見有熱服湯藥而斃者。有服玉樞丹。蘇合香丸。而愈者。然不若鹽湯和童便為最。點取砂亦佳。但凡臭惡腹痛。脈或伏。或細。小緊。或堅。勁。搏。指。中。而帶促結。皆是陰逆陽伏之象。不可誤。誤陰寒而投熱藥。致動其火。為害不可勝言。非但熱藥當禁。即砂仁辛溫。香薷生薑辛熱。上升氣。酒辛烈助火。皆當忌之。熱湯亦切勿與。熱浴尤為大忌。熱則上衝。莫制也。若見面青唇黑。脈勁搏指。厥逆喘促者。多不可救也。

番沙

昔方者。從無沙證之名。惟觸犯臭穢。而腹痛嘔逆。世俗以磁器煎油。刮其脊上。隨發紅斑者。謂之曰沙。甚則欲吐不出。欲瀉不瀉。乾嘔絞痛者。曰絞腸痧。近時有感冒惡毒異氣。而驟發黑沙。俗名番沙。卒然昏倒。腹面色黑。脈不呼。不叫。如不醫治。兩三時即斃。有微發寒熱。腹痛麻背。嘔惡神昏者。或戰汗出。或隱隱發斑。此毒邪熾發於表也。亦有發即瀉利厥逆。腹脹無脈者。此毒邪內伏。不能外發也。所患最暴。多有不及見斑而斃者。經謂大氣入於藏府。雖不病而卒死是也。初覺先將紙捻。點於額額。即以蕎麥焙燥。去殼。取末三錢。溫湯調服。重者少頃再服。即安。蓋蕎麥能鍊腸胃津液。降氣寬胸。而治瀉滯。為沙毒之禱藥。但服過蕎麥者。後患別病。藥中有

綠變者。切勿犯之。其毒甚而黑者。急於兩膝後委中穴。灸出黑血。以泄毒邪。蓋驟發之病。勿慮其虛。非此惡毒。束手待斃。以此病起於漠北。流入中原。故以番沙月之。原夫此病。與瘴癘相似。瘴則廣冒山嵐瘴氣。此則觸冒惡毒異氣。與時行疫癘不殊。但時行則沿門問境。傳染此則一人染感。死於一日。半日之間。不似時行之可以遷延數日也。又此病與傷寒之伏氣相似。伏氣發為熱毒。自裏達表。此則一身發為臭穢。無分表裏。藏府亦不似中寒明證。太虛不勝寒毒之暴也。又此病與瘧疾相似。瘧疾相。霍亂是客來與本氣之氣相併。此則正氣暴逆。不能與邪相立也。又此病與關格相似。關格是上下不通。病純屬裏。此則兼有在沙表證也。大畧與臭毒相類。然臭毒所觸穢氣。此則觸冒惡毒較之疫癘尤劇。初起昏憤不

省脈多沈匿不顯。或渾渾不清。勿以腹痛足冷。而與溫藥。荷藜麥一時難得。或服之不應。即宜理氣為先。如香蘇散加薄荷。荆芥。辛涼透表。次則辟邪為要。梔子鼓湯加牛蒡生甘草。解毒安中。表熱勢甚。清熱為急。黃芩湯加連翹。木通。分利陰陽。如見煩擾腹脹。脈來數疾。急投涼膈散。如局方以竹葉湯。生薑則毒從下奪。熱劇神昏。離合三黃。多不可救。煩渴引飲。遺尿。速清陽明。白虎湯加葛根。或使毒從表化。以上諸法。在未經誤藥。庶可挽回一二。若病家疑信未真。慎毋輕治。脫或變生反掌。取咎未便。曾見一商。初到吳會。暢飲酣歌。席間霎時不安。索生薑湯一啜而逝。又有朔客到楓。覓混澡浴。忽然眩暈。嘔逆。到舟卽斃。繼有醫者。飯後寒熱腹痛。手足逆冷。不終夕而告殂。更有文學。鄉居到郡作吏。歸卽腹痛。坐立不寧。語言不次。然見客猶能勉力作揖。診之。六脈模糊。是夜卽便捐館。邇來卒患腹痛死者。比比皆然。雖無斑現。靡不謂之香沙。近有年少新婚。陡然腹痛麻脊。或令飲火酒半甌。而腹痛轉劇。旋增顛脹。身發紅點。與蕨根汁得吐。通解。復有鼻衄口燥。胸腹畧見紅斑。噤童子小便稍寧。醫與葱白香豉濃煎。仍入童便。續續與之。得大吐汗出而痊。若斑點淡赤。毒在血分者。濃煎羌活。少投生薑。放風恣服。取効最捷。以其專下惡血也。或加生萊菔汁半杯。總取散血之功。且有誤認傷寒。而與發散。周身嫩紫如雲而死者。亦有誤認麻疹。而與檉柳櫻桃核湯。咽痛失音而死者。況有停食感冒。誤認香沙。而與寒涼解毒。反減去衣被。不慎風寒。煩熱躁擾而死者。以其卒犯惡毒。異氣。無以脈診。故辨治尤難。是以近世多用火燂砭刺之法。

須知因感惡毒異氣而致者。此屬外因。火燂為當。因觸臭毒。穢氣而致者。屬不內外因。非砭刺不足以奪其勢。然刺之無血。不可救也。

嶺南瘴毒

嶺南炎方。濱海地卑。土薄。故陽氣常泄。陰氣常虧。四時放花。冬無霜雪。一歲之間。暑熱過半。窮臘久晴。或至淫扇。人居其間。氣多上壅。膚多汗出。腠理不密。蓋陽不返本而然也。陽熾既泄。則使人本氣不堅。陽不下降。常浮而上。氣浮而不堅。則汗府開疎。津液易泄。故內寒外熱。上熱下寒之證。所由生也。治當固陽氣。實腠理。為主。若多用表散之藥。則陽氣愈虛。風邪益盛。鮮有不誤者矣。確係外邪為患。則當若木苓連湯解散之。○春秋時月。人感山嵐瘴霧之氣。發寒熱。胸膈飽悶。不思飲食。此毒氣從鼻口入內也。治當清上焦。解內毒。行氣降痰。不宜發汗。若木苓連湯。頭痛甚者。去木通黃連。加藜蘆。本葱。或若寒濕失節。汗身坦露。感冒風寒之氣。氣閉發熱。頭痛。此

醫通卷之九

嶺南瘴毒

空

思得堂藏

則傷寒類也。但嶺南氣溫易汗。故多類瘧。南方氣升。得此病者。卒皆胸滿。痰涎壅塞。飲食不進。與北方傷寒只傷表。而裏自和者不同。治當解表清熱。降氣行痰。若木羌活湯。若內停飲食。外感風寒者。霍香正氣散。若脾氣虛弱。而寒熱作嘔。平胃散加半夏木香。名不換金正氣散。○瘧瘵寒熱往來者。若木柴胡湯。瘵久者。加人參當歸。汗多者。去蒼朮。易白朮。加白芍。○大凡病久而氣虛血弱者。必發熱。須用四君之類。調補脾胃。脾胃一健。氣血自生。若認爲血虛。而用四物沉陰之劑。則脾土復傷。諸藏皆病。虛證蜂起。反爲難治。甚至不救。○瘵後變成痼。宜從虛治。補中益氣湯。有熱加蒼朮。有食加木香。砂仁。若溫暑之月。民病天行溫疫熱病。治宜清熱解毒之劑。蒼朮白虎湯。加入人中黃。○若時氣發熱。變爲黃病。所謂癰黃

也。治宜清熱利溼。茵陳五苓。加入人中黃連。○若中氣虛寒。四肢厥冷。或浮腫黑黃者。用理中湯加茵陳桂苓。

飛鸞曰。粵西方交趾一帶。皆雞之屬。俱煮湯殺去。更煮食之。其米亦然。且不能多食。稍過則腹悶。總由毒氣漸積所致。其日出時。有氣如蘭香。日中時有氣如茉莉香。日沒時有氣如炊新米香。如此。每日三氣。急掩口鼻。勿語。言以避之。其劑之者。寒熱如瘧。三四日死。元氣稍旺者。數日死。當此急服藿香正氣散。若木羌活湯。猶可救之。予感官其地。不三月而只存一口。乃元氣充裕者。然亦病幾於危。故仕任及客遊其處者。切須知之。否則無不蒙其害者矣。

中務氣者。心內煩悶。少氣。頭痛項急。起則頭眩。或身微寒。戰掉不安。時復增寒。心中欲吐。乾嘔無物。此清陽之位受濁陰

醫通卷之九

嶺南瘴毒

空

思得堂藏

之邪氣也。不可耗氣傷津。梔子鼓湯加葱白漏散之。頭痛甚。加藜蘆。煩悶加木香。藿香之類。謬仲淳經疏。只用藜蘆。木香。水煎服。大抵蒸發之邪。必中在上在表。故宜瀉之。總無關於藏府也。

蟲

蟲由少陽風木。淫熱鬱蒸而成。觀日中有雨。則禾節生蟲。人患蟲積。多因饑飽失宜。中脘氣虛。淫熱失運。故生諸蟲。小兒最多。大人間有。其候心嘈腹痛。嘔吐涎沫。面色痿黃。眼腫鼻下有黑。嗜食米紙茶葉泥炭之類。沉沉默默欲眠。微有寒熱。治宜隨證用方。如心腹中痛。上下往來。發作有休。時喜涎出者。蟲也。烏梅丸。胃脘受痛。發歇有時。痛發則吐涎沫。金匱九痛丸。狐疑善惑者。妙功丸。噎膈嘔吐者。剪紅丸。肚腹常熱者。化蟲丸。四肢常冷者。集効丸。腹中蟲積。萬應丸。隔上痰淫。蟲積。遇仙丹。穀道生瘡。蟲蝕瘻痛。膠艾指歸湯。外用雄黃。兌法。隨證取用。無不立應也。千金方用猪膽一枚。苦酒半升。和之火煎。令沸。三上三下。藥成。放溫。空腹飲三滿口。蟲死便愈。治

醫通卷之九

蟲

五

思得堂藏

疏攻心痛神應

仁齋云。血入於酒。則為酒瘰。血凝於氣。則為氣瘰。敗血雜痰。則為血瘰。掉頭掉尾。上侵胃脘。食人脂膜。或附脇背。或隱胸腹。惟無與炒煎服之。然必兼養胃益血理中。乃可殺之。若徒用雷丸錫灰。不能去也。

治蟲之藥。必在夏月。龍蛇起陸之時。服之方易奏功。若在萬類蟄藏之際。雖有合劑。不能取効也。丹溪以上半月。蟲頭向上。易治。當以上半日為是。先以糖蜜肉汁香甜物引起。後用殺蟲藥。然須為散。以渣滓可入蟲口也。痔漏中蟲蝕下部。肛蓋穿腸者。取鼠屎青背者一枚。入蘆薈一錢。用生雄雞脰骨二莖。入蒲離黃並用鹽泥固濟。燒存性。合和為散。入麝香。研砂各少許。再研極細。先以猪蹄甲三枚。胡葱七莖。煎湯日

洗。紙撚裏乾。吹下部孔內。令潑入。外以黑膏蓋之。日吹一次。以管盡為度。如或希奇怪病。除痰血。外百治不効者。即是蟲為患。視其經絡虛實。參脈證消息治之。○蟲在肝。令人恐怖。眼中赤壅。在心。心煩發躁。在脾。勞熱四肢腫急。在肺。欬嗽氣喘。醫者不察。謬指凡動屬火。屬痰。寒涼轉傷脾胃。卒至夭枉。自非垣視一方者。烏能辨哉。婦人陰蝕之蟲。詳婦人本門。石頑曰。蟲之怪證多端。遇之卒不能辨。昔人治例。有雷丸治應聲蟲之說。近有女子。致逆腹痛後。忽喜呼叫。初時呀唧連聲。漸至呶呶不已。變易不常。或如母雞聲。或如水蛙鳴。或如舟人打號。每作數十聲。日發十餘次。忍之則胸中悶悶不安。此為叫蟲。即應聲蟲之類也。復有一人。患發熱痞滿後。常兀兀欲吐。吐中必有蟲數枚。狀如蝦形。跳躍不已。諸治不應。或

醫通卷之九

蟲

五

思得堂藏

令服銅絲涌之。不過二三度。遂絕不復見矣。

蠱毒 射工溪毒 中諸毒

南粵蠱毒有數種。曰蛇毒。蜥蜴毒。蜈蚣毒。蟻毒。金蠱等毒。皆是變亂元氣。人有過造作之者。即謂之蠱也。多於飲食內行之。與人禍患。禍患於他。則謂之蠱。所以人畜事之中。其毒者。心腹絞痛。如有物刺。或吐血。皆如爛肉。或好臥闇室。不欲光明。或心性失常。乍喜乍怒。或四肢沉重。百節痠疼。或乍寒乍熱。身體習習而痺。胸中滿悶。或頭目痛。或吐逆不定。或面目青黃。甚者十指俱黑。診其脈。緩大而散。皆其候也。然其毒有緩有急。急者倉卒。或數日便死。緩者延引歲月。奔走腸內。蝕五藏盡則死。其死時皆從九孔中。或於腸下肉中出。所以出門。須帶雄黃。麝香。丹砂。辟惡之藥。即百蠱狐狸老物精魅不敢著人。彼處之人。亦有多法。初中蠱毒。即於心下

醫通卷之九

蠱毒

恩得堂藏

捺定。便大性。又炙百壯。又於足小指尖上。灸三壯。當有物出。酒上得者。有酒出。飯上得者。有飯出。肉菜上得者。有肉菜出。即愈。皆於灸上出。欲驗之法。當令病人睡。水沈者是蠱。不沈者非蠱也。初覺中蠱。冠服玉樞丹。或吐或利。隨服便痊。○南方有蠱毒之鄉。於他人家飲食。即以犀角攪之。白沫起。即為有毒。無沫者。即無毒也。凡嶺南蠱毒之鄉。卒患血痢。或赤或黑。無問多少。皆是蠱毒。或獨身腫滿。四肢如故。小便不甚瀉。相醫不察。誤作瀉治水治。日復增加。奄至殞歿。當知蠱主姓名。使之呼。欲知之法。以敗鼓皮燒作末。飲服方寸匙。須臾自呼蠱主姓名。令其解散自愈。又有以蛇涎合作蠱藥。飲食中使人得此。痼疾生大。豆末酒漬絞汁服半觔。○凡初中蠱。在膈者。歸魂散吐之。已下膈者。雄珠丸下之。一切蠱毒。

心腹脹滿。不得喘息。或下利膿血。大乙追命丹。香薷病丸。救之。吐利後。惟覺後心刺痛拘急。咽中如刺者。此是取利後氣乏故也。更不須再服吐利藥。但用一味苦梗為散。每服三錢。米飲調下。日三服。多服自然平復。使每日漸消散。不致再發。○丹方用蠍皮燒灰。桃根皮煎湯。服方寸匙。蠱便出。又方用苦瓠一枚。苦酒二升。或水煮一升。服之。當下蠱毒。及一切蠱毒。蠱斗之狀。一月後乃盡。

射工溪毒。孫真人曰。南方有射工。一名短狐。溪毒。一名蟻。形如甲蟲。無目利耳。有一長角。在口前如弩。以氣為矢。因水勢以射人。人或聞其水中鏗鏘作聲。要須得水沒其口。便以口中毒射入。此蟲畏薑。驚能食之。其初見證。有似傷寒。先惡寒。寒熱筋急。亦如中風。便口噤不能語。朝酥暮劇。寒熱

醫通卷之九

射工溪毒

恩得堂藏

悶亂是其證也。如得三四日。意以五香散治之。稍遲者七日。死。射著人影者。不即作瘡。先病寒熱。自非其地之人。不知其證。便謂傷寒。每多誤治。中人頭面尤急。腰已上去。入心近多死。腰已下稍緩。不治亦死。

孫真人云。凡山水有毒。蟲入涉水之時。中入。似射工而無物。其初得之。惡寒微頭痛。日既疼。心中煩懊。四肢振慄。腰背百節皆痛。兩膝痛。或翕翕而熱。但欲眠。睡且醒。喜劇手足逆冷。至肘膝。二三日腹中生蠱。蝕入下部。膈中生瘡。不痛不癢。令人不覺。不急治之。過六七日。下部生瘡。蝕入五藏。熱盛毒煩。下利不禁。八九日良醫不能治矣。其毒有陰陽之異。覺得之。意視其下部。若有瘡正赤。如截肉者。為陽毒。最急。瘡如鯉魚齒者。為陰毒。稍緩。要皆殺人。不過二十日也。欲知是水

毒與非者。當以小蒜五升。投湯中。浴之。是水毒。身體必發赤。斑。服解毒水。飲子。多磨生犀汁。調服。東南郡縣山谷溪源。有水毒病。亦名溪瘧。亦有陰陽之辨。狀洪大而數者為陽。先宜發汗及浴。脈沉細而遲者為陰。急當致裏。凡解湖水毒。生犀角磨水。調雄黃末二三錢。頻以麻油灌之。稍久則用牽牛。大黃雄黃蜈蚣蛇蝎梢末。等生湯。羊血調灌之。欲審是中水毒者。手足指必冷。若不冷者非也。

中諸毒。○一切毒中。雖各因氣味而歸諸藏府。然必胃先受之。而後流及其藏也。金匱云。凡煮藥飲汁以解毒者。雖云救急不可熱飲。諸毒病得熱更甚。宜冷飲之。食自死六畜肉中。毒燒大尿。酒服方寸匕。或大豆煮汁飲數升。或水浸豆豉。絞汁旋飲之。食馬肝中毒。以雄鼠屎二七粒為末。水和日再服。

醫通卷之九 中諸毒 辛 思得堂藏

食馬肉中毒。血洞下欲死。以香豉杏仁為散服之。或煮蘆根汁飲之。食牛肉中毒。狼牙燒灰取方寸匕水服之。食犬肉不消。堅滿腹脹。大渴如狂。以杏仁一升。合皮研煮。分溫三服。利下肉片大驗。食漏脯中毒。搗生韭汁服之。生大豆汁亦得。凡肉在器中。密蓋不泄氣者。謂之蠹肉。食之傷人。燒狗屎末方寸匕。水調服之。食毒箭射死鳥獸中毒。以大豆煮汁及鹽服之。食魚中毒。而腫煩亂。搗皮煮汁。停冷服之。食鱸多不消。結為癥病。厚朴大黃煮汁服之。或馬鞭草一味。搗汁飲之。或薑搗汁飲之。食鯢鮓中毒。以蘆根煮汁服之。食蟹中毒。以冬瓜汁服之。或紫蘇煮汁。以食諸果中毒。以猪骨燒灰服之。食諸菌中毒。及食楓樹上菌而笑不止。入薑汁飲之。土漿亦可。或磨生大豆吐之。釣吻與芥菜相似。誤食殺人。以薤白煮汁服

之。又甘草煮汁飲之。通除諸毒藥。○中石藥毒。白鴨屎人乳解之。中雄黃毒。防已解之。○中砒毒者。煩躁如狂。心腹攪痛。欲吐不吐。羊血不拘多少。灌之。或清油黃清亦可。切戒與酒火酒尤忌。○中巴豆毒者。其人大瀉。或吐瀉。急以黃連煎湯。或甘草湯冷飲。有卒權飲冷水亦好。忌食熱物。并熱性藥物。○中蠶蜚荒青毒者。吐逆不止。急煎萊豆湯。或黑豆湯。溫服。猪膏地漿葵子汁並解之。○中大黃毒者。泄瀉不止。腹中寒痛。先用薑湯熱飲。次以理中湯理胃。往寒。○中大戟毒。苦痛解之。○中甘遂毒。大豆煮汁服之。○中半夏南星毒者。其入喉間麻痺。急用薑汁細呷。并飲甘草湯。○中藟藟毒。梔子煮汁服之。○中野羊毒。地漿人糞汁解之。○中杏仁毒。藍汁解之。○中芫花毒。防已防風甘草桂枝汁解之。○中野葛毒。地

醫通卷之九 中諸毒 辛 思得堂藏

漿解之。○中藜蘆毒。葱湯下咽便愈。○中射罔毒。藍汁大小豆汁。生羊血並解之。○中蜀椒毒。人尿地漿冷水並解之。○中莨菪毒。甘草藍汁解之。○中川烏附子毒者。必煩悶。脣裂血流。頭重如斗。急與生萊菔汁解之。童便亦可。次煎黃豆黑豆湯。二三沸。即與冷服。然不若甘草湯。入腹即定。誤服伏火丹砂中毒。則毒歸心藏。其舌灰黑。服大慈宜童子小便飲之。次以金汁。及人中黃解之。或濃煮黑豆汁解之。或搗生菜豆汁解之。或生羊血。或磨犀角水並解之。○服風藥多汗。悶亂不醒。先以醋湯灌之。次煎甘草湯。同薑汁頓服。○夏秋間誤食停宿之物。中有蜈蚣蛇蟲等毒。則心腹膨悶。雄黃磨水細飲。玉樞丹磨服亦効。○蜀椒閉口者有毒。誤食戟人咽喉。氣欲絕。急以地漿水解之。○六畜肝藏常有毒。驢馬更甚。自死

者尤毒。用豆豉以水浸。故取汁旋飲之。○馬醫入及踰入毒腫熱痛作瘡。馬鞭指鼠屎燒灰。指膏塗之。○馬醫入陰。卵脫出。急令推入。桑皮線縫。研生烏雞肝塗上。欲小便忍之。○牛馬醫入及馬骨刺傷人。瀉灰淋汁熱漬。敷易汁勿令瘡爛。○馬血入瘡中。婦人月水。或人鼻塗之。○刺死馬。當傷人毒攻欲死。便取馬腸中屎塗之。○中河豚魚毒。急取蘆根搗汁服之。輕則清油多灌。便毒物盡吐出。亦須迴時而愈。或橄欖搗自然汁。甚則煮清灌之。○食鹽中毒。乾薑山查煮汁飲之。誤食蛇穴中蟹膽。令人頭旋目眩。腹痛而死。急磨玉振丹救之。凡蟹重一觔外者。大毒。食之殺入。○誤吞蜈蚣。胸腹絞痛。先飲生雞血。須臾以清油灌吐。其蜈蚣後在血中。同出。繼以雄黃細研水調服。○誤吞水蛭。生雞血調黃土丸服自下。或以

醫通卷之九

中諸毒

主

思得堂藏

藥對解法

凡藥相對者。誤服以防解救諸法。附列於左。
鍾乳對水。其治主肺。上通頭胸。水動鍾乳。胸塞短氣。鍾乳動水。頭痛目疼。又鍾乳雖不對海蛤。海蛤能動鍾乳。然鍾乳與水為患。不過此也。發動之始。體中有異。與上患相應。速宜服葱白香豉甘草吳茱萸湯解之。繞服便令人按摩。搖動口中嚼物。然後仰臥。發汗。汗出去。復服湯熱飲。即用冷海飯壓之。若服不解。復用面湯去黃。如桂若已解。肺家尚有餘熱。第二方加麥門冬。

硫黃對防風。又對細辛。其治主脾胃。通主腰。防風動硫黃。熱脚疼。腰痛。或喉念無常。或下痢不禁。防風細辛能動硫黃。硫黃不能動彼。始覺發。便宜服杜仲枳實甘草香豉梔子李核仁。服如上法。不解。復服大麥奴甘草人參芒硝桂心麥門冬。若服此已解。猶有餘熱。或冷。復服人參乾薑附子甘草當歸。

白石英對附子。其治主胃。通主脾胃。附子動白石英。煩熱腹脹。白石英動附子。嘔逆不得食。或口噤不開。或手足疼痛。始覺宜服麥門冬甘草麻黃香豉。不解。再服大黃香豉梔子甘草。服如上法。頻服湯下。便止。不下。再服。若熱勢未除。而渴復服。括囊根大麥奴甘草香豉。若已解。胃中有餘熱。復服芒硝桂心通草甘草白朮大棗李核仁。

醫通卷之九

藥對解法

主

思得堂藏

紫石英對人參。其治主心肝。通主腰脚。人參動紫石英。心忌而痛。或驚悸不得眠。即恍惚忘悞。失性發狂。乍寒乍熱。耳聾目暗。始覺宜服人參白朮甘草桂心細辛香豉。服如上法。若真盛。加大黃黃芩梔子。若忘悞狂發未除。復服葱白香豉麥門冬甘草人參。服如上法。溫覆。使身稍汗。便解。若有餘熱。更服人參防風桂心白朮生薑。
赤石脂對桔梗。其治主心。通主胸背。桔梗動赤石脂。心驚寒禁。手足逆冷。心中煩悶。赤石脂動桔梗。頭痛目赤。身熱壯熱。始覺發。便宜溫酒飲之。須酒勢行。則解。或大麥炒令汗出。勿焦。搗篩細末。冷水和服。
礞石無所偏對。其治主胃。發則令人心惡口燥。骨節強痛。生瘡。始覺發。即服葱白香豉甘草湯。若發身熱。即便生瘡。宜服

麥門冬人參甘草桂心葱白香豉

附子對白石英亦對赤石脂附子發則嘔逆脚疼體強骨節

痛面腫發則飲酒服熱麪自愈與白石英同解

赤石脂紫石英發宜飲酒得酒則解凡藥發或有宜飲熱酒

不可一藥也已上解救藥對八則出千金方

金太傅孫古修誤服伏火丹砂中藥誤治於石頭察其本

元素虧近因虛火上炎舌下腫脹延及兩頤醫用苦寒清

熱太過神思不寧藥中每服加升砂五錢甫進一劑覺胸

中有物觸者數次次早請政於醫復出丹砂視之色黑而

晦丹爐中伏火砂也醫令易砂更服四劑晝夜煩躁不寧

背時洒浙惡寒頭面烘熱大汗脛膝逆冷如冰忽忽氣逆

欲絕醫目睨無措乃延石頭診之六脈瀉數模糊次陰肩

醫通卷之九

醫對解法

主思得堂藏

舌俱色如汚泥而腫厚溼滑若係熱極似陰必無溼滑之

理若係寒犯三陰必無反厚之理惟酒食內蘊微帶色現

有之審其二便調適胸腹柔和決無實停胃府之理證雖

危疑而懸致最切以脈合證詢為陰受熱鬱今所最急者

恐其喘汗欲脫不獲已以生脈六味合劑庶幾金水相生

以救肺腎之垂絕進一服神思稍安自汗稍斂再一服入

事稍知稀康稍進方能畧述從前所患之病出從前所用

之方猶未言及伏火砂也見其舌沿稍轉微紅而氣微足

冷如故於前方中益入桂心五分五味數粒服後足稍溫

和氣稍接續語稍有次方詳述伏火丹砂之誤因以前方

減去地黃桂心五味易入棗仁秋石人中黃諸解丹砂之

毒三服舌轉微紅雖未鮮潔而伏毒漸解緣兩尺弦細乃

去入中黃仍用地黃以填補下元數日之間或去入中黃

而用地黃或去地黃而用人中黃隨脈證而更迭出入二

味不兼用者恐入中黃味甘戀膈載地黃之賦不能速達

下焦也下元雖虧調補藥中罕用鹿茸河車不敢用桂附

者慮其鼓舞丹砂之餘烈也

醫通卷之九

中華詩

主

思得堂藏

急救治例

自縊

凡救自縊死者。急須按定其心。勿截繩。抱起。徐徐解之。心下尚溫者。令人以口接氣入其腹內。無令氣泄。再令兩人吹其兩耳。半日許。纔者意。即勿吹也。

熱喘

取道上熱土。壅心中。少冷即易。氣通止。切勿與水。得冷即死。餘見暑門。

溺水

以甕灰布地。令厚半尺許。以甕或木凳。將溺死人。伏卧其上。使頭小垂下。炒鹽二方寸匙。內竹管中。吹下孔中。當吐水。水下去。既下溺死者。著暖灰壅身。使出鼻口即活。如灰淨。暖灰下。

醫通卷之九

急救治例

五

思得堂藏

易之。又法。但埋溺死者於暖灰中。頭足俱掩。惟開七孔。又法。屈兩脚。若生人肩。上以背向背。負持行走。吐出水便活。又冬月溺水凍死。以暖灰囊薄心。上冷即易之。心暖氣通。目轉。可與溫飲。稍稍吞之。若不先溫其心。便持火烘。冷氣與火爭。即死。

凍死

令人以熱體暖。暖被覆之。勿著火烘。即死。卒中寒肢體厥冷。四逆理中救之。

火燒

凡火燒損。順勿以冷水洗之。得令火毒更深入骨。初被火。急向火更炙。雖大痛忍之。須臾乃止。火燒悶絕。不識人。以尿乘熱飲之。和蜜亦佳。口紫按開與之。後用托子白蘇黃芩各

五兩。以水五升。油一合煎去滓。待微溫。令潰傷處去火毒。則肌得寬。或急以火酒浸之。其痛立止。醇酒亦佳。一切火燒湯

發用。隨甲燒灰。研極細。羅淨香油調傅。其痛亦止。或用水中

溺死。鼠一枚。以臘月猪膏煎令消盡。傅之。乾即再傅。與油浸

小鼠無異。或柏白皮細切。以猪膏煎四五沸。色變去滓。傅之

若以成爛瘡者。未楊梅皮。糝之即瘳。湯火所損。晝夜啼呼

不止。用松脂細研。和蠟熔化。再加猪膏半脂塗之。○金瘡箭

頭在肉中。用白歛生半夏為散。酒下方寸匙。日三服。瘡淺十

日出。瘡深二十日出。外以蛇蟬生搗塗患上。如無蛇蟬。以括

葉搗塗。荷葉上即出。不出。搗鼠肝塗之。○中射。閉諸毒。昏迷

腫疼。取藍子五合。升麻王不留行甘草各三兩。為散。水服三

方寸。日三夜二服。又以水和塗瘡。乾即易之。鐵折肉中。以

吸鐵石生搗細末。厚者鐵處即出。或刮象牙屑為細末。水和

塗折鐵上亦出。

漆瘡。以柳葉搗爛。煮汁。適寒溫洗之。

蛇蟲毒

乘涼睡。熱蛇入人口。并七孔者。割猪尾血。以罌盛血。傍蛇渴

入口中。出之。卒為蛇統不解。以熱湯淋之。急迫無湯。令人以

尿溺之。蛇蟬整痛。小蒜搗爛絞汁。服之。以滓薄傷處。又方。以

雄黃為末。傅之。日一易之。又方。搗生豆葉絞汁。服之。以滓塗

之良。○人山辟衆蛇。乾薑麝香雄黃為末。以小絳囊盛帶之。此藥以蜜和塗傷處。天常燒數羊角。使烟出。即去。虎狼皆去。如無數羊角。燒水羊角亦可。○蠟咬蟲尿著人。便起瘡。癰作聚。四邊中央有白膿。如黍粟。初得之。磨犀角水塗之。或羊鬚

燒灰。臘月猪脂和封之。或酥和胡粉塗之。

刺犬傷

凡刺犬咬人。七日輒應一發。三七日不發。腹中不作小犬吠聲。則無害。要過百日乃得免。終身禁食犬肉雞鵪食此則發。若未愈時。禁食生魚及諸肥膩冷食。又不宜飲酒。禁一年乃佳。治法先以熱草便洗去惡血牙瑩。便解被傷處看有紅者。拭去之。即以髮灰調成灰水和服之。并以韭菜搗絞汁飲一升。日三。瘡愈止。外以杏仁五合。熬令黑。研爛成膏敷之。

張氏醫通卷之九終

醫通卷之九

慈救濟

思得堂藏

張氏醫通卷之十

清

長洲石旗張

路路玉

男

登誕先

倬飛曉

日本

大泉長巷前田安宅子仁

男

典子守

再訂

婦人門上

經候

經曰。女子手少陰脈動甚者。妊子。

婦人以血為主。故手少陰動甚。為懷身之象。胎氣在下。反以上部動甚。為胎脈之驗者。蓋陽神氣旺。與尺內陰搏陽別。同一胎脈。而有左右上下陰陽男女之辨。是以內經特

醫通卷之十

經候

思得堂藏

為昭揭

二陽之病。發心脾。有不得隱曲。女子不月。其傳為風消。其傳為息責者。死不治。

手足陽明。皆曰三陽。不得隱曲。言情欲不遂。而病發心脾也。風消者。發熱消瘦。胃主肌肉也。息責者。喘息上奔。胃氣上逆也。此節雖言病發心脾。而實重在胃氣。心為胃之母。胃為脾之府。且與大腸一氣貫通。為有母傷而子獨安。藏病而府不病之理。

有病胸脇支滿者。妨於食。病至則先聞腥臊臭。出清液。先唾血。四支清目眩。時前後血。病名血枯。此得之年少時有所大脫血。若醉入房中。氣竭肝傷。故月事衰少不來也。治之以四烏鰂骨一鹿茹。二物并合之。丸以雀卵。大如小豆。以五丸

為後飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也

此段經文全重在氣竭用傷四字為通節之綱旨。胸膈肝部也。支滿肝病也。妨於食木邪凌土也。病則先問脛脛臑臑脾喜芳香今脾土為木邪凌病則先問脛脛臑臑乃肝之旺氣也。出清液脾虛不能收化水精也。先唾血脾傷不能統運營血也。四肢清陽衰不能傍達四末也。目眩陽不充而水上溢於經也。而後血陰受創而血內溢於絡也。血枯內有乾血血不歸經而結胞門也。良由年少不禁氣竭肝傷而致月事衰少或不來也。治以烏鰂骨四分取其味鹹走腎性溫達肝配以蘆茹一分取其辛散內風溫去惡血二物并合功專破宿生新九以雀卵取其溫補助陽能調子藏精血以五九為後飯者先藥後飯使藥徐行下焦力

醫通卷之十

經

思得堂藏

貴專攻五九不為少也。飲以鮑魚汁利腸垢和肝傷取其臭穢之味佐烏鰂骨而辟宿積之血也。烏鰂血黑如墨用之書契則有賊人之害故又名烏賊人腎走血而不傷伐真元功在蠱蟻之上。攻諸本草蘆茹即是茜根功專散血不可誤認蘭茹。蘭茹辛寒有毒功專外科。觀本經主治可知。

金匱云婦人之病因虛積冷結氣為諸經水斷絕至有歷年血寒積結胞門寒傷經絡凝堅在上嘔吐涎唾久成肺癰形體損分在中盤結繞臍寒疝或兩脇疼痛與藏相連或結熱中痛在關元脈數無瘕肌若魚鱗時著男子非止女身在下未多經候不勻令陰舉痛少腹惡寒或引腰脊下根氣街氣衝急痛膝脛疼煩奄忽眩冒狀如厥癰或有憂慘悲傷多嘆

此皆帶下非有鬼神久則羸瘦脈虛多寒審脈陰陽虛實緊弦行其鍼藥治危得安其雖同病脈各異源

婦人經閉諸病無不由虛寒而成經閉雖屬虛寒則崩漏之屬虛熱從可識矣。夫經水歷年斷絕則瘀積結於胞門寒氣凝於經絡蓋下焦寒積結聚則中上二焦皆不得通暢所以在上則寒沫結聚而為痰欬欬久熱結而為肺癰在中則寒飲結聚而為疝疝久熱結亦為內癰大抵內癰皆起於結血故申之以麻數無瘕肌若魚鱗昭揭病形然此不但婦人也男子亦有是證總由經絡鬱閉寒從火化所致至於在下則經候雖不調而不至斷絕所聚亦為不多其證雖久但少腹氣街引急寒痛也其或腰脛疼煩者以四肢為諸陽之本寒結於內則在下之陽不能上入故腰

醫通卷之十

經

思得堂藏

脛反熱而痛也至如奄忽狀如厥癰或時憂慘悲嘆有若鬼神所憑此皆陽神虛寒不能統攝濁陰發為帶下之候故以久則羸瘦脈虛多寒證之然多寒言屬寒者多非絕無屬熱者假如羸瘦而脈數又為陰虛多熱矣設形盛而脈虛豈不為氣虛多寒乎形盛而脈濡寧不為溼熱固結乎斯其所以為同脈異源也

寸口脈弦而大弦則為減大則為乳減則為寒乳則為虛寒虛相搏此名為革婦人則半產漏下旋復花湯主之。脈弦而大按之減小而乳者為表裏失血之候以其脈法大無力而少谷緩冲和之氣故調之草言胃氣近於革除也蓋弦為陽氣少乳為陰血虛婦人得之主半產漏下以旋復花湯主之本草謂旋復花主結氣葱白主寒熱新終

乃絲帛之染緋者。主活血。三味入肝理血。除邪散結。豈非以氣少無陽則寒。血虛無陰則熱。兩虛相搏。以害其肝之生化歟。若不明其相搏。止謂之虛。何以用旋覆花。葱白。皆解客熱之邪者。而不用溫補其虛乎。

婦人陷經漏下。黑不解。膠艾湯主之。氣暢而血從。則百脈流通。以候天癸。苟有邪以阻之。則血不從其氣。而自陷於血海。血海者。腎主之。腎者。寒水也。其色黑。是以漏下黑矣。猶內經所謂結陰下血也。○林億云。臣億等。較諸本無膠艾湯方。當是妊娠中膠艾湯。婦人少腹滿如敦狀。小便微難而不渴。生後者。此為水與血俱結在血室也。大黃甘遂湯主之。其血當下。水有清濁。清則入經化血。濁則為瀉為重。苟因氣化之亂。

醫通卷之十

經候

思得堂藏

濁者入之。則不能化血。而為血害也。水性惟能潤下。下流不通。入與血居。必停於脈。隨其所止。止於肌表者。作身腫。止於筋骨者。作肢節腫。此止於血室。故作少腹如敦狀。然血室雖與膀胱異道。膀胱是行水之府。水畜血室。氣有相感。故膀胱之氣亦不化。而小便微難。水與血皆陰類。雖有留滯。不能發熱。故不渴。若渴則為膀胱結熱。而非水血矣。若小便自如。而少腹之如敦者。亦不謂之水併。當是他邪血積可知矣。生後者。言曾生育過之婦。則有此患。非指產後而言。若室女則無是疾也。用甘遂取其直達水停之處。大黃滌滌瘀。阿膠為血室之向道也。

婦人經水不利下。抵當湯主之。亦治男子膀胱兩惡。有瘀血者。

傷寒陽明證。其人喜忘者。必有瘀血。大便色黑。抵當湯主之。發熱下之不解。六七日不大便者。有瘀血。亦抵當湯主之。傷寒有熱少腹滿。應小便不利。今反利者。為有血也。宜抵當丸。三者有病證而後立方。今止云經水不利。然經水不利。豈盡血畜不通。而無虛損者哉。此必有畜血形狀。而出是方也。

婦人經水閉不利。藏堅癖不止。中有乾血。下白物。礬石丸主之。

子宮血積。不與氣和。故新血不至。遂成乾血堅癖。外連子戶。津液不行。化為白物。是用礬石。磨消堅癖。破乾血。杏仁利氣。開閉。潤藏之燥。蜜以佐之。內子戶而藥氣可直達於子宮矣。設乾血在衝任之海者。必服藥下之。內之不能去也。

醫通卷之十

經候

五

思得堂藏

婦人腹中諸疾病。當歸芍藥散主之。

此腹痛者。由中氣虛。脾土不能升運陰陽。致二氣乖離。肝木乘剋而作痛。故用是湯。補中伐木。通行陰陽也。

婦人腹中痛。小建中湯主之。

小建中專主風木勝脾之腹痛。而婦人善怒。易動肝火。木邪乘土。多有腹痛。經水妄行之疾。故以此湯主之。

帶下。經水不利。少腹滿痛。經一月再見者。土瓜根散主之。陰癰腫亦主之。

此亦因瘀血而病者。經水雖不利。但一月再見之不同。皆衝任脈瘀血之病。土瓜根消水飲。為藥開血。桂枝通血脈。蠶蟲破血積。更需以酒行之。至於癰腫。非惟男子之辜丸。婦人之陰戶。亦有之。多在產時。瘀血流入作癰。下墜出。

戶也。

問曰婦人年五十。所病下利數日不止。暮即發熱。少腹裏急。腹滿。手掌煩熱。唇口乾燥。何也。師曰。此病屬帶下。何以故。曾經半產。瘀血在少腹不去。何以知之。其證唇口乾燥。故知之。當以溫經湯主之。亦主婦人少腹寒。久不受胎。兼治崩中去血。或月水來過多。及至期不來。

問下利不止。答屬帶下。何也。婦人年已五十。經絕。胞門閉塞。衝任不復輪瀉之時。所積血自胞門化為帶下。無所從出。大便屬陰。故就大便為下利。是即以帶下例治之。

王節齋曰。婦人女子。經脈不行。有脾胃損傷而致者。不可便認作經閉血死。輕用通經破血之藥。遇有此證。便須審其脾胃。何如。若因飲食勞倦損傷脾胃。少食惡食。泄瀉疼痛。或因

醫通卷之十

經候

六

思得堂藏

誤服汗下攻伐藥。傷其中氣。以致血少而不行者。只宜補養脾胃。用白朮為君。茯苓芍藥為臣。佐以黃耆甘草陳皮肉桂。川芎歸身柴胡等藥。脾旺則能生血。而經自行矣。又有飲食積滯。致損脾胃者。亦宜消積補脾。若脾胃無病。按其少腹。果有血塊凝結。方宜香附斷艾桂心桃仁行血通經等劑。

經云。飲食入胃。遊溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。故心脾和平。則經候如常。苟或七情內傷。六淫外侵。飲食失節。起居失宜。脾胃虛損。則月經不調矣。若先期而至者。有因肝脾血燥。有因脾經鬱滯。有因肝經怒火。有因血分有熱。有因勞役火動。其過期而至者。有因脾經血虛。有因肝經血少。有因氣虛血弱。治法因肝脾血燥者。加味逍遙散。脾經鬱滯者。歸脾湯。肝經怒火

者。小柴胡加生地。血分有熱者。四物湯加白朮茯苓柴胡丹皮。勞役火動者。補中益氣湯。脾經血虛者。十全大補湯。肝經血少者。六味九氣。虛血弱者。八珍湯。○經候不調。無他證而。不受胎。六味九氣。全料減澤瀉一兩。加重便製香附四兩。醋煮斷艾一兩。調理最妙。若有別證兼見。隨證制湯送下。○婦人勞傷氣血。衝任虛損。月水過多。淋漓不斷。或過期不來。崩中下血。或白帶白淋。四物湯加丁香膠艾。若曾傷胎。瘀血傳留小腹。急痛。五心煩熱者。大溫經湯。○月水不調。陰虛潮熱。或寒熱如瘧。盜汗痰嗽。漸成骨蒸者。血熱相搏也。加味逍遙散。○月水准信。不受孕者。其故有三。一。肥白腹不痛者。閉子宮也。因痰導痰湯。甚則間一二日。送滾痰丸二三服。腹多痛者。必食生冷過多。且又多氣。宜溫熱藥。七氣湯。如欬嗽形瘦。色赤

醫通卷之十

經候

七

思得堂藏

多火。陰血虛者。不宜服。只以四物加陳皮香附肉桂作丸。亦有血少不能攝精者。十全大補湯。兼寒。金匱溫經湯。或曰。經正而子宮寒者。非也。若子宮寒。其經必過期矣。豈有准信而曰寒乎。○黑瘦多火。人經少。色深紫。而不受孕者。為胞血枯而精被燥也。四物換生地加芩連。○瘦弱而不能受孕。子宮無血。精氣不聚故也。十全大補之類。○經水不准。必不受胎。然泰前受胎者有之。此是血熱。抑有泰前落後互乘者。將為寒熱並乎。大抵婦人受氣。則氣亂。經期亦亂。故調經以理氣為先。歸附丸。○氣盛者。宜抑氣以行血。血盛則氣行矣。○經不調而血淡如水。宜補氣血。保元湯加芎歸肉桂香附。腹痛加膠艾延胡。虛加薑附。○經水有先期而來者。多屬熱。其證有一。血熱者。腹多不痛。身多熱。此火也。其色必紫。脈必洪數。

四物湯中川芎減半。易生地加條芩丹皮香附。虛熱者四物合保元。不應加炮薑宜連炒黑香附乾薑者。道遂散氣多血虛者。腹必疼。香正氣散加芎歸香附。慎用涼藥。若婦人年四十餘。經水每月二三至者。此少年恣意太過。後必崩淋。經水後期來者。多屬寒。其證有三。血虛腹多不痛。微微身熱。間亦有痛者。乃空痛也。脈必大而無力。或浮滑濡細。宜調氣生血。八物加香附。虛則四物加參朮黃耆升麻陳皮。氣滯血虛者。四物加丹皮香附。肥盛多痰。去地黃再加橘半茯苓。血寒脈必沉遲弦緊。歸附丸。過期色淡者。痰多也。二陳加柴胡香附肉桂。若過期兼白帶者。艾煎九加香附。若欸忌香附。道遂散加丹皮。嗽而瀉者。養胃湯。血滯者。胸飽腰腹痛。醋煎散。或七氣湯加減。○衝任虛損。少腹有寒。月水過期不能受

綿作痛者。此經行時因氣滯而止。未盡故也。四烏湯加木香蓬朮砂仁。○每遇經行。頭疼氣滿。心下怔忡。飲食減少。肌肩不澤。此痰滯為患也。二陳加當歸炮薑肉桂。○經水延期。胸脇腰腹刺痛。虛浮寒戰。此衝任衰弱。氣虛冷故也。溫經湯加減。○一切氣上。心腹攻築。脇肋刺痛。月水不調者。用香附三錢。烏藥一錢。陳皮蘇葉各六分。乾薑四五分。煎服。○經水有紫黑。腹痛者。乃氣血相併也。腹不痛者。血熱也。淡紅色者。血虛也。其來必皆不准。腹痛者。四烏湯加蓬朮川連。不痛者。但加川連。色淡者。增損四物湯。○色如黃漿。水心胸嘈雜。汪洋。乃胃中有痰液也。六君子加肉桂木香。○經下利。若汗出。小便利者。為亡津液。故經水反少。補脾和胃。血自生矣。經行之際。禁用苦寒辛散之藥。飲食亦然。○經水不止。如左尺按之空虛。是氣血俱脫。輕手其脈數疾。舉之弦緊。或澹。此是陽脫陰亡。或見熱證於口眼鼻。或渴。是名陰躁。陽欲先去也。急用大建中湯。或十全大補送腎氣丸。以補命門之下脫。○痰多。占住血海。因而下多者。目必漸昏。肥人多此。南星蒼朮川芎香附作丸服。○肥人不及日數而多者。痰多。血虛有熱。亦用前丸。更加黃連白朮。○肥盛飲食過度。而經水不調者。乃是淫痰。宜蒼朮半夏茯苓白朮香附澤瀉芎歸。○軀脂滿而經閉者。以導痰湯加川連川芎。不可服四物。以地黃泥隔故也。○血枯。經閉。四物加參耆肉桂。切禁桃仁紅花。因鬱火者。道遂歸脾間服。○陰虛。經脈不通。小便瀉。身體疼痛。以四物倍芍藥。加肉桂丹皮香附甘草。○經行之際。與產後一般。將理失宜。為病不淺。若被驚。則血氣錯亂。漸止

不行或逆於上而從口鼻中出或逆於身而為血分勞瘵若其時勞力太過則生虛熱亦為瘵之根若鬱怒則氣逆氣逆則血滯於腰腿心腹背肋之間遇經行時則痛而重經過則安若怒極而傷於肝則又有目暈嘔吐之證加以血不循經遂成淋瀝不止凡此之類感風則病風感冷則病冷久而不治崩漏帶下七瘕八癥皆從此而成矣

薛立齋治一婦腹內一塊不時上攻或痛作聲吞酸痞悶月經不調小便不利面色青黃相兼已二年餘此肝脾氣滯以六君子加芍歸柴胡妙川連木香吳茱萸二劑次與歸脾湯下蘆薈丸月餘肝脾和而諸證退又與補中益氣加茯苓丹皮中氣健而經自調

又治一中年婦素性急先因飲食難化月經不調服理氣

醫通卷之十

經候按

思得堂藏

化痰藥反肚膨脹大便泄瀉又加烏藥蓬朮肚腹愈脹小便不利加豬苓澤瀉痰喘氣急手足厥冷頭而肢體腫脹指按沉而屈脉沉細右寸為甚此脾肺之氣虛寒不能通調水道下輸膀胱滲泄之令不行生化之氣不運東垣所云水飲留積若土之在雨中則為泥矣得和風暖日水溼去而陽化自然萬物生長喜其證脉相應遂與加減腎氣丸小便即通數劑腫滿消半四肢漸溫自能轉側又與六君子加木香肉桂炮薑而愈

崩漏○經云陰虛陽搏謂之崩又云陰絡傷則血內溢又云脾統血肝藏血之為患或脾胃虛損不能攝血或肝經有火血熱妄行或怒動肝火血熱騰沸或脾經鬱結血不歸經或悲傷胞絡血崩下脫治療之法脾胃虛弱者六君子加芍

歸柴胡脾胃虛陷者補中益氣加酒炒白芍肝經血熱者四物湯加柴胡山梔丹皮肝經怒火小柴胡加山梔芍藥丹皮脾經鬱火歸脾湯加山梔故先哲云凡下血證須用四君子收功斯言厥有旨哉若大脫血後母以脈診急用獨參湯加當歸救之其發熱潮熱欬嗽脉數乃是元氣虛弱假熱之脈也尤當加用人參此等證候無不由脾胃先損而患故脉洪大察其中有胃氣受補可救誤投寒涼之藥復傷脾胃生氣使血反不歸源也○暴崩下血不止者乃血不歸經陰血隨陽盛之勢妄行下漏也身熱不痛者追遙散加熟地川芎不應此血熱沸騰也四物加芍連肉桂○按東垣云經漏不止有二皆由脾胃有虧下陷於腎與相火相合淫熱下迫經漏不止其色紫黑如夏月腐肉之臭中有白帶者脉必弦細寒

醫通卷之十

崩漏

十一

思得堂藏

伏於中也有赤帶者其脉洪數病熱明矣必腰痛或臍下痛經欲行先寒熱往來兩脇急縮兼脾胃證見或四肢困熱煩不得眠心中急補中益氣加茯苓芍藥大補脾胃而升降氣血可一服而愈或先貴後賤先富後貧心氣不足其火大熾旺於血脉之中形質肌肉顏色似不病者此心病也經水不時而下或適來適斷暴下不止治當先說惡死之言勸諭令懼死而心不動以補中益氣下安神丸補養脾胃鎮降心火更以人參養營補陰制陽經自止矣○暴崩下血腹痛有少腹上喜熱按脉微弱但瘀血當去空痛當補有因內傷若小腹不痛八物湯加芩連如痛者四身湯加莪朮年高而崩者法在不治治亦無功○經候不調血氣成塊崩中下漏者

此是血海虛寒。外乘風冷。搏結不散。醋煎散加麝香。血虛氣損。或凝塊。七癥八瘕。上則氣逆嘔吐。下則泄下五色。金匱溫經湯加薑桂。以艾煎酒溫服。血崩之人。有服前藥不効者。火也。三補丸。卽三黃丸去大黃用黃藥。○風入胞門。忽時崩下鮮血者。一味防風丸。金匱旋復花湯送下。風熱入肝。經崩下發熱。手心灼熱者。一味子芩丸。小建中湯送下。○崩漏淋瀝。衝任衰弱。藏府虛冷故也。千金茯苓補心湯。如小腹急痛。兼下赤白帶者。艾煎丸。若下血過多。血氣不足。四肢倦怠。乏力。增損四物湯。有去血雖多。間有崩漏水下。時有鮮血者。四物加丁香膠艾香附丹皮。失血血崩白淋。及經事來多者。四物加參耆膠艾椿根皮。去血過多。虛勞發熱有痰者。補中益氣加苓牛。有熱少加芩連。加烏藥桂心。口乾去升麻。加

思得堂藏

煨葛根。○東垣論崩漏。並不言熱。其主在寒。卽使有熱證。亦是虛熱。若以寒藥治之。卽瘀血愈凝結。經血愈不止矣。四物加炮薑調理。因勞者。用參耆帶升補藥。○血崩甚而腹痛。人多疑惡血未盡。及見血色瘀晦。愈信惡血之說。不敢便止。太凡血之爲患。欲出未出之際。停於腹中。卽成瘀色。未必盡爲瘀熱。又曷知瘀之不爲虛冷乎。若必待瘀血淨後止之。恐并其人而不存矣。且腹痛更有說。積而腹痛。血通則痛止。崩而腹痛。血住則痛止。○千金治崩淋帶下。五崩熱病下血寒熱下血。經行犯房室下血。經來舉重傷任脈下血。產後藏開經利下血。外實內虛之病。用小牛角膠散。若崩中去血不斷。本方去禹餘糧乾薑烏雞骨赤小豆。加甘草地榆小剉根。丹參乾地黃芩菊赤石脂龜甲栝子仁。各角膠鹿茸散。○積

冷崩中去血不止。腰背痛。四肢沉重虛極。小牛角膠散去鹿茸阿膠烏雞骨赤小豆。加乾地黃桑耳白朮赤石脂礬石。附子人參蒲黃防風。名大牛角膠散。○崩中去赤白。或如豆汁。千金伏龍肝湯。○膀胱虛傷。不能攝血。而崩下不止者。單方用新絲綿燒灰爲末。空心酒調一錢。或雞子黃煮食。數日必効。○崩血經年不止者。用香附二兩炒黑。蓮房五枚燒存性。爲細末。空心陳酒調下二錢。或用陳棕櫚燒灰存性。黑糖調酒下一錢。卽止。此切法也。○崩漏過多。服補湯藥皆不効者。用黃牛角膠煨存性。空心酒服二三錢。虛寒血色稀淡者。同鹿茸煨服尤効。蓋牛屬坤土益脾。角總走肝主血。神農本草經云。下閉血瘀。補女人帶下血崩。燐之酒服。宗璽曰。燒灰主婦人血崩。大便下血。血崩虛人。獨參保元皆可送下。此血脫

思得堂藏

益氣之良法也。古方有用白馬蹄燒灰存性。酒服方寸匙者。有用桑樹上耳燒灰酒服者。皆千金法也。又用五靈脂生炒各半酒服者。此大傷中氣。雖紫雲亦難輕試。○崩證多用醋炒荆芥升麻。醋能收斂故也。○血崩日久。純下臭黃水。或帶紫黑筋塊。腥穢不堪者。不治服滿不能飲食。不受參朮補益者。不治。服大劑補中人參。每日服至兩許。不應反加寒熱口燥。而目足脛浮腫者。不治。瘀滯崩脫。少腹不疼。後發陰戶腫突。痛如刀割者。死期迫矣。診。○漏下赤白。日下血數升。脉急疾者死。遲者生。漏下赤白不止。服小虛滑者生。數盛者死。漏下脈弦動者死。瀉瀼不調。按之不來者死。下血脉虛者。脈浮者。俱不治。然峻實其下。亦有得生者。寸口脉遲。爲寒在上焦。則吐血。芤血。尺脈微遲。爲

寒在下焦。則崩血便血。大抵數小為順。洪大為逆。大法當調
補脾胃為生。

薛立齋治一婦。久患血崩。肢體消瘦。飲食到口。但聞腥臊
口出津液。強食少許。腹中作脹。此血枯之證。用八珍湯四
烏雞骨一葷茹丸兼服。兩月經行而愈。

一婦老年患崩。諸藥罔効。身熱皮痛。頭暈涕出。吐痰少食。
衆作火治。轉致絕粒數日。僅存呼吸。診之。乃脾腎虛寒。用
生料八味丸一劑。翌早遂索劑。再劑熱減痛止。服八味丸
愈後因勞役憂怒。至夏崩復作。崩血發熱。脊痛。腰不可轉。
神氣懶鬱。脈洪無倫。按之微弱。此無根之火。內真寒而外
假熱也。以十全大補加附子一劑。羣止。崩血漸減。日服八
味丸而愈。

醫通卷之十

崩漏按

思得堂藏

汪石山治一婦。年逾四十。形色蒼紫。忽病血崩。醫者或用
涼血。或用止瀉。俱罔効。診之。六脈皆沉滑而緩。按之無力。
乃胃病非血病也。當用甘溫之劑。健脾胃。使胃氣上騰。
血循經絡。則無復朋友。遂用補中益氣。多加參。兼服參
苓白朮散而愈。

失血心痛。婦人血崩而心痛甚。名曰失血心痛。心主血。心
脾血虛。無以榮養。故痛如刀刺。崩甚則痛甚。崩緩則痛緩。若
小產去血過多。而心痛甚。者亦然。若小腹喜按。而下淡色血
水。為陰血耗散。先用烏雞骨炒為末。醋湯調下。收斂之。次與
補中益氣湯升舉之。若小腹中有塊。而按之作痛。血色紅紫。
中有結塊。為瘀血不散。先用失笑散。後與十全大補。峻補之。
若心脾血弱。或鬱結傷血。用歸脾湯調補之。

醫通卷之十

經閉不行

思得堂藏

經閉不行。經水陰血也。屬衝任二脉。上為乳汁。下為血水。
其為患。有因脾虛不能生血。或鬱結傷脾而血損者。有因胃
火而血燥者。有因勞傷心神而血耗者。有因積怒傷肝而血
閉者。有因腎水不能生肝而血少者。有因脾氣虛傷不能統
血而經不行者。治法之法。損其脾者。益其氣。損其心者。調其
營衛。損其肝者。調其飲食。適其寒溫。損其腎者。緩其中。損
其胃者。益其精。審而治之。庶無誤矣。○室女婦人諸病。以調
經為先。調經以理氣為要。蓋氣不和。則血不流。故經閉然其
證不一。小腹疼痛。血海虛寒也。或潮熱頭目昏沉。肢體勞倦。
五心煩熱。怔忡而赤。口燥唇裂。盜汗身疼者。血氣虛損也。並
宜溫經湯。腹中結塊。腰腹重痛。及少腹痛。如錐刺者。瘀血凝
滯也。四物加肉桂。蓬朮。貌本壯實。飲食減少者。胃氣不調也。

蓋胃氣不和。亦令經水不調。逍遙散下歸附丸。○經水三月
不至。其脈右浮大而左反弱。其經當下。此為居經。非妊也。當
抑氣養血。又經水絕後。一朝而面血。二三日不止者。不須治。
當自止。經水常五日。至者五日愈。○下利而經斷者。利止自
來。蓋下利則亡津液。故經絕利止。津液復。經當自下。若脈微
瀉者。雖二三月不行。非胎。當養血。經自行。以脈瀉故知非胎
也。○經水不通而逆行。或吐血。或衄血。或鼻血。或血脈通
宜四物加韭汁。童便。甚則從虛旁。例用異功丸。烏雞丸。治
之。○室女經水既來而復不通。其說有三。而色不黃。飲食如
故。身不熱者。名曰非也。不須藥。面黃肌瘦。身熱。為虛勞。診
其肝脈。弦出寸口。魚際非藥所能治。急與婚配。自然經行而
愈。藥則加味逍遙散。乾欬。川蜜製白木橘皮生薑。又有氣血

不足而黃肌瘦。身熱不甚者。不可用桃仁紅花通血藥。宜六味丸去山茱萸加麥門冬。兼進異功散調補之。○婦人經閉不通。視其脈不足。當補氣血。四物湯加參耆木草之類。脈有餘而氣相併者。四烏湯加肉桂橘皮之類。○婦人經候漸少。以致不通。手足骨肉煩疼。日漸羸瘦。而生潮熱。其脈微數。此陰虛血弱。陽往乘之。當養血益陰。慎勿以毒藥攻之。○女人虛羸。有鬼胎癥塊。經候不通等證。當隨證辨治。丹方有服芫花下黑物而効者。苟非實證。未可輕試也。○婦人月經不利。臍下氣脹。上攻欲嘔。不得睡。加減四物湯。或用當歸身一兩。穿山甲炒蒲黃各五錢。辰砂一錢。麝香少許。共為細末。食前熱酒調下二錢。○婦女骨蒸痰嗽。診其脈七八至。或細而數。視其肌肉消瘦之極。面反嬌赤者。此必死候。更加泄瀉喘逆。

醫通卷之十

經閉不行

六 思得堂藏

不能石回者。死期尤促。若室女經水不調。尤當開鬱為主。○室女年及笄。天癸不至。而色不黃。飲食如故。此名石女。不在經閉論。亦有至十七八而經自來者。○婦人經閉。肥白者多痰。去痰經自行。二陳加芎藭川連。南星枳實生薑竹瀝。厚朴。於酒食者。平胃散加薑汁炒川連。歸尾半夏薑汁。黑瘦者多血枯。四物加參耆香附丹皮。○經閉脈沉弱。少腹痛。屬寒結。四烏湯。與藥用桂酒製烏藥用附子製。○寡婦尼姑經閉。鬱也。加味逍遙散加無灰酒竹瀝。○娼妓本無經閉之理。間或有之。勞也。十全大補中肉桂可用一二錢。○血枯一證。與血閉相似。皆經閉不通之候。然而枯之與閉。則相反。有如冰炭。夫枯者枯竭之謂。血虛之極也。閉者阻滯之謂。血本不虛。而或氣或寒或積有所逆也。病發於鬱。其證或痛或實。通之

則血行而愈。可攻者也。枯者其來也漸。衝任內竭。其證無形。必不可通者也。嘗見今人之於此證。聽其言。則明日血枯經閉。察其治。則每用四物桃仁紅花。甚至硝朴殺我之類。無所不至。夫血既枯矣。只當補養陰氣。使其血充。則弗招自至。奚俟通也。若勉強通之。則枯之愈枯。不死何待。○或問一婦。哮喘發後。必便血二三日。其喘方止。每歲常十餘發。無不皆然。經閉數年不通。而不成虛勞之病何也。答曰。此肺移熱於大腸。熱得下泄。故喘嗽止。經血從大便間道而出。雖閉而無留結之患。故不成勞。

診。凡經閉不調。與胎產之病。其脈要滑實重按有力。崩漏不止。與產後之病。其脈要虛濡小弱留連。調經及安胎。雖以順氣為主。又須補脾為要。治崩及產後。雖以散血為主。又當

醫通卷之十

經閉不行

六 思得堂藏

扶虛為本

喻嘉言治楊季章女。經閉年餘。發熱少食。肌削多汗。而成勞怯。醫見汗多。誤為虛也。投以參朮。其血愈鉅。診時見汗出如蒸籠氣水。謂曰。此證可療。處全在汗。蓋經血內閉。止有從皮毛間透出一路。以汗印血之液也。設無汗而血不流。則皮毛槁而死矣。宜用極苦之藥。斂血入內。而下通於衝脈。則熱退經行而汗自止。非補藥所能効也。於是以前補膏九日進三次。月餘經血畧至。汗熱稍輕。姑減前九。只日進一次。又一月經血大行。淋漓五日。而諸證全瘳矣。帶下。帶下之證。起於風氣寒熱所傷。入於胞宮。從帶脈而下。故名為帶。有五色。不只赤白。白帶者屬氣虛。其則腰痛如虛。不甚則不痛。若氣鬱甚。則腰痛頭眩眼花。此虛證也。千金

內補當歸建中湯加醋製香附。或草薢分清飲。量肥瘠選用。○赤帶多腰痛。艾煎丸加續斷杜仲。若肥盛者黑而肌肉腴。堅者為溼熱下注。平胃散加乾製星半酒炒。連○赤白帶下艾煎丸。隨量加氣血藥治之。○五色帶下。十全大補湯加熟附龍骨赤石脂。禹餘糧酒丸服。○或因六淫七情。或因醉飽房勞。或因膏粱厚味。或服燥劑所致。脾胃虧損。陽氣下陷。或溼痰下注。蘊積而成。皆當壯脾胃。升陽氣為主。佐以各經見證之藥。陽氣下陷。補中益氣湯。溼熱下注。加苓半蒼朮黃藥。氣虛痰飲下注。局方七氣湯。送腎氣丸。○丹溪云。帶下赤白。屬於大腸小腸之分。赤屬血。白屬氣。主治燥溼為先。漏與帶俱是。胃中痰積流下。滲入膀胱。無人知此。只宜升提。甚者必用吐以升提其氣。次用一陳湯加二木升柴丸服。○肥人

醫通卷之十

帶下

淋濁

六

恩得堂藏

多是淫痰。越鞠丸加滑石海石蛤粉星半茯苓桂皮。作丸服。○瘦人多熱。以大補丸加滑石海石桂皮龜版。作丸服。必須斷厚味。○帶下脉浮惡寒。腥臭不可近者。難治。○淫濁。小便白。淫白濁。皆由勞傷於腎。故心腎不交。泰水火不升降。腎主水。開泉在陰。陰為便溲之道。胞冷腎損。故有淫濁之證。白淫者。或一時放白水。嬌尼多有此疾。乃鬱火也。遺精散加炒黑山梔酒炒黃藥。白濁者。渾濁如膿。此膀胱經熱。失治。清心蓮子飲加草薢。○經水淋瀝不斷。其故有三。有因月戒來而行房。致傷胞絡。先服活血藥。小腹痛者。四物加香附烏藥。不痛。四物加膠艾黃芩。氣虛下陷。小腹喜溫按者。四物加參朮黃芩。汁麻陳皮。有多氣所致者。甚則胸膈飽悶。肚腹疼痛。用正氣散。若

肚腹不疼者。逍遙散加熟地。當歸。痛者。尤宜飲食少者。增損四物湯加焦白朮。禁服苓連。若勞傷氣血。衝任虛損。四物加丁香膠艾。小腹急痛。溫經湯。月水至老不斷。必成淋證。補中益氣。或八珍並加香附細辛。仍須戒氣。方可治癒。否則崩淋難治也。○淋證。皆由腎虛膀胱積熱所致。腎虛則小便數。膀胱熱則小便澀。通遇經行時。或為數淋。或為時痛。其尿沉細。皆因寒熱邪氣。客於胞中。故衝任不調。而成此證。宜服歸附丸。○白淋者。起於鬱多屬虛寒。小腹不疼。與去血過多。空痛者。俱宜人參養營湯。香附不可缺。或補中益氣湯下歸附丸。如痛者。四烏湯。白淋變為黃水。將成血淋。八物湯加減。○血淋者。月事三五日一至。積數月不愈者是也。腹痛則四烏

醫通卷之十

淋濁

九

恩得堂藏

湯加菰茂木香。甚則醋煎散。尚恐有瘀血未盡也。去多不痛。善飲食者。八物湯加苓連。或補中益氣加黃藥。如飲食少進者。苓連黃藥禁用。若少腹痛而脾胃不實。或痛而欲得按者。八珍湯加膠艾。或逍遙散加熟地膠艾。如瀉者。先實脾胃。大抵治淋。先治脾胃。為上。此證多腰痛。難屬而亦因氣所致也。○沙淋者。淋下則沉。積如沙。一層有赤白二種。白屬氣。赤屬血。不可依書用苓連。多不克効。當知婦人之疾。多有淫熱。止宜調經。不可與苦寒之藥。以其月事時下多。少宜故發營湯治白淋而効。以有桂也。艾煎丸亦然。以有艾也。惟赤淋不可服熱藥。艾煎丸亦禁用。宜八珍加苓連香附。調用溫補。必致躁渴引飲。加以水飲停蓄。而成腫脹者。加味逍遙散加苓連枳朴澤瀉橘皮。先治其脹。然後徐徐治水。慎勿驟補。驟補

則氣壅腹脹也。○年老患血崩淋瀝不拘痛與不痛。脾胃實與不實。皆以八珍加膠艾膏著澤瀉。若遂用芎連以傷脾胃。更何特以祛病乎。

泄瀉。○經行時先泄瀉者。此脾虛也。脾統血而惡濕。經水將動。脾血先注血海。然後下流為經。脾血既虧。不能運行其溼。所以必先作瀉。補中益氣加炮薑。有熱兼黃連。若飲食減少。六君理中選用。

石頑治一薛姓婦。每遇經行。必先作瀉二三日。其脈左手關尺弦細如絲。右手關上小駛而滑。服薑桂萸附。則大渴腹痛。泄瀉轉劇。服苓澤車前之屬。則目暗如盲。此肝血虛寒。而脾胃有伏火也。俟經將行作瀉時。朝用理中加黃連。作湯服五六劑。暮與加減八味加紫石英。作丸常服。不終

醫通卷之十

小便血

子

思得堂藏

劑而數年之疾頓除

小便血。○婦人尿血。或因膏粱炙燥。或因醉飽入房。或因飲食勞役。或因六淫七情。以致元氣虧損。不能收攝。歸源。若因怒動肝火者。加味逍遙散調送。數服。肝經風熱者。送一味子芩。九久而血虛者。八珍湯送。髮灰。膏粱積熱者。消胃散加槐花甘草。房勞所傷者。六君子加分參。風熱所傷者。四君子加防風。凡久而虧損元氣者。補中益氣為主。鬱結傷脾者。歸脾湯為主。

師尼寡婦寒熱。○瘵師尼寡婦。宜別製方藥。謂獨陰無陽。致血氣交爭。寒熱如瘧。或腰背作痛。而寒熱經閉。白淫。痞悶。飲食。面黃瘦削。久則成勞。其肝脈弦出寸口上魚際。是其證也。若室女出嫁。愆期而寒熱。或既嫁不得於夫者。亦然。蓋男子

精盛則思室。女子血盛以懷胎。此天地自然之理也。治宜開

鬱理氣。其經自調。逍遙散加無灰酒竹瀝。各酒瀝湯。專主尼寡寒熱。肥人用越鞠合二陳最宜。若兼怒動肝火而發熱。佐以小柴胡加減。若兼鬱結傷脾而寒熱。佐以歸脾湯。此證多兼經候不調。常審緩急治之。○婦人形瘦肉脫。胸中常想者。一事而百計不解者。勿與醫治。後必成癰。○凡婦人鬱怒發寒熱。逍遙散加丹皮香附。脾氣不運。痰氣留著。結為痰癖。發則其塊上升。氣逆喘促。嘔吐酸水。初起元氣未傷者。四七湯加枳實黃連。虛人香砂六君加柴胡白芍。下佐金九。大抵鬱證。皆虛火用事。故多骨蒸寒熱。經閉不調。喘嗽失音等證。當詳虛損例治。但須兼調鬱氣。亦有陰血虧損。不勝香燥者。惟降火滋陰為首務耳。

醫通卷之十

師尼寡婦寒熱

子

思得堂藏

千金云。凡人無子。當為夫妻俱有五勞七傷。虛羸百病所致。故有絕嗣之患。夫治之之法。男服七子散。女服紫石門。多圖無不有子也。○若丈夫陽氣不足。不能施化。慶雲散主之。○婦人立身以來。全不產。及斷緒後。十年二十年不產。此胞門不淨。中有瘀積結滯也。朴硝湯洗胞湯主之。○婦人月水不利。閉塞絕產者。白薇圓主之。

子嗣。○子嗣一門。古方悉用辛熱壯火之劑。若施之於氣虛精寒之人。固所宜然。設藥用於火旺精傷者。得不愈。伐其陰。手霜謂男子之數於嗣者。一如婦人經病調理。然有不生。不肖之不同。大意在於補偏救弊。往有體肥質實。偏生無子者。豈可一槩歸於虛寒耶。蓋淫勝則氣滯。氣滯則精凝。至而不能衝透子宮。故爾不能成孕。惟宜行淫耗氣。助其流動之

勢如二陳一妙七氣平胃之屬皆可選用甚則控涎丹先行
嚮導最爲要訣慎勿拘於世俗溫補壯陽之說也且人之所
稟不同勇怯各異有因男子真火式微者有因淫熱傷精者
有因婦人胞門濁膩者有因血海虛寒者有因子宮枯燥者
至如生而不育亦自不同有金石藥毒伏於腹中者有酒客
淫熱混於體內者有慾動精薄者有得胎後不成房室頻泄
母氣者有妊娠不慎起居而致胎病不育者有男子精隨雖
衝而督脈氣衰陽氣不振但生女不生男者此皆一法所可
治乎歷檢古方中惟孫真九千金種子丹五子衍宗丸等方
治男子陽道不振精氣寒薄與夫斷長太過及年老無子者
咸爲得宜若精微稀薄陽氣不固聚精丸最佳陽衰更加人
參鹿茸丸妙生女不生男者當大補督脈益陽氣鹿茸四具
參鹿茸丸之十

結而不能成實者四物換生地加麥連然此皆由氣血偏沮
是可以藥奏功若夫稟賦陰陽偏絕雖日用參朮峻補終無
回天之力也○丹溪曰無子之因多起於父氣之不足豈可
獨歸罪於母血之虛寒况母之血病奚止虛與寒而已哉然
古方治婦人無子惟秦桂丸一方其性熱其藥確今欲得子
者率皆服之無疑夫求子於陰血何至無用熱劑耶今得此
九經血必轉紫黑漸成瘕少或先或後始則飲食驟進久則
口苦舌乾陰陽不平血氣不和焉能成胎縱使有子亦多
病以其能損真陰也按東垣云李和叔中年得一子至一歲
身生紅絲瘤而死後三四子至三歲皆病瘤而死乃腎中伏
火精氣中多有紅線以氣相傳生子故有此疾俗名胎瘤是
也遂以滋腎丸數服以湯腎中火邪補真陰不足忌酒辛辣
醫通卷之十

之物其妻用六味地黃丸以養陰血受孕五月之後以黃芩
白水二味作散服後生子至三歲前證不復作矣
胎教○胎教之說世都未諳妊娠能遵而行之不特無產難
之虞且生子鮮胎毒易大之患誠爲廣嗣要旨姑以大槩陳
之婦人經後四十餘日不轉即謹房室慎起居薄滋味養性
情刻刻存心與執持寶玉無異舉趾必徐行立勿仰坐不實
其前陰臥不久偏一側不得耽坐嗜睡使氣血凝滯爲第一
義雖不可負重作勞然須時時小役四體則經絡流動胎息
易於動運腰腹漸粗飲食不宜過飽茶湯更須節省大熱大
涼總非所宜犬子蟹蟹等一切有毒之物固宜切禁即椒薑
常用之品亦須少嘗其豕肉醇酒淫麪之類縱不能屏絕不
食亦不可恣啖歸精於胎過於蕃長致母體孱難產而子在

胞中稟質肥脆。極微必多羸困。即如沃壤之草木。移植培土。枝葉得不凋萎乎。甫交三月。即當滿裏其腹。胎氣漸長。僅可微鬆其束。切勿因其氣愈滿。悶而頓放之。在夏深洗。須避熱湯。冬時綿麻。勿迫爐炭。其最甚者。尤在不節交合。淫火盡歸其子。以釀痘疹疥癩之毒。然須妊娠稟性安靜。不似強為方。遵實濟。若強制以違其性。則鬱火彌熾。此與恣情無禁者。雖截然兩途。而熱歸胎息。則一嘗見有切於求嗣者。得孕即分處房幃。而子仍致於痘。豈非強制其火。彌熾之明驗乎。蓋人之志欲匪一。苟未能超出尋常。又須曲體母情。適其自然之性。使子氣安和。是即所謂胎教也。當知胎教原非一端。若懷子受驚。則子多胎驚。懷子抱鬱。則子多結核。流注。懷子恐懼。則子多癰癩。懷子常起貪妄之念。則子多貪吝。懷子常交憤

醫通卷之十

胎教

思得堂藏

怒之心。則子多暴狠。懷子常造綺語詭行。則子多詐偽。非但懷子之後。當檢束身心。而輕淨交感。慎毋恣肆。以遺胎息之患。若大醉後。嬉精神中多著酒淫。則子多不育。大怒後。嬉精神中多挾怒火。即子多乖戾。大勞後。嬉精神中不滿真氣。則子多孱弱。若犬熱藥助戰。作意秘精。精中流行毒悍。則子多異疾。至於風雨雷電。嬉精神威觸震氣。則子多怪類。以此言之。則三元五臟。宜確遵禁戒。誼育自是不凡。宗祧重務。安得視為嬉戲哉。

胎前

經云。何以知懷子之且生。身有病而無邪脉也。○人有重身。九月而落。此胞絡之脉絕也。胞絡者。繫於腎。少陰之脉貫腎。繫古本故不能言。無治也。當十月復。○婦人重身。毒之何如。曰。有故無須。亦無須也。

言有是病而用是藥。藥雖峻克。可無傷於胎息也。金匱云。師曰。婦人得平脉。陰脉小弱。其人渴不能食。無寒熱。名妊娠。桂枝湯主之。於法六十日。當有此證。設有醫治逆者。却一月。加吐下者。則絕之。

平脉者。言其無病之脉也。惟陰脉小弱。以其營氣不足耳。凡感邪而營氣不足者。則必惡寒發熱。今無寒熱。妨於食。是知妊娠矣。妊娠血聚氣搏。經水不行。至六十日始凝成。

醫通卷之十

胎前

五

思得堂藏

胎。斯時營氣并於胎元。而胃氣不足。津液少布。故其人渴不能食。宜桂枝湯和營益胃。設有醫以他治。反加吐下者。此為惡阻。則絕之。謂絕止醫治。候其自安。不可用藥。更傷其胃氣也。婁全善云。當治一婦惡阻病。此愈治愈逆。因思仲景絕之之旨。遂停藥月餘自安。

婦人宿有癥病。經斷未及三月。而得漏下不止。胎動在臍上者。為癥瘕。經斷六月動者。前三月經水利時。胎也。下血者。後斷三月。所以血不止者。其癥不去故也。當下其癥。桂心茯苓圓主之。

宿有癥病。謂婦人行經時遇冷。則餘血留而為癥。然癥病婦人自有之。或不礙子宮。則仍行經而受孕。雖得血聚成胎。胎成三月。而經始斷。斷未三月。而癥病復動。遂漏下不

止。藏在下。迫其胎。故曰癥瘕。所以臍上升動不安。詢為
真胎無疑。若是鬼胎。即屬陰氣結聚。斷無動於陽位之理。
今動在於臍上。是胎已六月。知前三月經水雖利。而胎已
成。後三月經斷。而血積成。是以血下不止。故用桂心扶
芩丹及桃仁以散其血。芍藥以護其肝。則血方止。而胎得
安。世本作桂枝茯苓丸。乃得為之誤。詳桂枝氣味俱薄。僅
堪走我。必取肉桂之心。方有去癥之功。安常所謂桂不傷
胎。勿疑有礙於妊。觀下條子藏開用附子湯。轉胞用腎氣
丸。俱用桂附。內經所謂有故無殞是也。

婦人懷妊六七月。脈弦發熱。其胎愈脹。腹痛惡寒者。少腹如
扇。所以然者。子藏開故也。當以附子湯溫其藏。
妊脈弦者。為臨產。虛陽散外。故發熱。陰寒內通。故胎腹脹。

醫通卷之十

胎前

思得堂藏

痛惡寒者。其內無陽。子藏不能司閉藏之令。故陰中覺寒。
氣習習如扇也。用附子湯以溫其藏。則胎自安。世人皆以
附子為墮胎百藥。長仲景獨用以為安胎聖藥。非神而明
之。莫敢輕試也。

師曰。婦人有漏下者。有半產後。因續下血。都不絕者。有妊娠
下血者。彼令妊娠腹中痛。為胞阻。膠艾湯主之。

行經與結胎。皆屬衝任。衝任雖持。平陰陽交合。為肝腎之
用事。然長養成胎。皆坤土所資。蓋陰陽抱負。則不泄。坤土
隄防。則不漏。若宿有瘀濁。客於衝任。則陰自結。不得與陽
交合。故有時漏下。半產不絕也。凡妊娠胎氣。陽精內成。陰
血外養。今陰血自結。與胎阻滯。不得相和。獨陰存內。作腹
中痛下血。皆陰陽失於抱負。坤土失於隄防。此方皆治之。

芩歸宜通其陽血。芍地宜通其陰血。何膠血肉之質。同類
者以養之。甘草緩中解惡。此方調經止漏。安胎養血。然加
減又必從宜。若脈遲緩。陰勝於陽。則加乾薑。或見數大。陽
勝於陰。則加黃芩。可不言而喻矣。

婦人懷妊。腹中疼痛。當歸芍藥散主之。
此與胞阻痛者不同。因脾土為木邪所剋。穀氣不舉。淫淫
下流。以滯陰血而痛。故君以芍藥。為肝利滯。佐以芩歸補
血止痛。苓澤滲淫益脾。則知內外六淫。皆能傷胎成痛。不
獨淫也。

妊娠嘔吐不止。乾薑人參半夏丸主之。

此即後世所謂惡阻病也。先因脾胃虛弱。津液留停。為
痰飲。至妊二月之後。濁陰上衝。中焦不勝其逆。痰飲遂湧。

醫通卷之十

產前

思得堂藏

中寒乃起。故用乾薑止寒。人參補虛。半夏生薑治痰散逆
也。

妊娠小便難。飲食如故。當歸貝母苦參丸主之。

此小便難者。膀胱熱鬱。氣結成燥。病在下焦。所以飲食如
故。用當歸以和血潤燥。貝母以清肺開鬱。苦參以利癢逐
水。並入膀胱以除熱結也。

妊娠有水氣。身重。小便不利。洒淅惡寒。起即頭眩。葵子茯苓
散主之。小便利則愈。

膀胱者。內為胞室。主藏津液。氣化出溺。外利經脈。上行至
頭。為諸陽之表。今膀胱氣不化。水溺不得出。外不利經脈。
所以身重洒淅惡寒。起即頭眩。但利小便。則水去。而經氣
行。表病自愈。川葵子直入膀胱。以利癢閉。佐茯苓以滲水。

道也。

婦人妊娠。宜常服當歸散主之。常服即易產。胎無疾苦。產後百病悉主之。

內經曰。陰搏陽別。謂之有子。尺脈搏擊者。由子宮之氣血相搏。而形於脈也。故妊娠之血。不可以靜。靜則凝泣。虧少則虛。皆不能與化胎之火相合。要其胎孕生化。必先和其陰陽。利其氣血。常服養胎之藥。非惟安胎易產。且免胎後諸患。芎藭芍藥之安胎補血。白朮之補胃養胎。其胎外之血。因寒滯者皆解之。黃芩化壯火而生氣。故為常服之劑。然當以脈證虛實加減。有病則服。否則不必也。

妊娠養胎。白朮散主之。但苦痛加芍藥。心下毒痛。倍加芎藭。心煩吐痛。不能食飲。加細辛一兩。半夏大者二十枚。服之後。胎通。卷之十。胎前。思得堂藏。

更以醋漿水服之。若嘔以醋漿水服之。復不解者。小麥汁服之。已後渴者。大麥粥服之。病雖愈。服之勿置。

本方四味。本草皆謂能去惡血。而養胎用之何也。蓋血聚而後成胎。少遇邪。則所聚之血。將宿而不運。反類惡血。必開陳。然後胎可安也。養胎不惟在血。而胎係於腎。養之又在於胃。所以補腎調胃。以固精和中。用白朮調胃。秦椒開脾。脾開則陽精至。吐瀉治崩。崩止則陰精固。川芎下入血海。運動胎血。破積生新。或陰血不利。肝木為害。在內抑屈而痛者。瀉以芍藥之酸寒。以通其陰。設直衝過而痛者。散以芎藭之辛溫。以通其陽。或挾瘀惡之氣。上逆於胃。而胃中吐煩不能食者。用細辛溫中去痰下氣。半夏治心下痞痛。和胃進食。止吐逆。若嘔而不止者。由肝木妄動。用小麥

飲養其本氣以安之。大麥主消渴益氣調中。故中氣不足而渴者用之。

問曰。婦人病。飲食如故。煩熱不得臥。而反倚息者何也。師曰。此名轉胞。不得溺也。以胞系了戾。故致此病。但利小便則愈。宜腎氣丸主之。

此方在虛勞中。治腰痛小腹拘急。小便不利。此治腎虛轉胞。不得溺。皆用此利小便也。轉胞之病。為胞居膀胱之室。內因下焦氣衰。水溼在中。不得氣化而出。遂致鼓急。其胞因轉筋不止。了戾其溺之系。水既不出。經氣遂逆。上衝於肺。故煩熱不得臥而倚息也。用此補腎。則氣化水行。溼去而胞不轉。胎自安矣。雖然轉胞之病。豈盡由下焦腎虛所致耶。或中焦氣虛。土溼下干。害其胞。與上焦肺氣壅塞。不

化於下焦。或胎重壓其胞。或忍溺入房者。皆足以成此病。必各求其所因以治之。胎前。思得堂藏。

脈辨。婦人經水二三月不來。診其脈微滑而數。晝無間斷。於其間。雖身有病而無邪脈。不瘥不伏。不弦勁。即胎脈也。辨男女法。古人咸以左大為男。右大為女。然多有素稟偏大偏小者。惟寸口滑實為男。尺中滑實為女。最為要訣。如兩寸俱滑實為雙男。兩尺俱滑實為二女。右尺左寸俱滑實為一男一女。此屢驗者。若脈沉細。腹重而不時微痛。雖有形如抱甕狀。滿腹不動。但當臍下翕翕動。按之冰冷。又兩尺乍大乍小。乍有乍無。或停或沉。或動或止。早暮不同者。乃鬼胎也。須連

視三四日。乃見宜補氣活血。若脈來急如風雨。少停復來。如初者。夜叉胎也。亦有關部微似雀啄之形者。又有大小不勻。

而指下強勁不和者皆夜叉之兆也。若服來沉細膠腹痛胎伏不動或反覺上搶心悶絕按之冰冷即非好胎更察舌故青色此胎已死也。若并唇亦青連母都不可救但伏而不動者亦有好胎宜服順氣和血之藥。

養胎。婦人經候不行已三月欲驗有胎否生川芎二錢為末空心濃煎艾湯調下腹內微動則胎也。

養胎。婦人受孕一月足厥陰脈養其陰陽新合名曰始胎。大集經云胎成七日初不增減二七日如蕪酪三七日如生酪四七日如熟酪是也。二月足少陽脈養陰陽居經名曰始膏。經謂五七日如生酥六七日如息肉七七日如段肉八七日其堅如環是也。三月手心主脈養初有定形名曰始胞。經謂九七日變五泡兩肘兩腋及頸十七日續生五泡兩手腕。

醫通卷之十

養胎

養胎

養胎

養胎

養胎

養胎

兩足及頸十一七日復生二十六泡十手指十足指及眼耳口鼻十二七日泡相成就是也。四月手少陽脈養始受水精以成血脈而形體成。經謂十三七日現腹相十四七日生五藏十五七日生大腸十六七日生小腸是也。五月足太陰脈養始受火精以成其氣而肢節充。經謂十七七日生脾處十八七日生三焦十九七日生手少陰足少陽二七日生陰脂願乳是也。六月足陽明脈養始受金精以成其筋而骨幹立。經謂二十一七日生有三百系軟骨如初生。二十二七日生如未熟瓜二十三七日生如胡桃二十四七日生一百筋是也。七月手太陽脈養始受木精以成其骨而毛髮生。經謂二十五七日生七千脈尚未具成二十六七日生成如藕絲二十七七日生有三百六十三筋二十八七日生肌膚是也。八月

手陽明脈養始受土精以成膚革而藏府具。經謂二十九七日肌膚稍厚三十七日方有皮像三十一七日皮轉厚堅三十二七日皮單轉成是也。九月足少陰脈養始受石精以成皮毛而數氣入胃石稟五氣之餘藏府百肢俱實故謂之石經謂三十三七日耳鼻唇指廉節成三十四七日生九十九萬毛髮孔猶尚未成三十五七日毛孔具足三十六七日爪甲成就是也。十月五藏俱備六府齊通納天地之氣於丹田經謂三十七七日母腹中有風起通其七竅三十八七日隨其宿世善惡分香臭二種風以定容貌骨節貴賤右千金述徐之才養胎法與大集經胎合求其細則受胎在母腹七日一變展轉相成然多有不足月產而能長育長年者此各經榮養與七日之變皆不及期而養胎之氣仍周遍也。若經脈

醫通卷之十

養胎

養胎

養胎

養胎

養胎

養胎

榮養未周。胎屬半產非正產也。惡阻。經候不行兩三月精神如故喜酸惡食或嗜一物或大吐或時吐痰與清水肢體沉重頭目昏眩此名惡阻不可作痢治。四君子加烏藥香附橘皮煎而渴者加橘紅五味生薑若胸中憤悶四肢沉重怠惰不能轉舒惡聞食氣喜酸胎動不安嘔逆不食者理中湯加茯苓木香半夏若中脘停痰二陳加枳殼若飲食停滯香砂六君子加枳殼若脾胃虛弱異功散兼氣喘加枳殼砂仁若飲食少思六君子加紫蘇桔梗頭暈體倦六君子湯若嘔吐不食倍苓半薑半夏乃健脾胃化痰理之聖藥也。今人以半夏有動胎之性鮮有用之者以胎初結慮其辛散也。其全善云余治妊娠阻病累用半夏未嘗動胎也。千金用半夏茯苓湯二劑次用茯苓丸。懷

妊愛酸乃肝藏之虛不能榮其肝虛故愛酸物。戴氏云惡阻者謂婦人有妊惡心阻其飲食也。肥者有痰二陳加枳術瘦者有火異功加芩連。

胎動。懷胎數動此胎氣熱所以逆上而作嘔也。急用條芩香附白朮之類腹中滿痛又心不得飲食千金用黃芩白朮芍藥煎服令微下水則易生月飲一劑爲善。因惱怒而胎動不安者沈香降氣散或四製香附一味爲君加歸艾爲散鹽酒煎和滓服。虛者八珍去茯苓加黃芩紫蘇陳皮各安胎飲又氣虛少食四君子加紫蘇陳皮血虛多熱四物加黃芩白朮胎氣鬱滯紫蘇飲脾氣虛弱六君子鬱結傷脾歸脾湯鬱怒傷肝脾者四七湯加芍歸。怒動肝火者小柴胡加朮。安胎之法有二。有因母病以致胎動者但治母病其胎自安。

醫通卷之十

胎動

思得堂藏

八珍湯加膠艾黃芩氣滯者去茯苓加蘇橘黃芩。因胎動而致母病者安胎而病自愈。紫蘇飲加茯苓白朮阿膠砂仁千金治妊娠二三月至七八月胎動不安腰痠已有所見者用膠艾湯服之則安。身有微熱去艾葉甘草加續斷葱白以蔥能散客邪兼安胎也。鄭虛菴曰治胎前下血不止用大劑參朮以安胎。芎歸熟地黃芩白芍阿膠以止血砂仁行氣以止痛不可行動但安臥養胎自愈。若傷動胎氣而下血不止急用紫蘇飲若胎未損服之可安。已損服之可下若施用四物湯陰藥不得陽生陰長之功非但胎不能安每致腹痛少食脾胃愈虛而愈不安矣。

漏胎下血。妊娠經水。逆之以養胎。畜之以爲乳。若經水時下此衝任氣虛不能約制而然。千金云妊娠血下不止名曰

漏胞。血盡則死。宜服乾薑地黃散。氣虛乏力少食者宜益氣固胎。切勿妄用養血之劑。四君子去茯苓加膠艾芍歸黃芩砂仁。若漏血腹痛者芎歸人參阿膠大黃煎服。若因鬱怒發熱內熱加味逍遙散。若血虛至夜發熱當歸補血湯。勞動脾火加味歸脾湯。若因房事下血過多作痛八珍湯加膠艾脾胃虛陷補中益氣倍升柴。風熱加防風黃芩。月數將滿而漏血者此必不守禁忌所致。亦有瘀血凝滯不能轉運而下者。氣血先傷後必難產。宜服紫蘇飲或用益母草熬膏。肥人砂仁湯調下。虛人參湯調下。妊娠三月其經月來三五次但不多飲食精神如故此血氣有餘兒大自不來矣。若作漏胎治之其胎必墮。胎漏黃芩或如豆汁。若肝脾淫熱用升陽除濕湯。肝脾風熱加味逍遙散。肝脾鬱結加味歸脾湯。脾

醫通卷之十

胎前下血

思得堂藏

胃氣虛七味白朮散脾氣下陷補中益氣湯。肝經風熱防風黃芩作丸服。風入腸胃胃風湯。大生方治妊娠忽然下黃汁如膏或如豆汁胎動腹痛用黃芩一兩川芎一錢糯米一合煎服。暴下水者其胎必下若徐徐而下者可用補氣安胎藥主之。

驚胎僵仆。妊娠負重跌蹶。疑血作痛欲服活血藥則恐傷胎不服則傷血不去治之當辨胎之死生如無別證只用黑糖熬枯入紅酒煎便調服。細嚼連皮胡桃肉過口死者當下生者其痛即止。如餘傷未盡痛未止四烏湯加延胡木香傷去而胎氣未安紫蘇飲加童便砂仁傷重者香散散加熟地當歸以護胎勢劇者下瘀血湯加芍歸酒煎以去血血去則胎自安。然須詳慎若昏睡語言如狂此血迫心包當歸活血

湯如腹中重墜。按之冰冷。此胎氣已傷。急用香桂散加酒大黃生附子下之。若口中覺穢氣者。急用平胃散加芒硝下逐之。○若因怒跌仆。或手足抽搐者。紫蘇飲加釣藤釣子。去血過多。八珍湯去茯苓加膠艾黃耆。

胎上逼。○妊娠胎動氣逆。皆由調養失宜。致胎逆上。紫蘇飲為必用之藥。飲食不甘。款四君子。有熱加苓梔歸芍。若惱怒傷肝。致胎逆上。加味逍遙散。因鬱結傷脾。胎氣不安。加味歸脾湯。大抵胎氣逆上。皆屬火旺。急用苓朮香附之類。不可服大寒之藥。反致他變。○妊娠遍身痛。或衝心欲死。不能飲食。緣胎有水致痛也。千金鯉魚湯。或用白朮五錢。黃芩二錢。白芍四錢。大活鮫魚約重半觔外一尾。煮湯代水煎服。○妊娠胎動晝夜呼叫。口索唇舉。及下重溺不惠者。用艾葉五兩。以

醫通卷之十

胎前加上去

思得堂藏

好酒五升。同煮三升。去滓更煎。取一升服。口閉者。開口灌之。藥下即瘥。○臨月胎上逼心。嘔噦欲死。急用童子小便灌之。即下。或烏梅肉十枚。研爛入生薑三片。煎湯灌之。亦下。取酸以降飲之。兼辛以散火氣之逆也。

陳良甫治一婦。孕七月。忽然胎上衝心而痛。坐卧不安。醫治不効。又作死胎治。而用草蘇屬香研貼臍中。命在垂危。陳診之。兩尺脈皆絕。他脈和平。曰。此子懸也。若是胎死。必面赤舌青。今面不赤。舌不青。其子未死。是胎上逼心。以紫蘇飲治之。十服而胎安矣。

安胎。○婦人半產。多在三月。及五月七月。除跌撲損傷外。因內熱而虛者為多。曰熱曰虛。當分輕重。若前次三箇月而墮。則下次必如期復然。蓋先於此時受傷。故復至期必應。乘

其虛也。遇有半產者。須多服養氣血固胎息之藥。以補其虛。損下次有胎。先於兩箇月後。即用固胎藥十數服。以防三月之墮。其有連墮數次。胎滑甚者。服藥須多。久則可留。八珍加陳皮膠艾條芩。多氣加香附砂仁。肥盛有痰。加半夏。若瘦而多渴者。禁用。○懷妊三四月。肥盛色白。氣虛者。用白朮一倍。人參續斷山藥香附各半倍。枳實湯泛為丸。朝暮砂仁湯下三錢。肥盛色蒼。氣實者。不須服藥。至七八箇月。但服砂仁湯。或紫蘇湯足矣。瘦而色白。虛弱者。白朮二倍。人參一倍。山藥續斷各半倍。陳米飲和丸。朝暮沸湯下三錢。瘦而色蒼。血熱者。酒煮條芩。四製香附各一倍。四物各半倍。蜜丸朝暮沸湯下四錢。至八九月。肥盛色蒼者。必用枳殼蘇梗以順其氣。慎不可用補氣之藥。非但參朮當禁。厚味亦宜節者。肥白

醫通卷之十

胎前加上去

思得堂藏

氣虛者。則人參白朮必當加用。但補氣藥中。必兼香附砂仁以流動其氣。若色白怯弱者。全以補養氣血為主。非但枳殼蘇梗輩不可用。即砂仁亦不宜也。誤耗其氣。必致難產。若色蒼形瘦者。此氣血流薄。當無難產之患。或久抱鬱結之氣。間或有之。多服逍遙散可也。○有誤服行胎毒藥。胎動不安者。古法用生甘草黑豆淡竹葉煎服。若發熱用香豉。然不若與熱童便尤良。以其能解藥毒也。血下不止。或上溢而為吐衄者。四物換生地。加阿膠山梔炒黑蒲黃。若胎傷不安者。消息緩急虛實治之。○凡妊娠服宜滑利數寶。大忌遲滯浮緩。半產。○半產。俗名小產。蓋由衝任氣虛。不能攝養。或癱撲閃墜。致氣血損動。或因熱病溫瘧之類。薛立齋云。半產重於大產。蓋大產如果熱自脫。小產如生採。破其皮殼。斷其根蒂。豈

不重於大產。但人輕忽致死者多。治法宜補形氣。生新血去瘀血。若未足月。痛而欲產。八珍去茯苓熟地。加膠艾。若草。若胎下而血不止。參耆木草膠艾。歸芍之類。有熱。加炮薑茯苓。半產而心腹痛。或發寒熱。以手按之愈痛者。宜散瘀血。芎歸延胡桃仁香附丹皮澤蘭童便之屬。若按之則痛緩。是血虛。八珍去芍加炮薑。若痛而嘔吐作瀉。是胃虛。六君子加炮薑。凡胎氣弱欲小產者。八珍湯固之。若出血過多而發熱。聖愈湯汗不止。急用保元湯。發熱煩躁肉瞤筋惕。十全大補湯大渴面赤。脈洪而盛。當歸補血湯。身熱面赤。脈沉而微。四君子加薑附。

東垣云。婦人分娩。及半產漏下。皆胃不省。眼目無所知覺。蓋因血暴亡。則心神無所養。心包絡火上熾。故令昏冒。火勝其

醫通卷之十

胎前產後

卷

思得堂藏

肺。故令眼目不省人事。慎不可用寒涼湯火之藥。蓋眼目之病。悉屬於陰。即如傷寒鬱胃。得汗而解。必當補而升舉之。古法用全生活血湯。其間風藥尾雜。而無陽生陰長之功。宜補中益氣加門冬五味。或大劑獨參湯尤妥。血若暴下。是秋冬之令太旺。今舉而升之。助其陽則目張而神不昏矣。

石頑治一婦。懷孕六月。因喪子悲哭動胎。醫用黃芩白朮。輩安胎藥二服不應。改用枳殼香附紫蘇砂仁理氣一服。胎遂上逼心下。服悶喘急。口鼻出血。第三日午後來請。石頑薄暮往診。其脈弦疾如狂風驟雨。十餘至則不至。頃之復至如前。因論之曰。此孕本非好胎。安之無益。不若去之。以存母命。因思此胎必感震氣所結。震屬木。惟金可制。令以鐵斧烈火燒紅醋淬。乘熱調芒硝末一兩灌之。明日復

來請云。夜半果下異胎。下後脈息微。神思恍惚。所去惡露甚多。又與安神調血之劑。數服而安。

胎不長養。石頑曰。胎之長養皆賴母之脾土輸氣於其子也。脾為一身之津梁。主周身之運化。在藏為土。長養萬物。莫不由此。故胎之生發。雖主腎肝。而長養實關乎脾。所以治胎氣不長。必用八珍十全歸脾補中之類。助其母氣。其胎自長。多有延至十二三月而產者。觀瘠薄之士。雖執不獲。得沃澤灌溉。便能成實。我可見矣。亦有妊母氣血自旺。而胎不長者。此必父氣之孱弱。又當大劑保元專補其氣。不得雜一味血藥助母。則子氣方得受益。復有胎氣因妊母舉動失措。致兒內失榮養。不能長養。仍不限產者。此與果實乾萎在枝無異。以妊娠氣血無恙。但子不得稟母氣耳。非若妊娠有疾。枝傷

醫通卷之十

胎前產後

卷

思得堂藏

湯服至二十餘劑而下。胎枯色白。所治雖異。而胎枯則一也。

嗽。○娠婦咳嗽。悉以安胎為主。風邪傷肺。香蘇散。寒邪傷肺。小建中湯。若肺胃氣虛。異功散。脾肺氣虛。六君子。加當歸。久嗽不愈者。多因脾肺氣虛。廢理不密。復感外邪。或因肺虛。陰火上炎所致。有外邪者。內補當歸建中湯。加細辛。陰火炎者。六味九。加麥冬。五味。

子煩。○妊婦苦煩悶。頭目昏重。是心肺虛熱。或痰積於胸。吐涎惡食。千金竹瀝湯。若吐甚。則胎動不安。煩悶口乾。不得眠者。加味竹葉湯。氣虛者。倍人參。氣滯。紫蘇飲。痰滯。二陳。加白朮。黃芩。枳殼。腸滿寒熱。小柴胡。脾胃虛弱。六君子。加紫蘇。山

施。

醫通卷之十

思得堂藏

類中風。○此證若不早治。必致墮胎。宜服紫蘇飲。若口噤不能言。用白朮三錢。荆芥穗二錢。黑豆三合。炒淋酒煎服。得汗即愈。口噤者。拘口灌之。可服三四劑。至有目昏黑而厥者。胎前絕少。但一有此證。即是兒暈。屬氣與痰。故目昏黑。發厥。只服紫蘇飲。慎不可服蘇合香丸。及烏藥順氣散等。

傷風。○妊娠傷風。香蘇散。去香附。加葱豉。咳嗽多痰。加桔梗。或紫蘇飲。加葱豉。安胎為妙。嗽兼渴。氣口脈滑實有力。中有宿食者。胃苓湯。去蒼朮。俟脾胃實。而治嗽。總不如濃煎葱豉。頭湯為上。蓋風藥皆能墮胎。故嗽喘胎寒。多用連翹葱湯。大能安胎。散氣。胎始無虞。或加香豉尤妙。若不喘者。紫蘇飲。加砂仁。童便。

傷寒。○冬時為寒所傷。輕者漸漸惡寒。身發熱。微嗽鼻塞。

數日乃止。重者頭疼作痛。先寒後熱。久則傷胎。藥多忌。不與常婦概治。但服葱白香豉湯。汗出則愈。○千金治妊婦傷寒。用葱白十莖。生薑二兩。水煎熱服。取汗即安。治妊婦熱病。用葱白五莖。香豉一升。如前服法。取汗。若胎傷未死。但用葱一把。水煎食之。汗出即安。若胎已死。須臾自出。不應。加生薑蘇葉。不可輕用發表藥。若用發表。豈但墮胎。母命難保。惟葱白香豉湯。香蘇散。可解邪氣。又可安胎。妊婦溫熱時行。及傷寒邪氣內犯。熱毒迫胎。並宜千金石膏大青湯。悉效。庶可保全。遲則不救。凡胎前疫證。與傷寒陽明府證。內實便數。須急通大便。方不損胎。若大便自利者。真氣下泄。胎必難保。惟大小便如常。知裏無熱。則不傷胎氣。

醫通卷之十

胎前各症

思得堂藏

安胎。無過黃芩白朮。原夫胎息之安與不安。全在母氣之調與不調。故安胎先安母氣。安有母氣乖戾。胎氣獨安之理。當知黃芩之安胎。惟治熱盛胎動不寧。白朮惟主脾虛不能保胎。設氣虛胎氣下墜。誤用黃芩。氣滯胎不轉運。誤用白朮。滋害何可勝言。所謂先安母氣者。隨其形體之肥瘦。氣血之偏勝也。若妊婦形盛色蒼。肌肉堅實者。必多滯多痰。無論何疾。必顯滯熱本病。服多消實有力。絕無虛寒虛弱之候。可峻用豁痰理氣藥。治其本質。然後兼客邪見證而為製劑。治宜二陳湯。隨經加透表藥。或合小柴胡用之。蓋柴胡為疎證之嚮導。故多用之。然有自汗過多。尺中微弱。或熱盛手足清者。始終不用柴胡。而用建中桂芍收功者。或見煩渴脈實。大便六七日不通。陽明府實。又宜涼膈去積黃加鮮首烏調之。須知

稟質堅固者。其氣多滯。內外壅遏。但有滯熱。絕無虛寒之患。如元氣水弱。或病後得之。必當理脾行氣。惟六君子湯為合劑。有痰食結滯。則加枳實草果。內有寒。則加炮薑。外有風。即加桂枝。胎動上逆不安。則加子苓。胎下墜。則加紫胡。倍人參。以人參為舉胎聖藥也。間有不應者。又當補中益氣。大劑人參。以升舉之。中有留滯。則枳實理中。加紫胡桂枝。合表裏而治之。若夫日作間作。日晏日早。晝發夜發。寒多熱多。及審飲食便溺動靜安危之法。則與常症無異也。大抵病邪初發。元氣未耗。疎風滌痰。消導飲食。在所必用。然須大劑白朮培護中土。以脾胃為一身之津梁。土厚自能載物也。其最可慮處。尤在三四發至六七發。其勢最劇。若過半月。雖淹纏不止。邪熱漸衰。可無胎墮之虞矣。或有癰久氣血虛敗而小產者。此

皆失於調治也。若六七發後不止。即當和胃健脾。若稟質柔脆者。雖有風邪。不得施用表藥。以風藥性升。能使胎氣上逆。而為嘔逆喘脹。腸塞痞滿之患。雖有實滯。不得過用降泄之味。能引邪氣下陷。致胎墜不安。而為泄利不食。小腹疼痛之患矣。若疫癘毒盛。勢劇。急與涼膈承氣黃連解毒救之。瘟疫憎憎不爽。煩熱大渴。或壯熱無寒。或先熱後寒者。當與桂枝白虎。人參白虎。散其在裏之熱。不可與夏秋痞滿比例而推也。蓋有是證而用是藥。有故無阻。亦無阻也。惟在速祛邪毒。以救胎息之燔灼。若遲疑未決。下手稍收。救無及矣。痢。妊娠痢下。有三禁五備。一禁瀉滯腸胃。二禁滲利膀胱。三禁兜瀉滯氣。蓋瀉滯則腸氣下陷。胎氣愈墜。滲利則陰津脫亡。胎失榮養。兜瀉則濁氣愈滯。後重轉加。故善治妊娠之

痢者。惟以調氣為先。蓋調氣之法。如爐治分金。已敗之積沫。則隨氣而下。未傷之津液。則統之而安。不善治痢者。惟守通因通用。痛無補法之說。誤用苦寒瀉滯。使未傷之津液。涸則敗壞之中。建瓶而下。在胃氣有權者。尚可勝其藥力。譬諸引液灌渠。一決而勢無餘。津陳腐去而倉廩自修。津氣自復也。若腎氣不固之人。秘藏不密。五液盡隨轉利藥注下。使既病之津液。更加猛烈峻攻。不致精神離散。血液告竭不已。況能保其胎息乎。夫調氣之藥有三善。一使胃氣有常。水穀輪運。二使腹滿腹痛微重漸除。三使濁氣開發。不致侵犯胎元。此治妊娠下痢之大端也。所謂五審者。一番飲食之進與不進。夫下痢乃腸胃受病。若劇勢難甚。飲食無妨者。易已。故痢以噤口為最劇。在初起濁邪全盛之時。不足為慮。但要清理積滯。飲食自進矣。若七日已後。尚不能食。脈反數盛。此必初時失於清理之故。急當調氣理中。則積沫漸下。飲食漸進矣。或初時能食。至一旬一氣後反不能食。脈息不振。此必為滯太過。胃氣受傷所致。亦有過用寒涼積滯。苦寒破氣。而致呃逆嘔噦者。胃氣大敗。最危之兆。惟峻與溫補。庶可挽回。若脈見數疾無倫。或翕翕虛大。或歇止不前。或弦細搏指者。皆胃氣告匱。百不一生矣。二審漫之通與不通。下痢清濁不分。若痢雖頻。而水道順利者。胎必無虞。若月數將滿。胎壓膀胱。每多漫便頻數。轉胞脹悶之患。功禁利水傷津。急與開提自通。但須察其脈無過而過硬之形。便宜補中益氣。稍加澤瀉車前。以升清降濁。投之無不輒應。非特妊娠為然。即平人久痢。津液大傷。而漫瀉不通者。亦宜上法也。三審腹之痛與不痛。下

痢腹痛。必然之理。然間有濁溼下趨。而無鬱滯之火者。則不
痛也。但此多見於肥白人之白痢。若血痢與瘦人多火者。罕
見也。治宜調氣運積。不用清火明矣。原其腹痛有寒熱之分。
痛有止歇。痛則奔迫下墜。至圓不及者。火也。痛自下而攻擊
於上者。火也。痛而脹滿。不勝摩按。熱飲愈甚者。火也。實也。痛
無止歇。常時痛而無絞刺者。寒也。痛自上而奔注於下者。寒
也。痛而不滿。時喜溫手摩按。飲熱暫緩。欲至圓而可忍。須臾
者。虛也。寒也。大約初痢脹痛。為熱為實。久痢痞痛。為虛為寒。
即初因火注切痛。痢久氣傷。亦必變為虛寒也。故久痢腹痛
之脈。無論大小遲數。但以按之漸漸小者。並屬虛寒。急須溫
補。慎勿刺氣。惟急痛脈實。久按不衰者。可稍用炮黑薑連和
之。四寶後之重與不重。下痢後。濁氣滯滯也。夫開通滯滯。

醫通卷之十

痢前

思得堂藏

必以調氣為本。在妊娠尤為切要。調氣則後重自除。而胎息
自安矣。但初痢後重。首宜開發其滯。若久痢後重。又當升舉
其陽。陽氣升則胃氣運。胃氣運則周身中外之氣皆調達。而
無壅滯之患矣。故治孕婦之後重。無問胎之大小。但脈見有
餘。則宜調氣。脈見不足。便與升提。雖血痢亦宜陽藥。一切滋
膩血藥。總無干預。以氣有統血之功。則血無妄行之慮也。五
審身之熱與不熱。下痢為裏氣受病。若見身熱。表裏俱困。元
神將何所持。而得振邪之力哉。惟人迎之脈浮數。可先用
和營透表之法。分解其勢。然後徐行清理。若初痢不發熱。數
日半月後發熱。脈來漸小。或虛大少力者。此真陰內亡。虛陽
發露於外。在平人或可用辛溫峻補。飲之以歸其源。若妊娠
則桂附又難輕用。惟藉參朮薑艾之屬。非大劑濃煎峻

投。難望其轉日回天之勛也。或有痢久衛虛。起居不慎。而感
胃虛風。發熱者。但當察其左手三部。必顯浮緩之象。又需理
中湯加桂枝。合表裏而治之。以內氣久虛之邪。不得參朮助
其中氣。則客邪不得解散也。五審既明。三禁勿犯。又當審察
其積之稠與不稠。色之鮮與不鮮。則元氣之厚薄。病患之寒
熱。可曉然無惑矣。如赤白寒熱之辨。昔人擬議紛紜。要非正
論。以大畧言。氣分之病。其色白。血分之病。其色赤。氣血素亂
則赤白兼并。蓋氣屬陽。陽傷則受冷居多。即有火注下迫。皆
陽氣鬱遏。本寒標熱之證。不可純歸於熱。但當驗其積之稠
粘如糊。色白如脂。方可暫與清熱治標。若汁沫如水。色晦如
塵。急須溫理其氣。即有熱證。皆假象無疑也。血屬陰。陰傷則
受熱居多。然多有氣傷陽不統陰之血。又不得不從事於辛

醫通卷之十

痢前

思得堂藏

溫也。故治血痢。尤當以色之顯晦。驗其虛實寒熱。此義前人
未發也。故凡積之瘀晦不鮮。清稀不稠者。皆係虛寒之候。即
前所云陽不統陰之血。急投人參薑艾。庶或保全。倘不審而
誤調。卒連是速其斃也。惟積之稠粘紫赤而光澤者。合用苦
燥。以堅腸胃之滑脫。又必佐以調氣之藥。則陰邪得以解釋。
非若白痢之不可雜以辛連芍藥等味。引領滯機。變傷陰血
也。況有病後虛弱。或本質虛弱之人。及秋冬天令寒冷時下
痢。加以胎孕批脫。可與平人夏秋之痢同日而語哉。予嘗用
厚朴湯去乾薑。治妊娠能食。腹脹後重。積滯稠粘之白痢。甘
草乾薑湯理中湯。治妊娠腹痛少食。積沫清稀之白痢。厚朴
生薑甘草半夏人參湯。治妊娠腹脹後重。赤白相兼之痢。黃
芩芍藥湯送香連丸。治妊娠能食後重。積穢稠粘之血痢。連

理湯合千金三物膠艾湯治妊娠少腹疼痛。或問有鮮血之痢。駐車丸治妊娠發熱後。陰虛畏食之血痢。白頭翁加甘草阿膠湯治妊娠熱毒內攻。噤口不食。腹脹發重。腹血稠粘之痢。千金膠艾榴皮湯治妊娠腹血清稀。胎動不安。久泄不止之痢。補中益氣湯治妊娠先產後痢。及產前作元氣下陷。胎氣下墜。小便頻數。或轉胞不得溺之痢。以上諸方。並加砂仁以調其氣。烏梅以調其血。未常不隨手輒効也。

石頑治邪其字。懷孕九月。患瘧三四發後。即嘔惡畏食。診其脈。氣口清數不調。左關尺弦數微滑。此中脫有令物阻滯之候。以小柴胡去黃芩加炮薑山楂。四服稍安。思食。但性不嗜粥。連食肺鴨之類。遂瘳。痢兼併胎氣下墜不安。

醫通卷之十

胎前子後

思得堂藏

以補中益氣去黃芩加香砂烏梅。五服而產。產後瘳痢俱不復作矣。其後產後數日。亦忽下痢膿血。至夜微發寒熱。小腹脹痛。與千金三物膠艾湯去榴皮加炮黑山楂六服而瘳。

子淋。妊娠小便淋者。乃腎與膀胱虛熱。不能制水。然妊娠胞系於腎。腎間虛熱移於膀胱。而成斯證。若小便澀少淋瀝。生料六味丸加麥冬五味肉桂車前。若膀胱陽虛陰無以化。腎氣丸肺氣虛而頻數短少。生散散加山藥澤瀉。若小腸熱。小便赤澀。導赤散。若肺虛膀胱熱。而氣化不行。生散合導赤散。若因肺經蘊熱。黃芩清肺飲。肝經濕熱。加味逍遙散。膏粱厚味。加味清胃散。若因勞役所傷。或食煎燥。小便帶血。此血得熱而流於脾中。補中益氣加丹皮梔子。若因脾胃氣虛。胎

歷尿。胎而胎服腹痛。八珍湯倍茯苓加橘半。空心服。服後探吐。藥出氣定。又服又吐。數次必安。

遺尿。妊娠遺尿不覺。胎滿故也。千金白薇散。薛氏云。若胎中有熱。加味逍遙散。脾肺氣虛。補中益氣湯加益智仁。肝腎陰虛。六味丸。孕後有水從陰戶出不止者。千金鯉魚湯加肉桂人參。

諸血。妊娠尿血。熱乘血分。以致流滲於脾。名子淋。導赤散。若因怒動肝火。小柴胡加山梔。若脾氣下陷。及勞動脾火。補中益氣加茯苓車前。若因厚味積熱。加味清胃散。若因肝脾血熱。加味逍遙散。

妊娠吐衄。由七情藏府所傷。氣逆於上。致血上溢不止。心悶甚者多死。或墮胎也。若肝經怒火。加味逍遙散。膏粱積熱。

醫通卷之十

胎前子後

思得堂藏

加味清胃散。鬱結傷脾。加味歸脾湯。肺經有火。黃芩清肺飲。因氣鬱滯。紫蘇飲。氣不攝血。補中益氣去升麻加煨葛根。腎經虛火。六味丸加麥冬五味。欬嗽咯衄。胎前皆不宜見。面赤聲嘶。不治。咯血吐血。多致墮胎。胎前血養。不宜漏溢。紫蘇飲加條芩。如產後吐衄咯血。皆難治。漏極如同月水。胞乾胎死。母亦難保。腸風藏毒。腸胃不調。脹滿下血。者平胃散去蒼朮加槐角。防風當歸烏梅。

諸痛。宿有偏正頭風。川芎茶調散。宿有冷瘕痰飲結聚。或新觸風寒邪正相擊。上衝於心。則心痛。下擊於腹。則腹痛。痛不已。則胎動不安。此病多寒多食。間有屬熱者。並宜正氣散。寒加木香炮薑。食積發熱。加苓連炮薑。氣加砂仁香附。痰加橘皮生薑。若因錯雜之邪。當審其因而治。胎前產後心痛。

川棟茴香炒各三錢。鹽炒艾葉錢半。水煎服之。○腹痛或發或止。名曰痛胎。屬血少。四物加香附為末。紫蘇湯送下。氣滯者紫蘇飲。○胃口痛。禁食。用指迷。但宜養胃湯。妊娠腹中滿痛。心不得飲食。千金苓朮芍藥湯。○脇痛。其故有三。哭泣也。內傷也。惱怒也。有胎不宜服行傷破氣藥。只宜童便和酒服之。或紫蘇飲去參用白芍當歸加砂仁童便。雖曰傷重。勿服傷藥。且須安胎為要。○背痛氣滯也。紫蘇飲。○腰腹背痛。是因勞傷損動。痛不止。多動胎氣。補中益氣加續斷杜仲。有因淋證作痛者居多。當審治之。走注痛者。敗血入經之證。四烏湯加薄桂杜仲續斷。肥盛人多淫熱。腰痛重墜。或下白物者。二妙散加柴胡防風茯苓半夏。氣血鬱滯。遍身拘急。不舒而痛。服生黑花。夜不能臥。紫蘇飲加枳殼桔梗。○腰痛甚者。

醫通卷之十

胎前諸痛

思得堂藏

腎虛極也。其胎必墮。急服八珍湯加膠艾黃耆。或紫蘇飲加減。○臍下冷痛。腹脹虛寒。小便頻數。大便虛滑。皆食生冷所致。小建中加炮薑木香。不應。更加茴香良薑。○小腹痛。由胞絡虛熱相搏所致。紫蘇飲加生薑。虛寒用膠艾湯。不應。寒甚也。加桂附溫之。內傷者。胎下無疑。若服不効。須視小腹近下處。若腫脹浮薄發光者。孕離也。千金托裏散。或薏苡仁煎汁飲。若心腹急痛。煩悶面青。冷汗氣絕。血下不止。其胎上衝者不治。○子腫。○妊婦四肢浮腫。或腹大者。其證有二。有水腫。有胎氣腫。然胎前水腫者少。只是胎氣。謂之子腫。乃氣病也。蓋因藏府水虛。脾土不能制水。血散四肢。遂腹脹。手足面目皆浮。甚則通身腫滿。心腹急脹。悉宜紫蘇飲。小便不利者。其胎氣兼

水氣也。紫蘇飲加澤瀉白朮茯苓木通。若發浮氣。帶腹脹。服藥後腹退皮寬。六君子調理。若面目虛浮。肢體如水。氣腫。服金生白朮散。不應。六君子加腹皮車前。下部腫甚。補中益氣加茯苓。或因飲食失宜。嘔吐泄瀉。此是脾胃虧損。六君子加炮薑木香香附。若足指發腫。漸至腿膝喘悶不安。或足指縫水出。名子氣。乃婦人素有風氣。或衝任有血。挾風水。不可妄投湯藥。二陳加烏藥香附木通。脾胃虛弱。更加參朮。兼進逍遙散。不應。紫蘇飲。凡妊娠經血壅閉。忽然虛腫。乃胞中挾水。水血相搏。脾胃主肌肉而惡濕。淫瀉氣弱。則肌肉虛。水氣流溢。則身腫滿。或因泄瀉下痢。藏府虛滑。耗損脾胃。或因寒熱煩渴。引飲太過。淫瀉脾胃。皆能使手足頭面浮腫。然水漬於胞。兒未成形。則胎多損壞。及其臨產。經脚微腫。乃胞藏血少。

醫通卷之十

胎前諸腫

思得堂藏

水多。水出於外。故現微腫。則易生也。妊娠通身浮腫。胸膈不分。或心腹急脹。名曰胎水。千金鯉魚湯。有妊娠腹脹。服前湯三五劑。大小便皆下惡水。腫消服去。遂下死胎。此證蓋因懷娠腹大。終不知胎水之患也。○鄭虛菴曰。身半已上腫者。發汗。身半已下腫者。利小便。上下俱腫。汗利分消其淫。若腎黑。缺盆平。背平。臍突。足底平。皆不治。○不語者。多為痰閉心竅。亦有胎。不須服藥。岐伯曰。人有重身九月而瘖。此胞絡之脉絕也。胞絡者。繫於腎。少陰之脉。貫腎繫舌本。故不能言。無治也。當十月復。凡患此者。滋煎生脉散。空心服地黃丸。助肺腎之氣。以養胎。若與通聲開發之藥。誤矣。○妊娠識語。為藏府熱極之候。急宜童便時時灌之。不

應用生地黃黃連散清其血中之火。庶胎得安。脈實者加酒大黃下之。下遲則傷胎也。亦有傷胎下血。心神無主而譫語。雖用峻補亦難得効。若舌青者。子死腹中。急當下之。若數胎一生一死者。必腹中半邊冷半邊熱。因母患熱證。藏府熱甚。蒸其胎。兒因致死。但服黑神散加生蒲黃以煖其胎。胎即出矣。胎未死。并泥塗臍以護胎氣。多有保全者。

子懸。胎氣洩泊上心。忽然昏暈。人事不省。謂之子懸。必妊娠素多鬱悶。痰氣壅塞。致胎不安。乘其鬱火升迫心下。喘脹腹痛。甚則忽然仆地。愈宜童便灌之。次以紫蘇飲加鈎藤茯苓薑汁童便。將產時皆眩。亦宜紫蘇飲。若誤作中風治之必死。

子癰。妊娠體虛受風。則口紫背強。胃悶不識人。須臾自斃。

胎前子後

思得堂藏

良久復作。謂之風癰。亦名子癰。甚則角弓反張。追遠散加羌活羚羊角桑仁鉤藤豆淋酒煎服。鄭守恒云。子癰一證。人不易識。或眩暈。或冷麻。重至仆地。不省人事。驗其平日眼目昏沉。或認白為黑。認黑為白。是其漸也。

乳泣腹痛。未產乳汁先下。此名乳泣。生子多不育。又有兒在腹中啼哭者。因妊婦登高舉臂。脫出兒口中血乳。以此作聲。令妊婦曲腰就地。如拾物狀。或令掃地。仍入兒口即止。亦有胎熱不安而啼者。以黃連濃煎汁。妊娠時時呷之。

鬼胎。古人論鬼胎之說。皆由其人陽氣不足。或肝氣鬱結。不能生發。致陰血不化而為患也。有因經行時飲冷。停滯而成者。有鬱痰驚痰淫熱。凝滯而成者。有因患惡氣食。於積疔結而成者。故凡鬼胎之胎。必沉細弦滑。或有時虛浮。有時沉

緊皆陽氣不充之驗。其腹雖漸大。而漫起重墜。終與好胎不同。當臍或臍下左旁雖微動。亦與真胎迥別。治宜理氣行血為主。如因於鬱者。逍遙散加枳殼烏藥香附磨香。因於寒者。理中加烏頭逐末香附。因於痰者。導痰加香附烏頭乾漆炒桃仁。因於驚者。四七湯加茯神辰砂桂心磨香。因於氣食者。大七氣加酒麴。因於淫熱者。當歸龍薈丸加蓬朮蘇木香附。因血結者。代抵當去芒硝大黃。加煅硝硫黃五靈脂。產人只用十全大補加桂附。是可緩圖收功。不可峻用巴豆芫花并草鬼臼等毒藥。急迫取效也。嘗見得孕經止。尺脈或澀或微。弱而無他病。此子官真氣不全。精血雖聚。而陰不能化。終不成形。每至產時而下血塊血胞。若此必大劑溫補。預調而後方能成孕也。

醫通卷之十

胎前子後

思得堂藏

下私胎法。妊娠諸病。以安胎為主。慎勿妄下。禾傷人命。造孽非小。有生育多。畏產而欲下者。當與安胎之品。惟私胎方可下之。香桂散加烏頭尖一錢立効。若本元虛寒者。得辛溫之藥。愈助其生發之氣。且土牛膝一兩。歸尾三錢。川芎一錢。蘇木三錢。桃仁泥三錢。穿山甲一錢。三四服。必下。煎成加麝香尤速。或麴四兩。酒三大盞。煎取一盞五分。細濾。分溫三服。立下。又方。大麴五升。清酒一斗。煮二沸。去滓。分五服。隔宿勿食。但再服。其子如糜。母無疾苦。又方。麥蘖一升。為末。和水煮二升。服之立下。又方。以附子二枚。為末。醇酒和塗右足去之大良。然不若以牛膝粗者。取五七寸。候著子宮。將二指夾著送進。燃入三寸許。以線繫定。用帛兜束腰中。不使退出。母論月數多少。一夕即下。無不應者。

斷子法。用酒麴一升。無灰酒五升。煮至一升半。濾去滓。分三服。經候至前一日。晚進一服。次早五更一服。天明二服。月經即行。終身無妊矣。此千金下死胎法也。若婦人四十餘。欲其經斷。以前方加牛膝紫葳各一兩。經行後。如前法服之。即斷。又木耳煨灰存性。熬枯黑糖調。經行後。或產後月內服之。即不孕。孕婦服。其胎即下。又頭戴子三錢。煨灰存性。產後三五七朝內。陳酒調服。則終身不孕。雖虛人亦無妨礙。

臨產

扶持。妊娠九箇月。宜服達生散數服。若肥盛氣實者。用枳殼二兩。香附甘草各一兩。為散。沸湯下二錢。早暮各一服。血實色蒼者。枳殼二兩。當歸一兩。為末。煉蜜丸。空心酒服五十丸。然元氣虛弱者。惟大劑紫蘇飲鼓舞其氣。生產必易。若誤服前藥。反耗其氣。多致難產。傷胎。臨月胞水不破。血先下者。此是傷胎。非產也。大劑保元湯加當歸童便。最為得力。因臨產行動。已傷其胎。而發熱者多危。紫蘇飲倍人參。

胞乾。臨產胞水惡露破盡。致兒乾悶艱澁。達生散去木倍人參。若胞衣破久。其血已涸。元氣困憊。急用上好人參兩許。當歸二錢煎飲。盡則再煎。助其氣血。最為得力。捨此而通用

催生耗氣諸藥。總無一効也。

難產。難產者。腹痛久而未產也。若惡露少者。雖久不妨。此胞水未破。俟胞水行時自產。若連腰痛甚者。將產也。蓋腎候於腰。胎繫於腎故也。如胞水先破。惡露行盡。累日不能下者。當補養氣血。慎不可用破血耗氣之藥。急用佛手散加入人參三錢。入熱童便調服。此取純陽生氣。切不可停冷。冷則生氣上。而無益於治也。或用前藥送兔腦丸亦妙。難產須擇精細穩密。最為切要。惟胎氣逆上。全在醫治之功。如氣滯逆上。煩以熱湯便灌之。但得白色者即佳。不必拘用童子之便也。氣虛不能驅其胎而上逆者。獨參湯加濃便服之。甚至昏暈吐沫。痛極語者。急控頂髮。扶開牙齒。以濃便灌之。稍遲則不救矣。丹溪云。世之難產者。往往多見於鬱悶安逸之人。

富貴本養之家。若辛苦貧賤。鮮有之也。古方止有瘦胎飲一論。其方爲胡陽公主而作。恐非至當之言。余族妹苦於難產。遇胎則觸而去之。予甚憫焉。視其形弱而勤於女工。知其氣虛。久坐氣不運而愈弱。兒在胞胎。因母氣虛。不能自運耳。當補其母之氣。則兒運易產。令其有孕。至六月來告。遂以紫蘇飲加神氣藥。與數十貼。得男甚快。因此方隨母之性。稟與時會。加減服者。無不應驗。臨產時。去川芎生薑。加白朮黃楊。則腹不覺痛。母亦無病。因名方爲逆生散云。○難產及胞衣不下。悉於產母右腳小指尖頭上灸三壯。炷如小麥大。火去卽產。○凡難產兒下。多有不哭者。切勿燒其臍腸。後必不育。○凡胎帶粗大或青色。斷多鮮血者。及落下過早過遲者。皆不育。誠驗。

醫通卷之十

難產

五 思得堂藏

石頑曰。難產之患。多緣婦人稟性執拗。懷孕之日。不檢束身心。任意作爲。以致氣血乖違。胎孕偏著。臨產之際。雖遍用催生方藥。客無一驗。以數月失和之胎息。一時豈能克應。况有坐草多日。血氣大虧者。惟大劑獨參湯峻補其氣。方能逆力送產。獨怪世之婦。及生產家左右之人。皆堅持產中禁用。人參之說。坐視其斃者多矣。安知產中誤用人參爲害者。皆是力作勞動。軀體堅韌之人。雖有疾病。祛之則安。奚俟補爲。設強與服之。心膈光裂。是不能無助火發熱。凝滯惡露之患矣。若夫竹葉通瀉。養榮柔脆之家。平時慣服。服之泰然。何助火滯氣之有。余室人素稟羸弱。而多沉鬱。每產必用人參一二兩。濃煎時。以助其氣。聽其自然。雖二三日無恙。兒娘亦患氣滯難產。穩婆難阻。服參至第四日。子頭腹中。不得已煎。

大劑參湯灌之。產後方云。未服參已前。耳曠目盲。惟見滿室紅光。繼而漸漸紫黑。及服參後。開眼卽能辨物。神氣亦能主持。腹中便有漸陳。始信服參之驗。近日同道王公峻室人難產。竟日不下。自煎人參七錢。頓服便產。其助力之効。非他催生藥可比。因詳述以破世俗之惑。

產變。○兒未生先露手臂。謂之橫生。蓋因產母用力太早之故。當令安然仰臥。使懸婆推入肱上。以中指抵其肩。漸扳兒耳而正之。令服大補氣血藥。如獨參加當歸童便之類。切勿驚怖產母。使氣血凝滯。關礙轉閉也。候兒身正。門路皆順。然後用力。○胎氣不足。關礙甚牢。用力太早。兒不能自順。只一直下。先露其足。謂之倒生。亦如前法用力卽下矣。○兒方回轉。未能全正。却致產母用力。致兒頭偏左偏右。雖近門路。不

醫通卷之十

難產

五 思得堂藏

能卽下者。謂之偏產。亦如前法。○兒方出胞。氣力不續。身未轉運。却被產母用力一送。則兒臂先露。謂之坐齋生。亦如前法。令服補氣和血之藥。安臥靜養。候其力完轉運。然後用力。○兒出胞轉身時。偶然臍腸盤於項上。牽繫不能卽下者。俗名背包生。亦宜推入。輕擺擡去。然後用力。○兒出胞時。頭必轉向產門。自然正產。若無力轉運。脚踏胞衣。臍腸先出。謂浪臍生。急令懸婆清理。清推入。稍俟氣平。乘勢就其臍下。不可推轉久延。久則臍腸復下。復難收拾矣。○人之二腸。俱有脂膜聯絡。間有生成無膜聯絡者。則產時其腸隨兒而下。謂之盤腸產。須用漆器溫湯淋淨。務令溫暖溼潤。盛其所下之腸。切勿粘墜垢。及著乾物。卽不肯上而粘住斷絕矣。全在穩婆精細爲妙。○天氣嚴寒。經血凝滯。致兒不能下。凡遇此際。切

不可就脫寒衣。并不可坐卧冷處。房中須宜火暖。肩背須裹綿衣。使血得熱則流。兒易生矣。若遇春秋偶寒。亦如前法。暑月當令產母在無風清涼處。不可多人看。恐人多熱氣逼。蓋血得熱則散。溢上蒸。致令產母頭痛面赤。不省人事。謂之血暈。若夏月風涼陰雨。亦不可任意取涼。恐生大病。慎之。

摩揣。臨產腹痛。切不可使惡婆摩揣。候雖水破痛極。尤當忍之。令人扶掖緩行。則兒自順正。豈有橫逆之患。若胞水破。兒未下。謂之試水。此產甚遲。有隔二三日產者。宜服八珍膠艾。水止痛定。至五六日產者甚多。但覺腹中運動。切不可容穩婆動手。及產母用力。蓋兒出胞時。用盡其力。不能即轉。多有過數日方得力。轉運自然身正而下。舉世之難產者。

臨產色之十

臨產月法

養生

五十四

恩得堂錄

雖由平日居處失宜。往往皆是。惡婆輕易動手。摩揣所至。所以田野村婦。艱於產者絕罕。惟富貴之家。不習勤勞。任意眠坐。經絡凝滯。恣情飲啖。兒得肥甘。長養倍常。更多不替房室。頻泄母氣。自不能如勤勞村朴之天生天化也。況乎臨月。一有腹痛。即喚惡婆探候。驚動胎氣。傷其先天氣血之源。多致子母俱傷。亦有產後致變者。皆產時藏府受傷所致也。即子之天枉。多緣先天之氣不得其全耳。

臥法。臨產時宜仰而正。不可偏側。生時不可太早。蓋男胎向內。女胎向外。皆首居上。足居下。臨產時必側轉順出。須再三緩緩扶掖走動。使得其旋轉。不然恐有橫逆之患。催生。坐席時。用蓮生散去芍藥。加枳殼黃楊。腦童便。然必待胞水破。腰痛甚。方與熱服。不可太早。早則先行惡露。反致

難產也。凡十月未足。臨產腹痛。或作或止。或痛不甚者。名曰弄胎。或腹痛甚。而腹不甚痛者。或胎高未陷者。或穀道未挺進者。或水漿未破者。或漿水雖出而腹不痛者。皆屬氣虛。並非正產之候。惟宜獨參湯助之。慎勿妄投藥餌。致產母驚恐而妄亂用力。直待子逼門戶。腰重痛極。眼中如火。穀道挺進時。方可用力。兼服催生藥。如千金方用阿膠三兩。滑石一兩。車前子二兩。為末。飲服方寸匙。少頃再服。此藥臨時服之。不可先服。

飲食宜忌。臨產飲食宜調。不可不食。受饑。使母無力。尤不可過食太飽。使兒氣不能運。多致子母受傷。及乎產後發熱泄瀉。中脫精痛。皆緣飲食所傷。即湯水亦宜少用。往往有膀胱破損。良由引飲過多。尿膀胱滿所致。種種危候。皆產前不醫。通卷之十。

臨產飲食宜忌

五十五

恩得堂錄

慎之故。尤忌飲酒。每致血逆奔上。急與熱童便壓之。然多有不敢者。至於豬腎雞子之類。皆難剋化之物。非但產後當忌。臨產亦不可食。

備法。產婦或不順理。用草麻子十四粒。硃砂雄黃各五分。蛇蛻一尺。燒灰。麝香一字。為末。將水和作一丸。先用川椒湯洗臍中。置藥於內。再用熱敷重覆。蓋以帛繫之。即下。下即去藥。橫生逆生。手足先出者。以鹽擦兒手足心。盤腸生而腸不收者。用新汲水入醋。噴而當自收上。一法用草麻子十四粒。搗爛。貼產母頂心。其腸收上。即去之一法。以半夏末。搗鼻中。腸自上。一方以草麻子油。潤紙。擦臍。吹滅。將烟熏鼻中。其腸即上。

下死胎法。子死腹中者。或熱病傷胎。或顛仆高墜。或驚動

太早。或觸犯禁忌。或胎肥氣滯。惡露已盡。致胎乾于死。身冷不能自出。須臾產母而赤舌青。腹中陰冷重墜。是其候也。然不若見紫黑血塊血糞。尤為確候。至若爪甲與舌俱青。腹脹氣喘。口中臭氣者。危矣。急令總婆動手。以法下之。遲則不救。古法雖有童便調朴硝。及平胃散。木酒煎調朴硝。虛寒用理中湯。倍參。煎調芒硝等法。然有時輒應。有時不應。良由產母元氣盛衰不同。能行藥力與不能行藥故耳。亦有產難有兩兒。一死一生者。千金用蟹爪一升。甘草二錢。阿膠二兩。以流水先煮蟹爪甘草。去滓。內阿膠烱化服之。血凝不下。加桂心三錢。藥入死者。即出生者。即安。神驗。此千金法。取蟹能散血。而爪觸之。易脫物。類相感之應也。又有子死腹中。用黃牛屎塗母腹上。立出者。又有取龍心黃土為散。酒服二錢。是

醫通卷之十

產下死胎

五十六 恩得堂藏

立出者。又有以夫尿煮沸服之者。又有以冬葵子即向日半升。阿膠三兩。煎服者。又有用甘草筒桂。蒲黃香豉煎成。入雞子一枚調服者。若冬月胎死堅凝。腹中覺冷。用香桂散加烏頭及黑神散。黑龍丹。皆可用。內外有邪者。五積散最宜。若死胎及胎衣惡血上逆。搗碎。用小便乘熱灌之。但得一口下咽即止。若而赤舌青。子死母活。面青舌赤。母死子活。唇青吐沫。或而舌俱青。子母俱亡。
陸斗巖治一婦有胎四月。墜下逾旬。腹脹發熱。氣喘面赤。口鼻舌青黑。診之其脈洪盛。曰胎未墜也。面赤者。心火盛而血乾也。舌青口鼻黑。肝氣絕而胎死矣。內外皆曰胎墜久矣。復診色脈如前。以蛇蛻煎湯。下平胃散加芒硝。歸尾服之。須臾腹鳴如雷。腰腹陣痛。復下一死胎而愈。

胎衣不出。○膽腸墜斷。惡露入胞。脹大不能出者。二味參蘇飲童便和服。壯實人失笑散以消瘀血。甚則平胃散加朴硝下之。○胞衣不下。古法用蛇蛻一條。香油燈上燒研。入麝香為末。童便調服。或加斷文阿膠。蘇木各一錢。麥芽末打糊為丸。名烏金丸。難產及死胎不出。俱童便服之。亦有單用蛇蛻酥灸為末。童便下一錢匙者。千金治胞衣不出。胞爛喘急欲死。用牛膝湯服之。即下。妊娠肥盛多痰。阻滯氣道而致產難及子死胎乾。或子下而胎衣不出。半夏為散。服方寸匙。連進三服。并用吹鼻取嚏。以激動關竅。大妙。○常見下死胎胞衣用朴硝等法。非惟不効。即使得下。胃氣大傷。往往不能收功。丹方用草薢子肉。研塗母右脚心。胞下懸洗去。緩則腸亦出矣。今人以產婦頭髮入口作嘔。胎衣自出。其法甚効。如不

醫通卷之十

產下死胎

五十七 恩得堂藏

出。反逆上者必死。
交骨不開。陰門不閉。子宮不收。○三者皆元氣不足。交骨不開者。加味佛手散。助其血氣。補而開之。古法用加味芎歸湯。即佛手散加龜版灰血餘。每見服此藥者。惡血凝滯。反成不救。惟大劑人參童便入芎歸劑中。助其血氣。開關之功立致也。若見咬牙昏暈。急以熱小便灌之。稍遲則無濟矣。若元氣不虛者。只用佛手散。小便服之。單用小便亦得。人參不必也。○陰門不閉者。十全大補倍參桂。補飲之。若初產腫脹。或厥痛而不閉者。當用逍遙散加荆芥杜仲。切忌寒涼。○子宮不收者。補中益氣加酒炒白芍一錢。肉桂五分。補而舉之。或助以外治之法。如草薢子貼頂心之類。
薛立齋治一婦子宮脹大。二日方入。損落一片如猪肝。已

而面黃體倦。飲食無味。內熱晡熱。自汗盜汗。用十全大補二十餘劑而愈。仍復生育。

張氏醫通卷之十終

醫通卷之十

思得堂藏


張氏醫通卷十一

清 長洲石頑張

璐路王

男

以柔安世



日本 大泉長巷前田安宅子仁再訂

男

典子守

婦人門下

產後

經曰。乳子而病熱。脈懸小。手足溫則生。寒則死。

乳子中風熱。喘鳴肩息者。脈實大而緩則生。急則死。

上條言產後以乳哺子之時而患熱病。其脈只宜懸小。不宜實大者。以產後新虛故也。設脈雖懸小。而見手足逆冷。

醫通卷十一

產後

思得堂藏

又為脾氣衰絕。陰氣暴逆之候。亦主死也。下條言產後中風熱。而至喘鳴肩息。以風熱逆於陽位。其脈必不能懸小。但須實大之中。而往來和緩。則脾胃之氣在其中矣。設見急疾。胃氣已絕。安得不死。後世以乳子二字誤認為小兒。如張介賓之明。亦不加察。且因此而謂小兒不當視虎口三關。即宜診兩手六部。非智者之一失歟。

金匱云。問曰。新產婦人有三病。一者病痙。二者病鬱。三者大便難。何謂也。師曰。新產血虛多汗出。善中風。故令病痙。亡血復汗。寒多。故令鬱。胃亡津液。胃燥。故大便難。產婦鬱胃。其狀微弱。喘不能食。大便反堅。但頭汗出。所以然者。血虛而厥。厥而必胃。胃家欲解。必大汗出。以血虛下厥。孤陽上出。故頭汗出。所以產婦善汗出者。亡陰血虛。陽氣獨盛。故當汗出。陰

陽乃復。大便堅。嘔不能食。小柴胡湯主之。

病解能食。七八日更發熱者。此為胃實。大承氣湯主之。

產後氣血俱虛。汗下皆禁。獨此一證用大承氣者。乃證治之變。不當以尋常例測也。以其病解之後。尚有餘熱在胃。所以能食。食入既多。至七八日更加發熱者。此必復傷飲食之故。故知胃有實結。恐其煎迫津液。故以急下救陰為務。然必年體強壯。脈證俱實。且時日既久。與新產大便難不同。是可議下。設遇胃虛之人。雖能食而所食不多。即有發熱便秘。亦屬血虛。急宜調養氣血。斷非承氣所宜。不可恣行攻擊也。

產後腹中疼痛。當歸生薑羊肉湯主之。并治腹中寒疝。虛勞不足。若寒多者。加生薑成一觔。痛多而嘔者。加橘皮一兩白

醫通卷十一

產後

思得堂藏

水一兩。

產後腹中疼痛。乃寒積厥陰衝脈。故用辛溫以散血中之寒。助以血肉之性。大補精血。較諸補劑。功效懸殊。若腹痛兼嘔。而所嘔皆是稀痰。是知脾虛瀉氣上逆。故加橘皮以宣散其氣。白朮以固護其脾。倘見血逆而嘔。所嘔渾是清水。腹脹滿悶。則加桃仁肉桂。具見言外矣。至於寒疝虛勞。少腹結痛。總是下焦寒結。亦不越是方也。

產後腹痛。煩滿不得卧。枳實芍藥散主之。并主產後。以麥

仲景凡治腹痛。多用芍藥。以其能收陰氣之散也。以其能

除血痹之痛也。以其能緩中而止急痛也。本草謂主邪氣腹痛。故多用之。蓋五氣之邪。莫如厥陰肝水之性。急暴一

有不平。則曲直作痛也。此方治疝痛。用芍藥為主。佐以枳實。妙思入血破積聚。收陰緩中。逐陳致新。麥粥補血下氣。而壯血脈也。

師曰。產婦腹痛。法當以枳實芍藥散。假令不愈者。此為腹中有乾血著臍下。宜下瘀血湯主之。亦主經水不利。頓服之。新血下如豚肝。

血之燥乾凝著者。非芍藥枳實可能治。須用大黃桃仁蟅蟲。下其血閉。更加蜜以緩大黃之急也。

產後七八日。無太陽證。少腹堅滿。此惡露未盡。不大便。煩躁發熱。切脈實。再倍發熱。日晡時。煩躁者。不食。食則譫語。至夜即愈。宜大承氣湯主之。熱在於裏。結在膀胱也。

太陽為表。膀胱為裏。七八日表證入裏。故曰無太陽證。惡

醫通卷十一

產後

思得堂藏

露已為病氣所壅。不能盡去。因入裏與惡露相搏。結在膀胱。而作少腹堅滿。下焦熱極。故不大便。煩躁發熱。更切其脈微實。再倍。其發熱在日晡時。而煩躁不食。熱邪又攻於胃。胃熱則不食。食入則穀氣之熱更助。兩熱相併。故譫語。至夜即愈者。產後血虛。熱邪易入血室。入血室則夜如見鬼狀。言此以明其熱不在血室。而在膀胱與胃。故用大承氣湯也。

產後風積之數十日不解。頭微痛惡寒。時時有熱。心下悶。乾嘔。汗出雖久。陽旦證續在者。可與陽旦湯。

舉此與上文承氣湯為表裏之例。

產後中風發熱。面正赤。喘而頭痛。竹葉湯主之。溫覆使汗出。頭項強。用大附子一枚。破之如豆。入前藥揚去沫。嘔者加半

夏半升流

此證太陽上行至頭表。陽明脈過膈上循於面。二經合病。多加葛根。以葛根為陽明解肌藥也。防風佐桂枝。去二經之風。竹葉枳椇主氣上喘。參草和中氣。乳棗行營衛。穀氣行。則上下交濟。而汗出解矣。附子恐是方後所加。治頭項強者。以邪在太陽。禁固其筋脈。不得屈伸。故用附子溫經散寒。揚去沫者。不使辛熱上浮之氣助其虛陽上逆也。若邪在胸而嘔。加半夏治之。上言破之。如豆入前藥。舊本作如豆。大今如徐忠可改正。

婦人乳中虛。煩亂嘔逆。安中益氣。竹皮大圓主之。有熱者倍白薇。煩喘者加栝實一分。

醫通卷十一

產後

四

思得堂藏

則火撓而神昏亂。胃虛則嘔逆。用甘草瀉心火。石膏療煩。亂竹皮主嘔逆。桂枝和營氣。又宜導諸藥。使無杆格之逆。煩喘者。為心虛火動。故加栝實以安之。

產後下利虛極。白頭翁加甘草阿膠湯主之。

傷寒厥陰證。熱利下重者。用白頭翁湯。苦寒治熱。以堅腸胃。此產後氣血兩虛。故加阿膠甘草。然下利血滯也。古人云。血行則利自止。此方豈獨治產後哉。

婦人在草蓐。自發露得風。四肢苦煩。熱頭痛者。與小柴胡湯。頭痛但煩者。千金三物黃芩湯。

自發露。謂自發衣露體得風。非邪外傷者。故不為自汗風病。蓋產時天機開發。雖微風亦得入之。外感之風。內應之火。合化滲於四末。而作四肢苦煩熱。上至於頭作頭痛。病

在表裏之間。故用小柴胡湯主。治少陽。若頭不痛。是無表也。惟肝膽風熱內動。上膈作煩。故用黃芩退熱。苦參養肝。熱地補血。而益腎水。則肝膽之火寧矣。

婦人產後虛羸不足。腹中刺痛不止。吸吸少氣。或苦少腹中急。摩痛引腰背。不能食飲。千金內補當歸建中湯。產後一月日得服四五劑為善。令人強壯。若大虛加飴糖六兩。湯成內之。於火上煖令飴消。若去血過多。崩傷內衄不止。加地黃六兩。阿膠二兩。合八味湯成內阿膠。

產後血去。營衛俱虛。內不充於五藏。肝木妄動。作腹中刺痛。上一充於腹中。遂吸吸少氣。下不濟於腎。故少腹急引。外連腰脊。六府不和。則不能食。用此以益營衛。伐肝邪。補中和內。按此即黃耆建中之變法。彼用黃耆以助外衛。

醫通卷十一

產後

五

思得堂藏

之陽。此用當歸以調內營之血。然助外則用桂枝。調中則宜肉桂。兩不移易之定法也。千金二字義見中風門方千金三黃湯下

諸禁。一禁臥。二禁酒。三禁浴。四禁食。五禁汗。六禁下。七禁利。小便。八禁寒涼藥。九禁起動作勞。蓋初產血氣未定。遽則惡血上升。故分曉之後。須高卧仰倚。功不可即臥。三朝始可稍去其壁。尚宜高枕。七日後。如無他病。方可安枕。多有半月後。未能助席者。酒能助火。亂經。誤用不無動血之虞。至如雞子豬腎。一切滯氣堅初難化物。及生冷膩滑。皆不可食。即砂仁湯亦能動血。咸在禁例。浴能升動惡露。雖當夏月。亦須禁之。曾有產後日。後因浴。瘀血上衝而斃者。亦有因浴動血。誤用寒涼。瘀結不行。血化為水。喘滿腫脹而死者。不可不慎也。新產虛最忌著寒。寒則血氣凝滯。諸變冗生。每至飲食

不化。腹痛作湯。病虛其則。欲去其痰。則正氣并脫。欲止其瀉。則瘀結不行。惟薑桂參朮半溫燉補。庶幾血行。湧止。故冬月一產。即宜重綿。兜其腹。在夏月亦當複巾裹之。機要云。胎產之病。從厥陰。無犯胃氣。及上中二焦。為之三禁。不可汗。不可下。不可利。小便。制劑之法。能不犯三禁。則營衛自和。而寒熱止矣。故產後雖有表證。一功風藥。皆不可用。以其性升。不特氣血上行。令人發暈。抑且令人亡陽。多致汗脫而死。不特風藥當禁。即佛手散中。芍藥皆為散用。恐湯能發汗也。至於下藥。尤為功禁。非特確黃難於輕試。即沒便數難者。只宜調養元氣。若車前澤瀉之類。咸非所宜。以產後百脈空疎。自裏至表。無一不虛。應則諸寒皆禁。即芍藥亦難輕用。以其酸寒伐生發之氣也。地黃皆當慎用。以純陰之味。能令作瀉也。黃

苓能凝滯瘀血。令人惡露不行。為害不淺。然皆產後常禁。設有表裏客邪。又不當拘於上說也。試觀金匱產後例中。陽旦湯之用芍藥。以其中有桂也。薛按八珍十全之用熟地芍藥。以其中有參朮及桂也。豈復拘於此例哉。況乎大承氣小柴胡三物黃芩下瘀血等方。皆產後治例。此聖人臨證如日。大轉回天之手。非尋常下士可得而測議也。迨夫早起作勞。不避風寒。不禁飲食。往往致成大病者。皆自作之孽耳。凡產後之脈。寸口洪疾不調者死。沉微附骨不絕者生。緩滑沉小者吉。實大弦急者危。字卑結代。及滑澀不調者不治。血暈。產後元氣虧損。惡露乘虛上攻。眼花頭暈。或心下滿悶。神昏口噤。或寒延壅盛者。急用熱薑便主之。若血下多而暈。或神昏煩亂者。以歸湯加入參三五錢。澤蘭葉一握。重便

半盞。兼補而散之。痰合二陳加烏梅薑汁。并用鐵秤銼燒令赤。以醋沃之。或燒漆器并亂髮。以烟熏之。產後因虛火載血上行而暈。用鹿茸灰為細末。好酒量便灌下。一呷即醒。行血極快。產後昏暈。嘔逆不能飲食。此胃虛痰厥所致。以抵聖散去赤芍。加炮薑茯苓。慎不可用芍藥。歸血藥。賦隔其嘔逆。愈不能止矣。○初產血暈。連與扶起。勿卧。用韭菜一握。切碎。入有嘴磁瓶中。將醋煎滾。燒入瓶內。急蓋瓶口。以嘴向婦鼻孔。令氣透入鼻中。即蘇。若惡露未盡。忽昏悶不省人事。須問先因感氣而下胎者。以二陳加芎歸香附桃仁山查薑汁。切不可作中風治。產後口眼喎斜等證。當大補氣血。十全大補下黑龍丹。肥人佐以痰藥。如星半木香之類。若作中風治。而用續命必殆。若腹中刺痛者。屢氏消魂散。血暈語言顛倒。健忘

失志。此血入心包。宜失笑散加鬱金。或用血竭沒藥等分為末。熱酒和童便調下二錢。良久再服。惡血自下。三衝。敗血上衝有三。或歌舞談笑。或怒罵坐臥。甚者踰牆上屋。口咬拳打。山腔野調。號稱名神。此敗血衝心。多死。方書用龍齒消魂散。然用之多不應。不若花藥石散最捷。琥珀黑龍丹亦効。如雖悶亂。不致癲狂者。失笑散加鬱金。若飽悶嘔惡。腹滿脹痛者。曰衝胃。古法用五積散。余嘗用平胃加薑桂。往往獲効。不應送來復丹。嘔逆服血化。為水者。金匱下瘀血湯。若面赤暈逆。欲死。口衝肺。二味參蘇飲。甚則加芒硝。蕩滌之。大抵衝心者。十難救。一衝胃者。五死。五生。衝肺者。十全一二。產後口鼻起黑色。而鼻衄者。是胃氣虛敗而血滯也。急用二味參蘇飲。稍遲不救。

三急。○產後諸病。惟嘔吐盜汗泄瀉為急。三者並見必危。痰閉心驚。抵聖散去芍藥。加炮薑茯苓。多汗加烏梅。固不可用。浮麥傷胃耗氣。棗仁膩滑作瀉。芍藥五味酸收。皆能阻滯惡露也。

三審。○凡診新產婦。先審少腹痛與不痛。以徵惡露之有無。次審大便通與不通。以徵津液之盛衰。再審乳汁行與不行。及手飲食多少。以徵胃氣之充虧。必先審此三者。以脈證證以證合脈。脈證相符。雖異尋常。治之必愈。脈證相反。縱無危候。必多變端。即如產後惡露常以兩月為期。然間有六七朝即淨者。又未可以概論也。此雖產母稟質不同。而胎之所稟亦異。如胎息壯盛。則氣血盡歸其子。瘀血自少。胎息孱弱。則氣血涵養有餘。瘀血必多。亦有產時去多。產後必少。產時去

醫通卷十一

產後三審

八

思得堂藏

少。產後必多。勢使然也。曾見一婦。艱產異常。三朝下一血塊。大小形色與茄無異。此後絕無瘀血。惟小便如皂莢汁。其少腹畧無痛楚。良由艱產過傷子宮。關關廢弛。不能收斂。故其塊待下。世俗名兒枕者是也。大抵常產之婦。開闢有權。既產之後。子宮即閉。兒枕隨氣攻注。碎作小塊。續續而下。所以綿延日期。此則全塊頓出。自無淋瀝之患。即有餘血盡歸度便矣。此後屢見數婦。證雖大異。尋常以意逆之。其理自若也。產後血脫津傷。大便自應艱澀。每至五七日始通。無足怪也。其有發熱惡露。脈滑實者。又當急攻以救津液。若兼少腹鞭痛。又當破瘀為先。產後三朝。每有寒熱蒸乳。寒熱後乳汁大行。此胃氣字化。雖有餘病。必無他慮。如無寒熱而乳汁充然者。血氣本旺也。若不寒熱無乳汁。此營衛不調。總無所苦。意宜

當歸內補建中湯類與調之。否則彌月後新見寒熱骨蒸。而為勞之患矣。

嘔吐。○嘔吐惡露不行。二陳加當歸蓬朮肉桂乾薑。胸腹脹滿。多是傷食。二陳加丁香。不應加入參炮薑澤蘭。寧香。或抵聖散亦佳。如寒。理中湯加藿香。

呃逆。○呃逆者。胃寒所生。產後氣血俱虛。風冷搏氣而逆上。乃胃氣虛寒之極。最為惡候。理中加丁香。古方以丁香豆蔻伏龍肝為末。用桃仁吳茱萸煎湯。調下一錢匙。如人行五里再服。未應急投參附。遲則不救。

飽悶。○產後飽悶。惡露不行。多因血逆。宜行瘀血為主。如有塊上升。飽悶欲吐者。二陳湯加薑桂香附炮查蓬朮。塊不散。積久愈堅。琥珀黑龍丹。若惡露已淨而飽悶。受氣也。沉香降

醫通卷十一

產後飽悶

九

思得堂藏

氣散。若敗血傷於脾胃。而腹脹嘔吐者。抵聖散加陵鼈甲肉桂。孕婦服安胎藥過多。或正產。或半產後。經一兩月。惡露未淨。此非敗血之比。宜導氣行血。若用止截誤矣。飲食停滯。六君子加水香厚朴。大凡傷其脾胃者。當節飲食為主。識語。○識語多有血滯。亦有血虛者。風而痰變者。不可專以痰斷。亦不可認為血逆。其發識語。必脈大有力。始與證合。然又與產後不宜。故多難治。去血少者。血滯也。實則桃仁承氣。下瘀血湯。虛則龍齒清魂散。或四烏湯。用赤芍歸尾加桃仁。薑汁去血多者。血虛也。蓋血虛則心神失守。故識語必先養血。不可用參。去峻補常歸內補建中湯。當歸芍藥散。膠艾湯。選用者。風兼痰變者。心經虛。故風痰客之。導痰湯加鈎藤鉤。薄荷。又方益母草為末。薄荷湯為丸。童便服之。專治產後識

語

如見鬼神。產後傷耗血脈。心氣虛。則敗血停積。上于於心。遂至心中煩躁。臥起不安。如見鬼神。言語顛錯。誤作風治。必殆。虛則四物湯。換生地。加桂心。炮薑。生蒲黃。石菖蒲。實則四烏湯。加川連。煎成入龍腦一捻。服後得睡。即安心。悸恍惚。語言錯亂者。千金遺志湯。如內虛敗血攻心。狂言亂語者。龍齒清魂散。瘀積不行。腹脹喘急者。急用下瘀血湯攻之。庶或可救。稍遲必難挽回。此證多有。心脾血少者。宜八珍加炮薑。則痰清神自安矣。

不語。產後不語。多因停積敗血。閉於心竅。神志不能明了。嚴氏清魂加蘇木。丹參。若因心腎氣虛。而不能通於舌。則舌強不語。辰砂七珍散。或人參石菖蒲等分。不時煎服。腎虛風

醫通卷十一

產後不語。見鬼神

十

思得堂藏

熱地黃飲子。肝木太過。柴胡清肝散。或小柴胡加鈎藤。脾受木侮。六君子加升麻鈎藤。氣血俱虛。八珍湯加菖蒲遠志。不應。獨參湯加附子一片。峻補其氣。而血自生。若竟用血藥。則誤矣。

發狂。產後發狂。因去血過多。元氣虧極。或外邪相搏。或陰火內動所致。故傷寒汗下過多。潰瘍膿血大泄。多患此證。須大補氣血。或保無虞。若攻風邪必死。其證牙關緊。腰背反張。四肢抽搐。兩目連。十全大補。有汗加炮薑。多汗加附子。不應。并加薑附。倍入參。多服始應。皆大虛之證。服參者數劑。附子數枚。方應。若汗拭不及。兩手攪空者。不治。

發熱。婦人產後血虛。陽無所依。而浮散於外。故多發熱。治宜四物補陰。而以炮薑之苦溫從治。收其浮散。使歸於陰。若

氣血俱虛。惡寒發熱。煩躁作渴。十全大補湯。若熱愈甚。急加

桂附。若血虛至夜發熱。小腹腰脇作痛。四物加黃芩五錢。肉桂一錢。若作渴而赤。當歸補血湯。若誤認爲火證。投以涼藥。禍在反掌。然產後脾胃多虛。有過於飲食。傷滯而發熱者。慎勿誤作血虛治。但遇產後發熱。若胸膈飽悶。噯氣惡食。泄瀉等證。只作傷食治之。若發熱而飲食自調者。方用補血正法。○產後大發熱。必用炮薑。同茯苓淡滲其熱。一應苦寒。并發表之藥。皆不可用。凡產後發熱惡寒。皆屬血虛。此熱非有餘之熱。乃陰虛生內熱耳。故以補陰藥加炮薑。大劑服之。且炮薑能入脾胃。散虛熱。入肝脾。引血藥生血。然不可多用。獨用必與補陰藥同用。此造化自然之妙也。惡寒發熱腹痛者。當去惡血。○產後脈洪數。胎前脈瀉弱多死。懷孕者脈宜滑數。

醫通卷十一

產後發熱

十

思得堂藏

已產而滑數不改者。雖未必死。多費調理。

寒熱。產後因氣血虛弱。脾胃虧損。而發寒熱。皆不足證。經云。陽虛則惡寒。陰虛則發熱。若兼大便不通。尤屬氣血枯。切禁發表降火。若寸口脈微爲陽氣不足。陰氣上入陽中而惡寒。補中益氣湯加薑棗發越之。尺部脈弦爲陰氣不足。陽氣下陷陰中而發熱。六味丸加肉桂以收攝之。若肌熱大渴。引飲。目赤面紅。此血虛發熱。當歸補血湯不可誤認客邪而用表散藥。○下血過多。寒熱而小腹不痛者。此營衛虧損。陰陽不和。屬虛。增損四物湯。若惡露未淨。傷滯胞絡。寒熱而小腹痛者。屬實。輕則四烏湯。重則醋煎散。產後臥不如法。敗血流入經絡。骨節間寒熱。腰肢痠痛。不可拊。局方調經散。有食消食。頭痛骨疼寒熱者。外感風寒也。參蘇飲。增損柴胡湯。

柴胡四物湯選用。或兼湯及吐者。五積散。胸膈飽悶。前後心滿寒熱者。傷氣與食也。指迷七氣湯。虛人局方七氣合沉。香降氣散。如飽滿寒熱。兼腹痛腰疼者。四身湯。熱而不寒。胸煩自汗。與大病後虛煩相似。此去血過多。血虛生熱也。逍遙散。若脾下熱。非熱地不能治。如大熱必用炮薑。日哺轉甚。者。非柴胡不能治。不應必用肉桂。○新產蒸乳發熱。不必服藥。

中風。產後類中風證。大多血虛。非真中也。或挾風。或挾痰。或挾氣。證雖不一。治法莫要於行血。芎歸湯加荆芥穗。淋黑。豆酒煎服。亦治角弓反張。手足懸癱。脈來虛浮者。血虛四肢強直。芎歸湯加童便。或用荆芥穗微焙為末。豆淋酒調下二錢。或童便服之。口噤則挾齒灌之。斷噤則灌入鼻中。即蘇。手

醫通卷十一

產後發熱

中風

三

思得堂藏

足癱癱敗血入經絡也。用五積散。又有形盛氣虛。產後痿廢不起者。但當補氣藥中。兼行氣為主。朝用香砂六君子。暮用越鞠丸。久服自効。

咳嗽。產後咳嗽。多因腠理不密。外邪所感而致。若因風寒所感。桔梗湯加葱白。香散生薑。或小建中湯。虛用異功散去。米。加山藥細辛。桂枝。陰虛兼感客邪者。六味丸去黃加桂枝。細辛。陰虛水不制火而嗽。六味丸加麥冬五味。乾欬內熱不寒。桔梗湯加麥冬。冬丹皮。蜜煎薑橘之類。蓋乾欬一證。有小兒食乳易治。無則成勞。

發喘。喘而痰聲大作。此痰犯肺金也。絡其痰。喘自定。風則金匱旋覆花湯。加甘草桔梗。惡露未淨。加炮薑丹參。有食加厚朴陳皮。不嗽而喘。此肺為火迫。乃真喘也。難治。若肺虛熱。

生脈散為主藥。肺胃氣虛。異功散加桔梗。兼外邪加細辛。中氣虛寒。前方加炮薑肉桂。陽氣虛脫。更加附子。腎虛不能納氣。歸元都氣丸作湯送。靈砂丹。兼氣虛者。與異功散兼進。大抵產後發喘。加以脈之虛大急疾。皆不可治。

惡痰。產後陰血去多。陽火熾盛。筋失營養。虛極生風。而成此證。若見肩背肉冷。汗山目眩。神昏。命在須臾。四君子加芎歸丹皮。鈎藤。蓋血生於至陰。至陰者脾土也。若肝經血虛。逍遙散加鈎藤。陽氣虛敗。十全大補加葛附。鈎藤。鈎藤。經云。脾之榮在唇。心之液為汗。若心脾二藏虛極。而唇白多汗。急用參附救之。若無力抽搐。戴眼反折。汗出如珠。不流者。皆不可治。頭振。產後頭振。乃氣血虧損。虛火益盛。而生風也。坊不可。以風為治。急用十全大補。溫補氣血為主。如小產後半身肉

醫通卷十一

產後發熱

中風

三

思得堂藏

頭半身汗出。亦宜上法。若產後不省人事。口吐涎沫。而頭振。或癱瘓者。當歸補血湯加荆芥穗。豆淋酒煎服。婦人胎前產後。頭振惡痰。逍遙歸脾小柴胡補中。皆可選用。

傷風。產後傷風。須問惡露淨否。而後用藥。若未淨而小腹疼痛者。以行血理氣為主。金匱旋覆花湯。四烏湯選用。若惡露已淨。小腹不疼。但頭痛身熱。足冷。自汗欬嗽。黃芩建中湯。頭重。香蘇散。若風寒併傷。營衛俱病。遍體痛無汗。敗毒散。虛甚者。風者。不可發散。逍遙去米。加桂枝。得効雖遲。無失。

傷寒。產後傷寒。不可遽用小柴胡。蓋有黃芩在內。停滯惡血也。宜小建中湯。損柴胡湯。時疫。柴胡四物湯。香蘇散。伏氣發溫。蔥白香豉湯。感冒氣食。香蘇散。產後得熱病。四肢暖而脈息和平者。生。四肢冷而脈沉澀。煩熱甚而脈洪盛者。皆

死證也。

瘧。產後瘧疾在初產時絕少。即胎前久瘧。產後裏氣通達。無不愈。然間有發寒發熱不止者。此傷氣向虛。營血驟傷之故。但與內補膏膠連中湯。熱多倍芍藥。寒多加黃耆。夜發一倍當歸。三倍黃耆。不應加生何首烏。虛熱不止。大便不實。加炮薑茯苓。惡露不行。小腹結痛。另用炮黑山查。焚枯黑胡。伏龍肝湯煎服。或有產後一月半月。感犯風暑而發。小柴胡補中益氣選用。風加羌活紫蘇。暑加香薷厚朴。阻證裁酌。但黃耆苦寒。無論惡露與否。皆非所宜。

醫通卷十一

產後諸病

四

應得堂藏

化。腹痛惡露不行。理中湯為主。白加吳茱萸木香。赤加桂心茯苓。一者因產後誤食生冷。或臨產飲食過度。產後泄瀉下痢。亦宜理中湯。白加枳實茯苓厚朴木香。赤加香附炮查。裝補虛加入參肉桂。間有熱痢下重。白頭翁加甘草阿膠湯清理之。惡露已淨。痢久不止。腹痛後重。補中益氣升舉之。大抵產後下痢。惟宜顧慮元神。調和血氣。則積滯自下。惡露自行。非若妊婦之有胎息。難於照顧也。

勞。產後者。因產理不順。疲極筋力。憂勞心慮。或將發失宜。虛風多之。致令虛風喘乏。寒熱如瘧。百節煩疼。頭痛自汗。肢體倦怠。欬嗽痰逆。腹中絞刺。當扶正氣為主。六君子加當歸。若脾肺氣虛。欬嗽口乾。異功散加麥冬五味。氣虛頭暈。補中益氣倍用歸。若經血虛。肢體作痛。四物加參苓朮桂。肝

腎虛弱。自汗盜汗。往來寒熱。六味丸加五味子。脾虛血弱。腹痛。月經不調。歸脾湯倍木香。血虛有熱。增損柴胡湯。骨蒸勞熱。嗽痰有紅者。異功散去木加山藥丹皮五味。阿膠童便。熱而無痰。乾欬。逍遙散用蜜煎薑。蜜蒸白朮。產後虛損。不時寒熱。或經一二載。元神不復。月事不轉。先與千金當歸芍藥湯。後與烏骨雞丸調補。大抵此證。多因脾胃虛弱。飲食減少。以致疲憊而成。當補脾胃。進飲食。則諸病有所倚賴。病自愈矣。

醫通卷十一

產後諸病

十五

應得堂藏

驚悸。產後心悸。皆心虛所致。千金治產後驚悸。志意恍惚。言語錯亂。用茯神湯。虛熱口燥。加麥門冬。虛加入參。善忘加遠志。麥門冬。產後大虛心悸。志意不安。恍惚恐畏。虛煩不眠。少氣人參圓。吸吸乏氣。善忘。本方去薯蕷加遠志。亦孫真人法也。

多汗。產後血虛。身熱自汗。逍遙散加熟棗仁烏梅。不可用補氣藥。古方用麥煎散。治產後盜汗自汗。為醫不可勝數。因外感而汗者。黃耆建中湯。氣血俱虛。十全大補湯。不應加附子。若汗多不止。必發柔痙。尤當前藥。若頭汗者。或因濕熱。或因瘀血。當審虛實治之。半身汗出。昔人用二陳合四物。治多不効。以血藥助陰。閉滯經絡也。此屬氣血不充。而有寒痰留滯。非大補氣血。兼行經滯痰不効。宜十全大補人參養營加

星半川鳥。肥人多加豁痰行氣藥。瘦人氣血本枯。天之徵也。麻脊。產後麻脊。宜生血補氣。十全大補湯。去血過多。手足發麻。小腹大痛。則通體麻痺欲死。此非惡露凝滯。乃虛中挾痰。六君子加炮薑香附當歸。曾治一婦。產後右半身麻脊而昏暈。不省人事。發印胸膈痞悶。下體重者。或時心神蕩搖。若無心肺之狀。頃則周身冷汗如澆。大吐痰涎而蘇。此產後經脈空虛。痰飲乘虛襲入之故。因與六君子加歸蒼肉桂。隨手而効。復有一婦。產後左半身麻脊昏暈。不省人事。發則周身大痛。筋脈痠疼。肌肉顫動。或時頭面赤熱。或時腿上振振動搖。頃則蒸蒸汗出而蘇。此產後營血大虧。虛風襲入之故。用十全大補湯治之。諸證悉平。但麻脊不止。後與地黃飲子而安。

醫通卷十一

產後多汗

麻脊

六

思得堂藏

大小便諸證。產後去血過多。大腸乾澀。每至三五日後。甚至五七日而大便始通者。皆其常也。或血虛火燥。不可計其日期。必待腹滿。脹欲自去而不能者。乃結在直腸。宜用導法。蜜煎導。或削薑薑瓜。皆可為導。惟猪膽汁導。禁用。以其苦寒。誤用每致發呃也。若用苦寒藥攻通。反傷中焦元氣。或愈結難通。或通瀉不止。必成敗證。若屬血虛火燥。四物加鮮何首烏。潤下之。氣血俱虛之人。雖數日不通。飲食如常。腹中如鼓者。八珍加桃仁蘇子熟蜜。若多日不解。躁悶異常。不得已。用人參當歸枳殼煎服。亦權宜之術耳。古人用玉燭散治之。反致危殆者多矣。至始產後日久。病外感熱。有實邪燥屎者。急用承氣大柴胡下之。又不當拘於此例也。小便不通。腹脹如鼓。用炒鹽加麝半字填臍中。外用葱白十餘莖作

一束。切如半指厚。置臍上。將艾炙之。覺熱氣入腹。難忍方止。小便即通。此惟氣閉者宜之。若氣虛源涸。與夫熱結膀胱者。皆不可用。產母但覺小便少。此即是病。便宜調治。如大小便俱秘。惡露不行。先通惡露。四烏湯加蓬朮山查。如惡露不行。大便泄。小便難。五苓散倍肉桂加桃仁。不可服胃苓湯。以蒼朮能止血也。產後小便數。乃氣虛不能制水。補中益氣加車前茯苓。若膀胱陰虛。而小便淋瀝。生料六味合生散散。滋其化源。須大劑煎成。隔湯頓熱。續續進之。產後遺尿。不知。此恆有之。至六七朝自止。不必治也。婦人產後。水道中出肉線一條。長三四尺。動之則痛。欲絕。先服失笑散數服。次用帶皮薑三觔。研爛入清油二觔。煎油乾為度。用絹兜起。

醫通卷十一

產後大小便諸證

七

思得堂藏

肉線。周曲於水道邊。以前薑薰之。令則熨之。一日夜即落。二日即盡。再服芎歸湯調理。如肉線斷。則不可收矣。產婦尿胞損破。致病淋瀝者。當與峻補。丹溪云。難產多是氣虛。產後氣血尤虛。當以參耆為君。芎歸為臣。桃仁陳皮為佐。同豬羊脬煎湯。時時飲之。勿令間斷。使氣血驟長。匝月其脬自完。若稍緩則難成功矣。產間傷動。脬破。終日小便。但淋瀝不乾。用天然黃絲二兩。不用藥者。牡丹皮白朮人參各一錢。水煎至絲爛如湯服。服勿作聲。作聲則泄氣無効。名補胞飲。經月常服有効。產後損尿胞而淋瀝。參耆朮草熟地。豬羊胞煎湯。飲時調服。餘胞長淋止。產後陰戶著風痛。四物湯加桑本防風。不應有瘀傷也。加血餘龜版灰肉桂。陰類脫下。氣血俱虛。不能收斂者。八珍加升麻黃耆。陰戶腫痛。淫熱

也。用枯荊芥白芷當歸桃仁細辛川椒五倍子等分。入葱三莖。煎湯薰洗即愈。

諸痛。產後遍身疼痛。氣虛百節開張。惡露乘虛流入經絡。骨節之間。謂之敗血流經。或流於腰膝。或流入髀股。痛不可耐。痛處熱腫。流注日淡。漸致身面浮腫。局方謂經散最當。琥珀地黃丸亦宜。若因虛風所侵。以致肢體沉重不利。筋脈引急。發熱頭痛。局方用五積散去蒼朮加陳鯉甲。用生漆塗煨尤良。或四神散加桂枝鹽梔和管止痛最捷。若誤作傷寒發汗。致經脈抽搐。手足厥冷而變為痙。又當十全大補為主。若以手按而痛益甚者。是瘀滯也。四烏加散經中桂枝薑黃以散之。按而痛稍緩者。此血虛也。四物加香附炮薑人參白朮甘草以養之。如皮肉痛者外感也。如月內惡露未淨者。香蘇

醫通卷十一

產後諸痛

六 思得堂藏

散加肉桂陳鯉甲。產後五臟皆虛。胃氣虧損。飲食不充。則令虛熱。陽氣不守。上凌於頭。則令頭痛。神中益氣加川芎香附子。不應加附子一片。若血虛四物加參朮。有產後敗血上衝頭痛。非琥珀黑龍丹不効。又方。治產後敗血作梗頭痛。諸藥不効。用大附子一枚。醋醃一碗。用火四畔炙透。醋令盡。去皮臍加川芎等分。並為末。每服錢半。或二錢。茶清調下。偏正頭風作痛。川芎茶調散去白芷。加細辛黑豆淋酒煎。乘熱煎患處。候溫服之。如左半邊惡寒。腦後掣痛者。本方去白芷加歸身。右半邊畏寒。兩太陽引痛者。本方去白芷加參耆。千金治產後中風頭痛。手背逆冷。白朮三兩附子一枚。獨活一兩。生薑三兩。豆淋酒煎服。婦人患頭風者。常居其半。每發必掉眩。如在車船上。皆因血虛風邪運動其痰。二陳加當歸黃

醫通卷十一

產後諸痛

九 思得堂藏

芩羌活防風。不應加烏頭石膏。挾氣虛者。必加黃耆。然崩傷產後。吐血衄血。並令人眩暈。當隨所因而治。感氣而胃口作痛。養胃湯。因氣而心腹痛。降氣散。感寒而痛。甘草乾薑湯。加焦白朮桂枝。有食積實理中。加炮黑山查。產後惡血上加攻心痛。為陰血虧損。隨火上衝心絡。名心胞絡痛。宜理中加當歸。產後惡露未淨。胸腹作痛。或小便不利。琥珀地黃丸溫散之。產後心痛。大寒嘔逆不食。千金蜀椒湯。產後心痛。乾嘔吐涎沫。大岩蜜湯。若真心痛。旦發夕死。夕發旦死。瘀血上衝。用失笑散一錢。童便調下即定。血既散而仍痛。增損四物湯調補之。腸痛。且分左右。蓋左屬血。血藏於肝。肝傷有死血。故痛。小柴胡去芍。加丹皮香附。薄桂當歸。並便右屬脾。脾有瘀積於腸。則痛。補中益氣去升麻。加葛根。半夏茯苓枳殼。生

滯四烏湯加蓬朮肉桂。若止是發熱頭痛。或兼腹痛。按之却
不痛。此是血虛。四物加艾附著桂。若腹痛脇脹。此氣寒不能
溫養肝血。當歸乾薑香附。肉桂丹皮茯苓。入鹽少許。熱服。產
後下血不盡。腹內堅痛。不可忍。者。甘草乾薑當歸芍藥桂心
桃仁山查煎服。產後少腹作痛。俗名兒枕塊。古法用失笑
散及四物加我茂山查。產後崩中去血。赤白相兼。或如豆汁。
千金伏龍肝湯。能溫脾胃。涼肝血。其効如神。若惡露既去而
仍痛。四神散調補之。小腹痛。當視去血多少。如敗血凝滯。有
塊而痛者。隨煎散無塊者。四烏湯。須看人虛實酌用。產後
臍腹作痛。冷氣乘虛也。內補當歸建中湯。產後腰痛者。因
產勞傷腎所致。十全大補湯加附子。產後惡露漸少。忽然不
來。腰中重痛。下注兩股。痛如錐刺入骨。此由敗血流滯經絡。
不即通之。必發癰疽。局方調經散加陵經甲。水煎日三服。以
痛止爲度。琥珀地黃丸亦宜。下瘀血湯代抵當丸皆可取用。
切勿誤用五積散等辛溫之藥。丹溪云。局方五積散治產後
瘀血作痛。以蒼朮爲君。麻黃爲臣。厚朴枳殼爲使。雖有麻黃
之補血。僅及蒼朮三分之一。不思產後之婦。有何寒邪。血氣
未充。似難發汗。不過借藥性溫和。可以推陳致新。豈可用麻
黃之悍。蒼朮厚朴之燥乎。虛而又虛。禍不旋踵矣。
泄瀉。產後泄瀉。其因有五。一者因胎前泄利未止。產後尤
甚。一者因臨產過傷飲食。產後消脫。一者因新產驟食肥腥。
不能耐過。一者因新產煩渴恣飲。水穀混亂。一者因新產失
護。臍腹臟府受冷。其致瀉之由雖異。一皆中氣虛寒。傳化失
職之患。宜理中湯爲主。食加枳實山楂。水加桂心茯苓。虛

加桂附倍參。寒加桂附倍薑。久瀉腎虛。加桂心熟附。瘀結不
行。加炮查歸身。若見完穀不化。色白如糜。此脾胃大虛。元氣
虛脫之候。十有九死。惟猛進溫補之劑。庶可挽回。卽有煩躁
發熱而赤。脈來數大。皆虛火上炎之故。當并進桂附人參甘
薑苓朮之類。伏龍肝煮湯代水煎服。仍得收功。若小便混濁
如泔。或大便中有白沫如腸垢者。乃元氣下陷之故。並宜補
中益氣。加桂芍炮薑升舉之。或臭水不止。加藳艾香附吳茱
萸。若兼瘀結不通。腹脹喘急。神丹不能復圖也。
浮腫。腫脹腹大。筋青。小便不利。必食生冷。傷滯瘀血也。若
用利水藥。病必轉劇。理中湯加木香肉桂蓬朮。身腫或腹大
如鼓。四七湯加木香。嗽者忌木香。用炮薑灰。面腫下不腫。屬
風。宜發散紫蘇飲加防風。下腫上不腫。屬濕。宜利小便。紫蘇
飲加木通。四肢與頭面腫甚。氣食也。紫蘇飲加消導藥。有血
兼破血藥。停血不散。腹腫喘滿。夜甚於晝。四烏湯加蓬朮。若
足忽腫者。爲溼熱注病。恐成脚氣。當歸拈痛湯。若紅腫而痛。
恐生腫毒。則以膚熱與不熱爲辨。產後敗血乘虛停積。循
經流入腿脇。留滯日深。故令面目四肢浮腫。宜調血爲主。醫
者不識。便作水氣。治以導水之藥。必危。夫產後既虛。又以藥
虛之。是謂重虛。往往多致夭枉。但多服局方調經散。或四神
散加蓬朮桃仁肉桂穿山甲。血行腫消。則愈。陳無擇云。若風
邪乘於氣分。皮膚腫而浮虛。乃邪氣有餘也。若皮膚腫其形
色如熟李者。乃水也。水腫者宜利小便。氣腫者宜發汗。
諸血。產後鼻衄。乃氣血逆行所致。紫蘇飲入童便荊芥灰。
如口鼻黑氣起而衄者難治。初產時口中血溢出鼻。或吐血

嗽血。名血氣衝心。四物加延胡木香炮薑。產久惡露已淨。吐
咯。欬血者。治與平人同。產後血崩。因經脈未復。而勞碌惱怒。
或犯房事。多成此候。若小腹滿痛。肝經已傷。最為難治。若血
滯小腹脹滿。四烏湯加蓬朮肉桂。血少小腹空痛。四物加丁
香膠艾。肝火迫血妄行。加味逍遙散。脾鬱不能統血。加味歸
脾湯。脾虛不能攝血。補中益氣湯。厚味積熱傷血。清胃散加
炮查。風熱相搏傷血。四君子加防風枳殼。惡寒嘔吐。大便秘
瀉。六君子加炮薑。下焦虛寒。不能統血。漏下色晦。及痰涎不
止。千金芎藭湯鹿茸散選用。
月水不通。乳子週歲而乳母經行。是其常也。若兒半歲而
母經行。有血盛血熱之分。血熱者宜涼血。四物加續斷條芩。
不乳者不在此例。若兒二三歲。其母經不行而無疾。不必服

醫通卷十一
產後月水不通
思得堂藏

藥。若肢體倦怠。食少內熱。是血少也。宜逍遙散加參。以健
脾胃。若以藥逼之。則誤矣。若脾胃虛弱。六君子湯加當歸。若
兼鬱火傷脾。縮脾湯加丹皮山梔。若怒火傷血。柴胡四物湯。
氣血俱虛。八珍湯加丹皮。
諸淋。淋因熱客於膀胱。則頻數。熱則瀉痛。氣血兼熱。血入
胞中。則血隨小便而出。而為血淋也。若膀胱虛熱。六味丸。若陰
虛而陽無以化。腎氣丸。蓋土生金。金生水。當滋化源。若少壯
元氣實強者。用滑石通草車前。葵子瞿麥蒲黃。漿水煎服。
乳汁。產後三朝五更。發寒熱。名曰蒸乳。若產後乳塊。或
骨作者。須服清利之藥。則乳自行。仍以美羅引之。產後乳
汁自出。不止。乃胃氣虛。宜服五味異功散。加黃耆五味。以
之。若乳多滿。惡露者。用溫升散之。新產兒未能吮乳。乳汁

蓄結。與血氣相搏。而壯熱大渴。通乳脹硬。乳痛。名曰妬乳。當
以手摺去宿乳。或吮去尤妙。并以貝母栝樓實甘草節木通
煎服。初產因子不育。蒸乳而發寒熱。作痛者。俗名乳脹。用斷
乳法。以四烏湯加炒麥芽一兩。即止。不然恐內結成癰。多致
潰膿。亦有乳鬱潰而成危候者。不可不知。若有子而乳不
下者。通草八錢。煮猪蹄湯飲之。白蝦汁亦妙。乳母氣血虛而
不能蒸乳。八珍湯加黃耆麥冬。肺胃虛寒而乳不通者。千金
鍾乳湯。寒熱不均。氣道阻逆而乳不通者。麥門冬散。有熱去
鍾乳加漏蘆。因怒火者。逍遙散加參。麥冬之類。凡產不蒸
乳者。後必有變。須預言之。元氣壯實者。不在此例。吹乳腫
痛。速用栝樓實一枚。連梗搗爛。甘草節一寸。乳香一錢。煎成
加溫酒服。服後側臥於床。令藥氣行。外以天南星生末醋調

醫通卷十一
產後諸病
思得堂藏

效以手揉之自散

瘡瘍

金匱云少陽脈滑而數者陰中生瘡陰中蝕瘡者振牙湯洗之。

少陰脈滑而數熱結下部也。治用狼牙煮湯。瘰者如齒。浸瀝陰中日四遍。以解毒殺蟲。但用一味。以取專功。蓋此證多患於瘰癧。諸必欲逆經閉。骨蒸寒熱。凡見煩赤。中有白斑。下屑紅中白點。皆陰蝕之候。雖用上法。及服降火滋陰藥。終歸必亡。此情志之病。非藥可治。故仲景但用外法。絕不及於湯藥。厥有旨哉。

胃氣下泄。陰吹而正喧。此穀氣之實也。豬膏髮煎導之。

導之者。服之使病從小便而出。非外用導引之謂。詳陰吹正喧。婦人恒有之疾。然多隱忍不言。以故方書不載。醫不

醫通卷十一

瘡瘍

七

思得堂藏

加參金匱明言胃氣不清穀氣之實。所以腹中喧響。則氣從前陰吹出。如失氣之狀。第用豬膏髮煎之治。難於推測。近余治一僕人之婦。經閉三月。少腹痛。實微心。而見前證不已。與失笑散一服。瘀血大下。遂不復作。又治一貴顯之媳。小產後寒熱腹痛。亦有前證。與炮黑糯米熬焦黑糖為丸。用伏龍肝煮水澄清。煎獨參湯送三錢。一服結糞。大下再進。瘀血續行。而前證頓止。始悟豬膏髮煎。皆為逐瘀而設。雖皆未用其方。而實不離金匱之法也。

源。婦人瘰癧多因憂思鬱怒。傷損肝脾。累累然如貫珠。多生於耳之前後。項側胸脇間。若寒熱腫痛。乃肝經氣鬱而為病。不可峻用痰藥。加味逍遙散。若寒熱既止。而核不消。乃肝經之血亦病。四物湯加白朮茯苓柴胡丹皮。若飲食減少。

經事不調。為脾胃虧損。六君子加香附丹皮柴胡當歸。若初生如豆粒。附者於筋肉。色不變。而後漸大。腫痛內熱口乾。精神倦怠。久不消。乃肝脾虧損。迺遙散歸脾湯。健脾胃。培肝木。切不可輕用散堅追毒之劑。誤下之。必犯病禁。經禁。若久潰。脈浮大。邪火盛也。而色皎白。金剋木也。皆難治。凡風木之病。但壯脾土。則未自不能剋矣。若行伐肝。則脾胃先傷。而木反來侮土矣。

結核。婦人結核。皆因鬱怒。虧損肝脾。觸動肝火所致。非但婦人多鬱患此。則小兒胎中受母氣之鬱。生後至七八歲外。往往有之。多結於項側耳前後。或發寒熱。屬膽經風熱。怒火柴胡清肝散加鉤藤山梔。以清肝火。若結於肉裏。其色不變。肺熱內熱。屬肝火血虛。加味逍遙散。或結於肢節。或累累如

醫通卷十一

瘰癧

結核

七

思得堂藏

貫珠。其色不變。亦肝火血燥而筋變。小柴胡加鉤藤。佐以六味丸。若時消時作。此氣滯而痰結也。用歸脾六君二湯。以調和脾胃之氣。外用一味香附末。應調作餅艾炙。乾即易之。勿令傷肉。常灸自消。丹方治痰核。用貝母全蠍連皮胡桃肉各百枚。同搗蜜丸。空心日服彈子大二三丸。効。又方用羯羊角磁片刮下為末。或舊明角琉璃刮下為末。尤良。每飭入貝母四兩全蠍二兩。蜜丸空腹服三錢。外用皂莢肉入鯽魚腹中煨灰存性。蜜和醋調塗大効。若潰而肉不腐。或肉不生。或膿水清稀。肌寒肉冷。自汗盜汗。寒熱內熱。面色痿黃。食少體倦。便利不調。五臟皆虛也。但用補中六君益氣養營等湯。調補脾胃。則各證自退。故經云。氣傷痛。形傷腫。慎不可輕用行氣破血之劑。

流注。婦人流注。多因憂思鬱怒。虧損肝脾。以致營氣不從
逆於肉裏。或因腠理不密。外邪客之。或產後流注。或跌撲血
滯。或產後惡露凝滯。氣血流而注。血注而凝。或生於四肢關
節。或留於胸腹腰臂。或結塊。或漫腫。皆屬鬱火。急用葱熨法。
內服益氣養營湯。未成自消。已成自潰。須久服無間。自然收
功。若久而腫起。作痛。肢體倦怠。病氣有餘。形氣不足。尚可調
治。若漫腫微痛。屬形氣病氣俱不足。最為難治。或不作膿。或
膿成不潰。氣血虛也。人參養營湯。倍參。畏寒。陽氣虛也。十全
大補湯。補熱內熱。陰血虛也。四物加參。作嘔欲嘔。胃氣虛
也。六君子加炮薑。食少體倦。脾氣虛也。補中益氣加茯苓。半
夏。四肢逆冷。小便頻數。命門火衰也。八味丸。小便頻數。痰盛
作渴。腎水虧損也。六味丸加麥門冬。月經過期。多日不止。肝

脾虛也。八珍加柴胡。胡丹皮。凡潰而氣血虛弱不斂者。十全大
補煎膏服之。久潰而寒邪凝滯不斂者。豆豉餅法散之。其潰
而內有膿管不斂者。用藥腐化之。若不補氣血。不節飲食。不
慎起居。不戒七情。或用寒涼。伐伐俱不治。

乳癰乳巖。婦人乳癰。有內吹外吹。上逆下順之異。總屬膽
胃二經熱毒。氣血凝滯。故初起腫痛。發於肌表。肉色微赤。其
人表熱發熱。或發寒熱。或憎寒。頭痛。煩渴。引飲。加味逍遙散
加枯薑。若至數日之間。膿成滿。膿稠。膿湧出。膿盡自愈。若
氣血虛弱。或誤用敗毒。久不收斂。膿清。膿大。非大劑開鬱理
氣溫補氣血。不能收功。丹方治乳癰初起。用蒲公英草搗
汁。和陳酒服。以浮敷腫處。即消。然此施於熱證之人。輒効。若
高粱七情內鬱所致者。良非所宜。當用鹿角。磁鋒刮屑。加麝

香溫酒調服。若肥盛多痰。鬱滯者。用橘皮。橘碎。如豆。大湯泡
淨。以飛羅。攪拌炒。去麩。為末。黑糖調二錢。醇酒服之。又方用
蟹殼。煨存性。醇酒服三錢。又乳房癰。用貝母。枯薑。實甘草。
節。各三錢。煎服。効。已潰。加忍冬。一兩。佳。乳巖。屬肝脾二藏
久鬱。氣血虧損。故初起小核。結於乳內。肉色如故。其人內熱
夜熱。五心煩熱。肢體倦怠。月經不調。益氣養營湯。加味逍遙
散。多服。漸散。氣虛必大劑人參。專心久服。其核漸消。若服攻
堅解毒。傷其正氣。必致潰敗。多有數年不潰者。最危。貴則不
治。周季芝云。乳癰乳巖。結未潰。以活鯽魚。同生山藥。搗爛
入麝香。少許。塗塊上。覺癢。極勿搔動。隔衣輕輕揉之。七日一
塗。旋塗漸消。若往其歲月。以致潰腐。漸大。類拳。巖色赤出。水
涸。洞臭。穢用歸脾湯等藥。可延歲月。若誤用攻伐。危殆迫矣。

曾見一婦。乳房結核。如杯。數年。諸治不効。因血崩後。日服人
參兩許。月餘。參盡。二肋。乳核霍然。

陰瘡。婦人陰瘡。乃七情鬱火。傷損肝脾。淫熱下注。其外證
有陰中。舒出如蛇。俗呼陰挺。有翻突如餅。俗呼陰菌。亦有如
雞冠。如鼠乳。亦有生諸蟲。腫痛。淫癢。潰爛。出水。膿悶。脫墜者。
其內證。口乾。內熱。體倦。絕候。不調。飲食無味。嘔熱。發熱。胸膈
不利。腸腹不調。小腹痞脹。赤白帶下。小便淋瀝。其治法。腫痛
者。四物加柴胡。山梔。丹皮。脂草。淫癢者。歸脾湯。加山梔。柴胡。
丹皮。淋瀝者。龍膽瀉肝湯。加白朮。丹皮。潰腐者。加味逍遙散。
腫悶。脫墜者。補中益氣。加山梔。丹皮。佐以外治之法。可也。若
陰中有蟲。瘡痛。乃肝經淫熱。此惟獨陰無陽。鬱火內蘊所致。
患此者。必丹熱潮熱。經水不調。乾欬。吐血。紅面。赤聲。臨日用

開鬱降火之藥。多不能愈。大抵五志之病。非藥可醫。而失合。證治尤難。外治之法。以桃仁研膏。和雄黃末。極粉塗。指肝精。陰中。并用肥湯煎。苦參洗滌。或以鯽魚膽塗之。然旋治旋發。如菌蒂生。蟲不腐不止。又有交接時。輒出血作痛。此肝傷而不能藏血。脾傷而不能攝血也。多用加味逍遙散。加肉桂。或歸脾湯下。加減八味丸。自愈。

嬰兒門上

脈法

小兒三歲已內。看虎口。食指寅卯辰三關。以驗其病。脈紋從寅關起。不至卯關者。上已。若連卯關者。難愈。若寅侵卯。卯侵辰。辰者最劇。其脈紋見五色。如因驚必青。熱則赤。風熱湯利。色紫。當以類推之。又紋色顯而有紫。行者。為有胃氣。易治。紋色細淡而直。如刀刃者。乃正氣之虛。難治。紋上另有一點。如流珠者。為宿食。紋傍另有一條。如絲縷者。為風痰。紋斜向內者。易已。斜向指甲者。難愈。三歲後。則以一指轉側。辨其脈。五六歲後。脈六七至為平脈。浮為風。浮大而數為風熱。沉細為寒。沉瀟為傷食。伏結為物聚。微細為疳積。為腹痛。浮而洪為有熱。浮而遲為有寒。弦急為氣不和。促結為驚。脈亂不治。

此論脈之大端也。

面目證

左腮屬肝。右腮屬肺。額上屬心。鼻屬脾。頤屬胃。青主驚。積不散。紅主痰。積驚熱。黃者食積。癰癤。白主泄瀉。水穀。黑主胃氣受傷。目內赤者。心實熱。淡紅者。心虛熱。青者肝實熱。淡青者肝虛熱。黃者脾實熱。白而混者。肺實熱。目無精光者。腎虛也。若目無大眇者。五臟皆不調。兒多不育。

五臟虛實寒熱

心主驚。實則叫哭。發熱飲水而搐。虛則困卧而悸。心熱則合面睡。或上鼠咬牙。心氣實則喜仰卧。肝主風。實則面青目直。叫哭壯熱。項惡頓悶。虛則咬牙呵欠。肝熱則手循衣領。及亂捻物。壯熱飲水喘悶。肝有風。則目速掣。得心熱則發搐。或

筋脈牽索而直視。肝熱則目赤。兼青則發搐。風甚則身反張。強直。○脾主困。實則身熱引飲。虛則吐瀉生風。若面白腹痛。口中氣冷。不思飲食。或吐清水者。脾胃虛寒也。呵欠多睡者。脾氣虛而欲發驚也。○肺主喘。實則喘急。虛則喘促。飲水。虛則喘氣出息。肺熱則手指眉目鼻面。肺盛復感風寒。則胸滿氣急。喘嗽上氣。肺虛則眉目鼻面。肺氣不足。目無精光。面虛而邪實也。○腎主喘。皆胎稟虛怯。神氣不足。目無精光。面白顯解。此皆難育。難育不壽。或目畏明下。鼠者。蓋腎重則身縮也。咬牙者。腎水虛而不能制心火也。惟痘瘡有實則黑陷。證乃邪火亢盛。非正氣之實也。

變蒸

小兒變蒸。變者變其情智。蒸者蒸其血脈。大抵三十二日為一變。每經變畢。則情智異常。全嬰方論云。變蒸者。以長氣血也。變者上氣。蒸者發熱。輕則體熱虛驚。耳冷能冷。後汗屑生。

白泡。三日可愈。重者寒熱脈亂。腹疼啼叫。不能乳食。食即吐。

五七日方愈。變蒸之時。不欲驚動。當其時有熱微驚。慎不可治。及灸刺。但執視之。若良久不已。少與紫九微下。熱歇便止。

若於變蒸之中。加以時行溫病。或非變蒸而得時行病者。其證皆相似。惟耳及尻通熱。口上無白泡。當先服黑散。以發其汗。汗出溫粉粉之。熱歇便瘳。若猶不除。乃與紫九微下之。小兒稟虛之所不免。勿藥可也。嘗見小兒變蒸發熱有痰。投以抱龍丸。卒至不救。若一熱不熱。暑無證候。而暗變者。稟氣壯實故也。

胎毒

一變。每經變畢。則情智異常。全嬰方論云。變蒸者。以長氣血也。變者上氣。蒸者發熱。輕則體熱虛驚。耳冷能冷。後汗屑生。白泡。三日可愈。重者寒熱脈亂。腹疼啼叫。不能乳食。食即吐。五七日方愈。變蒸之時。不欲驚動。當其時有熱微驚。慎不可治。及灸刺。但執視之。若良久不已。少與紫九微下。熱歇便止。若於變蒸之中。加以時行溫病。或非變蒸而得時行病者。其證皆相似。惟耳及尻通熱。口上無白泡。當先服黑散。以發其汗。汗出溫粉粉之。熱歇便瘳。若猶不除。乃與紫九微下之。小兒稟虛之所不免。勿藥可也。嘗見小兒變蒸發熱有痰。投以抱龍丸。卒至不救。若一熱不熱。暑無證候。而暗變者。稟氣壯實故也。

小兒胎毒。謂胎熱胎寒。胎黃。胎肥。胎弱。是也。胎熱者。生下。有血色。旬日之間。目閉面赤。眼胞腫。啼叫驚煩。壯熱滿黃。大便色黃。惡欲食乳。此在胎中受熱。及育稟內蘊。宜用清胃散之類。胎寒者。初生面色。白。啼聲低。小。或手足攣屈。或口禁不開。此母氣虛寒。或在胎時。母過食生冷。或感寒氣。宜用五味異功散之類。胎黃者。體目俱黃。小便短。不乳。啼叫。或腹膨泄瀉。此在胎時。母過食炙煇辛辣。致生溼熱。宜用瀉黃散之類。胎肥者。肌肉稟厚。目睛粉紅。滿月後漸瘦。五心煩熱。大便不利。口吻流涎。此受母之胃熱所致也。乳母服大連翹湯。兒亦飲少許。以疏利之。胎弱者。面無精光。肌體瘦薄。身無血色。大便白水。時時嘔氣。及嘔。因父氣不足者。六味地黃丸。因母氣不足者。八珍湯。母子並服。近世初生小兒。藥與化毒丹。及

黃連犀角貝母甘草硃砂之屬。殊不知此惟身面皆赤。胎稟多熱毒者為宜。若身面皆白。胎稟虛寒。本來少毒者服之。反伐其如生之氣。多致夭枉。當用連皮胡桃肉三枚。研極爛。橄欖核三枚。燒存性。明雄黃研細水飛淨三分。甘草煎濃汁。和生白蜜數匙。研勻攪去滓。時時溫服。引出腎藏之毒。皆見服此者。多不出痘。即出亦稀。而無苦寒傷胃之患。可不辨虛實寒熱而漫投化毒之劑乎。

胎毒

小兒初生。其身如有湯瀉火傷者。皆母過食膏粱所致。母服清胃散。通遠散。消其熱。血兒亦常飲數滴。有身無皮膚而嫩赤發熱者。皆由產母胃中火盛也。用熟石膏末。加珍珠粉。搗之。亦有因父遺毒所致。當從微瀉。治夏月以兒臥蕉葉上。

尤良。有身無皮膚而不斂赤者。皆由產母脾肺不足也。以參
耆末加珍珠粉撲之。脾主肌肉。肺主皮毛。故知病脾肺也。子
母俱服保元湯。如腦額生瘡者。火土相合。濕熱攻擊。癰海也。
難治。脚上有瘡者。陰虛火盛也。不滿五歲而死。如未滿月而
撮口握拳腰軟者。此肝腎中邪。勝正弱也。三日內見者。必不
治。如男指向裏。女指向外。尚可治。鈎藤散主之。

紫風撮口瘡風

小兒初生。紫風者。胎中受熱。毒流心脾。生下復為風邪所搏。
致眼閉口噤。啼聲不出。舌上如粟。口吐白沫。七日內見者。百
無一生。撮口者。因胎熱兼風。自臍而入心脾。致面目黃赤。
氣息喘急。聲不出。舌強唇青。口撮腹脹。急於顛門。灸七壯。灸
之不哭。甲腸吐沫者。不救。瘡風者。因斷臍之後。為水淫風

醫通卷十一

紫風撮口瘡風 思得堂藏

邪入於心脾。致腹脹臍腫。四肢厥直。啼不吮乳。甚則撮口發
搐。七日內患者最危。宜用麝香蠍尾銅絲輕粉辰砂為散。置
湯調服。若臍邊青黑。握拳口噤。是為內搐。不洽。若齒齙有泡
如粟。挑破即開。不必用藥。

惡欲乳

惡欲乳。不能食者。此風邪由臍而蘊心脾。致舌乾唇燥。不能
吮乳也。因外邪而臍口撮緊者。名臍風。多不可救。若心脾有
熱。舌大痛不能吮乳者。以柳華散敷之。目閉口噤。啼聲不出。
吮乳不得而吐沫者。辰砂膏塗臍。令兒吮之。若舌下腫如小
舌者。或舌絡牽痛。或齒齙患白星。俱用線鍼刺出血。亦敷
柳華散。凡鍼重舌。以鍼向外橫挑底尖。細脈不可傷。其本絡
輕。則言謬不清。重則血出而死。若暴病發熱。作渴飲冷。口舌

生瘡。大便秘結。湯黃散。若病後發熱。口渴飲湯。大便不實。異
功散。或口角流涎。或痰氣壅盛。脾不能攝也。六君子湯。若兒
自食甘肥。或母食酒麪。致兒口舌生瘡。清胃散。

弄舌

脾藏虛熱。令舌絡牽緊。時時微露。而即收者。名弄舌。屬心脾
虧損。溫脾散。有熱。人參安胃散。舌舒長而良久不收者。名吐
舌。乃心脾積熱。或兼口舌生瘡。作渴飲冷。屬胃經實熱。並用
湯黃散。若飲水者。脾胃虛而津液少也。兼面黃肌瘦。五心煩
熱者。疳瘦也。胡黃連丸。大病未已而弄舌者凶。

遊風後疳

丹瘤之證。俗名遊風。因胎毒客於腠理。搏於氣血。發於皮膚。
其赤暈遊走者。乃血熱風熱也。若發於胸脇。遊走四肢者。輕

醫通卷十一

弄舌 遊風後疳

思得堂藏

發於頭面四肢。延及胸背脇腹者。重。千金云。赤遊風腫。若
獨身入心腹者。即能殺人。伏龍肝為細末。雞子白和傳。勿令
乾。或加髮灰。豬膏傳之。古人云。從四肢起入腹。囊者皆不治。
當令入用力。於各患處遍吮毒血。各聚於一處。急取出之內。
服小劑活命飲。惟百日內禁從。若肚腹膨脹。二便不通。毒入
內也。用大連翹湯。亦有生者。或用雄黃二分。硃砂一分。水飛。
生蜜水調勻。隔湯溫熱。常服數匙。得瀉其毒。便解。在小腹脇
上陰囊等處。忽紅腫如霞。流行不定。不止一處者。用白蠟胡
桃七箇。連殼搥碎。大川連一錢五分。生甘草節去皮二錢。水
煎。頓熱。陸續飲。鄉村不便醫藥者。以生萊菔搗汁塗之。亦
可。灌服數匙。更以萊菔滓絹包烘煖。裹紅腫處。○後疳者。狀
如圓瘰。色紅從唇而起。漸及遍身。四圍皮脫。中裏赤肉。醫疳

若猴之狀。乃胎中毒邪。畜於腎臟而發。不急治必死。用大川連生甘草各六分。乳香沒藥並炙。雄黃水飛各四分。青黛研淨。硃砂水飛各分半。西牛黃一分。各為細末和勻。每服分半。蜜調燈心湯下。日三夜二。服外用淨青黛二錢。黃蘗末微炒。閉口連翹炒黑。人中白火煨研。各一錢。土貝母去心炒。褐色五錢。為末和勻。臨用入西牛黃水片各半錢。麻油調傳神効。

胎驚

小兒胎驚者。因妊娠飲酒忿怒驚跌。或外挾風邪。內傷於胎。兒生下即病也。若月內壯熱。翻眼握拳。緊口出涎。腰強搐掣。驚怖啼叫。顫縮顫開。頰赤面青。眼合者。當疎風利驚。化痰調氣。及貼額法。若面青拳搐。用鈎藤散。切不可誤作脾風妄用。

醫通卷十一

胎驚

思得堂

溫藥。若眉間色赤。或虎口指紋曲裏者。可治鈎藤散加全蠍。若眉間青黑者。不治。大抵小兒藏府脆弱。不可輒用銀粉鎮墜之劑。反傷真氣。多致不救也。

目睛動

目者肝之竅也。肝膽屬風木二經。兼為相火。肝血不足。則風火內生。故目睛為之動。動經曰。曲直動搖。風之象也。宜四物湯滋其血。柴胡山梔清其肝。陰血內營。則虛風自息。兼用六味丸以滋其源。若愈後驚悸不寐。或寐中發搐呀牙。目睛動者。血虛不能榮筋脈也。補中益氣倍歸。著凡病氣有餘皆屬元氣不足。此證兼屬肝脾。多為慢驚之漸。尤當審之。

唇口蠕動

唇為脾之華。陽明之脈。環唇而交人中。是以脾胃虛者。多有

此證。不獨病後而已。夫脾主涎。脾虛則不能收攝。多兼流涎。或誤認為痰。而用祛逐之藥。則津液益枯。不能滋養筋脈。遂致四肢抽搐。病勢愈甚。原其治法。與慢脾風相同。當大補脾胃。六君子加升柴。切禁青皮龍膽草伐肝之藥。若兼四肢微搐。或潮熱往來。或泄瀉嘔吐。而色痿黃。皆脾胃有傷也。加黃耆當歸白芍。若脾氣下陷。而肝木侮之者。補中益氣以升其陽。加苓半芍藥。制肝補脾。切不可用疎風治驚之藥。

發搐

驚風發搐。多因乳母鬱怒。傳兒胎中受患。或生後乳傷驚恐。致病。證多吐乳面青。若痰實壅積。則壯熱面紅。當兼調治其母。切不可損其元氣。驗其順逆。男則握拳。母指父入食指中。為順。於外為逆。女則父入食指為逆。於外為順。凡小兒忽然

醫通卷十一

唇口蠕動

思得堂

驚。搐目直者。皆肝經風熱。若肝虛生風。則目連掣而不搐。及多呵欠咬牙。若肝經風實。則目直大呵欠。項急頓悶。若肝經有熱。則目直視不搐。得心熱則搐。其證手循衣領。及亂捻物。宜瀉肝熱為主。凡病之新久。皆能引動肝風。風內動則上入於目。故目為之連掣。若熱入於目。牽其筋脈。兩皆俱緊。不能轉視。故目直也。亦有飲食停滯中焦。致清陽不升。濕陰不降。肝木生發之氣不得升。致生虛風者。若胸滿腹痛。嘔吐惡食。輕則消導化痰。重則探吐攻積。更須審其所傷。寒物熱物。亦有因感胃吐瀉。致土敗水侮而生虛風者。不可遽服驚藥。若輒用之。反以風而益其病矣。潔古云。傷風發搐。當辨有汗無汗。用大青膏小續命分治。薛按前證。若口中氣熱。搐而有力。屬形病俱實。宜大青膏以散風邪。若口氣不熱。搐而

無力屬形病俱虛宜異功散以補脾土六味丸以滋肝木鈞
藤飲以清肝火因風邪鬱熱而變諸證當理肺經清風邪若
外邪既解而諸證不愈者當實脾土補肺金若竟治其風恐
脾氣復傷諸證蜂起矣若傷食後發搐身溫多睡或吐不思
食宜先定搐搦止白餅子下之後與秘旨安神丸若飲食停
滯嘔吐不食腹脹便秘者屬實熱白餅子下之若下後搐熱
益甚嘔吐不食者屬虛熱異功散補之若脾胃既傷肝火所
勝六君子加鈞藤鈎以健脾氣平肝木大凡飲食既消而不
愈者但調補脾胃則諸邪自退○百日內發搐真者不過兩
三次必死假者煩發不死真者內生驚癇假者外傷風冷血
氣未實不能勝任故發搐也口中氣熱大青膏及塗頰法并
用大青膏加白礬取三錢入桃枝一握煎水浴之勿浴兒背

醫通卷十一

驚風

癩癇

此即浴體法也前證多因胎中受患或乳母鬱怒傳兒或兒
脾傷自病當固元氣為主凡搐頻者風在表易治宜發散搐
稀者風在藏難治宜補脾

癩癇

錢仲陽云小兒發癩因氣血未充神氣未實或為風邪所傷
或為驚怪所觸亦有因乳母七情驚怖所致若眼直目牽口
噤流涎腹脹搐搦背項反張腰脊強勁形如死狀或一時二
時醒若反折上竄其聲如雞屬肝抽搐有力為實邪柴胡清
肝散大便不通者瀉青丸陰虛地黃丸若目睛吐舌其聲如
馬屬心發熱冷為實熱砂安神丸發熱飲湯為虛熱辰
砂妙香散若目直頭痛其聲如牛屬脾若發熱抽搐仰臥面
色光澤脈浮病在府為陽易治加味導痰湯身冷不搐覆臥

面色黯黑脈沉病在藏為陰難治六君子加木香柴胡若驚
跳反折手縱其聲如羊屬肺面色痿黃者土不能生金也五
味異功散面色赤者陰火上衝於肺也地黃丸若肢體如尸
口吐涎沫其聲如豬屬腎地黃丸用紫河車骨代蜜丸服腎
無瀉法故悉從虛治凡有此證先宜看耳後前骨間有青紫
紋抓破出血可免其患此皆元氣不足之証須常用六味丸
加鹿角膠或八味丸用鮮河車骨代蜜丸以助先天更以六君
子補中益氣以助後天設若泛行越伐復傷元氣則必不時
舉發久而危殆多致不救凡癩癇虎口脈亂乃氣不和也脈
紋見有五色由其病甚色能加變至於純黑者不可治也

中驚動

小兒睡中驚動由心腎不足所致蓋藏府脆弱易為驚恐夫

醫通卷十一

驚風

癩癇

人之神氣寤則行於目寐則棲於腎令心腎既虛則不能寧
攝精神故睡中驚動也治宜清心安神亦有驚嚇而作者因
驚動其肝故魂不安也宜抱龍丸以驚痰鎮驚若食驚生痰
驚動不安者用四君子以健脾加神龍半夏以化痰山梔柴
胡以清熱

目動咬牙

小兒驚後目微動咬牙者皆病後亡津液不能榮其筋脈也
亦有肝經虛熱生風者宜審其氣血有餘不足而治之其日
中發熱飲冷而動者氣有餘也瀉青丸夜間盜汗及睡不安
而動者血不足而肝腎有熱也地黃丸或因肝經風邪傳於
脾腎者亦令咬牙先用柴胡清肝散次用五味異功散六味
地黃丸若因肝胃虛熱補中益氣加芍藥山梔實熱瀉黃散

以牙齦屬手足陽明故也

握頭便血

經曰。諸風掉眩。皆屬於肝。肝屬木。木得風則搖動。乃肝經火盛而生風也。便血者。風木搖動。則土受凌虐。而不能統血也。或因乳母患怒。風熱熾盛。肝木傷脾。使清陽不升。亦有風邪侵入大腸者。治法。若因風熱。柴胡清肝散。若因怒火者。小柴胡湯加白芍丹皮。若清氣不升。脾氣下陷者。補中益氣湯。肝經血熱妄行者。六味地黃丸。脾土不能培肝木者。六君子加柴胡鈎藤鈎。

偏風口噤

小兒偏風者。少陽厥陰肝膽二經證也。口噤者。由風木太甚而乘於脾。則筋燥而急。然燥令主於收斂。勁切。或左或右。其

醫通卷十一

經頭便血

偏風口噤

思得堂藏

因一也。若足陽明胃經氣虛。風邪所乘。其筋脈偏急者。屬內因。若脾肺虛弱。腠理不密。外邪所乘。或吐瀉後。內亡津液。不能養肝。致口眼喎斜。皆屬肝血不足。內火生風。宜滋腎水。養肝血。壯脾土。治法。脾胃虛而動風者。異功散加柴胡鈎藤鈎。肝肺虛而外邪所乘者。鈎藤散。若兼目赤上視。寒熱往來。小便淋瀝。面青筋脹。皆肝經本病也。或唇口喎斜。腹痛少食。目胞浮腫。面色青黃。肢體倦怠。皆肝木乘脾證也。當審五藏相勝而主之。設執其見證。緊投風藥。反成壞證矣。

角弓反張

角弓反張。即是痙病。經脈空疎。虛風襲入。而致筋脈拘急。或因驚駭停食。肝脾受困。內動虛風。皆能致此。若身反張強直。發熱不搐者。風傷太陽也。人參敗毒散。小續命湯。因驚駭目

直呵欠項強頓悶者。為木風內病。鈎藤散。因暴怒擊動肝火者。瀉青丸。若服前劑。其證益甚者。此邪氣已去。而脾氣虧也。異功散加芎歸補之。若氣血素弱。或服攻伐之劑。而手拘衣領。或牙呵欠者。肺經虛甚也。兼進六君子地黃丸補之。

驚驚

錢氏云。小兒驚驚。因聞大聲。或驚而發搐。搐止如故。此熱生於心。身熱面赤引飲。口中氣熱。二便黃赤。甚則發熱。蓋熱盛生風。陽盛而陰虛也。經曰。熱則生風。風則痰動。痰熱客於心。膈間。風火相搏。故抽搐發動。當用抱龍丸瀉青丸。除其痰熱。不可用巴豆之藥。要全善云。急驚屬木火土質。木實則搐有力。及目上視。火實則動劇頻。土實則身熱面赤而不吐瀉。偃睡合睛。治法宜涼宜瀉。用利驚丸等。亦有因驚而搐者。才

醫通卷十一

驚驚

思得堂藏

關緊。壯熱涎潮。鼠視反張。搐搦頻動。唇口眉毛引。口中無氣。類赤唇紅。二便秘結。脈浮洪數。此內有實熱。外挾風邪。當戒風定搐。若痰熱尚作。仍微下之。痰熱既泄。急宜調養脾氣。此肝脾血虛。火動生風。蓋風生則陰血愈散。陰火愈熾。若屢服祛風化痰瀉火辛散之劑。不愈。便宜認作脾虛血損。急以六君子湯補其脾胃。否則必變慢驚也。驚而見目睛翻轉。足攣跳搐。忽大吐逆。逆藥不得入。搐鼻無嚏者。不治。

慢驚

錢氏云。小兒慢驚。因病後。或吐瀉。或藥餌傷損脾胃。肢體逆冷。口鼻氣微。手足逆冷。昏睡露睛。此脾虛生風。無陽之證也。因吐瀉脾肺俱虛。肝木所乘。或急驚屢用瀉熱。則脾損陰消。遂變慢驚。而致惡痰微搐。此全善所謂木虛則搐而無力。火

虛則身寒。口中氣冷。土虛則吐瀉。睡而露睛。治宜溫補脾胃。六君子。薑桂蠅尾。或兼大熱夾食夾痰。與外感證相似者。當審其因而治之。大率吐瀉痰鳴氣喘。眼開神緩。皆睡露睛。驚跳搐搦。乍發乍靜。或身熱肢冷。面淡唇青。其脈沉遲微緩者。是也。當溫補脾氣為主。佐以安心制肝藥。若氣賦不足。或久病脾虛。及常服吐伐之藥者。多致此證。若因土虛不能生金。金不能平木。木來侮土。致成慢驚者。五味異功散加當歸。棗仁。鉤藤。以補土平木。若脾土虛寒者。六君子加烏頭。蠅尾。泄瀉加炮薑。木香。不應急加附子以回陽氣。凡元氣虧損。而致昏憤者。急灸百會穴。若待下痰不愈。而後灸之。則元氣脫散而不救矣。此乃藏府傳變已極。總歸虛處。惟脾受之。無風可逐。無驚可察。因脾虛不能攝涎。故津液妄泛。而似痰者。當依

醫通卷十一

慢驚

思得堂藏

前法自效。若不審其因。泛用祛風化痰之劑。反促其危也。每見小兒脾胃弱者。一病即成慢驚。不可泥為久病誤藥。而後始成也。內經謂之慢脾風。意可見矣。慢驚而見目不轉睛。痰鳴如拽鋸聲。項軟身冷。汗手足一邊。牽引者。不治。○喻嘉言曰。小兒初生。以及童幼。肌肉筋骨。藏府血脈。俱未充長。陽則有餘。陰則不足。故易於生熱。熱甚則生痰。生風。生驚。亦所恆有。設當日直以四字立名。曰熱痰風驚。則後人不惑。因四字不便立名。乃節去二字。後人不解。遂以為奇特之病。且謂此病有八候。以其頭搖手動也。而立抽掣之名。以其卒口噤脚攣也。而立目心亂搖擗之名。以其脊強背反也。而立角弓反張之名。相傳既久。不知其妄造。遇此等證。無不以為奇特。而不知小兒之膜理未密。易於感冒風寒。病則筋脈牽

強。因筋脈牽強。生出抽掣搖擗。角弓反張。種種不通名目。而用金石藥鎮降。外邪深入藏府。千中千死。間有體堅證輕得愈者。又詭為再造奇功。遂至各守偏門。雖日殺數兒。不自知其罪矣。如方書中有云。小兒八歲以前。無傷寒。此等胡言。竟出自高明。備足為驚風之說。樹幟。曾不思小兒不耐傷寒。初傳太陽一經。早已身強多汗。筋脈牽動。人事昏沉。勢已極於本經。湯藥亂投。死亡接踵。何由見其傳經解散耶。此所以誤言小兒無傷寒也。不知小兒易於外感。易於發熱。傷寒為獨多。世所妄稱驚風者。即此也。小兒傷寒。要在三日內即愈。為貴。若待經盡方解。必不能耐矣。又剛症無汗。柔症有汗。小兒肌腠不密。故剛症少。柔症多。世醫見其汗出不止。神昏不醒。往往以慢驚風證為名。而用參耆木附等藥。閉其腠理。熱

醫通卷十一

慢驚

思得堂藏

邪不得外越。亦為大害。但比金石藥為差減耳。所以凡治小兒之熱。但撤其出表。不當因其入裏也。仲景原有桂枝湯法。若舍而不用。從事東垣內傷為治。毫釐千里矣。

天鈞內鈞

天鈞者。發時頭目仰視。驚悸壯熱。兩目反睜。淚出不流。手足搐掣。不時悲哭。如鬼祟所附。甚者爪甲皆青。蓋由乳母厚味積毒在胃。致兒心脾生熱。熱痰鬱滯為患。加以外挾風邪。而發。法當解利其邪。鈞藤飲。面色皎白。氣虛喘促者。四君子湯加蠅尾。內鈞者。腹脹多喘。唇黑囊腫。偃僵反張。眼尾赤色。若內藏抽掣。作瘧狂叫。或泄瀉瀉脚。內證一作。則外證亦然。極難調理。內證烏蠅六君子丸。外證鈞藤飲。進乳食者可治。若因乳母醇酒厚味。積毒在胃。加味清胃散。若因乳母鬱怒積

熱在肝。加味道遙散。稍加漏蘆。母子俱服。

盤腸氣痛

小兒盤腸氣者。痛則曲腰乾嘔。額上有汗。皆由肝經風邪所搏也。肝腎居下。故痛則曲腰。乾嘔者。風燥其液。故無淚也。額上有汗者。風水助心火也。口閉足冷者。脾氣不榮也。下利清糞者。肝水乘脾也。丁香棟實丸。曲腰乾嘔者。鹽湯送下。額上有汗者。葱豉湯下。口閉足冷者。人參湯下。若面赤唇焦。小便不通。小腹脹痛者。小腸熱也。加味通心散。若痛不止。煎葱湯淋探其腹。就以熱葱熨臍腹間。良久尿出痛止。若因乳母飲食停滯者。保和丸。怒動肝火者。加味道遙散。子母俱服。

傷風

小兒傷風。鼻壅發熱。或痰壅發搐。多因乳母鼻吹額門。但服

醫通卷十一

盤腸氣痛

傷風

聖思得堂藏

惺惺散。或用葱頭七莖。生薑一片。細切搗爛。攤紙上。置掌中。合待溫。貼於額門。其邪即解。乃去其葱。却用絹緞寸餘。塗以麝香。仍貼額門。永無傷風之患。其餘用藥發散。與大人不異。但脾胃怯弱。所以多手足寒冷之證。故治法以照顧脾胃為主。

諸經發熱潮熱

小兒之熱有五藏之不同。虛實之各異。實則面赤氣粗。口燥唇腫。作渴飲冷。大小便難。或掀衣露體。煩躁暴叫。伸體而臥。睡不露睛。手足指熱。宜用汗下。虛則面色青白。恍惚神疲。口中虛冷。喘氣頓弱。身熱惡寒。泄瀉多尿。或乍涼乍溫。拂鬱驚惕。上熱下泄。夜則虛汗。風體而臥。睡而露睛。手足指冷。宜用調補。壯熱者。肢體大熱。熱不已。則發驚癇。若身熱而口中

醫通卷十一

諸經發熱潮熱

聖思得堂藏

氣熱。乃風寒外感也。輕則惺惺散。重則羌活之類。發熱而搐。搦上竅。拘攣昏睡者。驚熱也。實則瀉青丸。抱龍丸。虛則釣藤散。肝火內熱者。龍膽瀉肝湯。陰盛格陽而熱者。理中湯。發熱而不欲飲水者。胃氣虛熱也。白朮散。發熱而飲水作渴者。暑冷飲食者。胃氣實熱也。瀉黃散。小兒諸熱。其因外證而作者。當從外證治之。或乳母七情厚味。飲食停滯。遺熱於兒。或兒嗜食甘肥。衣裳過煖。或煩浴熱湯。積熱於內。為患者。當詳其因而治之。潮熱者。時間發熱。即退。來日候時而至。有風寒疳積食癖之分。表裏陰陽虛實之異。如汗出身熱。呵欠面赤。風熱也。傷寒時疫。陰陽相勝。外感熱也。肌瘦口乾。骨蒸盜汗。疳熱也。大小便秘滯。汗下不解。積熱也。腹背先熱。夜寢且止。食熱也。涎嗽飲水。乳食不消。癖積也。又有煩熱者。氣粗喘促。心煩不安。煩赤口瘡。兼發癰。證皆疹熱者。耳鼻尖冷。心熱者。已午間發。至夜則涼。虛熱者。困倦少力。大凡壯熱。飲水大便秘結。屬實熱。瀉黃散。加黃耆犀角。熱渴飲湯。大便如常。屬陰虛。六味丸。若見驚搐等證。肝經血虛生風也。四物加天麻。釣藤。釣類亦口乾。小便赤色。大便焦黃。表裏俱實熱也。清涼飲。如大便已利。或熱未止。表邪未解也。惺惺散微汗之。陽氣下泄。於陰中而發熱者。補中益氣。若食乳嬰兒。當兼治其母。小兒潮熱。或壯熱不退。多是變蒸。及五藏相勝。不必用藥。又多食積鬱熱。由中發外。見於肌表。只理其中。清陽明之熱。而表熱自除。不可認作外感。用解表攻裏等藥。重傷其內。又潮熱不退。恐是出痘。亦當審察。勿使下藥。大抵發熱飲水者。熱在內。不飲水者。熱在外。宜詳辨之。

傷寒夾驚夾食

錢仲陽云。小兒正傷寒者。謂感冒寒邪。壯熱頭痛。鼻塞流涕。畏寒拘急是也。夾驚者。因驚而又感寒邪。或因傷寒。熱極生風。是熱乘於心。心神易動。故發搐也。羌活散解之。不可便用抱龍丸。以有硃砂能鎮固其邪也。夾食者。或先傷風寒。後復停滯飲食。或先停滯飲食。而後傷風寒。以致發熱氣粗。嘔氣壯熱。頭疼腹脹作痛。大便酸臭。先用解散。次與消導。不解者。大柴胡湯。周歲已前傷寒。熱輕者。惺惺散。周歲已後。須解表微汗。若五六日不除。邪入經絡。傳變多端。不可枚舉。大畧悉以六經例治之。

效嗽

兒因腠理不密。外邪內蘊。或因乳母七情厚味鬱熱。若風邪

醫通卷十一 傷寒夾驚夾食 效嗽 思得堂藏

外傷。鼻流清涕。頭痛身重者。參蘇飲。小兒傷寒發熱。效嗽頭面熱。千金用麻黃湯加石膏黃芩芍藥生薑。小兒發熱喘效。喉中水雞聲。千金射干湯。若嗽而吐青綠水者。六君子加柴胡桔梗。若嗽而吐痰乳者。但加桔梗。勿用柴胡。嗽而嘔苦水者。膽汁溢上也。二陳湯加黃芩。嗽而喉中作梗。心火刑金也。桔梗湯加山梔。有痰。加半夏茯苓。風熱。加荊芥薄荷。小兒嗽久不止。服發散之藥不應。至夜微熱。急當改用小劑六味地黃。以清其陰。若面目浮腫者。五味異功。以益其氣。其嗽立止。切禁升發及助氣藥。若痰中有血。或嗽則鼻衄。須加紫苑。因風熱痰結。屢嗽痰不得出者。必用荊芥白蜜以潤之。百日內嗽者。名乳嗽。甚難調理。桔梗湯。隨證加薄荷紫蘇羌活前胡葱白香豉之類。更須禁其吮乳。但與粥湯乃効。風邪

外感者。惺惺散。痰熱既去。而氣粗痰盛。或流涎者。脾肺氣虛也。異功散加桔梗。口瘡服熱。五心煩熱。腹滿氣粗。大便堅實者。涼膈散。若因乳母食五辛厚味。致兒為患者。母服清胃散。仍參所見諸證治之。

喘

喘急之證。有因暴驚觸心者。有因風寒之邪壅盛者。有因膏粱積熱。熏蒸清道者。有因過服消導。脾胃氣虛者。然喘與氣急。有輕重之別。喘則欲言不能。隘於胸膈。氣急則但息短。心神迷悶耳。治法因驚者。抱龍丸。風寒傷肺氣者。小青龍湯。或三拗湯加減。熱傷肺氣者。當涼肺定喘。痰聲如鋸者。小劑金匱麥門冬湯加牙硝。脾肺氣虛者。面色青白。四肢不溫。大便不實。五味異功散。薛云。前證因脾肺氣虛。勝理不密。外邪所乘。真氣虛而邪氣實者為多。若已發之際。散邪為主。未發之先。補脾為主。設藥攻其邪。則損真氣。裡補其肺。則連其邪。惟在臨證之活法耳。凡喘嗽小便不利。則必生脹。脹則必生喘。當分先後標本治之。

吐瀉

小兒脾胃俱傷。則嘔泄並作。傷辛熱停滯。則嘔吐出酸穢。或黃色乳。或腹痛下利者。瀉黃散保和丸選用。胃虛食不化而發熱者。六君子加黃連吳茱萸木香。若停滯已去。泄瀉不已。埋中湯去參加茯苓木香。胃氣不能化食。益黃散。若傷生冷腹痛。瀉利青白。六君子加砂仁木香炮薑。若傷魚肉等物。六君子加山查砂仁。若瀉紅黃赤黑。腸胃俱熱也。養胃湯加木香黃連。若夏秋傷熱。吐瀉色黃者。玉露散。若夏秋霍亂吐瀉。

醫通卷十一 喘 思得堂藏

手足心熱口乾唇燥喜飲冷水者五苓散凡霍亂吐瀉手足逆冷喜飲熱湯者理中湯若瀉利青白乳食不化額上微汗脈沉遲而或噦逆者由胃氣虛甚過服伐伐使清氣不升濁氣不降以致氣不宣通而作也若瀉而噦臭吞酸胸腹滿痛按之益甚者雖作瀉而所傷之物未消也保和丸消導之腹瀉按之不哭者乳食已消也異功散加水香驚瀉者肝主驚木盛必傳於脾脾土既衰則乳食不化水道不調故泄瀉色青或兼發痛也亦有因乳母脾虛受驚及怒動肝火致兒吐瀉色青異功六君加柴胡鈎藤鈎蟻梢之屬實脾以寧肝膽之氣慎勿用峻攻之藥脾氣益虛肝邪彌甚甚至抽搐反張也若母食厚味而乳熱者清胃散若母飲燒酒而乳熱或子母身赤或昏憤吐瀉丹方用錫撮盛滾水蓋良久取蓋上

吐瀉

聖得堂藏

蒸氣水服之即解同氣相求之義也吐痰涎及綠水者胃虛受冷也吳茱萸湯。小兒衣甚薄則腹中乳食不消不消則大便酸臭此欲為癖之漸也便將紫丸微消之乳哺自當如常若兒不受食哺而但欲乳者此是有癖當下之不下必致寒熱吐利失下之故也凡小兒尿黃而臭甚此腹中有伏熱龍膽湯微下之若白而酸臭者此宿食不消也當與紫丸微者少與藥令內消甚者稍增藥令小下節乳哺數日令胃氣平和若不節乳哺則病易復復下之則令腹脹滿必發痼此為食痼輕則下之重則難療。大凡吐乳瀉青色手足乍冷乍熱者屬驚法當予肝補脾若吐瀉青白色而不甚臭手足指冷或昏睡露睛者屬虛法當溫補脾土若吐瀉黃赤色而

導清理脾胃此驗虛實補瀉法也

疳病

海藏云疳病者因母有妊兒飲其乳所致他孕相迫亦能致此其狀微利寒熱往來或發熱形瘦腹大毛髮聳聳情思不悅令兒斷乳先與龍膽瀉肝湯加扁蓄及白餅子下之後與異功散益黃散補之稟氣素虛不勝攻擊者理中加黃連茯苓扁蓄或一味扁蓄濃煎日服以其能利小便也

瘡

小兒瘡疾不越風食乳癖食積痰積挾驚挾暑與脾虛胃弱之不同蓋風則多寒食則多熱乳癖則泄瀉多哭痰積則嘔吐喘鳴食積則腹脹下血挾驚則發搐指冷挾暑則昏睡壯熱脾虛則倦怠肢冷胃虛則多渴少食治法不離疎風消導

醫通卷十一

疳病

聖得堂藏

豁痰如小柴胡證加減多寒則加羌活桂枝多熱則加橘皮枳實泄瀉則加厚朴神麴嘔吐則加橘皮枳實下血則加枳實黃連發搐則加鈎藤羌活昏睡則加茯苓澤瀉脾虛則補中益氣加桂枝胃虛則六君子加草菓夜發則加當歸日晏則加升麻若痢後瘡瘡後痢與夫三日瘡及久瘡不止俱補中益氣為主瘡母以小柴胡加龍甲桃仁丸服大抵小兒肌腠疎薄無汗者絕少即使無汗稍加桂枝有汗并加芍藥不必用知母石膏紫蘇羌活輩也至於勞瘵瘡瘡之類小兒本無不復賢及其有因乳母七情六淫所致者又當以小柴胡逍遙散之類兼治乳母為當

痢

錢仲陽云瀉利黃赤黑皆熱也瀉利清白米穀不化皆冷也

東垣云。白者溼熱傷於氣分。赤者溼熱傷於血分。赤白相雜。氣血相亂也。羅謙甫云。小兒下利色白。大都受寒。下利膿血。大都受熱與食積。薛云。手足指熱。飲冷者為實熱。香連丸。手足指冷。飲熱者為虛寒。理苓湯。若兼體重肢痛。溼熱傷脾也。升陽益胃湯。小便不利。陰陽不分也。五苓散。若溼熱退而久痢不愈者。脾氣下陷也。補中益氣湯。倍升柴。瀉利兼嘔。或腹中作痛者。脾胃虛寒也。異功散。加炮薑木香。或變而為瀉者。六君子加升柴。若積滯已去。利仍不止者。脾氣虛也。四君子加肉果。有寒加吳茱萸炮薑。有熱加炒黑宣連。九服尤妙。

脫肛

實熱則大便秘結。虛寒則肛門脫出。因吐瀉脾虛。肺無所養。故大腸氣虛下脫也。補中益氣為主。若脫出鮮赤。或作痛者。

醫通卷十一

痢血 脫肛 大便不利

思得堂藏

血虛有熱也。本方加丹皮芍藥。甚則加川連。外用槐角煎湯熏洗。若色淡不腫不痛。無血此屬氣虛。只用補中益氣以升舉之。或加烏梅以收斂之。大凡手足指熱。屬胃熱。手足指寒。屬胃寒。若小兒肛癢或嗜甘肥。大腸溼熱壅滯。或溼毒生蟲而齧肛門者。內服肥兒丸。外以雄黃銅絲為散納肛門。若因病不食。蟲無養而蝕肛者為狐惑。黃連犀角散。若蝕肛透內者不治。

便血

熱入大腸則便血。補中益氣加黃連柴胡。熱入小腸則尿血。六味丸。小兒多因胎中受熱。或乳母六淫七情厚味積熱。或兒自食甘肥積熱。或六淫外侵而成。糞前見血者。清胃散加槐米。糞後見血者。清胃散加犀角連翹。若嬰兒則以治母為

生。餘當臨證制宜。

大便不利

小兒大便不通。脾與大腸有熱也。清涼飲。若飲食不化。及積滯不通者。瀉青丸。此皆治實熱例也。若因乳母膏粱積熱。及六淫七情鬱火傳兒為患。清胃散加蜂窠。清邪解毒。若兒稟賦性弱。五心煩熱。作渴引飲。而大便難者。六味丸加二冬。滋補肺腎。若用大黃麻仁輩。是速其咎也。

小便不利

小便不利。有在氣在血之分。上焦氣分有火。則必渴。下焦血分有溼。則不渴。若津液偏滲於腸胃。大便瀉利。而小便澹少者。五苓散加半夏人參。若脾胃氣滯。不能通調水道者。補中益氣加木通澤瀉。心神煩熱。膈腹脹悶。而小便不通者。梔子

醫通卷十一

小便不利

思得堂藏

仁散。脾肺燥熱。陰無以化而赤者。黃芩清肺飲。膀胱陰虛。陽無以生而淋瀝者。滋腎丸。若膀胱陰虛。陽無以化而淋瀝者。六味丸。若因乳母厚味酒麪積熱者。清胃散。

遺尿

膀胱者。州都之官。津液藏焉。則陽氣內收。腎與膀胱之氣。虛寒不能約制。故睡中遺尿。一味稀骨脂酒炒為散。醇酒或益智仁煎湯送下。脾肺氣虛者。補中益氣加補骨脂山茱萸。

疳

楊氏云。疳者。府藏蟲疳也。其名甚多。姑舉其要。蟲疳者。其蟲如絲。出於頭項胸背之間。黃白赤者可治。青黑者難療。蚊疳者。皺眉多啼。嘔吐清沫。中脘作痛。腹脹青筋。唇口紫黑。頭搖齒搖。脊疳者。身熱羸瘦。煩渴下利。拍背有聲。脊骨如鋸齒。十

思得堂藏

思得堂藏

思得堂藏

二便色白

食積

之夾食傷寒者。先散之。參蘇飲。熱甚便秘者。先利之。大柴胡湯。如無外感。直只傷食。不至於甚。保和丸調之。蓋脾為至陰之藏。故凡脾病者。至夜必熱。熱而兼寒。則又見所勝者侮所不勝矣。食未消者消之。則寒熱止。食既消者補之。則寒熱痊。若手足並冷。喜熱飲食。此中州虛寒也。宜溫之。大便欲去不去。脾氣下陷也。宜升之。若夜間或侵晨泄瀉者。脾腎俱虛也。四神丸手足並熱。作渴飲水者。脾胃實熱也。瀉黃散。大便秘結。大柴胡湯。手足雖熱。口不作渴。大便不實者。白朮散。大便下血者。理中湯去參加枳實黃連紅朮。

腹痛腹脹

小兒腹痛體瘦。面色純白。目無精光。手足指寒。口中氣冷。不思飲食。或嘔利振口。此脾土虛而寒水所侮也。益黃散。或理中湯。

醫通卷十一

腹痛腹脹

五五 思得堂藏

中九去參加茯苓。若口中氣溫。手足心熱。面色黃白。目無精光。或多睡惡食。或大便酸臭。此積滯也。消積丸。甚者白餅子下之。後以白朮散調補脾胃。若腹脹而悶。喘滿者。白餅子。若不悶亂喘滿者。脾虛也。白朮散調補之。誤下而致目胞腫面四肢浮腫。肚腹愈脹。脾虛欲發驚癇者。竭氣丸溫理之。若腹中有癖。不食飲乳。則吐。按之則啼。當用白餅子下之。蓋小兒病此。良由乳食不消。伏於腹中。乍冷乍熱。飲水過多。脾胃虛弱。不能傳化水穀。以致四肢羸瘦。肚腹漸大。而成疳矣。六君子加乾蟾。若痛連兩脇。肝木乘脾也。四君子加柴胡芍藥。若腹痛重墜。脾氣下陷也。補中益氣湯加枳實。若手足指冷。或呃逆泄瀉。寒水侮土也。六君子加炮薑肉桂。不應。急加附子。若服剋劑之藥。致腹作痛。按之痛止者。脾氣復傷也。五

味異功微。至於腹脹喘滿。亦皆脾虛邪乘所致。東垣所謂寒脹多而熱脹少。熱者六君子加蒼朮枳朴。寒者六君子加薑桂吳茱萸。亦有寒熱錯雜者。渴心渴。冬連炮薑並用。若治實脹。用二陳加枳朴木香。有熱加蒼朮可也。

煩渴

小兒肩紅如丹。即發渴。紅甚焦黑。則危篤。若三焦煩熱。作渴。導赤散。風熱瀉青丸。虛煩煩渴。梔子散。渴不得眠。酸棗湯。夜甚者。當歸補血湯。傷寒後。唇口焦者。竹葉石膏湯。渴利作渴。五苓散。暑傷心脾。煩渴引飲者。人參白虎湯。下利脾虛作渴。七味白朮散。熱結膀胱。小便赤澀。五苓散。上焦虛熱。四君子湯。膏梁積熱。消胃散。脾虛積熱。瀉黃散。中氣虛熱。異功散。腎水虛熱。六味丸。慎勿誤用寒涼降火。脾胃復傷。則腹脹

醫通卷十一

煩渴

五五 思得堂藏

而為敗證矣。

汗

小兒腠理疎薄。常時微汗。但不宜過多。亦不可衣被過厚。使汗太出。若睡中出汗。名盜汗。止汗散。遍身多汗。煩熱為胃熱。三補丸。胃虛汗者。上至項下至臍也。益黃散。六陽虛汗者。上至頭下至項。乃稟賦不足。保元湯加防風白朮。小兒元氣未充。腠理不密。或飲食停滯。或厚衣溫燥。熱鬱心包。而津液妄泄也。導赤散。血虛用入參當歸等分煎服。名回春湯。其盜汗屬胃經虛熱者。五味異功。腎經虛熱者。六味丸。若寒水侮土。益黃散。設泛行施治。誤損脾胃。多成疳瘵。大凡汗多亡陽。必至角弓反張。頸項強。用十全大補多有生者。

黃暈

夫人身之神。貴於藏而默用。見於外則內虛也。其證皆由脾氣有虧。運化失職。淫熱留於肌膚。發而為瘡。錢仲陽所謂身痛背強。二便澀滯。遍身面目爪甲皆黃。小便褐色是也。治法宜固脾為先。如專用利伐寬中。淡泄利水之藥。則鮮有不致危者。若初生及百日之中。半旬之內。不因病而身黃者。胃熱胎黃也。腹大食土。為脾疳。兼作渴冷飲。瀉黃散。小便不利。五苓散。加茵陳。大便秘。茵陳蒿湯。病後發黃。肢體浮腫。白朮散。清便自調。肢冷嗜臥。益黃散。身淡黃白。理中丸。加茵陳。身熱。膈滿。肌膚面目皆黃。瀉黃散。加枳殼生薑。若閉目壯熱。多哭不已。大小便赤澀。口中熱氣。乃疳母厚味遺毒也。母子並服。消胃散。生料地黃丸。忌酒麪五辛熱物。倘誤傷脾土。急則瀉風。吐瀉。緩則肢體浮腫。小便不利。眼目障閉。多成疳疾矣。又

醫通卷十一 黃疸 五十一 思得堂藏

有脾虛發黃者。當於脾胃中求之。

坑

曹氏云。蛇者九蟲之一。因藏府虛弱及傷甘肥生冷。致蛇不安。動則腹中攻痛。或作或止。口吐涎水。黃心則死。錢仲陽云。吐水不心痛者。胃冷也。吐沫心痛者。蟲痛也。與癰相似。但目不斜。手不搖耳。化蟲丸。田氏云。蟲痛啼哭。俛仰坐卧不安。自按心痛時。時大吐。面色青黃。唇色兼白。目無精光。口吐涎沫也。若因胃冷即吐。理中湯。加沙川椒烏梅。或送烏梅丸尤妙。若中氣虛而蟲不安者。但補脾胃自安。冬月吐蟲多是胃氣虛寒。白朮散。加丁香烏梅。

疳

小兒陰腫疳氣。多屬肝腎氣虛。為風邪所傷。血氣相搏而成。

六味丸。加茴香。川棟子。若坐卧淫地所致者。五苓散。換蒼朮。加蠟尾。柴胡。山梔。車前。不時寒熱者。小柴胡去參。加桂。苓。川棟。蠟尾。若因啼哭不止。動於陰器。結聚不散。而辜丸腫大者。桂枝湯。加細辛。當歸。木香。蠟尾。啼叫氣逆。水道不行而致者。沈香降氣散。加青皮。蠟尾。柴胡。小腹作痛。小便澀滯者。龍膽瀉肝湯。加延胡索。肉桂。

目

五藏六府之精氣。皆上注於目。而黑睛為肝之竅。瞳神又為腎之精華。小兒目無精光。及白睛多。黑睛少者。肝腎俱不足也。地黃丸。加鹿茸。薑。視通明。夜視目見者。所秉陽氣衰弱。遇夜陰盛。則陽愈衰。故不能視也。沖和養胃湯。煮肝散。疳眼者。因肝火淫熱上衝。脾氣有虧。不能上升清氣。故生白翳。雙閉。

醫通卷十一 疳 五十二 思得堂藏

不開。淚如糊。久而膜流。遂至損目。益氣聰明湯。決明雞肝散。目閉不開者。因乳食失節。或過服寒涼之藥。使陽氣下陷。不能升舉。補中益氣湯。取連翹者。肝經風熱也。柴胡清肝散。若目割面青。食少體倦。肝木剋脾土也。五味異功散。加白芍。柴胡。生薑。實者去參。換赤芍。加羌活。蠟尾。若生下目黃。壯熱。大小便秘結。乳食不思。面赤眼閉者。皆由在胎時。感母熱毒所致。兒服瀉黃散。母服地黃丸。若乳母豪梁積熱。致兒目黃者。母服清胃散。若肢體而目爪甲皆黃。小便如屋塵色者。難治。餘參。眼日本門治之。小兒誤跌。或打著頭。屬受驚。肝系受風。致瞳神不正。名曰通睛。宜石南散吹鼻。內服牛黃平肝鎮驚散。

耳

耳者心腎之竅。肝腎之經也。心腎主內證。精血不足。肝膽主外證。風熱有餘。或虛風或虛鳴者。稟賦虛也。或腹痛或腹癢者。邪氣客也。稟賦不足。地黃丸。肝經風熱。柴胡清肝散。若因血燥。梔子清肝散。不應佐以六味丸。若因腎肝府熱。朝用六味丸。夕用蘆薈丸。若因乳母膏粱積熱而致者。子母並服加味清胃散。

鼻塞鼻衄

曹氏云。鼻乃肺之竅。皮毛腠理。乃肺所主。因風邪客於肺。而鼻塞不利者。內服清風散。外用葱白七莖。入麝粉少許。搗碎。帛上。掌中。暖溫貼鼻門。小兒鼻衄。多因驚仆氣散。血無所歸。而隨氣上脫。先用小烏沉湯。次用止衄散。或異功散。加柴胡。山梔。久不愈。用麥冬。黃耆。當歸。生地。人參。五味。煎服。若久血脫。但出淡紅水。或帶黃黑色者。難已。

解頤

解頤者。生下頤門不合也。長必多愁少笑。目白睛多。面色晄白。肢體消瘦。皆屬腎虛。按腎主髓。髓為腦海。因父母精血不足。不能飲固也。地黃丸。加五味。鹿茸。更用天南星。微炮。為末。醋調。攤餅。吊。烘熱。貼頤門。虛寒用細辛。桂心。乾薑。為末。乳汁和。傅上。乾復傅之。兒面亦即愈。又方。半夏。生薑。芎藭。細辛。桂心。烏頭。苦酒。煮去滓。以帛浸藥汁中。適寒溫。以敷頤上。冷更溫之。復敷如前。朝暮各三四敷。乃止。二十日可愈。有至七八歲。或十四五歲。氣血既盛。而自合。若縱恣色慾。戕賊真陰。終焉不壽。此證若在乳下。當兼補其母。更以較帛束繫兒首。使其易合。亦有懸陷頤填。俱屬賦稟不足。或五疳久病。元

氣虧損。瀉利氣虛。脾氣不能上充。所致者。補中益氣及十補丸。若手足並冷。前湯加薑桂。不應虛寒之甚也。急加附子。振則不效。

龜胸背

龜背者。由兒生下。風客於脊。入於骨髓。小續命去。附加防風。龜胸者。因肺受溼熱。攻於胸膈。龜胸丸。並用龜尿。點其骨節。多有得愈者。蓋小兒腠理不密。風邪乘之。或痰飲壅熱於肺。風熱交攻。而致。或坐蚤風入骨髓。治用上法。若稟受肝腎虛熱。六味丸。腎氣不足。八味丸。背加鹿茸。胸加龜甲。治之。貴早。遲則不驗。

虛羸

小兒虛羸。因脾胃不和。不能乳食。使肌膚瘦弱。或大病後。脾胃虛。通卷十一

龜胸背

虛羸

五十七 思得堂藏

氣尚弱。不能得化穀氣所致。若冷者。時時下利。唇口清白。熱者。身溫壯熱。肌體微黃。更當審形色。察見證。如面赤多啼。心之虛羸也。面青目斜。肝之虛羸也。耳前後或耳下結核。肝經虛火也。頸間肉裏結核。食積虛熱也。面黃痞滿。脾之虛羸也。面白氣喘。肺之虛羸也。目睛多白。腎之虛羸也。仍參相勝治之。

五遲五軟五顛

五遲者。立遲。行遲。滿遲。髮遲。語遲是也。蓋腎主骨。齒者骨之餘。髮者腎之榮。若齒久不生。生而不固。髮久不生。生則不黑。皆胎弱也。良由父母精血不足。腎氣虛弱。不能榮養而然。若長不可立。立而骨軟。大不能行。行則筋軟。皆肝腎氣血不充。筋骨痿弱之故。有肝血虛而筋不榮。膝蓋不成。手足拳攣。

者有胃氣虛而體不溫。骨不能用。而足膝無力者。並用地黃丸為主。齒運加骨碎補骨脂。髮運加龜版鹿茸何首烏。立運加鹿茸桂附。行運加牛膝鹿茸五加皮。語遲之因不一。有因妊母卒然驚動。邪乘兒心不能言者。有稟父腎氣不足。而言遲者。有乳母五火遺熱。閉塞氣道者。有病後津液內亡。會厭乾涸者。亦有脾胃虛弱。清氣不升而言遲者。邪乘兒心。善補丸腎氣不足。地黃丸加遠志。閉塞氣道。加味逍遙散。津液內亡。七味白朮散。脾胃虛弱。補中益氣湯。若病久或五疳所致者。但調補脾胃為主。○五鞭者。仰頭哽氣。手脚心堅。口緊肉硬。此陽氣不榮於四末。獨陽無陰之候。若腹筋青者。本乘土位也。六味丸加麥冬五味。若係風邪。小續命去附子。○五鞭者。頭項手足口肉皆軟。胎象脾腎氣弱也。若口硬不

醫通卷十一 五鞭五鞭五鞭 五鞭五鞭五鞭 五鞭五鞭五鞭

能嚼物。肉硬不能轉骨。必先用補中益氣以補中州。若項硬天柱不正。手轉持物無力。足軟不能立地。皆當六味丸加鹿茸五味。兼補中益氣二藥久服。仍令壯年乳母哺乳為第一。

失音

舌者音聲之機也。喉者音聲之關也。小兒卒然無音者。乃寒氣客於會厭。則厭不能發。發不能下。開闔不致。故無音也。若咽喉聲音如故。而舌不能轉運言語。則為舌瘡。此乃風冷之邪客於脾絡。或中舌下廉泉穴所致。若舌本不能轉運言語。而喉中聲嘶者。則為喉瘡。此亦風痰阻塞。使氣道不通。故聲不得發。而喉無音也。大抵此證。多有稟賦不足。不能言者。有乳母五志之火遺兒。稟閉清道。不能言者。有驚風中風不能

言者。若遺熱與津液耗者。七味白朮散。清氣不升者。補中益氣湯。稟賦不足。與虛火傷肺者。地黃丸。若仰首欬嗽。肢體羸瘦。目白睛多。或兼解頰。阿欠咬牙等證。悉屬腎虛。非地黃丸加鹿茸遠志不能治也。若吐瀉後。或大病後。雖有聲而不能言。又能嚼物者。非失音。乃胃氣不能上升。地黃丸與補中益氣湯兼服。

咬牙

小兒寤寐不時咬牙及齧乳者。雖多屬驚。然所致各有不同。惟驚乳驚者。抱龍丸。若發熱飲水。叫哭而搖者。心經實熱也。熾心湯。睡因驚悸。食目而吐者。心經虛熱也。導赤散。面青目斜。呵欠頻強。煩悶者。肝經實熱也。柴胡清肝散。手循衣領。及亂搶物者。肝經虛熱也。發搐目青面赤。肝經風熱也。並宜

醫通卷十一 夜啼 夜啼 夜啼 夜啼 夜啼

六味丸

夜啼驚啼

夜啼有二。曰脾寒。曰心熱。夜屬陰。陰勝則脾藏之寒愈盛。脾為至陰。喜溫而惡寒。寒則腹中作痛。故曲腰而啼。得溫火其啼便止。其候面青白。手腹俱冷。不思乳食。亦曰胎寒。益黃散加鉤藤。若見腹愈痛者。心熱也。心屬火。見燈則煩熱內生。兩陽相搏。故仰身而啼。其候面赤。手腹俱暖。口中氣熱。導赤散加黃連麥冬。若面色白而黑睛少。屬腎氣不足。至夜陰虛而啼也。宜用六味丸。因驚者。各各件驚治之。○驚啼者。邪氣乘心也。哭而多淚。是驚也。啼而無淚。是痛也。若因心火不足。而驚啼者。秘製安神丸。心火熾盛。導赤散。木火相搏。加柴胡梔子。肝血不足。六味丸。

喜笑不休

經曰。神有餘則笑不休。又曰。在藏爲心。在聲爲笑。在志爲喜。又火太過爲熱。熱之紀。其病笑。譫狂妄。又云。少陰所主爲喜笑。又云。精氣并於心則喜。此數者皆言屬心火也。先用瀉心湯治其心火。次與六味九滋其腎水。太僕所謂壯水之主。以制陽光也。扁鵲云。其人口赤色者可治。青黑者死。若腎水虧涸。不勝心火。而喜笑不休。尋作不安之態者。六味地黃丸。肝水過盛。上挾心火。而喜笑不休者。柴胡清肝散。餘兼別證各從其類而治之。

循衣撮空

循衣撮空。皆由肝熱筋脈血枯而風引之。故手指爲之撮歛也。宜確服六味九。間有回生之功。亦有脾虛肝乘者。六君子

通卷十一

喜笑不休

循衣撮空

思得堂藏

加鈞藤蠟。若肝經實熱。渴青丸。蓋循衣撮空。皆病之敗證。求其實熱。十無一二。許叔微云。循衣撮空。皆神虛無主。非大劑獨參保元。不能挽回。虛寒則十全大補。人參養營。大建中溫補之。然亦有心包熱極所致者。王海藏治血脫。循衣撮空。摸脈。揚手握頭。銷番失神。脈弦浮而虛。血脫內燥。熱之極也。氣粗鼻乾。此爲難治。生地黃黃連湯。

壽夭

孫真入曰。兒初生。叫聲連延相屬者壽。聲絕而復揚急者不壽。啼聲散不成入。啼聲深不成入。胸中無血者好。胸小者不放入。通身軟弱如無骨者不壽。鮮白長大者壽。生下目自開者不成入。目視不正數動者大非佳。汗血者多危。不壽。打不流不成入。小便凝如脂者不成入。頭四破不成入。常搖手足

者不成入。額上有旋毛者早貴。妨父母。兒生後骨不成者。能言而死。凡骨不成者。能強而死。掌骨不成者。能旬而而死。腰骨不成者。能行而死。腰骨不成者。能立而死。身不收者死。鼻目者死。股間無生肉者死。頰下微者死。陰不起者死。陰囊下白者死。赤者死。甲縫通連黑者壽。兒小時。識悟通敏過人者。多夭。大則項索額回之流也。小兒骨法成就。威儀迴避。舒雅。入精神。離羣者壽。其預知人意。迴旋敏速者夭。大則楊修孔融之徒也。

張介賓曰。小兒之壽夭。其因有二。一則由於稟賦。一則由於撫養。夫稟賦爲胎元之本。精氣之受於父母者也。撫養爲居處寒溫。飲食饑飽之得失者也。凡少年之子。多有羸弱。慾動精薄也。老年之子。多強壯者。慾少精全也。多飲者子多不育。

通卷十一

壽夭

思得堂藏

蓋以酒淫亂。精則精半。非真而淫熱勝也。多慾者子多不育。以孕後不節。則泄母陰。奪養胎之氣也。此外如饑飽勞逸。五情六氣。無不各有所關。是皆所謂稟賦也。至於撫養之法。則俗傳有云。若要兒安。須帶饑寒。此言殊爲未審。夫欲其帶饑者。恐飲食之過耳。過則傷脾而病生。寧使暑熱。其猶庶幾。至若寒之一字。則大有關係。小兒以未成之血氣。嫩薄之肌膚。較之大人。相去百倍。顧可令其帶寒邪。管見新產之兒。多生驚搐。此爲極要。不慎。則風寒襲之。多致不救者此也。及其稍長。每多發熱。輕則爲鼻壅。欬嗽。重則爲小兒傷寒。切勿不識。一察呼爲變蒸。投藥致斃者此也。或寒氣傷。則爲吐瀉。或因寒生熱。則爲驚風。種種變生。多由外感。雖稟賦強盛。不根風寒者。亦所常有。但強者三之一。弱者三之二。傷熱者十

之三。傷寒者十之七。況膏粱貧賤。氣質本是不同。醫家不能察。直知見熱攻熱。嬰兒不能言。病家不能辨。徒付之命。誠可歎也。又有謂小兒純陽之體。故多宜清涼治之。此說尤為誤入。而王節齋又曰。小兒無補腎。謂男至十六而腎始充滿。既滿之後。妄用虧損。則可用藥補之。若受胎之時。稟之不足。則無可補。稟之原足。又何待補。嗚呼。此何說耶。夫小兒謂純陽者。以其陰氣未成。即腎虛也。或父母多慾。而所遺水虧。亦腎虛也。陰既不足。而不知補之。陰絕則孤陽亦絕矣。何謂無可補耶。殊不知錢氏六味地黃丸。專治小兒腎虛解。顧以其純陽無陰。故取崔氏八味丸。裁去桂附。以獨補腎水也。此義惟薛立齋得之。惜乎世醫多所未悟也。

張氏醫通卷十一

醫通卷十一

醫通卷十一

思得堂藏

張氏醫通卷十二

清

長洲石頑張

璐路玉

中國醫

男

以柔安世

日本

大泉長卷前田安宅子仁

男

典子守

嬰兒門下

夫人腎尚不同。趨舍各異。痘疹一門。向得誦高兄採輯諸家方論。備列醫通。其間方藥多有以意參易者。惜乎筆削未竣。完璧難求。志兒心折其學。因命續貂。系以麻疹諸例。庶不失先哲二者並名之義云。

錢氏痘疹論

醫通卷十二

錢氏痘疹論

一

思得堂藏

小兒在胎時食母五藏血。生後其毒當出。故痘疹所發皆五藏之液。肝水泡。其色青小。肺膿泡。色白而大。心為斑。其色赤小。脾為疹。其色赤黃。諸疹欲出。五藏證具。惟腎無候。但耳涼尻冷是也。諸疹出時。辨視輕重。一發便出盡者。必重也。瘡夾疹者。半輕半重也。出稀者輕。裏外微紅者輕。外黑裏赤者微重也。外白裏黑者大重也。瘡端裏黑。點如鍼孔者。勢甚也。青乾紫陷。昏睡汗出不止。煩躁熱渴。腹脹喘喘。大小便不通者。困極也。凡諸疹當令乳母慎口。不可令饑。及受風冷致歸。腎變黑難治也。有大熱當利小便。有小熱宜解毒。若黑紫乾陷者。百祥九下之。不黑者慎勿下。更看時月輕重。大抵痘疹屬陽。出則春夏為順。秋冬為逆。又當辨春臘泡夏黑陷。秋斑冬疹。亦不順也。黑者無問何時。十難救。一其候寒戰喉呀。或

身黃腫紫。急宜百祥丸下之。復惡寒不已。身冷汗出。耳尻反熱者。死。腎氣大旺。脾虛不能制故也。下後身熱氣溫。欲飲水者可治。脾旺勝腎。寒去而溫熱也。治之宜解毒。不可妄下。下則內虛。多歸於腎。若能食而頭焦起。或未焦而喘。實者四順清涼飲下之。若身熱煩渴。腹滿而喘。大小便澀。面赤悶亂。大吐。此當利小便。不瀉者。宜風散下之。若五六日痼不焦。是內發熱。熱淫於皮中。故痼不得焦。宜宣風散導之。用生犀磨汁解之。便熱退痼脫矣。○瘡疹欲出。先欠呵頓悶。肝也。時發驚悸。心也。乍涼乍熱。手足冷多睡。脾也。面腮頰赤。咳嗽噴嚏。肺也。此四臟證俱見。惟黑者屬腎也。瘡疹乃五臟之毒。內一臟受穢多者。出則歸其藏矣。

丹溪參補陳氏痘疹論

醫通卷十二

丹溪參補陳氏痘疹論二

思得堂藏

小兒痘疹。大抵與傷寒相似。發熱煩躁。臉赤唇紅。身痛頭疼。乍寒乍熱。噴嚏呵欠。咳嗽痰涎始發之時。有因傷風傷寒而得。有因時氣傳染而得。有因傷食嘔吐而得。有因跌撲驚恐瘀血而得。或為竅眼驚搐如風狀。或口舌咽喉肚腹疼痛。或煩躁狂悶。昏睡自汗。或下利。或潮熱。證候多端。卒未易辨。須以耳冷尻冷足冷驗之。蓋痘疹屬陽。腎藏無證耳與尻足俱屬腎。故獨冷。又不若視其耳後有紅脈赤線為真候。調護之法。首尾俱不可汗下。但溫涼之劑。兼而濟之。解毒和中。安表而已。虛者益之。實者損之。冷者溫之。熱者平之。是為權度。如庖人籠蒸之法。但欲其熟耳。蓋毒發於表。如苟妄汗。則營衛一虛。開泄滯爛。由是風邪乘間變證者有之。毒根於裏。如苟妄下。則內氣益虛。毒不能出而返入焉。由是土不勝水。變黑

歸腎。身作振寒。耳尻反熱。腹脹黑陷。十無一生。汗下二說。古人深戒。以此觀之。瘡疹證狀。雖與傷寒相似。而治法實不同。傷寒從表入裏。瘡疹從裏出表。故也。如欲解肌。葛根紫蘇可也。其或氣實煩躁。熱熾便秘。則犀角地黃湯。或紫草飲。多服亦能利之。故雖云大便不通。少與大黃。尤宜斟酌。若小便赤少者。分利小便。則熱氣有所滲出。凡熱不可驟退。但宜輕解。若無熱。又不能起發也。○瘡疹分入清濁。就形氣上取勇怯。凡已發未發。但覺身熱。證似傷寒。疑似未明。先與慍慍散。參蘇飲。熱甚則升麻湯。人參敗毒散。復發者曰上方俱熱。一見紅點。便忌葛根。恐發則表虛也。凡痘疹初欲出時。身熱鼻尖冷。呵欠咳嗽面赤。便宜升麻湯加山查大力子。則瘡稀疎易愈。凡痘疹發熱時。法以溫實子為未。審調貼額門。免有患

醫通卷十二

丹溪參補陳氏痘疹論三

思得堂藏

眼之疾。凡初出之際。須看胸前。稠密。急宜消毒飲加查肉黃芩紫草。減食。禁加人參。初出之時。色白者。便大補氣血。參香木草桂芍芎歸。若大便瀉。加木香肉豆蔻。初起時自汗不効。蓋淫熱熏蒸而然。有初起煩躁譫語。狂渴引飲。若飲水則後來屬不齊。意以涼藥解其標。如益元散之類。凡瘡已出。可與化毒湯。升麻湯。出不快者。加味四聖散。或紫草飲。紫草水通湯。及快痘湯。出太甚者。人參敗毒散。色赤。犀角地黃湯。疎則無毒。密則毒盛。宜多服涼藥解之。庶無害眼之患。瘡灰色白靜者作寒。看背湧者燥者。煖發者作熱治。○黑屬血熱。涼血為主。白屬氣虛。補氣為主。中黑陷而外白。起得遲者。則相兼而治。凡痘瘡分表裏虛實。吐瀉少食為裏虛。不吐瀉能食為裏實。裏實而補則結癰毒。陷伏倒靨灰白者為表虛。紅活綻

起爲表實。表實而後補表。則潰爛不結。痂痘分氣血虛實。虛則黃耆養營。活血之劑。佐以風藥。實則芍藥黃芩爲君。佐以白芷連翹之類。調解之法。活血調氣。安表和中。輕清消毒。兼而治之。溫如當歸黃耆。涼如前胡葛根。佐以川芎白芍。枳殼桔梗。羌活木通紫草之屬。則可以調適矣。黑陷二種。因氣虛而毒不能盡出者。酒炒黃耆紫草。人參輩。黑陷甚者。用燒人矢。蜜水調服。癰瘍者。於形色脈上分虛實。實則脈有力。氣壯紅紫。虛則脈無力。色淡平塌。癰癤以參耆實表之劑。加涼血藥。實癰如大便不通。少與大黃寒涼之藥。下其結毒。氣怯輕者。用淡蜜水調滑石末。以羽潤瘡上。瘡乾宜退火。祇用輕劑。芥防風牛旁之類。上引用升麻葛根。下引用檳榔牛膝。佐以貝母忍冬。白芷栝蒌之類。若咽喉痛者。鼠粘子湯如聖。

醫通卷十二

丹溪泰和陳氏痘疹論四

思得堂藏

飲選用。喘滿氣壅者。麻黃湯加黃芩白芍石膏。煩渴瀉利者。烏梅與萊菔黑豆作湯。時溫服之。瀉利嘔逆者。理中湯加木香。將欲成就。却色淡者。宜助血氣。芍藥芍藥紅花之類。將欲成就。却色紫者。宜涼血解毒。生地芩連連翹之類。甚者犀角大解。痘毒淡白色。將靨時。如豆殼者。蓋因初起時飲水多。其靨不齊。俗呼爲倒靨。但服實表之劑。消息二便。如大便秘。通大便。小便秘。通小便。小便赤澀。大連翹湯。甘露飲。大便秘結。內煩外熱者。小柴胡加枳殼最當。或少與四順清涼飲。痘疹用藥。固有權度。大小二便不可不通。其大便自下黃黑。則毒已成。不必多與湯劑。稍與化毒湯。不用亦可。二便一或閉。則腸胃壅遏。脈絡凝滯。毒無從泄。眼閉聲啞。不旋踵而告歿矣。陷入者。加味四聖散。更以胡荽酒薄敷其身。厚敷其足。

噴其衣被。併厚蓋之。若猶未也。獨聖散入木香煎湯。若其瘡已黑。乃可用錢氏宣風散加青皮。錢氏云。黑陷青紫者。百祥九下之。不黑者。慎勿下。知其所下者。爲勝肺之邪也。又云。下後身熱。氣溫欲飲水者可治。寒戰者爲逆。知其脾強土可以制水也。百祥丸太峻。宜以宣風散代之。渴後溫脾。當用入參茯苓白朮等分。厚朴木香減半爲妙。蓋瘡發肌肉。陽明爲主。脾土一溫。胃氣隨暢。何脾不消。脾已泄之。腎水乎。此錢氏不刊之秘旨也。其壞瘡者。一曰內虛泄瀉。二曰外傷風冷。三曰變黑歸腎。近時痘疹。多宗陳文中木香散異功散。殊不知彼時立方之時。爲嚴冬大寒鬱遏。痘疹不得紅綻。故用辛熱之劑發之。今人不分時令寒熱。一槩施治。誤入多矣。夫渴者用溫藥。瘡瘍者用補藥。自陳氏發之。迨出前輩。然其立方

醫通卷十二

丹溪泰和陳氏痘疹論五

思得堂藏

多用燥熱。或未適中。恐其立方之際。必有扶寒而虛者設也。痘疹多是毒氣盛。便先宜解毒。然恐氣血周貫不定。故隨後亦宜兼補。以助成膿血也。

薛立齋痘疹大要

痘疹大要。與癰疽治法無異。宜辨表裏虛實寒熱。蓋表虛而用發表之劑。輕則斑爛。重則不能起發而死。裏實而用托裏之劑。輕則患痘毒。重則喘急腹脹而死。裏虛而用疎導之劑。輕則難以貫膿結痂。重則不能結膿落膿而死。治法可不慎哉。若骨亦發熱。疼痛作渴。能食便秘。此形氣病氣俱實也。雖在嚴冬。必用四順清涼飲。以救其陰。若黑陷不食。嘔吐泄瀉。寒戰咬牙。手足逆冷。此脾土虛敗。寒水所侮也。雖在盛夏。必用六君輩附。或陳氏異功散。以回其陽。此內經舍時從證之

法也。若起發遲不紅活。不作膿。不結痂。或發熱作渴。飲食少思。此脾胃虛弱也。參耆四聖散補之。若雖起而色白。雖灌膿而不滿。雖結痂而不落。或瘡場作渴。飲湯腹痛不食。嘔吐泄瀉。此脾胃虛寒也。陳氏木香散以溫之。其在四五日之間死者。毒氣盛真氣虛。而不能起發也。六七日之間死者。元氣虛而不能灌膿也。旬日之外死者。邪氣去脾胃敗。而元氣內脫也。治者但能決其死。而不知其死。必本於血氣虧損。若能逆推其因。而預為調補。豈斷無生理哉。蓋起發灌膿結痂三者。皆由脾胃榮養。不可妄投伐之劑。以致其大耗也。至於大入患此。治法迥異。昔丹溪嘗治一老人。初患痘。昏憤不知。亟用大補四十餘劑。出痘而愈。觀此可見。

魏桂岩逆順險三法論

醫通卷十二

魏氏逆順險三法論 六

思得堂藏

夫遠分逆順險法。古無有也。愚妄立之。何則。順者吉之象。逆者凶之象。險者悔吝之象。治痘而執此三法。以觀形色。驗吉凶。將無施而不當也。蓋痘發熱三日。放標三日。起長二日。灌漿三日。收靨三日。始於見形。終於結痂。凡十四五日之間而已。是故吉不必治。法則反凶。凶不可治。治之無益。至如險者。治之則可以轉危就安。夫氣血盛。斯毒已解。氣血損。則毒難愈。惟氣血弱者。雖毒不能頓解。故必加補益。扶持使生意固。手其中。無不平矣。余嘗苦心究討。定立法式。觀者幸毋以余為僭。

一二日。初出如粟。點淡紅潤色。於口鼻年壽之間。先發兩三點。順之兆也。形如蠶粒。紫黑乾枯。於天庭司空印堂方廣太陽等處。先見者。逆之兆也。雖稠紅潤。澤成箇者。亦

險也。○圓暈成形。乾紅少潤。險之兆也。險者毒難犯上。其氣未離。候其氣血交會。保元湯加桂。

二三日。根窠圓混。氣滿血附。長發飽滿。光潔為順。根窠無暈。氣失血散。枯死不長為逆。○根窠雖圓。而頂不滿為險。保元湯加芎桂。

四五日。大圓光澤。大小不一。氣和血就為順。○綿密如蠶種。黑陷乾紅。紫泡者為逆。○根窠雖起。色不光潔為險。保元湯加桂糯米。

五六日。氣會血附。紅活鮮明為順。○氣雖旺而血不歸附。灰陷紫陷。或發水泡。瘡場為逆。○氣弱血微。光白不榮為險。保元湯加木香芎歸。

六七日。氣化漿行。光潔飽滿為順。○漿毒不行。神去色枯為逆。○氣血不足。不能成漿為險。急以保元湯加桂米。

七八日。氣旺血附。神全色潤為順。○毒不化漿。色枯乾紫為逆。發癰者可治。外剝者必死。○氣血少緩。毒雖化而漿不滿為險。保元湯加桂米。

八九日。漿足根化而無他證為順。○漿不足而或外剝者為逆。○漿不充滿。血附微紅。氣弱者為險。保元湯加薑米。

十一二日。血盡毒解。氣調漿足而軟為順。○氣弱血凝。枯朽剝盡為逆。○血盡漿足。溼潤不斂。內虛為險。保元湯加芎木。

十三四日。氣血歸本。漿老結痂為順。○毒未解而脫形。諸邪並作。雖結痂為逆。○漿老結痂之際。或有雜證相併。不可峻用大寒大熱之劑。保元湯隨證加減。

醫通卷十二

魏氏逆順險三法論 七

思得堂藏

十四五日氣血收切。痲落癰明爲順。○痲未易落。寒戰咬牙。識語狂煩。疥癩作者爲逆。○痲落潮熱。唇紅口渴。不能食者爲微。四君子加黃連山查陳皮。不解大連翹湯加減。

論曰。保元湯。即東垣所製黃耆湯也。不越人參黃耆甘草性味甘溫。專補中氣。而能補火。故虛火非此不去。人參固內。黃耆固表。甘草解毒。借以治痲。令其內固外拔。扶陽助氣。使氣生血附。藉此裁領。有同生起死之功。或云氣血與毒同途。何專理氣而不理血。殊不知氣旺自能載領其血也。或曰。桂者辛物。痘出已熱。而更用之何也。蓋取其辛甘發散。助參耆之力。而成偉功也。今更採入痘科諸方。協助保元湯。以收圖治。是以升麻湯和解湯。四順清涼飲等。有開濟之功。故用於三日七日保元之前。解毒湯大連翹湯參蘇飲等。有平治之能。

醫通卷十一 魏氏通脈散三法論八 思得堂藏

故用於十四日前後。四君子湯生脈散。桔梗湯。參苓白朮散。四苓散等。故用於保元之間。有贊相之能。不拘日數。白螺散治痘之不收。全華散治痘後肥疳疥癩。生肌散治痘疳。不斂。以上諸方。不過翊運保元。以濟陰陽虧盈之變。治痘用藥之要。始出之前。宜開和解之門。既出之後。當塞走泄之路。痲落已後。清涼漸進。毒去已盡。補益宜疎。其他雖有奇方。不合中和之道。悉皆不錄。

翁仲仁痘疹論

大痘由中以達外用。藥因期而變通。以常言之。發熱三日而後見標。出齊二日而後起脹。蒸長三日而後灌膿。漿滿三日而後收靨。故發熱三日。當託裏解毒。使其易出。亦有氣弱而不能出者。當微補其氣。氣和則出快。切不可輕用黃耆。恐肢

理一。痲則痘難出也。四五六日起發之時。宜清熱解毒。清熱則無血熱枯燥之患。解毒則無壅滯黑陷之虞。七八九日灌膿之時。宜溫補氣血。氣血流行。而或聚自易也。十日至十一二日收靨之時。宜調和氣血。補脾利水。自然結靨矣。此特語其常也。蓋常者。可必而變。幻無期。當隨候參詳。見紅點之時。如痘輕少。不可過表。在後恐成斑爛。如乾紅紫色。急宜疎利。不然。在後必成黑陷。四五日之內。痘出足下爲齊。苟未盡出。於解毒中宜兼發散。若專於清涼。則痘反凝滯。不能起發也。七八日之間。毒未盡解。於溫補之中。宜兼解毒。若偏於溫燥。則毒反蘊蓄。不能化聚也。十一二日之間。藥未滿足。雖當大補氣血。然須兼解毒。不然。恐有癰毒痘疔之患也。夫痘瘡之發也。身熱和緩。達於外者必輕。閉亂煩躁。彰於外者必重。其顏色青潤澤而嫩。昏暗黃光而燥。枯淡紅而燥。黑滯黃鮮潔而嫩。嬌嫩黃圓淨而燥。黃碎黃高聳而燥。平塌其皮膏貴堅實而嫩。薄黃貴勻淨而燥。元雜其根。稟貴收緊而嫩。散潤痘根陰陽見點最忌浮腫。出要參差。血宜歸附耳。後頭項心胸少於他處爲吉。眉發兩額額前先後潤而不滯爲佳。夫色之紅者。毒始出也。白者。毒未解也。黃者。毒將解也。乾黃者。毒盡解也。灰白者。血衰而氣滯也。焦黃者。毒將解而血枯也。黑者。毒滯而血乾也。如紅變白。白變黃者吉。紅變紫。紫變黑者。死之兆也。

醫通卷十二 翁仲仁痘疹論 九 思得堂藏

痘疹提機論

張安世曰。醫學貴乎專精。崇古分科習業。各擅所長。庶幾奪權造化。痘疹一門。爲嬰孺始基第一關隘。予嘗歷攷錢陳朱

魏諸家之論各執一端。緣其立言之後有就證而論者。有究本而論者。有因時而論者。觀費氏大運論云。皆指痘證有獨取於辛熱。有得意於寒涼。有扼要於保元。是皆治痘名家。何不見有逐年先後之別。要知天運使然。非三者之偏倚也。而費氏明指文中仲陽桂岩三子而言。獨不及濟川者。以濟川實得一本萬殊之妙。兼該三子之長。其論可法後學。可宗。有言於神宗。丁巳至癸亥。尚多氣虛。由甲子而血熱者漸多矣。其毒亦漸深矣。向補宜從重者變而宜輕。宜從輕者變而宜重。逮及丁卯所宜重者。雖極清極解而亦弗靈矣。勢必蕩滌而元氣之勢始殺。然猶放標起服時之權宜也。至壬申後蕩滌之法。向施於成漿前者。竟有首尾而難免者矣。其黃氏痘疹或問亦云。予自萬曆辛巳始行其道。所歷之痘多屬

醫通卷十二

痘疹機論

十一

思得堂藏

虛寒至癸卯歲忽然氣候大變。自後當溫補者。十無一二。虛中挾火挾發者。十常八九。痘色亦常變異。良由運氣使然。握司命之機者。可不達權通變而固守成則歟。於是會恭諸家宗旨。綜其大端。不出血熱毒盛。毒盛氣虛。氣虛不振之三綱。順險逆之三要。順則無庸治。逆則治何益。惟險者在急治而尚變通。其機不暇少緩。不可泥於首尾而拘於繩墨也。至於病有寒熱。證有真假。毒有淺深。藥有輕重。治有緩急。時有寒暑。人有貴賤。果有強弱。安可槩論。若夫膏粱之治。與貧賤之治。迥乎不侔。夫膏粱之家。素嗜肥甘。肌體柔脆。譬之陰地草木。未經風日。氣血勝於一。有微病。即日歷數醫。雖具法服。亦難獨出。已見稍用一有關之品。即眾口誹謗。功未見而咎有歸。此亦世道使然。無足憾也。而貧賤之家。日甘粗糲。風霜

切體縱有疾苦。力能勝受。即或從事醫藥。則專任於一。雖證劇可危。尚堪重劑推挽。功成反掌。第貧家之痘。一涉危疑。醫者往往忍略而委之不救。棄以待斃。因得土氣滋化而復蘇者。亦恒有之。達權之士。務在見機於始萌之際。變通於未發之先。如毒因表邪而發者。疎解之。由裏邪而發者。宣揚之。熱劇者。涼潤之。毒劇者。開洩之。挾驚者。清理之。挾痰者。驅導之。虛者益之。實者損之。寒者溫之。熱者清之。此救者通治痘之大概。必須明燭其機。而教與之慎。毋疑似而混用。升發標證一退。其痘自起。蓋治痢必求其本。審係血熱而用涼解。即是升發。審係氣虛而用補托。即是升發。以故新甫有見點忌升麻之說。丹溪復有一見紅點便忌葛根之說。夫今之以痘疹名世者。或稱家秘。或尚師傳。下手不辨氣血之虛實。熱毒之

醫通卷十二

痘疹機論

十一

思得堂藏

淺深。察賦之強弱。兼證之有無。槩以通套升發為務。直待點齊而驗以凶吉。不知延過三日。則毒已歸經。加之兼證交攻。種種變端。莫不由此。此皆識見未真。習俗之謬耳。費子所謂識見不真。先迷向往之路。勝力不雄。同歸廢弛之地。理障未捐。難神變化之用。是必膽與識俱。心隨理運者而後可以語此。昔有痘雖初放。功不在於升發。時雖起脹。寧有事乎清涼。寓補於瀉。何嫌實漿而解利。用散為收。何病結痂而疏發。至若臨證之機。必細察其形。熟驗其色。後於神情而釋之。兼內證以參之。庶乎似虛寒而反實。熱似有餘而反不足。似平易而實危殆。似必斃而實可生。瞭然於心目。聞其有素稟氣虛而證見血熱者。皆於發熱之初。乘毒未歸經。元氣猶堪。宜先其標。峻投涼血以化熱毒。後固其本。任用溫養以助成漿。

設先不為清理至四五日間欲行涼解則痘必難起蓋欲行補托又礙熱毒未清至此攻補兩難而致夭枉者比比且有悶痘一證方書但言白陷紫陷緊陷從無辨救之法因思悶者痘緣毒邪壅蔽而不發其證最急是為逆中之逆雖有神丹莫可救也然有似因而非因即弱陷而緩者是為險中之逆此閉證也世多倒之謂痘毒而不救可樂委之於數乎若能明究其故而開其閉庶可轉危就安猶之雞鳴度關此關一過前途別有料理但閉證之由種種有因火毒熾盛而閉者有因痰垢壅塞而閉者有因蟲蠱內攻而閉者有因挾食挾血而閉者有因真元虧極而閉者畧舉一二言之如一發熱即報點如丹身熱如烙漸乾焦紫黑煩躁悶亂唇焦口臭或唇口腫滿是屬火也雖冬月亦須大劑白虎化斑湯

醫通卷十二

痘疹辨機

上

思得堂藏

石膏非數劑不應或發熱時便頭項不舉痰喘氣急或目閉神昏眩暈顛仆悶亂抽搐是屬痰也亟當猛進金匱大黃甘草湯使上吐下泄以救之或一發熱即煩悶嘔吐舌下常流清水或時沉默喜睡或時躁擾不寧或腹痛孤寒或煩煩叫喊厥其舌下筋青或下唇有黑白細點是屬蟲也宜先與椒梅丸誘入蟲口即以紫草承氣湯下之或初發時便壯熱神昏腹痛語舌刺如芒或氣粗便閉狂叫悶亂是屬食也急投大承氣湯及三承氣選用或因跌撲內傷瘀血阻滯識語神昏喘脹吐血者桃核承氣湯或有身無大熱見點細白如瘡氣怯無力目閉神色及唇反鮮澤嬌艷光彩倍常是氣虛無陽脾胃之精華洩散於外也然此亦不多見惟養養平脆者間或有之若非峻用人參二三兩生芪兩許佐以升

麻五味續續灌下烏能回元氣於無何有之鄉而振起之耶其證之屬實而閉者竭力圖之可全十之半屬虛而閉者則與秦越人起號太子不異可知造化樞機在掌握間豈可拘於尋常例治哉

辨證六則

初發悠悠身熱最宜氣息和平飲食甘而便溺如常手足溫而面容不改服之雖臥安寧便見證米之順四肢清而面色純白飲食少而精神倦怠此證當作虛看痘出決然不振再見便溺呢乳急當補氣為宜若還熱甚氣粗定須解毒何疑諸語狂言煩燥均為內熱喘滿氣粗便秘須知毒壅毒盛則頭面赤熱氣虛則手足寒清嘔吐為火氣上炎滑瀉為毒氣下迫腹脹口張喘急喘聲不絕嘔頻須防失血面青割眼握

醫通卷十二

辨證六則

上

思得堂藏

頭狂亂忽生吐乳發驚先兆是以熱盛者只宜清涼發散不可峻用苦寒發散則毒外出而熱自解苦寒則毒反伏而出愈難故發散之劑輕則升葛以疎其熱而煩躁壯實者非此何以定其標重則麻黃以開其壅而喘急脹滿者非此何以救其危未明先瀉有熱證莫作虛看已泄而渴無熱證便從虛治止熱泄以清涼重加發散治虛瀉以溫補仍用開提內虛誤用寒涼助其作瀉實熱妄投補劑轉增煩劇安靜能食勿謂便實可下油瀉煩渴休言熱證宜涼氣弱而少食者不任其毒神強而能食者不失其常

初紅點似丹朱不久定成毒勢粗肥便頂點子不紅終白陷頭尖皮薄紫黃故起定空瘡白嫩則皮薄瘡紅黃瘦則痘成褐色石人者黑皮粗瘡色必然慘暗嬰兒肌肉不同未可一例而斷只宜緩凸有神不喜嬌紅平塌色澤神安見點如珠如粟毛焦皮燥數者或紫或焦帶熱出來最惡密似頭頭縱然積出尤忌形如蠶種如髮如疹如疥如根窠不立脚地俱無犯此數端總皆不救夾斑如同咬咬最為惡烈乃或螺蛳雲電差為可治未熟先敷數點俗名痘痘若還熱久不敷便作疔看先發塊而後發瘡塊為風毒所發先發瘡而後發塊塊名鬼腫難醫避痘避於隱僻眼胞唇內多凶痘痘悶於要處喉舌胸背皆危順不憎多通緣一點冷疔先見諸瘡何敢彰形賊痘若生諸痘焉能灌汁辨認若真急須挑破表證未平痘雖出而毒猶在表解毒為務便調人靜身雖熱而毒已透表安表為先設使內外證平此際不須過治再看精神勇怯審詳表裏如何

三四日痘出當齊點至足心勢方安定猶是陸續不齊尚隱皮膚之內若非風寒速退定屬氣虛不救是以四日已前痘毒方出身表宜涼四日已後毒出已定身表宜溫涼則氣血和平痘色必然潤澤溫則腠理開通其勢易以成漿故至此而身不微熱色不鮮澤雖不至於冰伏並恐斷乎不長五六日來血包已成候當肥大而粗頂宜發光而白故根紅而頂白者已具行漿之勢若還赤色過頭雖見嬌紅可愛綿延六日依然到頭空殼虛花皮薄而光亮如燈內含似水頂尖而根脚不紅行漿不實熱毒盛而未解則為紫為黑壅而不

起則為陷為塌滯而不榮則為乾枯為青灰怯而不振則為不快為得漿或有肉先腫而痘反不起者漿則滯而不行面已浮而痘反退伏者毒則壅而不通故身不熱而痘不起已成冰硬之形赤色者還不變溫之可與氣血弱而瘡不振遂成不快之狀紅潤依然如舊補之可生紫色乾枯切忌溫中滯補祇宜活血鬆肌毒勢壅滯烈藥雖然可發透肌尤是良方滯泄惟於溫補潤甚佐以升提

六日七日之期氣血敷化之際順候漿行半足虛瘡纔發微光毒重而壅遏者頂滯乾紅氣盛而嫩發者飽滿光澤頭面行漿而四肢未起切莫慌張腿膝發泡而臉頸焦枯且休軟甚既以懼其發者且又慮其喘急飲食不多恐致藏虛而內陷水漿頻進須防泄瀉而變危熱盛煩渴到此休為實論再

加清泄此時只作虛看黑紫乾枯急須攻發其熱氣虛塌陷便當溫補其虛發增恐其失聲喘急恐其腹脹瘡或白而少神根雖紅而難治尖不起而離根脚雖赤而無濟色淡白而塌滿此內必無漿汁皮薄澤而嬌紅有漿亦是清稀犯此四端總屬氣虛八九日間必然發癢若還壯熱燥入不寢定行乾燥紫色乾枯不須著眼中疑血逆或可伴成漿既行而半足時則未當收斂忽爾一齊紫黑倒屬莫認結痂若還攻發得丘傍生血點再行漿如見氣急腹脹不久失音死在通痘出八九日來已乾紅痂死被如或少生不順至此方得灌漿若遇身重發熱停漿不易結痂此則陽亢陰虛應以清涼收斂漿足氣足恐因痰湧而然忽爾發驚母乃二便秘結再見氣虛塌陷必然倒屬黑焦一則溫補可與一則攻發可

活泄瀉安寧。大虛少毒。脾寒則下白膿。藏毒必然便血。喉
聲。難行飽滿亦無妨。場瘡咬牙。便實聲清猶可活。歷來和
硬。變證終無死脫如。須悉餘毒。蒸發或致太過。則潰爛難
收。身熱若見燎入。則燎漿發泡。空遺痘殼不成。和。祇為漿清
熱重。腹脹喘呼而喘。皆因毒入內攻。出來不灌黃漿。和。死
猶如血赤。若曾解毒於先。此證斷之極美。胃氣絕則唇口腫
硬。肝熱盛則目睛吊白。喘急發於瀉後。總屬氣虛。便瀉繼以
煩渴。諒非實熱。泄瀉而煩渴不止。理必升提。好飲而發渴愈
甚。勢難救挽。氣虛寒戰。痘瘡無恙。即溫經漿足難收。便實熱
蒸須解利。進清涼以助結源。此補法而防過益。
痘成而花八九功成。餘毒變遷。終非吉兆。是故眼合腹脹。獨
陷危機。虛浮不退。尚難凶告。和。雖成而反致失聲。獨為黑脈。

醫通卷十二 辨證六則 十六 思得堂藏

腫未退而眼已先開。恐毒內攻。陽氣極而狂叫喘呼。腸胃傷
而便溺膿血。熱毒遏遏不化。結毒而壯熱憎寒。經絡餘毒未
盡。日晡則往來寒熱。發在午前為實證。煩渴腮紅。申後方熱
是陰虛。便溺形瘦。他如遺精弄舌。心經畜熱無疑。煩肚挫胸
肺胃毒中有準。身熱便秘。恐成暴急驚風。潮熱便清。防變慢
脾風搐。驗失明於眼合。蓋明辨口疳於唇焦。眼黑實熱結於
大腸。必然便秘。虛寒客於胃府。乃成泄瀉。喘渴須分虛實。泄
瀉當辨寒熱。欲觀邪陷之餘。再審癰痕之色。桃紅光澤。營衛
俱安。灰紫乾焦。尚留風熱。粉白為氣血之虛。皮枯為脾胃之
疾。遍體赤斑。乃是失於解利。渾身青紫。恐為風寒所客。餘毒
未清。不特為痘為癰。見風太早。須防發瘡發癰。匪入切勿誤
傳。此本先賢真訣。

表裏虛實論

凡痘灰白不紅。發不起。發出不快。昏暗頂陷。皆表寒而虛。二
便清。身涼。手足口氣俱冷。不渴少食。唇白涕清。飲食不化。皆
裏虛而寒。此表裏虛寒之證。急宜溫脾胃。補氣血。當用參耆
歸朮木香肉桂等藥。以助灌膿收靨。夫表虛者。以補氣為主。
補血次之。裏虛者。於補血之中。須兼補氣。使胃氣條暢。脾氣
壯實。在後必無陷伏之憂。苟能補氣。則血亦週流。送毒出盡。
不致凝滯。在後必無癰塌之患。凡紅紫乾滯。黑陷焦枯者。皆
表熱而實。大便秘結。小便赤澀。身熱鼻乾。唇燥煩渴者。皆裏
熱而實。此表裏實熱之證。急宜涼血解毒。當用紫草紅花連
翹鼠粘木通蟬蛻荊芥。甚則李連之類。如表熱者。則宜清涼
解表而分利次之。裏熱者。重於解毒而兼清涼。如在二三日

醫通卷十二 表裏虛實論 十七 思得堂藏

氣血虛實論

夫氣有生血之功。血無益氣之理。故氣不可虧。虧則陽位不
及。而痘之圓暈之形不成。血不可盈。盈則陰乘陽位。而痘之
倒靨之禍立至。是以治虛證。必當補氣。為先。蓋氣有神而無
形。補之則易充。血有形而無神。補之難收速効。況氣陽而血
陰。陰從陽。血從氣。理也。故神氣不補。血使氣盛而充。血亦隨
之而盛矣。何謂氣血虛實。且如氣過熱。則泡血過熱。則斑。氣
不及。則頂陷不起。血不及。則漿毒不附。凡痘色淡白。頂不堅

實不礙手不起脹皆屬氣虛宜保元湯倍黃耆加肉桂丁香人乳與酒釀同服根寒不紅不緊束或紅而散瀉以手摸過即轉白毫毛豎起枯槁不活者皆血虛也保元湯加芎歸紅花及山查以行參香之滯木香以散滯氣而血自活也凡用黃耆當在瀉出盡之後凡用熱藥當看毒盡解之時更察氣血之虛實偏勝而治之則藥無不効矣凡補血首尾用地黃防滯血必用量製用芍藥恐酸寒伐胃必用酒炒以抑其瀉下之性借酒力而行之達表也

虛證防變論

初發身熱悠悠乍熱乍涼肌鬆神倦面青皖白飲食減少手足時冷時熱嘔吐便瀉痘點方見隱隱不顯淡紅皮薄三四日陸續不齊不易長發五六日不易成漿少食氣陰陽食易

醫通卷十二

虛證防變論

六

思得堂藏

池七八日塌陷灰白不起自汗微渴或腹脹喘渴泄瀉塌癢悶亂咬牙寒戰頭溫足冷勢所必致皆緣氣虛之故故治虛症初發不宜輕投透表之劑即參蘇飲人參敗毒散等亦不宜用况升麻湯等純行升發之藥乎至於黃連紫草皆為切禁惟宜保元湯為主若氣粗皮燥無潤色者亦當忌之以四君子少加桔梗川芎補益之中畧佐升提之法俟點子出齊重用參耆峻補其氣助其成漿至八九日間無他凶證十全大補湯倍桂塌陷灰白腹脹泄瀉木香散塌癢悶亂腹脹渴渴喘嗽頭溫足冷寒戰咬牙者急進異功散遲則不救

虛證變實論

氣虛痘疹調理得宜使元氣充實膜理堅固脾胃強健二便調適仍可轉禍為祥若補益太過藥足之後重用參耆多有

腹脹喘急之患用枳殼湯誤用五苓木香散多有大便秘結之患用寬中散便實而渴用麥門冬湯過用丁桂辛熱之劑則有咽喉腫痛煩躁開渴之患用潤燥湯蓋喘急腹脹大便秘堅煩渴咽痛皆類實證然而氣虛變實非真實也是病淺而用藥過深之失也只宜斟酌不宜疏通若誤行疏利則方生之氣復虛而脫證將至矣

虛證似實論

氣虛痘疹或為飲食生冷調理失宜致傷脾胃遂成泄瀉津液下陷虛火上盛必發而為瀉元氣下陷虛陽上壅下氣不續必發而為喘夫瀉與喘實證也起於泄瀉之後斯為津液暴亡而渴陰氣暴逆而喘故治瀉則宜錢氏白朮散瀉瀉不止則用錢氏異功散治喘則宜獨參湯不應亦用錢氏異功

醫通卷十二

虛證似實論

十九

思得堂藏

散大便實者少與生脈散調之喘渴而泄陳氏木香散異功散選用若至悶亂腹脹毒氣內攻眼合自語者此名失志庸醫不察謬認為實而與耗氣之劑速其斃也安有實熱而渴氣推而喘生於泄瀉之後哉

實證似虛論

身發壯熱毛直皮燥睡卧不寧腮紅睛赤煩渴腹脹便秘喘急皆實熱證而復見嘔吐者此熱毒在內不得伸越或為寒冷所搏乳食不節冷熱相拒則上逆而為嘔吐病機所謂諸逆衝上皆屬於火者是也治當升提發散兼辛以散之如升麻湯加生薑橘皮之類吐逆勢甚者更加縮苓澤瀉引之下行可也又有泄瀉兼見似乎虛證然因熱毒鬱盛熏炙脾胃不得外達則毒從下陷尋竅而出亦當升提發散熱毒外解

內泄自止。有食則兼消導。如枳殼、山楂之類。又復有「不思飲食」似乎內虛。不知鬱熱在內。不得伸越。二便秘結。勝理阻塞。熱毒壅遏。腹脹滿急。不思飲食。必然之勢。亦當升提發散。引毒達表。有熱則兼清熱。如山梔、黃連之類。則熱氣有所升越。而藏府和平。飲食自進矣。若誤用「丁桂」半夏等熱藥於嘔吐泄瀉之證。用參耆白朮等補藥於腹脹不思飲食之證。立能殺人。他如龍骨、豆蔻、麝香、砂。皆熱瀉之戈戟也。

熱證變虛論

血熱痘疹。只宜清涼發散。不宜峻用苦寒。過投芩連之屬。必致內傷脾胃。外閉肌肉。脾胃傷。則飲食減。而泄瀉重。則洞泄無度。遂致虛寒。肌肉閉。則熱蒸之氣不行。勝理滿滯。則痘不起發。不行漿。遂成伏陷。此熱證變虛之驗。虛證既形。便從虛治。不可膠執而畏參耆丁桂也。六七日後見之。則水香異功。皆可應用。但中病即止。不可過劑。以招竭澤之禍也。

毒盛變虛論

毒盛壅遏。固宜升提發散。而佐以清涼。使熱毒得平而止。若發散太過。必致肌表空虛。元氣耗散。內泄清漿。或虛腫空殼。或癢塌外斜。或潰爛不收。百變皆至。而內氣亦不能自守。若傷飲食。則成泄瀉。泄瀉不止。遂變虛寒。而氣脫煩渴悶亂。寒戰咬牙。無所不至矣。夫始出之時。雖為血熱壅遏。至三四日後。身反不熱。痘站不長。焉得不進溫補之劑。如觀桂、川芎、乾薑之類。使內氣一煖。則外氣自和。泄瀉之後。其內必虛。雖有腹脹煩渴喘急。焉得復為實熱。不過內虛伏陷。毒氣內攻。而然。故實熱之證。七八九日曾經泄瀉。皆從虛治。有木香異功。

證。便進木香異功。如無水硬之證。非泄瀉之後。切勿誤投溫劑。蓋塌陷倒靨乾枯。而無水硬泄瀉之患者。多因熱毒內攻。而然。又當用百祥丸、豬尾膏等方治之。誤投溫熱。虛弱不能復圖也。

氣虛血熱毒盛三法治例

凡氣虛之證。初發身熱。手足厥冷。乍涼乍熱。精神倦怠。肌肉脫白。飲食減少。睡臥不安。清便自調。此皆虛證無疑。未見點前。用保元湯加紫蘇、防風、白芷以發散之。見點後。以保元湯加川芎、桔梗以開提之。見點四五日後。仍用保元湯。隨證加減。處治。七八日漿足之後。宜四君子加歸、芍、山藥以調養之。大便實者。加熟地以兼補其陰。若證見虛寒。不妨加肉桂、倍參耆以溫補之。如見塌陷黑靨。多用陳氏木香異功收功。

通卷十二

三法治例

思得堂藏

凡血熱之證。初發壯熱。腮紅臉赤。毛焦色枯。煩躁渴飲。飲水日夜啼哭。睡臥不寧。好睡冷處。小便赤澀。此皆熱證無疑。未出之前。升麻湯加生地、芍、歸、紅、花、鼠粘、連翹。以涼血解毒。見點三四日後。熱證漸平。將欲灌漿。紫草木通湯加生地、川芎、桔梗、紅、花、山查之類。八九日漿足之後。亦宜四君子加養血藥調理之。若七八日根脚紅暈不化。或紫黑乾枯。及青灰乾黑陷者。皆由血熱之故。急宜清熱涼血為生。切勿誤用補氣之藥。則營血愈虛。愈熱矣。惟泄瀉之後。變黑陷乾紅者。則從小劑木香異功治之。凡熱毒壅遏之證。初發身熱而赤。氣粗喘滿。腹脹煩躁。譫語狂言。睡中驚妄。二便秘澀。面浮眼脹。多啼多怒。此皆熱甚無疑。未見標時。先須升麻湯一服。隨加羌防、荆芥、川芎、連翹、紫草、白芷、桔梗、鼠粘子。以清熱透表。至

見點三日之內。諸證向寧。勢將行漿。紫草木通湯加川芎桔梗山查蟬蛻鼠粘子之類。漿足之後。亦宜四君子加養血藥調理之。若六七日外。根巢連肉通紅。或紫黑乾枯及青灰乾白陷者。此皆氣虛血燥。毒邪壅盛之故。急宜涼血解毒。兼調中氣為主。切不可輕用溫補。惟會泄瀉。內氣暴虛而陷。則當小劑木香異功救之。

汗下論

錢氏論痘瘡。發散利下皆不可妄。又曰。非微汗則表不解。非微下則裏不解。言表熱方熾。痘點未見之光。或外感寒邪。約束腠理。痘因出不快。此當微汗之。令陰陽和。營衛通。俾痘易出。而毒易解。若原無閉塞不快而妄汗之。則成表虛癰爛斑爛之患也。如痘出時。煩熱譫語喘脹便秘。此毒蓄於腸胃之證。通卷十二。汗下論。所忌者重論。思得堂藏。若原無裏實壅熱而妄下之。則元氣下陷。致變灰白虛脫之證矣。張涵高曰。余治血熱毒壅便秘之證。每用涼膈散下之。百不失一。

所感輕重論

或問時氣之盛衰。而痘出之輕重者何也。蓋痘之出。必假天行時氣而發。天時疫氣有盛而有衰。人之生稟有強而有弱。疫氣盛行。雖輕亦能變重。稟弱者當之。必致於危。屬氣已衰。雖重亦能變輕。稟強者當之。益見其輕。故貧賤家兒多歷辛苦風寒。更無厚味傷脾。即有重證。亦能抵當。富貴家兒。煖衣厚味。少見風日。脾胃脆弱。不經勞苦。凡遇小疾。亦為大病。譬之陰地草木。豈能禦冰霜烈日乎。臨證之際。可不辨人之強

弱貴賤。熱時氣之盛衰。而為施治哉。

死而復蘇論

痘有死而復生者。非氣血相離也。乃毒火熾熾。氣血壅遏不行。故肢體俱冷而氣絕。本不終絕。雖絕必通。毒火有時而少。解則正氣漸復而蘇。嘗見痘兒氣絕。轉臥於地。良久復生者。得土氣以化毒熱。而正氣復矣。然雖氣絕而死。其心胸必溫。暖若胸冷氣絕復生者。未之有也。

原委

嘗讀黃扁鵲仲景書。從無痘瘡一證相傳。謂是伏波定交趾歸。中原始有此患。則知皆是炎方火毒。蒸發先天淫火毒邪而成。蓋得於有生之先。發於既生之後。或感風寒驚食。或當歲氣併臨。則蘊發為痘。今之所見者。不問何藏所生。但發

熱之後。一二日間。紅點成水泡。水泡成膿泡。膿泡後結痂脫

腐。總謂之痘。此則胎毒也。其或隱現於肌肉。不膿不痂謂之

癰疹。一見紅色。而後沒復現者。謂之瘡疹。此入謂之瘡疹。還

身紅斑如錦紋雲霞者。謂之瘡疹。失人謂之瘡疹。越人謂之瘡疹。其或

初發紅點。有似痘瘡。不三日而灌漿紅潤。見漿即焦者。謂之

水痘。南人謂赤痘。已上諸證。乃脾肺畜熱。或外感風熱。或傷寒發斑之候。不可盡歸胎毒。方書所謂痘毒之發。傳於心為

斑。傳於肝為水痘。傳於肺為瘡疹。傳於脾為痘。其沿街巷一

發熱

漿山痘者。此則胎氣併臨。疫癘傳染。豈可巢為胎毒哉。痘瘡將出。必先發熱。然其熱有風痰食驚變蒸之異。及時氣傳染。俱能出痘。疑似之間。即當審其所觸。隨證清理。以觀其

勢更察其耳冷尻冷足冷。中指稍冷耳後紅絲赤縷現呵欠噴嚏六脈洪數身微瀰瀰顫動白睛微紅目光如水額間有花紋見者乃為真候如溫溫微熱乍涼乍熱咳嗽嘔欠呵頓悶而微紅者此必痘稀毒少身涼後出尤輕也其或發壯熱如火熏灸頭面俱赤悶亂昏眩狂躁不定一熱便見紅點此必稠密毒盛投藥胡飲甚則涼膈散下奪之發熱時肢體骨節俱痛者六淫之邪也宜表散兼透毒之劑發熱時遍身作癢此表虛客冒風寒毒不能出故癢桂枝湯加黃耆防風白芷蟬蛻發熱時惡寒身振振動此氣血弱不能遏邪快出邪正交爭故振升麻湯加入參穿山甲桂枝防風發熱時腹痛攻攪躁渴此毒勢壅遏熱氣內蒸急以蜜調元明粉四五錢不下再服甚則涼膈散大便一利其痛即減看亦

醫通卷十二

發熱

思得堂藏

隨發勿泥首尾不可下也若虛寒厥弱而腹痛者小建中加升麻若腰脇痛者此毒在肝腎最為惡候急以石膏六七錢人參一錢茶一撮煎好入元明粉三五錢加生白蜜熱服或可十全一二若唇日上下紫黑燥裂疼痛者此毒攻脾藏難治急投犀角消毒飲加石膏黑參以救之發熱時或吐或瀉此毒邪奔越精神不減者為吉兆毒氣上下分泄也若見點後猶吐瀉不止四苓散加枳椇山查虛者錢氏異功散加香木通發熱時如驚者為熱乘心包亦是吉兆導赤散加蟬蛻紫草形質便秘者瀉青丸微下之如見點後驚搐不止者危發熱時咬牙鼠視此心經熱甚也導赤散加黃連赤芍若咬牙悶脊為肝經風熱羌活湯加青皮柴胡發熱時聲音遂變者宜清肺氣消毒飲加連翹枯梗面赤加紫草發熱及見

點時兩目紅腫者風熱上攻也導赤散加荆防蟬蛻若熱至五六月或腹脹喘急便秘狂煩痘不見點而熱甚於背者風寒留滯於經羌活湯不應加麻黃熱甚於腹者實熱亢盛於裏大承氣湯其或譫語循衣昏睡不省者皆毒氣內攻導赤散加連翹犀角使小便流利神爽發出為吉若大便四五日不通而譫語者紫草承氣湯下之昏迷果次譫語不休者不治發熱二三日痘隱隱不透壯熱譫語喘脹便秘者夾食感寒而發先以升麻湯加麻黃汗之次以大柴胡利之發熱時小便黃赤短滴者熱毒不透滲入膀胱也導赤散加荆芥連翹鼠粘子自汗者邪從汗散也不須更與升發之劑衄血者邪從衄解也衄久不止犀角地黃湯去丹皮加木通荆芥穗發熱時遍身皆熱手足獨冷者此脾胃虛弱急宜補中益氣

醫通卷十二

發熱

宜

思得堂藏

溫三四服仍厥冷者難治發熱時以火照之若皮肉裏有鮮紅成片者凶也若遍身如蚊迹發斑者不治發熱時壯熱譫語喘脹搖擲尋視腰背有一二點如蚊迹者悶痘也不治發熱時腰膝如折不能坐立者折腰症也四五日當口鼻出血而死痘出三四日身猶有熱者尚欲發痘也出盡則熱自止若五六日後痘出盡復熱者必有餘毒未盡當輕劑以解其毒不可驟遇至八九日復發熱者名曰前藥將欲收關結毒故耳凡痘疹發熱不可誤認外感過投解散之劑則表之陽虛不惟不能長發且有癰塌之患亦不可誤認內傷過投消導則裏之陰虧不惟不能灌漿倒陷之禍立至矣

見點

痘家以看法為要初見點時用紙擦蘸清油點照遍觀其色

熟視其形須以火在內而外平則陽於肌肉間者悉皆顯現以手指摩面頰如紅色隨手轉白白隨轉紅謂之血活生意在矣如指之不自舉之不紅是為血枯縱疎難治又看目睛光形雖然口唇尖上紅活如常無燥白紫滯之色乃為吉兆又須知燈火之下紅紙窗之下白不可不審。先嘗看痘有四曰根曰裏曰脾曰地根欲其活裏欲其起脾欲其固地欲其寬四者俱順雖無慮近世有法但言盤頂蓋盤即根也頂即裏也所謂脾地則本乎根裏之同此痘點之稀密也凡見頂起盤深紅暈透在肉裏方是正痘若無盤頂紅色浮在皮膚即是水痘非正痘也否則必是氣虛毒盛之故始雖長發後必變清腫期十朝十一朝必變壞而死者根脾兩敗不成紅暈後必難於收斂十二三朝必有變也蓋痘疹須

加紫花地丁以解其毒其後痛不止者隔蒜灸之若無根葉色紫黑疔多小弱者不治若頭面一片光潤如脂脂塗抹隱隱於皮膚中者是血毒不流氣凝不通為癰疽不得通貫也先以升均湯大吐其痰次以犀角地黃湯去丹皮加木通紫草連翹連翹但兩顆質碎成粉紅暈不分點粒者急投羚羊解毒湯以分之若雖分根裏身熱枯紫者後必發躁導赤散以利小便更用涼血解毒藥入燒人矢一錢遲則變黑而危矣若身不熱只乾焦者熱也導赤散若雖紅活太覺嬌嫩此元氣不實毒入氣分保元湯加連翹忍冬若色淡皮寬者此元氣至虛參耆肉桂散若雖高起色紅但乾燥口渴此火盛血少四物湯換生地加刺芥紫草連翹木通最忌參朮若帶淫淫氣者此脾胃氣弱四君子加耆朮防川芎切戒黃耆若色雖光潤捺之即破此氣不足大劑參耆肉桂散或保元湯若色如麩殼無水氣者此氣血俱虛急用十全大補加燒人矢治之能變紅潤含赤者可治否則危矣已上俱有癰瘍之變均險證也若遍身有細如芥子者次疹也有皮肉鮮紅成片者次斑也皆毒火太盛故一齊湧出並宜化斑湯發之熱劇勢甚加石膏若初見點發於皮中不現不起者非風寒壅遏必氣虛不振風寒壅遏必煩燥色暗羌活湯如升葛氣虛不振必氣微色淡保元湯加黃桂有痘出身涼而口燥渴者此熱毒內盛其痘必密而重急宜內解熱毒禁服用升麻痘初出而肢體作癢爬搔不寧者此風寒滯於皮膚也解毒飲子加穿山甲痘出隱隱不起而發狂便溺瀉者此毒火鬱結於陽明也涼膈散下之痘本磊落而變乾焦紫黑

厥冷厥伏者。此必飲食所傷。不能運化。致氣血凝滯。故形如死狀。但按其胸腹必熱。枳實梔子瀉湯加大黃。痘出將半。遍身作痛者。此熱毒鬱滯而未盡外出也。荆防解毒飲亦有六淫所滯而作痛者。審時令寒。略而調之。痘出壯熱煩渴。痰喘便秘者。肺胃二經實熱壅遏也。涼膈散加前胡枳殼。痘未出齊而煩躁壯熱色赤。用涼劑轉躁熱者。此毒得寒而凝滯也。仍用前藥稍加辛溫之味。以開發之。凡痘出未盡。毒猶在內。慎不可與大寒大熱之劑。寒則凝滯其毒。熱則轉助其火。惟宜平和疎透之品。隨表裏虛實寒熱調之。痘未出齊而刺下赤白。此血熱毒盛。兼有積滯也。黃芩湯去棗加枳殼。防風若痘隱不現。形色淡白者。非保元湯加桂附不救。痘出而手足搖動者。由脈不能約束其毒。熱甚生風之象也。荆防解毒

醫通卷十二

痘疹

思得堂藏

飲加全蠍。痘出未齊。而頭面浮腫者。風熱上攻也。解毒飲子。痘出而兩目赤腫。色見乾紅。大小便秘。睡臥不寧者。此血熱毒盛不解。上攻於目也。犀角地黃湯去丹皮。加連翹黑參牛旁刺芥。有未見點時。身熱和緩。見點後。身反大熱。不休煩躁。昏沉便秘。或吐瀉者。逆證也。痘報形起脹時身熱。四肢冷者。後天脾胃衰弱也。睡臥不伸者。先天腎氣本虧也。俱不可治。有初出便見水泡。二三日即頭顱白漿。不久即乾。此火毒盛劇不治。若叢雜細密如蠶種。平塌如胖蠶。如冷粥結面。或大者平塌。小者稠密皮薄而軟。邪視若無。皮肉眼胞面唇先腫。則五七日出血而危。若皮膚如寒風粟起如疹。如瘡。或隱或現。此不待長發。當啼叫而危。若正而胸背手足腫硬。或成塊。青紫。或紫如瘤狀。當黑陷破爛而危。若紅紫黑斑。如蠶蟻蚊

迹。酒朱點黑。癰青。與皮膚一平。頭面一片如胭脂者。三五朝即危矣。

部位

痘疹見點之時。先察部位。即可知吉凶輕重矣。痘為陽。故隨陽而先見於面。凡口鼻兩傍。人中上下。腮耳年壽之間。出見者吉。若見於天庭司空印堂方廣太陽等處。俱非佳兆。大抵見點於眉已下。順已上。正中陽明部分皆吉。若見點於眉心。上至髮際太陽部分多凶。其見點於腮頰耳傍少陽部分俱險。朱濟川曰。余初業時。亦據前論。每每不應。究心三十餘年。從正額間兩額先見者多。順人中口鼻先見者多。險。或口唇目胞預為浮腫者。此脾胃受毒尤險。太陽頰頰腮耳先見者多。逆。其不能先見於上。而反於下部見者。亦元氣之不振耳。

醫通卷十二

痘疹

思得堂藏

其起漿收靨亦同。凡初見點於正面吉部。相去一二寸一顆。尖細淡淡桃紅色者。必稀而輕也。若初見點於正面凶部。二三相並。五六成叢。或赤或白。頂平而少神者。必密而重也。張潔古云。一發稠密如銀頭者。形勢重也。輕則表而涼其內。連翹升麻湯。然稠密之處。各有經絡部分所屬。額主心。面主胃。腹與四肢主脾。脇主肝。兩腋主肺。腰足主腎。肩背主膀胱。當隨見證治之。若面色黃。大便黑。煩躁喘渴。或腹脹者。瘀血在內也。犀角地黃湯。或磨生犀汁。但根葉分明肥滿者。無妨。其頭面最要稀少。勾閉。紅澤。肢體雖密。治之可生。若頭面稠密平塌。肢體雖稀。未可輕議其吉。故頭額多者為家頭。頸項多者為鎖項。目前多者為胸前。兩頰兩順多者致成片。或如塗朱。則肝盛剋脾。八九日當作瀉不食。而為險候。惟四肢雖

多不妨。痘出稠密。雖為險候。若面痘易起。易灌。目封能食者。可治。若身痘難好。面痘漿清平塌者。難治。若諸處痘不起。惟面部及臂上痘。有漿起綻者。可治。有面痘好。惟鼻上無痘。或有痘不起。綻行漿者。皆不治。四肢有痘。身面無者。難治。一身有痘。漿足。惟面上不行漿者。死。一身痘色紅活。惟面部焦枯者。死。通身痘好。惟兩足膝下全無者。凶。冬寒不出。胡荽酒熱洗多次。內服溫解透肌之藥。加木瓜。以引之。延至五日。治無及矣。若面部漿足收靨。肢體尚不行漿。神清能食。可治。有面上左有右無。右有左無。此氣血乖離。必難漿綻。多不可治。痘出而面半已下稠密灰白。面半已上勻朗紅潤者。補中益氣湯。若面半已上稠密灰白。面半已下勻朗紅潤者。補名雲掩天庭。不治。痘出左半身稠密紅潤。右半身間有數點。

者。此毒發於陽為順。補中益氣湯。若右半身稠密。灰滯平塌。左半身間有數點者。此毒發於陰為逆。漿難行。不能收斂。九日死。痘出齊而諸處俱勻朗紅潤。而膠固稠密灰滯作痛者。名纏腰。此毒滯於陰。不能成漿。九日死。遲則不遇十一朝也。痘出齊而通身稠密。頭面全無者。此陰毒不能升於陽位。不治。已上諸證。除不治外。俱要疏通營衛。健脾胃生津。使無乾枯焦黑之患。紫草消毒之味。似不可少。若熱甚者。苓連地骨皮。渴者花粉煨葛根。氣虛者。參耆木香。大便秘者。枳殼。小便利者。木通。食少者。山楂枳朮。瀉者。白芷蟬脫。脹者。木香厚朴。腹痛者。芍藥丁香。然亦看人之大小虛實。大而實者。猶或可治。小而虛者。多不可救。諺云。樹小花多難結果。小船重載定傾危。可為警喻者矣。

形色

形乃色之充。色乃血之華。氣旺則頂尖圓。血旺則根盤緊。形貴尖圓起發。瘡皮堅厚。若見平塌皮薄為凶。色貴光明潤澤。根窠紅活。若見慘淡皆黑為危。然形有起發而致變者。由色不明潤。根不紅活故耳。若痘色光澤。根窠紅活。雖塌可治。但以紅活為貴。而又有圈紅。與紅鋪紅之別。圈紅者。一線淡紅。緊附根下而不散。吉兆也。圈紅者。血雖似附。根脚隱隱出部。險兆也。鋪紅者。痘色與肉不分。平鋪散漫。凶兆也。根者血之。暈。膿者血之腐。故六日已前。專看根窠。六日以後。專看膿色。若無根窠。必不灌漿。若無膿色。必難收靨。此必然之勢也。然間有有色不明潤。而根脚好者。仍得收功。以根為痘之本也。若根脚不圓。顏色雖好。須防七朝有變。不可以色好而轉許無。

起服

事也。有初出色白不紅活。若尖圓易起。分顆潤澤者。此氣血未會。至三四日色轉紅活。不宜妄補。反生變端。若色白枯燥。稠密脚散。目微紅。唇腫燥。熱劇無神。二便秘澀。或作吐瀉。此火盛無血。多致內攻。死在五六月間矣。王肯堂曰。痘疹之中。惟黑者最難識。若初出時。隱隱有黑點見於頭面。自三四朝至六七朝。黑色如故。不見紅色。形如圓珠而有光澤。行漿充滿。漸漸黃赤者。名曰黑痘。今人皆以變黑歸腎者。指為腎經之痘。不知血熱毒盛之痘。初必乾紅。青紫。至六七日後倒靨變黑。與初出便見黑潤不同。與一熱腰下便見黑點如蚤咬者迥異。此腎氣充實之黑。豈可與尋常痘疹同例而論哉。

痘瘡既出之後。二三日間足心齊見。漸漸長發。肥潤光澤。面

目漸腫。灌漿爲吉。若三四日內隱於肌膚。不長發者。此元氣虛也。快斑湯透肌散催之。色不紅活。紫草快斑湯。若身面俱起。手足四肢不能長發者。桂枝湯加防風黃耆。若見吐瀉口渴。手足指清而不長發者。此內虛寒也。陳氏木香散。并雞冠血和酒釀灌之外。以胡荽酒微噴衣被。若四五日雖見長起。顏色淡白。頂者。此氣虛也。參耆內托散加糯米。雖不白亦不紅活。陷頂者。此血虛也。四物湯合保元。若色赤而兼癢者。血虛有熱也。四物湯換生地加犀角連翹。若氣虛有熱。保元湯加連翹木通桔梗忍冬。若痘頂色白。連肉紅腫。而痘反不腫。口燥唇焦者。九日死。應以化毒湯加生地川芎。調二寶散救之。若色紅根散不長發者。此血熱而氣不相依。大鼠粘子湯加紫草。若色雖紅而焦。口乾不起發。紫草飲加紅花酒。岑連翹芍藥。若大便秘結。內有實熱。不發者。消毒飲加犀角。或四聖散加枳殼黃芩山樾穿山甲。若大便利。口渴不發者。此內虛熱。七味白朮散。若自利不渴者。此內虛寒。理中湯加水香。若出遲而小便清滯。救有痰。生聖散。起遲而小便赤滯。四聖散去黃耆加連翹升麻。虛則紫草木通湯。若夏月暑氣熏灸。煩渴不發。四苓散加門冬竹葉。冬月冷氣所侵。寒涼不發者。陳氏木香散。寒顛渴瀉。飲沸湯。口不知熱。陳氏異功散。作渴。飲冰水。口不知寒。實則四順飲。虛則地黃丸。手足不冷。飲湯溫和者。錢氏異功散。若鼻塞聲重。咳嗽不發者。此風寒所侵。人參敗毒散加荆防。若血氣虛弱。偶爲外感。所觸伏陷。不發。內服參耆內托散。外燒胡荽乳香辟之。觸犯風寒邪氣。黑陷不起。奪命丹。至知長發之際。頭面多者。自然腫脹目閉。

然不要目胞充亮。若應腫閉不腫閉。此毒鬱於內。不得起越。惡川托裏快斑湯。腫者。否者。凶。腫後忽然平塌。目開。此爲氣泄。愈用參耆內托散加穿山甲糯米。漿滿後無別變。證而不同者。參耆內托散加白芍連翹。復腫。否者。凶。又有頭面太多。將起發時。頭先腫大者。此天行大頭病。惡宜羌活救苦湯解者。否者。凶。此證易服易消。六七日變爲癰。增水錯。喉聲啞。痰喘倒陷。百無一生矣。若六七日不起發。顏色不正。難能灌漿。亦難保十一二朝之變也。痘不起發。皮粗色晦。而隱於肉下者。此脾肺俱虛也。須防七日之變。八日之喘。陳文宿云。痘瘡出不快。誤言毒氣壅盛。用藥宜利解散。致藏府受冷。營衛滯滯。則氣不能充貫。其瘡不起發。不充澤。不充滿。不結實。不能成痂。多致發癰。煩躁喘渴而死。翁仲仁云。起脹發頂。雖起。而四圍淡白枯濇者。屬血虛。有四圍雖收。起暈而頂陷者。屬氣虛。頂陷色白。氣血俱虛。保元湯加芍藥肉桂之類。起脹時。頂上有小孔而色淡者。此腠理不密。元氣開泄也。保元湯加桂。若色黑者。爲火毒熾盛。又當涼血解毒。痘起其孔自密。海藏云。痘瘡身後出不快者。足太陽經也。身前出不快者。足陽明經也。身側出不快者。足少陽經也。若便利調和。而出不快者。熱在表也。又有上中下三部。先上部次中部。後下部。出齊自愈。又有作三次出者。錢氏云。三日不快。不出。用消毒之藥。仍不出。服平靜者。本稀也。不必服藥。大凡五六日間。當解毒。漸托七八日間。毒氣不能盡出。而反入於內。必用藥救出之。此大法也。

痘瘡出齊長足。至六七日紅潤灌漿。九日十一日收靨爲苦。蓋成質之令。肺金用事。然必藉脾胃強。則氣血充實。中陷者盡起。頂平者盡峻。飽滿光榮。先長者先作漿。次長者次作漿。循循有序爲順。若脾胃弱。則氣衰微。不能助痘成漿爲險。若脾胃損。則氣血澆薄。不能灌汁。必喘脹悶亂。瘡場倒靨。喘嗽泄瀉爲逆。其或肝上有痘先黃者。此毒攻脾。當十一二日不食而危。若稠密焦紫。不起頂者。此血熱毒盛。當視其入皮之厚薄。厚者化毒湯加連翹黑參。若皮薄如水泡者。雖灌不滿。必有瘡塌黑陷之變。若頭面稠密。身上稀少。色白不能起頂。灌漿者。此血氣虛少。參耆內托散。藥力在上先頭而灌。四肢不灌。前藥加糯米芍藥。以牛膝下引至足。若五六日漿雖灌而不稠濃。不圓滿。或陷頂者。此爲氣弱不能統血。保元湯合四物加觀桂。若雖飽滿。色見桃白者。此氣盛血弱也。四物湯加木香糯米。若六七日內灌漿不滿。中有不灌者。此氣血不和。必變瘡癰。瘡場保元湯加芍藥芍藥白芷糯米。若雖見長滿。摸則皮皺。此血虛而氣不相依。必難收靨。參耆內托散加糯米。若氣虛之證。用內托補藥。暫起灌漿。不滿而復平塌者。更用大劑保元湯。加芍藥木香升桂糯米。痘養漿。漿不易充。而色淡白。食少便溏。此氣虛也。保元湯加當歸肉桂。若根赤煩渴便秘者。此血熱也。犀角地黃湯。誤用參耆托漿。而熱愈甚者。四順清涼飲。發漿時乾空無水。此氣虛伏陷也。若人事清爽。飲食如常。痘無損處。補中益氣湯。若喘脹喉痛。煩悶外刺者。不治。痘本稠密色淡。養漿時昏睡妄言者。此血虛神無所依也。保元湯加參仁茯苓神歸地門冬。養漿時喜笑。

止者。此心包熱甚也。保元湯加入中黃黃連。養漿時嘔噦不止。而漿不充者。土敗木侮。不治之證也。灌漿時痘色明綻。而兩臂腫痛如瓜者。此手三陽氣虛。而毒凝滯不散也。保元湯加桂枝羌防當歸忍冬犀角連翹。養漿時能食便溏。諸痘俱灌。惟正面平塌無漿。此足陽明氣虛也。保元湯加觀桂芍藥。有灌漿時忽然倒靨。或血熱毒盛不能起長。伏陷喘脹便秘。諸藥不効者。攻毒湯有漿雖灌。而清稀不能充滿者。後來必有餘毒。能食便堅者。用嫩黃雌雞。入黃耆一兩。煮汁。少和酒釀飲之。若漿清頂不足。而不犯條款。自能飲食者。當發痘毒。方可收功。若有變。及不能飲食者。必危。已上諸證。年大能食者。十全五六。年小不能食者。難治。漿雖灌而色太紅。根脚散者。此血熱未解。九朝十一朝內必發癢。急宜化毒湯去升麻加芍藥白芷連翹忍冬。勿令抓破。如破處鮮血淋漓。則氣血流通。外用陳年屋茅研細摻之。或以松花掩之。若因發癢而擦破清水無血。必無生理。破後隨灌隨乾。顏色青白。堆垛如雞矢者。終必咬牙寒顫。發渴作喘。二十日外必危。但抓破處如刺光魚皮湯火泡者。不治。若八九朝灌漿之時。身發壯熱。渴飲飲水者。此瘡多毒盛。表裏氣血俱虛之故。加味四聖散去木香加歸芍。亦有漿半足。而熱甚渴引飲不已。此津液外布。而肺胃枯涸也。大劑保元湯合生脈散類進。漿滿而渴自止也。若壯熱煩渴。舌乾唇裂。痘色乾紫者。血熱毒盛。或重裏煖炕所致。不可誤與前藥。犀角地黃湯去丹皮加苓連。若行漿時感冒風寒。痰喘者。難治。畧與疎散。不効者死。痘漿充而腹滿泄瀉。此停食所致。保和丸消導之。若灌漿時痛不止。

者氣滯也。保元湯加山柰木香。以行其滯。則痛自止。有塌發不止者。此血熱也。四聖散加生地黃。乾首烏。以涼其血。其癢自止。若癢足而癢不妨。若滿癢之時。十指之外。身體倦怠。煩悶嗜臥。口有氣息。此必胃中熱。喉舌生瘡之故。急用黃連解毒湯。或消導飲加防風。遲則瘡難收。應脫痂。延至二十日外。牙齦蟲蝕出血。而成牙宣。呼吸息出。而成息露。或為走馬崩砂。狐惑齒落。腐爛為不治矣。

收靨

痘瘡至八九朝。至十一二朝。灌漿滿足。膿汁漸乾。先從人中上下口鼻兩邊。收至項下額上。遍身手足一齊俱收。如厚色黑。漸漸脫落。飲食便溺如常。為吉。若額上先收者。孤陽不生。腳趾先收者。獨陰不長。為大逆兆。若癢不稠濃。頂未滿足。面

醫通卷十二

收靨

思得堂藏

腫忽退。目閉忽開。瘡脚放潤。色白乾癢。痂薄如紙。此津液枯竭。血少毒存。急用四君子湯加麥冬。牛蒡。荆芥。連翹。救之。今人每見此證。認作痂無事。致成不救者多矣。或有將暑之時。熱不止而脈滑數者。痘未盡也。托裏快斑湯發之。脈後復出。增痘。其熱自除。有將瘡時。痘內復出。增痘者。吉。若癢足難。腐色轉黑者。凶。亦有能食神清者。可治。有收靨時。咳嗽咽喉不利者。此肺胃餘火不清也。桔梗湯加牛蒡。連翹。黑參。痘漿清而忽然乾黑。謂之倒靨。若癢足而次第收靨。痂厚色蒼。忽然而喘急腹脹者。此傷食所致。保和丸消導之。若收靨如期。而身熱喘逆者。此客風寒也。當隨輕重以汗之。其或當靨之時。身熱悶亂。不寧。更氣腹脹。泄瀉寒顫。咬牙。急用錢氏興功散加木香。當歸。助其收靨。若目開腫退。色白不收。反腹脹躁

醫通卷十二

收靨

思得堂藏

渴。悶亂更氣者。此必曾經泄瀉。或過用涼藥。脾胃虧損所致。陳氏木香散。否則倒靨而危矣。薛氏云。若手足並冷。屬脾胃虛寒。陳氏異功散。手足微冷。屬脾胃虛弱。錢氏異功散。加木香。若手足熱。大便秘。作渴引飲。屬脾胃實熱。四順清涼飲。救其陰。以抑其陽。又有當靨之時。潰爛淋漓者。毒當發而發散遲。則毒蓄肌肉。未當發散而發散早。則毒邪暴出。肌肉虧損。熏灼腐爛。甚至內氣併虛。滑泄自利。悶亂呻吟而死。急用陳氏木香散。或錢氏白朮散。治裏。豆蔻丸以止瀉。外以白螺殼。或端上敗草為末。摻之。或用黃牛糞燒存性。入麝少許。摻之。或蠶繭燒灰。加枯礬少許。摻之。或用蕎麥麩。豬膽調塗。爛處并用蕎麥麩。視身下。以收其毒。夏月盛暑。用芒硝。豬膽汁調塗。若手臂臂膊之間。久著牀席。展擦破損。急難成痂。或破爛成片。焦乾黑。如火燒湯潑。亦難治也。又或當靨之時。發熱惡寒。身疼面青。瘡不收靨者。此必風寒侵襲。故發身疼。桂枝湯加荆防。淡豆。虛則參蘇飲。如或夏月居處過熱。熱與毒相凝而痛。益元散加枳橘。連翹。白芍。痛去熱退。瘡自靨矣。倘痘疔失於挑拔。收靨時作痛。急宜挑治。以泄其毒。又或頂破膿出。結聚如碎松香者。此因多用溫補之藥。邪氣得補。反傷正氣。急磨生犀水飲之。及益元散。利小便。當歸丸導大便。自然收靨。亦有漿雖灌。而未得滿足。不能收靨者。犀角消毒飲。解散其毒。方得收靨。又有曾用涼解之藥。及飲冷水。致腹中滑泄。氣短體倦。而不靨者。以胃苓湯和胃安脾。亦能收靨。其或瘡頭有孔。膿水流出。或清水無膿。卒然自破。水出乾黑。是名漏瘡。不治。又有遲延日久。潰爛淋漓。皮脫腥臭。若先曾成膿

而後潰爛能飲食無他證者當和脾胃避風寒多用乾黃土末摻之自能平復若先未成膿而潰爛者不治又有先因皮膚破損多用補藥重復灌漿而發熱不瘳者此正氣得補驅邪為膿然正氣終為邪克不能逼邪成痂十全大補湯又有雖重灌漿膿血浸淫面目加味消毒散更加犀角多服若元氣本實可愈如或膿血不止變成疔蝕難治也又有結痂乾厚忽然戰慄乾噦煩渴者此正氣將復不能禁持之故生厥散又通身俱收惟頭與足不收者此氣血不調四物湯去地黃加升麻牛膝牛旁紅花荆芥陳文宿云痘瘡收靨之後渾身壯熱經日不除別無他證柴胡麥冬人參甘草黑參磨草主之翁仲仁云痘瘡灌漿已滿熱毒已解至收靨時有數日不焦者只看痘色如初此亦無妨乃表虛不能收斂之故八

醫通卷十二

收靨

八

思得堂藏

珍湯加木通牛旁神脾利水痘自靨矣朱濟川曰表虛則易出而難靨表實則難出而易靨於此可見其表裏虛實矣

脫痂

痘瘡潰漿滿足乾靨結痂數日之間脫盡痂色紅潤如桃花色者為吉若痂厚色蒼當落不落乃火盛之故宜清餘熱或有半月二旬痂皮粘者不脫此名丁痂或脫去痂薄痂痕凹陷乾枯色白或潮熱發癢者皆表虛無力收斂發表太過所致人參因肌湯痂死半粘半脫痂色紅紫痂腫癢痛重復作膿者此名翻痂為風熱餘毒急宜涼血犀角地黃湯若發癢刺去痂皮或出血或無血仍復灌漿如瘡疥者此血熱氣虛十全大補湯去桂加紅花紫草牛旁子不愈各症蝕瘡出血不收者名陽瘡俱危痂落不光淡白全無血色痂平不滿者

名衰衣涼元氣虛寒之故當大補脾胃補中益氣湯加桂若痂不落及見昏沉不省人事者此脾胃虛也歸脾湯若抓破被風侵襲作痛屢愈屢破為血風瘡雖多用養血消毒之劑亦難速効若結痂乾燥深入肌肉不落即以真酥或蜜水潤之遲延日久則成癰疽矣脫後痂痕凸起紫赤作痛者餘毒不解也解毒防風湯癰下溼者蜜陀僧滑石白芷為散乾則蜜水調敷溼則乾搽須避風日可免癰疽也痘收靨乾黑黏著皮肉不脫而身熱煩渴夜卧不寧者熱毒不化也犀角地黃湯加連翹牛旁若妄言譫語四物湯合生脈散加棗仁若痂薄如縑昏睡少食者此脾胃虛也大劑保元湯補中益氣並加穿山甲預防發癰之患痘收靨後身熱致嗽聲啞吐痰而咽者此毒火乘金越出上竅也犀角地黃湯加芩連門冬

醫通卷十二

脫痂

九

思得堂藏

牛旁子有脫痂後自汗不止痂痕色淡而手足清者氣虛也十全大補湯若身熱手足自汗不止而痂痕紫赤者胃中餘熱傍達四末也犀角地黃湯夏暑人參白虎湯脫痂後能食便秘身熱口渴者此胃中積熱上蒸須防口疳齒齦之患清胃散有脫痂後午後潮熱臉赤煩悶錯語昏沉者此火從虛發也保元湯加歸芍有收靨後復發斑疹紫色者此餘毒熾盛也犀角地黃湯加荆防連翹牛旁人中黃若服藥後反加清瀉或喘脹者不治凡痘痂色白急當調補中氣為主若服藥而漸紅活為吉色不轉者危雖二三年後多患瀉痢而死若妄投攻伐禍在反掌

陷伏

發生聚散而彰於外者陽之德也灌漑滋潤而守於內者陰

之德也。陰不足則陽不長。而枯萎之變出焉。陽不足則陰不生。而陷伏之變出焉。痘疹正當長發。灌漿之時。平塌不起。謂之伏。出而復沒。謂之陷。有紫黑白三者不同。虛實寒熱之異。今人乃謂變黑歸腎。欲用錢氏宣風散。百祥九下之。不知牽牛大戟。峻利之藥。有傷元氣。非實便實者。不可輕用。大抵血熱之證。初必深紅。失於解散。必變紫黑。甚至乾焦。自然之理。治者當於乾紅之時。急用解毒涼血。頂雖平陷。斷不可以氣虛例治。而用參耆補劑。則氣盛而血愈涸矣。丹溪曰。痘乾宜退火。祇用輕劑。劑防牛旁之類。若其人能食。便祕溺赤者。當用解毒防風湯。發散其毒。有黑疔。挑出惡血。內服犀角消毒飲。外以珍珠散塗之。觸犯寒邪。肌表固閉。毒氣伏而不發。致黑陷者。神應奪命丹發之。熱毒內攻。神昏悶亂。寒戰咬

醫通卷十二

陷伏

思得堂藏

牙而黑陷者。神授散救之。便秘氣實。四順清涼飲。小便不利。導赤散。減食氣弱。加味四聖散。兼扶脾以勝腎水自愈。閻孝忠不違錢氏本意。妄言黑陷為寒。及云斑疹終始不可服涼瀉之藥。後人因之。反致熱甚黑陷而死者多矣。觀斑疹之陷者。無不腹滿喘急。小便赤澀不通。豈非熱極所致耶。間有胃氣虛寒。而陷伏不起。則用至寶丹。毒邪傷胃。無價散。毒邪竄入腎經。入牙散。毒邪伏於心腎。珍珠人牙散。但人牙發痘最猛。用之不當。則有痘頂迸裂之虞。不可不慎。若因虛熱毒盛而陷。急用桑蟲漿。地龍酒。雞冠血等方。選用蓋氣虛白陷。用桑蟲血。熱黑陷用地龍。瘡乾紫陷。用雞冠血。不可混也。朱清川曰。毒壅心肺二經。用雞冠血以發之。毒壅脾經。用桑蟲漿以醇之。毒壅肝經。用紫草茸以鬆之。毒壅腎經。用人牙散以

攻之。毒滯經絡。用川山甲以透之。葉子蒼云。毒壅於肺。則用桑蟲。毒壅於肝。則用雞冠血。毒壅脾胃。則用地龍。毒壅心腎。無藥可治。惟寒閉毒邪於腎。則用人牙。與濟川稍異。古方牛李膏。宜風散。集變百祥丸。獨聖散。周天散。皆治毒壅黑陷之藥。咸可取用。如外觸穢氣。常用胡荽酒噴其衣被。并燒紅棗乳香辟之。若瘡癢者。茵陳蒿為末。漿蜜和。晒乾燒烟熏之。在大江以北。則用水楊湯浴之。凡見灰白陷者。此必不能食。乳或先因吐瀉。脾胃虛弱。毒匿不起。而變虛寒白陷者。白花蛇散最捷。蓋氣虛則為癢。為陷。血熱則為癰。為燥。痘色白者。必至於灰慘。灰慘者。必至於癢塌。此皆氣虛而不能起。脈血虛而不能華色也。參耆內托散加歸芍。使血活氣行。白者可變為紅矣。若虛寒甚者。陳氏異功散加養血藥救之。若單行補

醫通卷十二

陷伏

思得堂藏

倒靨

氣則氣燥血虛。必致發癢。抓破灰慘。倒靨。為不治矣。

痘疹能依期灌漿結痂。如螺靨為吉。若膿未滿足。忽然乾靨。或膿成之後。不期破爛。或收靨之時。泄瀉膿血。或空泡乾枯。或發熱昏憤。或咬牙寒戰。或手足並冷。飲沸湯而不知熱。是名倒靨。由中氣不足。毒從內入之故。宜參耆內托散。補中益氣湯。保元湯選用。使破者重複灌漿。無處更出。贈痘。則正氣得補。復袪出毒邪也。若服補藥不出。贈痘。破處不復腫。灌。更下膿血者。不治。若將靨之時。忽然黑靨。或漿未充。而忽然收靨。或漿雖充。而一齊結乾。乾紫。此氣虛血熱。因火迫而收之。太速也。犀角地黃湯加紫草茸。或四聖散加入參當歸。然其形證。又當推辨。如身痛四肢微厥。痘色青紫者。此則外感寒

邪腠理閉拒而倒靨。人參敗毒散并用胡荽酒噴之。忽然倒靨而心神不寧者。豬尾膏。若心煩狂躁。譫語便秘。口渴飲水能食者。此則外觸穢氣而倒靨。內服奪命丹。外燒熏散。散之。屍氣所觸而靨。辟穢香解之。有膿未滿足。忽然目眦深陷。乃氣脫倒靨者。作昏沉痰喘者。死。丹溪云。痘瘡倒靨。因與陽虛而毒氣不能出者。保元湯加紫草之類。若將成就之際。却淡色者。屬血虛。芎歸之類。或加紅花紫草。燂熱升麻。芩連桔梗之類。甚者用犀角。薛氏云。若熱毒方出。忽被風寒閉塞肌竅。血脈不行。身體作痛。或四肢微厥。斑點不長。或變青紫黑色者。此為倒靨。若胃氣虛弱。不能神接營衛。出而復沒者。謂之陷伏。誤用解毒之藥。必致陷塌。若喜熱飲食。手足並冷者。乃脾胃虛弱之證。宜用辛熱之劑補之。喜冷飲食。手足並熱。乃陽氣壯熱之證。宜用苦寒之劑瀉之。外感風寒者。溫散之。毒氣入腹者。分利之。陽氣虛者。溫補之。外寒觸犯者。重解之。陳文宿用異功散以預保脾胃於未敗之先。實發前人所未發。開萬世之疎眼也。

夾斑

痘瘡夾斑疹而發。是藏府熱毒交盛。故一齊湧出。予嘗洗心體會痘證。但有夾麻而夾斑之說。未果。斑乃傷寒之熱毒內蘊而發。安有與痘齊出之理。即前見點例中所言。皮肉鮮紅成片者。為夾斑。實癰疹也。細如芥子者。為夾疹。則癰疹也。然斑則多見於胸腹肢體。頭面絕少。於此可以明辨。而舉世通謂夾斑。若一齊聚楚。大不合時矣。觀先輩治例。首推升麻葛根湯。先散表邪。俟斑退痘起。然後隨證施治。循致方書。無不

醫部全錄卷十二

痘疹

三

思得堂藏

皆然。張涵高曰。斑痘齊出。方書俱言先撤斑熱。往往痘隨斑陷。惟發其痘。則熱聚於痘。痘起其斑自退。兩說似乎相左。其實並行不悖。當知斑痘齊發。總由熱毒勢盛。絕無扶虛之候。得其旨。則撤斑無非清涼化毒。起痘亦無非清涼化毒。化斑湯一方。隨證加增。允為斑痘夾出之金針。如斑色紫赤。加大劑石膏以化之。大便秘結。稍加大黃以利之。設不知此。而誤認真斑。專事寒涼。則痘隨斑陷。若不化斑。專力升發。則斑隨痘起。最難不分頭粒。兩難分解也。黃五芝云。風寒夾斑。當先表散。則痘自起。大便壅者。宜速下之。大便利者。涼血透肌。解毒為主。次言先痘後疹者。輕麻出以分痘之勢也。先麻後痘者。重麻發於肺。表氣先虛。失其起灌之力也。麻痘齊出者。險兩毒並發。但看麻之形色。痘之稀密。斟酌而為處治。若斑見紫黑。痘見漿清。證見喘急。皆不可治。大抵斑痘齊發。總由熱毒勢盛。不可誤用參耆。若元氣本虛。痘色淡白。小劑保元亦不禁也。如六七日內。熱毒未盡。而誤與之。必身復壯熱。痰喘不食而死。否則癰毒口疳目疾之害。所不免焉。

板黃

痘瘡根窠薄劣。漿汁板滯不活。而枯黃色晦者。曰板黃。若方廣天庭板黃。而餘者潤活。癰毒必結於腦項。若腮臉板黃。而四肢潤美。癰毒必發於肩臑。若肚腹板黃。癰毒必發於曲池三里。若背脊板黃。癰毒必結於兩軸尻骨。如遍身板黃。頸項前後板黃。頭面板黃。眼眶眉上板黃。兩脇莖莖板黃。皆死證也。愚按板黃。皆由胃熱能食。食滯壅積於中。胃氣不得宣通而致。非痘之根氣本然也。治者能達斯意。急與苦寒消導。大

醫部全錄卷十二

痘疹

三

思得堂藏

便秘者當微利之。熱滯去而內外宣通。烏有癰毒之患哉。

厥赤

聞人規云。瘡瘡厥赤。大便不運。小便如血。或結癰毒。身瘡破裂出血。乃內火熾盛。失於解利。急用犀角地黃。小柴胡加生地黃。及四順飲之類。薛氏云。若心脾熱甚。犀角地黃湯。心肝熱甚。小柴胡加生地黃。若大便不通。先用四順飲。次用犀角地黃湯。若色赤。煩痛。二便不通。急用活命飲加硝黃。若色赤。煩痛。惡寒發熱。枯命飲加麻黃。若因乳母怒火。加味逍遙散。

斑爛

聞人規云。痘瘡斑爛之證。因當發散而不發散。則毒氣閉塞。以致喘促悶亂。不當發散而誤發散。則毒隨陽氣暴出於外。遍身皮肉潰爛。治宜調脾胃。進飲食。大便調和。脾胃健旺。毒

醫通卷十二

痘瘡

斑爛

思得堂藏

氣自解。而無目赤咽痛吐衄等證。若發表過甚。大便自利。急用理中丸。豆蔻丸。以救其裏。亦有痘瘡如蚊所咬。而色黑。乃危證也。若小便秘結煩燥。導赤散加山梔犀角赤芍。自利不食者。不可用。蓋毒發於表。而妄汗之。勝理開泄。營衛益虛。轉增斑爛。由是風邪乘虛變證者有之。若毒蘊於裏。而妄下之。則內氣益虛。毒不能出。而反入焉。由是土不勝水。變黑歸腎。身體振寒。兩耳尻冷。眼合腹脹。其瘡黑陷。十無一生。醫者審之。

飲食

痘瘡既出。全藉脾胃安和。進納飲食。則易變易。自四五日以至漸落之後。飲食不減。二便如常。雖不起發。不紅綻。或陷塌。用藥得宜。可保無虞。若乳食減少。兼之泄瀉。則元氣日衰。

雖無前證。日後必至有變。藥亦難効。豈能保其無事哉。若胸

前稠密。毒氣傷脾。減食者。消毒飲加黃芩山梔紫草人參。有傷食腹脹不食者。枳朮丸。有痘出太多。中氣暴虛不食者。四君子加糯米。有痘已漸起。而不能食。身無熱者。調補脾胃為主。凡四五日而不食。而便秘者。此毒盛於裏。癰毒可治。至六七日後。反不能食。則變證百出。縱藥何益。有稟受壯實。而發於五歲之外者。又不可一例而論也。又有痘起之後。能食易餓者。此胃大熱。不久而變生焉。大便秘者。四順飲加連翹牛旁微利之。不秘者。芍藥湯加茯苓木通牛旁子以和之。又有渴飲食而不能者。必喉舌有痘。難於吞嚥也。

吐瀉

凡痘疹發熱。有嘔吐者。有泄瀉者。有吐利兼作者。有乾嘔而

醫通卷十二

痘瘡

吐瀉

思得堂藏

噦者。有不食者。皆毒火所致。不可驟止。吐利中有疎通之義。治宜平和。疎透引毒達表。則吐瀉自止。如不止。兼調脾胃。如乾嘔而噦。為胃虛火逆最危之兆。宜橘皮茶連散。以安胃氣。消火毒。有不嗜食者。此脾受熱毒。當升提發散。俾毒得外出。飲食自進。若誤認嘔吐泄瀉不食為裏虛。而用下桂薑附。轉增煩劇也。誤認嘔吐泄瀉不食為裏虛。而用參耆苓木。反增壅遏也。此專為痘疹初出未透者而言。若染正行時。而吐利不食者。乃脾胃虛弱。多有內虛倒靨喘脹之患。凡長發起頂。灌漿時。泄瀉俱為險候。急用白朮茯苓。以滲泄健脾。人參黃耆。以助元托裏。訶子肉果。以止瀉。佐以升提之藥。使無壅遏之患。若不升發。難免倒靨之虞。如見心煩乾嘔而噦。此藏敗毒攻。最為凶候。二陳加黃連木通燈心竹葉夏月四苓散。以

醫通卷十二

五

哭一思得堂藏

功散救之。

腹痛

瘧瘧腹痛者皆每鬱三陰如腹痛面青手足冷此脾胃虛寒
理中湯益黃散選用若腹痛痞滿氣滯手足厥逆而大便不
通者此毒壅不透也桂枝大黃湯合表裏而開泄之若腹痛
面赤作渴手足熱此脾胃實熱消毒飲加山蘆枳殼黃芩木
通若氣粗身發顫動而痛口臭脣古白胎者此毒攻臍府腸
胃內潰不治甚全善云腹痛多是熱毒爲患當臨證消息之
薛氏云若痘未出而發熱煩躁作渴飲冷大便堅實而痛此
熱毒壅滯也急調元明粉通利之若痘不出而煩熱渴不能
飲冷大便不實此元氣虛也白朮散溫補之若噤腐舌酸大
便穢臭乳食停滯也保和丸消導之凡腹痛作渴飲冷手足
並熱者屬實熱若作渴飲湯手足並冷者屬虛寒也翁仲仁
醫通卷十二

腹痛
思得堂藏

云痘疹腹痛當升發以解利痘毒兼分利小便使上下分消
則痛隨利減俗醫恆用厚朴以行滯氣不行升發解利者非
其治矣亦有乳食停滯而腹脹痛者當於升發解利藥中加
消導之劑兼審所傷何物而爲之清理又有數日不大便者
大便秘而痛自止亦未可驟用硝黃也然有實邪固結按之
硬滿而痛又須峻攻不可膠於上說耳

腹脹

痘出腹脹皆海蟾腸胃所致。若胃中伏熱心氣不降小便赤澀而腹脹者導赤散加滑石紫草。若痘乾紫而腹脹不大便者爲血熱毒盛紫草承氣湯。若瘀血在裏而黃煩躁小便利大便黑羣角地黃湯加穿山甲。若氣促體倦大便利小便秘手足冷者脾虛也五苓散加大通木香。若腹脹腸鳴氣喘厥

逆瀉白濁者。急用陳氏木香散救之。遲則陷伏難治矣。若
識語便秘。躁渴者。紫焦者。此內實熱。小承氣湯。若長發時。倒
壓腹脹者。不治。

腰州

經曰。腰者腎之府。痘瘡見腰痛。或痛連背脊。轉側不能。皆因
腎郭空虛。邪火亢盛。真陰不能勝邪之故。急宜四順清涼飲
救。熱存陰為務。若痘未出而喉熱。腰痛。面色紫赤。痘必乾枯
紫黑。此腎藏火毒盛。刺急用百祥丸。或水調元明粉以下奪
其勢。後用消毒飲加防風紫草。連翹木通。若腰下見紫黑。成
片如蚤噬者。不出七期必死。

二便秘瀉

痘疹要小便清而長。大便疏而潤。謂之裏氣和。一有艱阻。則

醫鑑卷十二

大便秘

思得堂藏

毒邪內畜。腸胃壅遏。不能傳化。便宜清解。得大便通。瀉自利
矣。三黃丸四順飲前胡枳殼湯之類。此專為痘始發時而言。
若痘正養漿時。而二便秘者。宜審虛實。治之。中病即止。不可
過劑。若飲食如常。二便如昔。內證平和。不可溫補。亦不可妄
施攻擊也。

大便秘

痘瘡出後。灌漿之時。雖要大府堅實為順。若痘出五六日不
大便。此毒火內乘。津液外耗。腸胃乾枯而秘也。四順飲若色
白少。神不食。嘔吐清水者。虛秘也。錢氏異功散加歸芍。若血
熱口乾。煩躁便秘。四順飲加紫草。使其便利。二三度熱毒自
解。煩躁自寧。若有風寒。先宜解散。然後可下。若不先解。恐表
邪乘虛入裏。痘反伏而不發。發亦不齊。遂成塌陷焦枯。勢所

必致。如六七日灌漿之時。壯熱脈盛。而大便不通。加味消毒
飲及蜜煎導以潤下之。否則腹脹喘滿矣。有過利小便。津液
內耗而秘者。生脈散加當歸。又氣血俱化成漿。而四五日不
大便者。只宜清涼活血。漿足自行。不須下之。薛氏云。痘疹大
便不通。當分辨虛實。以手足冷熱及飲水飲湯驗之。

瀉瀉

痘瘡解毒。以利小便為要。小便不利。乃熱毒結於下焦。連翹
防風湯。赤瀉有血者。犀角地黃湯加木通。壅中痛者。合益元
散。延久則身熱躁悶。喘渴焦紫。或生癰破裂。或口瘡咽腫。或
內作膿血。變證不測。大抵未出之先。熱甚而小便不利。恐欲
起驚。導赤散微解之。初出不快。小便赤澀者。生聖散。長發灌
漿時。瀉瀉者。五苓散加木通。收靨之後。小便不利。煩熱而渴。

醫鑑卷十二

瀉瀉

思得堂藏

瘡疹未出之先。先會下痢。此元氣已虧。起灌最難。滿足。升發
補中必兼實脾為要。又須辨其寒熱赤白。如痘色紫赤。口燥
乾。小水短澀。痢下鮮赤。此風能動血也。三奇散四苓散。然
用。若痘色淡白。四肢清冷。小水清利。痢下晦淡。此小液泄。宜
補中益氣湯。陳氏異功散。兼用。有食積而腹急脹痛者。

痢

瘡疹未出之先。先會下痢。此元氣已虧。起灌最難。滿足。升發
補中必兼實脾為要。又須辨其寒熱赤白。如痘色紫赤。口燥
乾。小水短澀。痢下鮮赤。此風能動血也。三奇散四苓散。然
用。若痘色淡白。四肢清冷。小水清利。痢下晦淡。此小液泄。宜
補中益氣湯。陳氏異功散。兼用。有食積而腹急脹痛者。

胃散如山。植木通。若至二七內外。而瀉利膿血。為餘毒未盡。熱移大腸。兼之淫熱相併。紅白交作。四苓散加苓連山。植木通連翹。大抵痘後利膿血。為五液注下。最危之兆。若以藥治。而峻用苦寒。不旋踵而告變矣。

驚搦

古人謂先發驚而後發痘者。是熱在痘而不在心。為順。先發痘而後發驚。是熱在心而不在痘。為逆。然有因風邪所激而發者。有因脾氣虛弱而發者。不可不辨。若正當灌漿之時。忽手足搖動驚搦者。肝熱生風。風火相搏生痰也。治當平肝木。利小便。為要。瀉肝則風去。利小便則熱除。先與導赤散。瀉青丸。次以四聖散。加入參鈎藤。若手足愈瘳。口眼喎斜。涎盛語澀。腰項強急。口張舌強者。此火盛耗金。木無所制而風生。消

醫通卷十二

驚搦

思得堂藏

風散加蠟尾鈎藤。痰盛加元明粉。若渾身冰冷。不知人事者。不治。若發搦至口。噤流涎。此脾胃受虛風。或誤服涼藥之藥所致。謂之痘風。急當清火養血。卒多莫救。若痘初出時無驚搦。收靨時忽然發搦。如角弓反張。直視流涎者。此毒火傳心。移熱於肝。木來乘土。氣血但虛。最凶之兆。惟痘疹將化。先發驚搦者多吉。然發一二次即止而見點者。其痘必稀。發十數次而報點者必落。報痘一二日。而驚搦不止多重。雖曰痘前搦者吉。若發之不止。為毒伏於裏。未可以言吉也。○安世曰。大抵痘前發搦。貴在熱盛。痘後發搦。貴在正虛。若余治一五歲兒。放標時忽發驚搦。痰涎壅盛。壯熱不省。忝在同道。不忍坐視。先與西黃蘗。點舌上。遂用硝黃苓連。佐以荆翹。大力之類下之。一服神清熱緩。痘亦隨起。反掌收功。近於都門。療

正黃旗四川道監察御史蕭粹然李公之孫。年四歲。痘後忽發驚搦。諸方皆謂是救。亟邀予。往診其六脉虛數無力。手足時發拘攣。口眼喎僻。唇燥鼻衄。漫便瀉難。証雖危殆。以舉家懇救甚切。因思痘後發搦。多緣氣血兩虧。土衰木賊。虛風內動所致。法當溫養肝脾。填補氣血。使正氣有權。虛風得以自息。若治其驚。是速其斃也。為疏一方。以十全大補桂枝湯。日進二服。搗遂稍定。又二服。二便自通。囊亦少減。目睛轉動。諸証向安。但頭發毒數處。其色亦不甚赤。於前方中去芍地。加白芷。忍冬。貝母。三日後毒亦消散。聲音清朗。飲食如常。惟左臂與左足。不能舉動。更於原方加牛膝。倍當歸。四劑便能步履。獨手腕無力。仍以牛膝易桂枝。先後不逾一方。調理而痊。孰謂證見危逆。而悉委之不救哉。○痘疹盛行時。如見驚搦。

醫通卷十二

驚搦

思得堂藏

切不可作驚治。一切硃砂牛黃腦麝輕粉等。皆痘所忌。不可不慎。

咳嗽

咳嗽痰喘。雖屬肺熱。然有氣虛痰理不固。風邪侵肺而嗽吐稀痰者。參蘇飲。頭痛身熱。鼻塞喘嗽者。風寒也。芎蘇散。若咳嗽不已。無表證者。此肺虛為痘毒所乘。補肺湯。喘脹便秘者。肺熱也。黃芩瀉肺湯。有湯水入口。即欬而吐出者。肺胃熱痰膠固也。先與梔子豉湯。加薄荷。桔梗。搗碎。後服如聖飲。面白手足冷喘促者。此虛寒也。白朮散。亦有肺脫有痘。淫淫作瀉。習習如癢。阻礙氣道而為咳嗽。痘收自愈。有不效嗽但喘者。若初出噴嚏。鼻流清水而喘。風寒客肺也。參蘇飲。痘點乾紅。腹脹便秘而喘。毒盛氣不舒暢也。宜清火解毒。有氣虛不能

逐邪外出。毒伏於內而喘脹者。乃悶危證。不治。有瀉後喘者。脾氣下陷。虛火上擁。下氣不續也。補中益氣湯。有吐後喘者。胃虛不能制伏相火也。六君子湯。這四五日。伏匿喘脹。必再攻發。復起可治。痘漿半足。而倒壓喘脹者。宜補兼攻發。復應灌為吉。有誤服寒者。腹脹而喘。枳殼湯。有痘密以致鼻塞。而口中氣促。似乎喘者。非喘也。以喘治之誤矣。

喘咳

痘瘡要清。壅滯則熱。毒容易蒸發。若涕壅稠粘。身熱鼻塞。大便如常。小便黃赤。可蘇散加減。如痰盛壯熱。胸中煩悶。大便堅實。則喘咳。前胡枳殼湯微利之。庶元氣不傷。痘瘡易出。

咽喉

醫通卷十二

咽喉

咽喉

五十一

思得堂藏

痘出最要咽喉清利。若毒火上熏。咽喉先受。以致腫塞。喉狹。呼吸不能。飲食不入。疼痛咽啞等證。如聖飲甘露飲射干鼠。粘子湯選用。血熱咽痛者。紫草消毒飲最宜。若咽痛發熱。手指初捻似熱。持久則冷者。此脾氣虛也。錢氏異功散。若咽痛發熱。作渴引飲。手足並熱者。脾氣熱也。瀉黃散。若大便清。飲食不進者。白朮散。慎勿用涼藥。致損脾胃。而變吐瀉。瘡也。若咽痛足熱。小便赤澀而頻數。此三陰虛。無根之火。從經上至咽喉也。生料六味加麥冬五味。

喉水

喉水者。咽喉為毒所壅。則飲不得入而溢於氣喉。故氣逆噴。而喉也。若喉水在六七日前見。痘色紅紫者。乃熱毒上壅。若痘色灰白不起。乃氣血虛弱。肺胃受傷。大為危兆。急宜解毒。

開胃。色赤兼涼。血色淡兼補氣。若七日後。外痘蒸長光潤。而見此證。乃內痘起發而喉。只須助其灌漿。外痘結痂而喉自愈矣。

失音

失音之證。大抵肺熱氣病。咽喉有痘也。若於七日前見者。毒氣熏蒸。肺竅閉塞。內瘡糜爛。呼吸俱廢者。為難治。若七日後。喉木失音。乃內瘡先熱而腦射于鼠粘子湯。或有內本無瘡。多服熱藥所致者。急用消毒飲去荊芥加桔梗門冬。嫩赤熱甚。更加犀角黑參。或涼膈散去硝黃。若毒火上熏於肺。肺受火鬱。而發聲聲啞者。導赤散加桔梗牛蒡。若聲啞而煩熱。喉痛。呻吟作渴。欲飲冷水。大便不通者。此心脾實熱。急與清涼解毒。夏月盛暑之時。稍與冷水救之。潔古云。痘疹已出而聲解。毒已盡。暑之時。稍與冷水救之。潔古云。痘疹已出而聲解。

醫通卷十二

喉水

失音

五十二

思得堂藏

音如故者。形氣俱不病也。痘疹未出而聲不出者。形未病而氣先病也。痘疹出而聲音不出。形氣俱病也。其治法可領悟矣。凡痘瘡黑陷乾枯。咳嗽失音。吐瀉煩渴。發熱肢冷。昏睡少食。痰多氣促。寒熱咬牙。黑陷燥癢者。皆為不治。惟極進溫養之劑。間有得生者。

寒熱咬牙

痘疹咬牙。寒熱。有先後之序。痘正出時。為寒邪所襲。則肌腠閉塞。不能宣達。而發寒熱。宜疏解之。若發熱時寒。則陰凝於肌。陽分虛。則陰入氣道。而作嘔。保元湯加丁桂以溫陽分。若係表虛風寒所乘。則宜保元湯加羌防。升連翹木香之類。痘未透而咬牙者。陽明胃熱。宜清解之。若發熱時咬牙。乃陽陷於陰。陰分虛。則陽入血道。故咬牙也。保元湯加芎歸以

益陰分。若係肝盛木邪乘土。則宜瀉青丸合導赤散作湯。二
證並作於吐瀉後者。邪正交攻。氣血俱虛之候。十全大補湯。
單見且凶。况血見乎。若痘色紅紫。大小便秘。煩渴欲飲水者。
表裏俱熱之證。而不寒但熱者。瘡癤而腫也。受牙者忌痛也。
乍作乍止。四順清涼飲。若清瀉灰白。泄瀉不止。此脾胃虛寒。
純陰無陽之證。急用陳氏木香異功。若清瀉則腹脹足冷。
者。倒懸也。不冷者。痘熱紫陷伏。悶亂昏睡。或躁擾不寧。聲啞。
氣急而寒。顫咬牙者。為熱毒內攻。法在不治。急投神效救以
救之。若青乾紫陷。二便不通。大渴不止。此純陽無陰。百祥
九宜風散。慈下以救陰津。下後身安手足溫者。方許可治。若
腹脹氣喘。識語。手足冷者。伏陷也。不治。大抵二證並見最為
危候。又當以痘色辨其吉凶。或單寒頭者。當補氣之中兼補
醫通卷十二 痘疹受牙 恩得堂藏

其血。單受牙者。於補血之中兼助其氣。然此二證多發於痘
後。其人屬虛無。雖有少熱。亦餘毒耳。有養榮收靨之時。最
忌見此。故於七日前見者可治。在七日後見者為逆。

發泡

發泡為氣盛血虛之候。蓋肺火動而皮毛傷。遂聚而為泡。小
者如水珠。大者如葡萄。色白而空。或有清水者。氣虛有火也。
治之當補脾肺。順水道而虛自實矣。錢氏異功散加車前澤
瀉之類。紫而空者。血虛有熱也。清肺湯加當歸芍藥茯苓車
前。使小便下行。則氣平血利。其泡自斂。若薄如竹膜。燎瘡泡
者。必待漿臭而後可治。泡碎則亡矣。

發瘡

氣虛則陷伏。血虛則發瘡。痘初出而遍身作瘡者。此邪欲出。

因風寒閉其腠理。其火游移往來故瘡。宜疎散而瀉肝木。邪
氣得泄。痘出而瘡自止。痘收斂而作瘡者。膿成毒解。火氣漸
微。本無毒也。芍藥湯。若大便秘結。犀角消毒飲。痘養漿時。
淡白平塌。少食便滑。漿清而瘡。爬搔不寧者。此脾胃虛弱。氣
血俱虛。虛火擾攘所致。參耆內托散。甚則陳氏木香散佐之。
藥不應者凶。痘色紅紫乾滯。二便秘。口渴煩躁。漿充而瘡。抓
破血流者。此氣盛血熱也。四物湯加連翹赤芍白芷蟬蛻。甚
則四順飲下之。如作瘡人事清爽。自知其誤。抓破。或言其瘡。
欲人拊之。吉。如癢而悶亂煩躁。語禁不止。搔頭手足舞亂。破
損無血。眼目開凶也。若他處破損雖多。膿血稠粘。正面不
破者。其藏府精華不散。正氣未虧。儘可收功。有面痘雖殘。甚
擦破即癒。能食神清者。可治。昏亂者死。若破無膿血。不結腐。

醫通卷十二 發泡 發瘡 恩得堂藏

如無瘡之狀。寒顫受牙。便泄噤瘡者。不治。

發渴

痘前渴者。宜清金利水。痘後渴者。當大補元氣。若痘瘡稠密
而渴。為津液外泄。生肌散。在熱養生津葛根湯。如煩躁譫語
身熱者。白虎湯加麥冬竹葉。若大便黑小便利。面黃小腹脹。
喘急而渴者。內有瘀血。犀角地黃湯加歸尾桃仁紅花穿山
甲。若夏暑窗牖閉塞煩渴。四苓散加麥冬黃連。薛氏云。若發
熱作渴。大便秘結。手足並熱。喜飲冷水。此陽盛也。四順飲。若
煩渴泄瀉。手足俱冷。飲沸湯而不知熱。或陷伏黑陷者。此屬
虛寒。錢氏白朮散。或陳氏異功散選用。若煩熱作渴。而赤睛
白。此為腎經虛熱。生料六味丸。煎與恣飲。以救腎家將竭之
水。熱都小兒出痘作渴。恣與冷水飲之。如期而愈。亦無痘毒。

之患。蓋北方人臥火炕。飲火酒。有熱與水相搏而然也。按陳文宿云。痘瘡發熱。口渴煩躁。切不可與冷水。蜂蜜。柿子。西瓜等物。恐內損脾胃。致腹脹喘滿。寒頭咬牙。則難治也。蓋方宜各有不同。不可一例而論。張涵高曰。痘出三四朝。便發瀉。清煩渴壯熱。痘色乾紅焦紫。必用涼膈散下之。後用涼血解毒。調理。如八九朝。元氣虛弱。而痘平塌。漿色清稀。保元湯補之。有大證發渴。始終不可溫補。但與涼血解毒。則漿行結疔而愈。

煩躁

凡痘未出而煩躁者。毒火內鬱。或風寒壅遏不能即出。宜發散為主。痘未盡出而煩躁者。亦毒火盛也。消毒散加連翹黑參。痘盡出而煩躁者。乃血熱毒盛。犀角地黃湯解之。痘長黃

醫通卷十二

痘疹

五十六 思得堂藏

時煩躁者。當辨虛實。若痘頂平。淡白少神。漿不易充者。此氣血不足。保元湯加歸芍門冬。虛煩懊懣者。梔子鼓湯加解毒之藥。若綻凸紫滿。便秘瀉瀉。乃正氣實而毒盛不解。涼膈散四順飲三黃九解利之。小便赤澀。益元散導赤散分利之。若痘倒靨喘服而煩躁悶亂。乃氣虛毒盛。難治。

昏沈

痘瘡成漿之時。精神倦怠。神思昏沈。不省人事。呼之不應。自語呢喃。如邪祟狀。此痘出太過。心臟空虛。神無所依也。人參酸棗湯。氣虛大州獨參。或保元加棗仁茯神。若煩熱氣壯。痰涎湧盛者。改定清心丸。如服藥後不寧。反加悶亂者。死。漿清不食者。不治。

汗出

痘瘡多汗。則津液外泄。或未漿。或既靨。並宜保元湯加養血藥。然又有面赤發渴。汗出不及腰者。皆胃熱腎虛。四君子湯去參易麥冬。下六味丸。若而赤作渴。手足心熱。大便堅者。腸胃實熱也。瀉黃散。若初起發熱時。自汗不妨。乃淫熱熏蒸。而然切不可便用膏木之類。以資腠理。亦不可妄用升葛之類。以泄肌肉。蓋自汗則痘熱已輕。恐發泄太甚。則津液內耗。陰陽散離。難以收靨。即靨後自汗。亦宜詳審而治。若血虛自汗。則至夜煩熱作渴。當歸補血湯。氣虛不能自固而汗。則動作喘息。力微身熱。四肢不溫。四君子加歸者。有痘出平塌。淡白少神。身涼而汗者。保元湯加肉桂當歸。有重嘔。蟬蟻。厚衣重衾而多汗者。宜漸減以清過之。

失血

醫通卷十二

痘疹

失血

五十七 思得堂藏

痘疹失血。俱為危候。若氣血旺。毒火盛而失血者。乃邪從血解。不可妄投止血之劑。惟宜清血解毒。若治之不止者。凶。有氣血虛而毒盛失血者。不治。有悶痘五發流血者。不治。有痘倒靨而鼻流血水者。不治。有熱證誤投熱劑而失血者。宜清涼解毒。痘未盡出而用寒涼。毒為涼激傷脾。不能運動其血。致逆於臟腑之中。內毒搏滯於胸膈之上。積成穢血。妄行而暴吐。面唇青。痘色淡白。陷伏者。理中湯獨參湯並加肉桂。溫補為主。所謂血脫益氣。陽生陰長是也。若痘尖綻紫滿而靨者。乃毒火刑金。犀角地黃湯加妙黑山梔。有膿後餘毒乘脾。脾氣受傷。不能統血而衄。小劑參苓白朮散加妙黑連芍。若躁熱悶亂。口乾渴甚而衄。手足逆熱者。犀角地黃去丹皮加黃連山梔炮薑。亦有中氣虛而不時悶熱。手足時冷時熱而

身邪

經曰諸寒爲痛又曰其熱則痛又曰其寒則痛三說不同各有其理常熱作之時毒邪運行忽遇氣寒折之毒邪壅於皮膚之間不能宣發此正寒而痛也宜透肌運表如煩躁渴甚狂言譫語便秘溺赤更值春暄夏炎之令痘見乾紅焦紫就火熱而痛甚就陰涼而痛衰此因熱而痛也宜清涼化毒若

醫通卷十二

身痛

天一閣藏

身不壯熱口不煩渴飲食如常二便清調痘見尖綻紅澤至七八日漿極充滿惟覺根裏脹痛此諸痛爲實宜平和疏養若初出而身痛者爲發未盡升麻湯冬月加蜜炙麻黃二三分既出稠密三身痛爲毒盛瘀血也犀角消毒飲倍連翹加紫草兼腰背痛者肝感血凝也瀉青丸減大黃加甘草防風便秘腹脹四皮厥冷實痛瘡色紫黑者難治百祥丸若偏身如蠶而色紫者瘀毒壅滯最危之兆若二便秘結喘急煩躁梔子仁散自利不食者不治若身後痛屬太陽經用羌活防風甘草身前痛屬陽明經用升麻葛根紫草身側痛屬少陽經用連翹柴胡防風四肢痛屬脾經用防風芍藥甘草急止之蓋恐叫號傷氣恐痛傷血而致變證也若食雞魚酒物而致者清胃散加生犀汁大凡痘瘡切不可食毒物恐作痛致

頭面

朱濟川曰痘未起發而頭面先腫者此陽火亢盛陰血不能
歸附氣血相離之象若痘瘡起發頭面以漸而腫者之毒氣
發越聚於三陽欲作膿血故宜腫也發當起發而頭面不腫
者必痘本磊落毒氣輕所以不腫如痘本稠密起發應腫
不腫此毒伏於內不能透達治宜助正為主如痘稀疎起發
不應腫而腫者此感疫毒之氣治宜救疫氣而治如應腫而平
塌如發後三五痘悶者或或焦紫者此毒盛氣虛不治之
證也六九應痘者且三聚滿者此毒化而腫消目開言吉若
梁未元足而應消目閉者此正氣不足不能化毒成膿各爲

卷之二十一

三

三

倒廐乃送此也。○明人云：溫疹屬火，面已赤者爲順，赤甚爲熱，云云。大抵溫疹之毒走衄也，身用四三子或附子理中並加干姜調服之，爲三三三法，可治有溫疹之風寒相搏，是流於外而機身者三三三法，意用身合三三三法，然多不收。

正氣

朱濟川曰：養乃心之害。分若遠，則偏寒。平歸，則正。養勻則綻，此元氣不足，不能成功於上內也。正氣至三指，而後有數點。此元氣不足，不能成功於上內也。正氣至三指，而後有數點。尖綻者，險也。又須兩額頰來助。若頰頰不足，則無兩澤。爲氣血不足，終不可治也。若眉心密簇如錢，而色入滯，雖偏身朗綻，八九日漿行俱滿，眉心必空殼無水。後必癢塌倒，壓喘脹而死。

手足

朱清川曰。四肢之瘡。應出不出。應起不起。應聚而清水。應收
疔而不收。應脫唇而粘者不脫者。皆脾胃虛。不能旁達四肢
也。治宜調理脾胃為主。然四肢始終皆手溫。若瘡出手足
冷者。脾胃也。瘡出而手足作痛者。少毒火乘脾。疏解為上。若
偏身漿滿。而四肢尚空。效多有不治者。臨病之際。可不撫按
手足之溫冷哉。又有自言手足冷。及按之熱。而夜臥不寧者。
此脾弱而虛陽發露於外也。當補脾調血為主。瘡出而兩足
常動搖不休。此熱毒流於陰分。不治。若出七八日足不伸者。
不治。

唇舌

瘡出始終以所舌紅潤為吉。若唇口腫脹。紫黑乾裂。或有瘡
瘡也。卷十二 手足 唇舌 二十 思得堂藏

先黃。或唇色皎白。或有白泡。或腫爛流膿者。皆毒火乘脾。極
為危候。當先升解以化其毒。次補益以培其本。庶可無虞。若
瘡出稠密。唇口瘡相粘乾黑者。死證也。若臭爛死及牙齦肥
爛腫破。而成走馬疳。牙宜息露。低感等證。皆不易治。即用
化愚丸。馬鳴散。亦難取效。若初見舌白唇紫。即知腎熱。急投
涼膈散及馬鳴散吹之。庶可急奪其勢。若見痰喘作渴者。不
治。若氣虛火盛。津液不能上行。而舌乾口燥者。補益為主。若
毒火盛而舌乾口燥者。解利為主。若舌上燥黑芒刺者。此熱
毒內蘊。急用硝黃下之。或可十救一二。又舒舌者。脾之熱。弄
舌者。心之熱。有以腎熱而舒舌者。亦脾之熱也。若痘稠密漿
清。唇口推動。作沉寒顛者。不治。唇口動。目眶內陷。足常動
搖者。不治。若下唇有白屑如芝。或翻轉如葵花。或有紫泡

出血。及唇燥裂而見而色枯槁。煩渴不止。及腰足痛者。皆不
可治。

眼目

痘疹初發熱時。目赤腫者。風熱上攻也。四五日間目赤者。火
毒盛而上熏也。痘後目赤腫者。餘毒鬱於心脾也。痘疹出
多至灌漿時。自然眼閉。然乾唇之後。又當開眼。若仍閉不開
者。此毒氣上攻於目。急宜清解餘毒。其則涼膈散加荆芥牛
旁蟬蛻。大抵過期不開。即當以舌舔潤去其膜。汚自開。痘
瘡害目。不在於初而在收唇之後。皆由頭面痘密。膿血膠固。
或破爛而復腫。灌毒火鬱蒸。內攻於目。又或痘出太盛。成就
遲緩。過服辛熱。失於清解。或通受火氣。或衣衾過厚。或客胃
風寒。或恣食諸卵。皆能害目。治當活血解毒。得血活其毒。即
瘡也。卷十二 眼目 二十 思得堂藏

解。切不可藥用涼劑。恐冰凝血脈。終成痼疾也。亦不可點香
鼠之藥。穀精散。決明散。蜜蒙散。神功散。羚羊散等方。選用。
初見點時。有痘叢生目中。急須移痘丹移之。庶無害眼之患。
方雖似誕。而功効特奇。不可因其異而忽諸。若三日後根氣
已定。不可移也。輕者以象牙磨水點入移之。

餘毒

痘瘡平塌倒靨破爛之證。用藥得以收靨者。餘毒發泄未盡。
必循經絡而出。發為諸毒。看何經絡而用藥。俱以托裏解毒
為主。如未潰腫硬者。排毒散。隨元氣虛實加減。外用生肌散。
嚼爛卷之。或大黃酒煮入真桑豆粉敷之。或蛇蛻煎生豆。煎
貼之。若潰腫而膿未透。解毒內托散。加白芷。陳皮。外用海
石。細研蜜調敷之。如已潰膿盡者。十宣散。加連翹。忍冬。凡痘

後餘毒發。根赤而作癰者。氣虛也。四君子加當歸芍藥色。赤而腫痛者。血熱也。四物湯換生地加犀角。按犀角連翹忍。冬。腫而不潰者。氣血兩虛也。托裏消毒散。潰而不愈者。脾氣虛弱也。六君子加歸者忍冬。若發於皮膚之外。或大片小片。如塗朱。或作核腫痛。不可摸者。此名紫丹癰。內藏毒盛。雖用解毒藥。亦難消散。從上發者。過心即死。從下發者。過腎則死。急以磁鋒砭去惡血。毒腫未平。再與砭之。更須內毒。其毒得以開泄也。若皮膚發出隱隱紅斑。搔癢或紅塊者。俗名蓋痘。痧。消毒飲加防風。若收靨安好。忽然手足厥冷。此脾氣虛弱。不可認作寒證。參耆內托散加桂枝。若手足忽然拘攣。不能屈伸者。此外感風寒。淫三氣。勿用發散耗血之藥。十全大補湯用桂枝者。木骨節痛。加羌防。有痘瘡收靨後。忽然下痢膿血者。此毒氣流入大腸。須二三日間。聽其下盡。然後清熱利小便。再後補脾健胃。不可用止瀉之劑。若熱毒蘊蓄於肺。閉塞咽喉。則口張不食。欲吐不吐。乾嘔聲嘶。此胃中有腐腐爛。最凶之兆。急用消毒飲加甘桔黑參牛旁竹葉。并犀犀角水救之。遲則咽爛而死。若腹痛脹滿。煩躁氣急者。此毒入於脾。當用枳實導滯湯利之。否則喘急厥冷。難治矣。若痘後勝常飲食。日漸羸瘦。此氣血兩虧。胃中虛火也。錢氏異功散四物湯。並加黃連。相間服之。更節飲食為要。若大便秘結。毒盛血枯也。消毒飲加生地黃麻仁杏仁。以潤之。因多服熱藥燥結者。消毒飲加麻仁芍藥山梔。若口舌生瘡。赤者為心脾熱。熱者消涼。白者為心肺有熱。宜清肺湯外。以青布蘸水拭淨。用馬鳴散搽之。收靨時。口舌生瘡。及患齒疳者。皆由餘毒不

解。乘於陽明。而熏逼上焦也。宜清胃化毒。甘露飲加犀角連翹。咽痛者。亦由餘毒留於管。肺受火淫而為腫痛也。如聖飲。若收靨之後。目閉不開。或生翳膜。疼痛昏暗者。俱宜涼血解毒清心。瀉肝。隨證治之。若收靨未齊。忽發餘毒。而身面目睛俱赤者。難治。翁仲仁云。痘瘡既靨之後。或成癰腫。人固知為餘毒矣。不知氣高而喘息作聲。頭背攣肚者。餘毒之在肺也。痰涎稠粘。咬牙受齒。泄瀉不止。而口臭者。餘毒之在脾胃也。盜汗出於胸前。向午則熱而渴者。餘毒之在心包也。睡中多驚。身常發熱。餘毒之在肝也。耳輪與尻常熱。餘毒之在腎也。眼合不開。身腫不消。壯熱不清。變鬱不樂。諸經皆有餘毒也。又須知發於顙頂及胸者。為心經之毒。發於臂肘及背者。肺經之毒。發於脇肋及筋聚處者。肝經之毒。發於七節之傍。及尻上者。腎經之毒。發於正面及咽者。胃經之毒。肝肺及胃之毒。多易治。心毒多危。腎毒不必治也。大抵血熱毒盛而發者。其毒必熾。腫色赤。能食便秘。並宜消毒飲加解毒涼血藥。胃氣實者。排毒散微下之。若氣虛毒盛而發。其毒必漫腫。色淡。食少便滑。雖用參耆內托。多不可治。若用犀角。連地黃之屬。是速其斃也。如偏身流注清水。延綿不已者。不治。

婦人

女人天癸既至。陰常不足。痘瘡以氣為主。血為輔。有不足則變易生。如發熱之時。正遇經來。此熱從血解。瘡自發出。最為吉兆。若四五日不止。則熱入血室。血必妄行。內動中虛之證也。小柴胡加芩歸。若非經行之期。於發熱時而經忽至者。此毒入內。藏退血妄行。必瘡多毒盛。急以犀角地黃湯加紫

草蟬蛻牛旁連翹。使熱消毒解。痘出經止。方無變患。遲則內虛瘡陷矣。又如起發灌漿之時。適遇經行。三四日不止。必難起發灌漿。或平塌。或灰色。或黑陷。急用十全大補湯加熟附。使起發灌漿。或出則痘為吉。若寒顛咬牙。喘滿者。為內脫。不治。又如起發灌漿之時。經水逆來。或口瘡不能語者。乃血去心虛。不能上榮於舌。先與保元湯加歸地。門冬。茯神。棗仁。待其能言。後以十全大補湯加豬心血調服。又經不斷之時。適逢出痘。發熱神昏。言語狂妄。循衣撮空。如祟狀者。此經後血室空虛。邪熱乘虛而犯衝脈也。四物湯合導赤散加麥冬。又如崩漏不止。氣血俱虛。之後出痘。此必不能勝任。雖十全大補多不可救。又如向來經閉不通。血海乾涸。適逢出痘。毒氣拂鬱衝任之間。一陽之證併發。攻之則妄行不止。宜歸脾湯

調其心脾。使毒得發泄。庶或可救。至如孕婦出痘。最為可慮。不問輕重。悉以安胎為主。胎動不安者。四物湯加參朮砂仁。有熱證。當用黃芩。必須酒炒。胎安痘出稠密。參著內托散加紫草歸芍。至如痘疹正在起發灌漿時。忽過分晚。氣血俱虛。十全大補倍參者。加熟附子。以補氣血。甚則大劑保元湯。更加膠艾薑附。續續灌之。若少腹急痛。瘀血未盡。須加肉桂。胎下之後。絕無瘀血。按之惡痛者。此必瘀積少腹。加炮黑山楂。以伏龍肝煎湯代水煎藥。臨服再加熟附黑糖半兩。最妙。若咬牙寒顛。腹痛作渴。手足令身熱者。此脾胃內虛。而顯假熱於外也。十全大補湯加熟附。服後止者吉。不止者凶。如產後半月十日之間。適遇出痘。此氣血新虛。必以大補氣血為主。大抵男婦婚嫁之後。出痘其頂必不能高聳。其形多大而扁。

痘形

潤其色多淡而不黃。不可拘小兒元氣未發泄之例也。

痘瘡從額骨上起者。曰當額痘。朗朗不妨。稠密者危。在口兩角出者。曰監門痘。後必成大泡及瀉。下順先出。曰脫鬚痘。漿雖充灌。終屬危候。痘出紅活光澤。粗細一勻者。曰石痘。吉。手足四肢皆有。惟身少者。曰四脫痘。凶。吉相半。若身而皆無者。不治。通身皆有。足心無者。曰無根痘。須看周身多少。少者吉。多者凶。上身少。下身多者。曰逆痘。凶。上身多。下身少者。曰順痘。吉。上下有而中間少。或兩脇多而腹上無。腿不起者。曰兩節痘。危。此證當從虛治。有前獨多。曰瞞心痘。多凶。加渴瀉者。不治。兩腰每邊一箇紫大者。或皆紫黑如蚤咬者。及未出先見腰痛者。曰折腰痘。五日死。

初發點五七粒成簇。數十處皆然者。曰梅花痘。起腫必連成一片平塌。若有暗瘰。光澤如珠者。吉。暗瘰亦平塌枯澀者。凶。報點周時。即痂復又報點。如是數番。名九焦痘。可治。若當額地角。額骨心。胸背手耳後。有一二箇黑陷者。亦曰九焦。不治。痘粗肥而嬌紅色。斃不能結實。名晃痘。不可因其好看而妄斷為吉。急宜調補脾氣。否則為瀉瀉養塌之患。痘出而項有皺紋者。曰椒皮痘。或紋如茱萸者。皆不治。痘出紅潤而中心少有黑點者。曰紫黃痘。為血熱可治。中黑陷而四圍灰白者。曰陷頂痘。九日死。初出狀如蚊蚤所咬。三日後反不見者。曰反關痘。五日死。痘起黑陷。或紫黑中有血者。曰紫疔痘。七日死。痘瘡中有紫黑疔。生於額上太陽當心者。曰黑疔痘。三日死。痘黑而光澤者。曰賊痘。有背部

與當類臨門。及拘腸鎖口。俱用銀鍼挑破。以珍珠散塗之。初起瘡色淡紫成片。曰紫雲痘。十日死。痘未出時先驚。曰先驚痘。不必治。驚出自愈。若出而復沒。雖少而不起。發者難治。若已出而發。驚者曰逆驚痘。不治。痘起稠密無縫。紫黑成片而發。驚者曰驚搖痘。不出六日死。痘出雖有縫。粒密而色昏者。曰數次痘。不治。痘出不圓不起。頂紅根白者。曰頂紅痘。不治。痘空處有雲頭紅色者。名夾斑痘。治之而斑退痘起者吉。否則凶。痘空處細密有頭粒者。曰夾疹。痘稀而疹先退者輕。痘密而疹不退者重。痘出大便秘結。而痘瘡朗朗紅活者。曰關門痘。不妨。痘瘡不成膿。而內瀉痢者。曰伏陰痘。治宜溫裏。痘瘡紅潤。而引飲渴不止。及狂言譏妄者。曰向陽痘。治當涼解。痘瘡正出。而胸膈高腫。

醫通卷十二

痘形

李一思得堂藏

內不寬者。曰結胸痘。下之生遲則死。周身皆收。屬脫痲。顛頂一粒紫大不收者。曰錫頂痘。二十日外。必發驚而死。亦有周身痲脫。正額一粒潰而不斂。至月餘作癰。破出臭膿。聲啞悶亂而死。有周身痲脫。頭上一粒不收。至四七日忽瘳甚出蛆。聲啞悶亂而死。皆鶴頂之類也。有收屬脫痲之後。忽身發火熱。舊痲愈處重出一番。痘瘡變聚。腫痛愈加者。曰椅杌痘。此毒蓄管衛。急宜涼血解毒。當順風寒。節飲食。否必毒邪攻迫。腹脹潰爛。陰陽不分而死。痘皮薄破爛者。曰淫痘。大劑補脾燥濕。間有生者。切禁黃耆。以其反助表淫也。痘一出如豆。殼水泡。兼腹瀉不止。曰水患痘。不治。痘起脹而與肉齊平。雖有黃漿。根血紫滯者。曰板黃痘。亦名延日痘。雖痲盡脫。而日漸枯涸。延至月餘多死。痘四圍平塌。潤滿中。

間一點色白。曰點者。曰蟬巢痘。必死。痘出數粒成叢。平塌不起者。曰蟬峰痘。治之起發分額者吉。否則凶。初起發時。瘡頭便帶白漿者。曰疲癆。不治。痘點見於下頤。或耳下眉心。若白頭如蟬。漸乾枯倒陷者。曰白關痘。三四日死。若報點如丹。漸乾焦紫黑者。曰紫關痘。五六日死。若喘脹。衄血便血者。曰緊關痘。二三日死。痘周身皆白。內空殼一聯者。曰蛇殺痘。難治。若變臭者可治。痘瘡至漿來而潰爛。臭不可聞者。曰臭痘。無妨。臭而裂者。為外創。不治。痘稠密不能起發。灌漿六七日。間忽瀉膿血者。曰瀉漿痘。此證多有生者。雖危不妨。痘初起時先澤。至四五日反不起。而伏陷。將發虛寒者。曰伏陷痘。急當扶裏為主。痘雖起發灌漿。漿未足而忽然乾陷者。曰倒靨痘。多危。痘出既紅。忽然變白。更加寒顫。

醫通卷十二

痘形

李一思得堂藏

咬牙者。曰寒。當助表養血。亦須防過。二十四朝方可無事。若先出紅澤。遙遇婦人經事所觸。而發灰白色者。曰血厥痘。急覓月月紅花或菴葉煎湯調紫草茸末一錢。匙入酒釀服之。緩則難救。

異痘

夫痘有似凶而吉者。似吉而凶者。不可不辨。如諸痘不起。而天庭曉星起。灌者吉。諸痘壯起。而天庭曉星不起者凶。諸痘不起。而太陽獨起者吉。諸痘壯起。而太陽不起者凶。諸痘不起。而耳邊方圓寸許獨起者。腎經旺也。吉。諸痘壯起。而耳邊方圓寸許不起者。為腎敗也。不治。遍身俱起灌。惟左耳下外。而有兩三粒不起灌者。肝腎毒盛。定作盾裂齒乾。宜急救之。凡頭面四肢密者為險。若得地角有數粒如珠者。為

順諸痘俱好。地角獨伏陷乾枯。或灰白不起者。為通。痘偏身俱陷。惟尻骨飽滿如珠。此腎藏有精。補托灌漿即愈。面部俱稀。而鼻梁左右密如蠶種者。毒聚於胃也。危。面部俱稀。而口角有黑痘一粒獨大。或兩邊有兩粒者。為關門疔。初起可救。五六日不治。痘出遍身稀疎。惟項下稠密一片至順者。名鎖項托。順不治。若喉頭太多者。急用山豆根牛蒡子黑參木通甘桔芎歸生地荆芥葶藶之運則毒結咽喉。不收矣。初見標時。胸上臍下俱有。中間一橫。此脾胃虛。急用參耆歸芷厚朴紫草木通防風葶藶之七日之外難矣。痘出遍身斑斑成片。如打傷痕者。不治。痘標既完。手足胸背俱多。而頭面無者。氣血不能上升也。急用升麻芎歸甘桔防芷蘇葉而胡加薑服之。五日後不治。曲池生瘰而死者。過身

血紅。惡以犀角地黃湯加白芍治之。血黑不治。痘本稀少。四五日起發。六七日收。腐而赤。九日而痂落。此氣血充足。毒少。故隨出隨痂。不及作膿也。最佳。瘡雖起發。四畔又出小痘。攢簇如粟米。不待長。多潰爛。必加搔癢而死。瘡頭有孔。膿水漏出。堆聚乾結。或清水自破。水去乾黑者。不治。痘發漿泡。而人中平滿唇翻。腹脹氣急者。不治。痘發漿漿。泡切忌損破。漿臭後猶或可治。破則不治。其形如豆殼。灰白全無血色。擦破血出無膿。不治。痘已出齊。紫色不起。不漿。如浮萍貼於肉上者。不治。如微微高起。肥出有血。急以涼血解毒之劑救之。黑痘多屬血熱。本為惡候。然形狀多端。宜隨證解救。紫黑點子。隱於皮膚間者。用人牙燒灰豬尾血酒釀調五七分。量入大小。與之。初出便見黑點。急用紫草茸三錢酒煎服。或形如瘰。或如牽牛子。或如煤炭。或青紫成塊。皆為寒閉熱毒。宜化毒涼血。荆防蟬蛻紫草黑參木通連翹輩救之。熱甚加黃連。黑而軟大者。氣弱毒盛也。保元湯加紫草。已上諸證。竭力圍成。或可十全一二也。近看知水蓼花遠望如胭脂色。清水不能成漿者。不治。先見標一二點於面部。或口唇上下。周身俱無。如常起。應灌漿收。此為報痘。不知者以為木痘稀少。以火照之。紅點隱隱藏於肌肉之內。急宜托裏解毒。其痘齊出。否則願下發。雖毒而成。不救。

逆證

痘瘡不治之證。總勉強用藥。終無生理。初出時從天庭司空太陽印堂方廣等處發出。或如蠶種。或如魚鰾。或如點朱。或如墨。或青黑紫斑。或肌肉有成塊處。或有青脫。或紫黑

乾枯或遍身有癰疹。或如玳瑁。或頭面一片如臙脂。或初出紅點帶紫。或夾斑如錦紋者。俱危於四五朝。遲則不過六七朝也。若見青斑者。傾刻危矣。若遍身不起。俱發紫黑斑點。或初起頂陷連肉通紅。或如沸無縫。或薄如竹膜。摸之便破。或如蛇殼。如魚皮。頂陷如羊眼。赤亮如湯泡火燒。或腰腹作痛。上下出血。或如松糕。或片連貫。眼合無漿者。俱危於七八朝。遲則不過十朝也。若四五日間。面目浮腫而瘡不腫。其痘黑陷紫陷。或灰白。或發紫泡水泡癰者。危於十一二朝。其泡刺破。出黑血黃水者不治。若四五日諸痘未灌漿。脣上有瘡。先黃火於針挑者不治。若五六日內。痘白而腫。光亮如水。根脚不紅。或聲嘶氣急。或鼻陷齒齦。或目閉忽開。露白無神。不省人事者不治。若六七日不能灌漿。但空殼乾枯。全無血水。搔破無膿血而癢場者。十二日死。有膿血者不死。二三日根窠不分。紅腫如瓜。或如冷粥結面。或如肝蠶之形。或如油光黍米。內有紅紫。或頂陷有眼如鍼孔。色紫黑者。俱不治。若兩頰兩頰多致成片。如塗朱者。此肝乘脾。當十二三朝不食而危。若七八日間。陷伏焦紫乾枯。不能灌漿。或咬牙寒顫。譫語狂躁煩悶。冷水錯喉。在七日前見者難治。或目閉口中臭爛成疳。延及內外者不治。或七八日後。腹脹氣喘。有痰如拽鋸。喘哭不止者。可治。無喘哭者不治。或咳嗽薄易破。抓塌成餅。堆聚如雞屎。泄瀉不止者不治。或瀉下如豆汁。或便膿血。或乳食不化痘爛。或口臭唇焦。或目閉反開者不治。或不時噁氣。如欲大便狀。或胸高突起。神昏悶亂。或舌卷髮縮。咽腫不食。或蹠脚不伸。或憎寒四肢逆

冷。或目閉腹脹。厥冷過膝。或先痘後驚。連發搐不止。及痘後慢驚。目無神而色奇者。皆不可治。當屬癰場無膿。皮如血殼者。必發寒顫咬牙口紫而死。婦人經水不止。或墮胎下血。身大熱不退者。並不可治。凡發熱時。頭溫足冷。皆悶如癡。渴飲不止者。其痘必危。凡腰下見點。腰上不出者不治。凡斜視之臉如橘皮。不分肉地者死。起脹時色白如飯。平塌不起者死。若此者。乃毒盛血枯。不可認以為虛寒之候。至如可畏之證。附列於後。如不食。或多渴寒顫困倦。脾虛也。憂齒緊牙。腎經熱甚也。煩躁體熱提頭。肝熱生風也。吐逆泄瀉。乳食不化。便膿血者。脾胃虛寒。毒入大腸也。瘡作黑坑。內無膿血者。腎熱脾虛也。大小便瀉。口渴者。心肺熱也。喘急痰盛者。肺熱甚也。已上可畏之證。內犯一二用藥得効者生。不効者死。若犯三四證。必無生理也。諸證頭疼可治。目閉初起不治。八九日無事。十三四日凶。咳嗽無事。氣急初起無事。八九日凶。提頭初起雖凶。可治。八九日後。不治。聲啞初起難治。七八日可治。痧落後凶。兼喘急不治。或哭泣聲啞。色澤者可治。色晦者不治。喉痛初起可治。痧落後凶。譫語初起重。痧落後凶。心胸痛不治。腹疼初起無事。痧落後凶。腰痛初起及痘中凶。十四日後無事。項不能舉。天柱折。雖結痧乾。二十日外必凶。十指冷。脾虛者可治。毒盛者不治。手足搐不治。手足痛初起凶。八九日無事。足冷過膝不治。眼耳出血不治。鼻衄無事。吐血鮮紅可治。紫黑不治。尿血不治。大便

血可治。吐黃水腹不疼無事。吐清水無事。吐濃痰無事。吐臭痰不治。吐痰初起不治。起長寒顛初起不治。七八日後亦不可治。咬牙初起不治。起長時凶。七八日後可治。泄瀉清血可治。泄瀉黑水藏府壞也不治。此就初起吐一。一。多則凶。十四五日吐山即死。便出多者亦凶。燥渴結痼後凶。不食結痼後凶。餘毒盛也。

看法

朱濟川曰。醫以認證為要。凡一人門。必先知其家貧富何如。時月炎冷何如。兒之稟賦何如。形色善惡何如。脈診微盛何如。肌膚老嫩何如。痘出稀密何如。部位順逆何如。氣血虛實何如。表裏寒熱何如。聲音清濁何如。口舌燥潤何如。睡卧安否。如何如舉止動靜何如。飲食多少何如。二便堅利何如。又有凶中藏吉。吉中藏凶。不可不辨。審此數者。隨宜而治可也。

醫通卷十二

附錄 看法

主 思得堂藏

用藥

痘瘡者血毒也。治宜活血為主。故紫草紅花不可少。紅甚便滑則忌。山楂散血消積。胃虛不能食則忌。甘草解毒和中。中滿則忌。陳皮健脾行氣。白汁則忌。大腹皮利水治脹。發散則忌。牛蒡子疏風潤色。消發通肌。泄瀉則忌。木通疎利膀胱。溺多則忌。訶子烏梅止渴。渴飲汗便實則忌。參未扶元益胃。血燥毒盛則忌。升麻葛根升發開提。痘密汗多毒盛裏實則忌。羌活白芷敗毒追風。氣虛則忌。歸身活血補血。血熱黑爛則忌。芍藥地黃涼血助陰。血寒不發則忌。辰砂定神除熱。煩灰白不發則忌。糯米煨胃實脾氣。帶則忌。防風散風解熱。氣

醫通卷十二

附錄 用藥

主 思得堂藏

禁忌

熱起。便以絲瓜近帝三寸。連子燒灰存性。加辰砂酒服。可使痘稀。見點則忌。每年端午日服之。服久可使不出也。
痘瘡自初出至收靨時。藏府俱虛。外邪易觸。飲食易傷。必須避風寒。調飲食。日用胡荽紅棗大黃乳香焚之。若血熱毒盛。禁燒胡荽紅棗之屬。恐變煩渴焦癢之患。如煎油炒豆殺牲腥血。硫黃腦麝諸香。葱蒜薑椒之氣。及孕婦月經房事淫氣。僧尼孝服生人。及鐘鈸金器之聲。俱宜避之。勿令洗面。恐生木損。眼故也。眼鼻勿動。其熱則無眼。吊鼻鼻之患。行坐勿令太早。免致疲癆脚痛之虞。能食者與神魚白鯊之類。切不可與生冷瓜柿梨橘韭菜醋醬椒蒜雞鶩椒薑辛辣等物。雞子。害目。亦不可食。近世多用鮮鮮魚發痘。若脾胃虛寒者。誤

與每致泄瀉不食。如天大寒。蓋覆常宜溫煖。恐毒氣為寒所滯。則痘不能生發也。如天大熱。勿使客熱與毒相併。致增煩躁。潰爛也。其麻疹比之出痘。固輕。然調治失宜。風寒不避。禍不旋踵。一切辛辣。厚味。助火酸收之物。咸須禁食。如酸醋胡椒豬肉核桃。及梅杏櫻桃。梨柿等類。若誤犯之。則有伏患。焦紫喘脹聲啞而難救也。誤食雞則終身肌膚栗起。誤食糖霜。多發疥蝨。必俟兩月後。方無禁忌也。

麻疹總論

麻疹者。手足太陰陽明二經蘊熱所發。小兒居多。大人亦時有之。是亦時氣傳染之類。其發熱時多咳嗽。多嚏。多嘔。眼中如淚。面浮腮赤。多瀉多痰。多熱多渴。多煩悶。甚則躁亂咽痛。唇焦神昏。通身紅赤。起而成粒。勻淨而小。斜目視之。隱隱皮膚之下。以手摸之。磊磊肌肉之間。其形若芥。其色若丹。以其陽氣從上。故頭面愈多者為順。法當清涼發散為主。藥用辛散以升發之。涼潤以清解之。切忌酸收。凡動氣燥熱。及一切溫補之藥。慎不可犯。誤用禍不旋踵。辛散如荆芥薄荷前胡葛根麻黃石膏鼠粘子。涼潤如黑參枯蕒根。鹿麥冬生甘草。芩連貝母連翹竹葉。皆應用之藥。又當隨所發月時。量兒大小。及見證輕重。而為制劑。若漸出漸收者。其勢雖輕。而熱尚未平。須防喘急。若連綿三四日者。其勢雖盛。而熱已發泄。必無他變。宜大青湯或消毒飲加黑參石膏麥冬竹葉。若發熱時。獨身汗出。或咽血者。此毒解也。勿遽止之。若汗出太多。血流不止。當以清肺湯去欬冬杏仁加麻黃根以斂汗。犀角地黃湯以上。血遲則氣虛神耗。為難治也。若發熱時。或嘔吐。

醫通卷十二

麻疹總論

思得堂藏

或自利者。此火邪內逼。毒氣上下行也。俱宜清熱解毒。利小便。切勿止瀉。大凡疹證發熱時。未有不渴者。但當與黃豆燈心湯。勿與冷飲。致成水瀉。多生變幻也。即痘腥酒麪生冷水。果咸須禁之。麻疹多有熱痰在肺。初發時必咳嗽。宜清熱透表。不得止嗽。疹後咳嗽。切忌辛溫酸滯。但用清咽滋肺湯以清餘熱。痰壅自愈。多喘者。熱邪壅肺也。切勿定喘。惟應大劑竹葉石膏湯去半夏加貝母黑參薄荷。如冬天寒甚。麻毒為寒鬱於內。不得透出。而喘加蜜酒炒麻黃。一劑立止。夏月熱勢甚者。即川白虎湯加竹葉。忌用升麻。誤服必喘。然喘為肺氣壅遏。故喘必兼嗽。而張口擗肩者。肺氣不通。不治也。豈有喘而致嗽者。可察喘而不嗽者。難醫之語。又其證多泄瀉。慎勿止瀉。惟宜芩連葛根。則瀉自止。疹家不忌瀉。瀉則陽明

醫通卷十二

麻疹總論

思得堂藏

之邪熱得解。是亦表裏分消之義。又有疹收之後。飲食如常。卒然心腹絞痛。遍身冷汗如冰者。此元氣虛弱而中惡氣也。朝發夕死。勿妄治之。凡麻疹以鮮明似錦為吉。黑晦如煤最凶。頭而不山者重。紅紫黯慘者重。咽喉腫痛不食者重。黑黯乾枯一出即沒者不治。鼻扇張目無神者不治。鼻青黃黑者不治。牙疳臭爛者不治。疹之牙疳最為難治。外用無比散吹之。內服加味清胃散更加荆芥石膏。緩則不救。疹中諸患。不宜依證施治。惟當治本。本者手太陰足陽明二經之邪熱也。解其邪熱則諸證自退矣。有次痘而出者。此毒氣太盛。故一齊湧出。不必治疹。但當托痘為生。然治痘宜溫。治疹宜涼。此又不可不審。大人男婦出疹。當與外感並治。惟清涼解表。隨天時寒暑施治。凡麻疹並作。藏府風熱交患也。疹乃風邪。

外感痘爲胎毒內發二者相雜亦最難辨多有誤認痘出太密而委之不救殊不知其爲疹夾痘也當與化斑湯續續頻進麻毒解而痘自起矣○有種行漿疹子極似痘最難看然痘則必有頂盤疹雖有漿而頭粒必不堅根盤必無紅暈也疹後痘不結痂乃元氣虧損當大補脾胃爲主不可誤認邪熱未盡復與清熱退火之藥

例治四十則

麻疹俗名痧子浙人呼爲瘡子麻病風熱人或未知痧之與瘡字學不收皆土音習俗之訛耳原其證之輕重今昔懸殊吾吳水土濡弱之鄉生氣最易萌動故麻疹之發自始至終不過二三日即安從古迄今靡不皆然邇來風氣變遷有似北方氣候即尋常麻疹必六七日乃化消若熱勢未盡或觸

醫通卷十二

例治

生一思得堂藏

風寒或犯飲食變證百出其危有甚於痘者因通致方書從無麻疹專學間有一二及此無非附見痘疹之末一皆簡略不詳何怪兒科之莫能舉措且以痘方混治曷知麻屬陽陽從陰化故外山內沒而不聚痘屬陰陰從陽化當外疎內托以助膿二者相去天淵焉可不辨然皆爲嬰孺說也但今不特嬰孺少壯每多患此雖常參詳診切仍不能舍此繩墨而臨證之機活法在乎心手繩墨又不可拘也予聞扁鵲入咸陽秦人愛小兒卽爲小兒醫予由是隨時兼愛曲盡一貫之道爲麻疹特開生而云

發熱○麻痘之初必由發熱但痘熱不過二三日卽出麻熱有六七日或半月乃出或乍涼乍熱或壯熱經日不退始熱之際必見面赤眼腫多涕淚欬嗽連聲是其候也熱甚經日

不退曰壯熱惟正出時爲正候若初發壯熱至已出而熱不少衰者其證必重清熱透肌湯出盡而壯熱不退者竹葉石膏湯去半夏加荆芥黑參沒後而壯熱不退者危意需涼解爲主其有熱數日止而復作者有早熱而暮退者在初發時爲熱邪未透葛根解肌湯正出之際而煩熱轉甚乃邪熱未解而復內攻也清熱退肌湯沒後見者爲餘邪未盡四物湯換生地赤芍加連翹黑參亦有麻退身涼越六七日而復熱者非餘熱未清卽復感風邪當以急消息或因大病之後中氣虛而然者治本爲要臨病之機不可不審也

部位○麻屬府候發則先動陽分而後歸陰經一身之中陽部宜多陰部宜少陽部宜透陰部即不透亦可無礙若陰部多而陽部反少不透者爲險防有他變陽部者頭面背四肢

醫通卷十二

麻疹發熱

部位

生一思得堂藏

向外者皆爲陽陰部者胸腹腰四肢向內者皆爲陰也凡發自頭至足爲齊頭面多者爲順先從胸腹煖處起漸發四肢者順如從手足起漸發胸腹背者逆

形色○色貴紅潤形貴尖登若色雖紅潤而不起二便艱澀者清熱透肌湯如色淡不起二便如常此屬本虛兼當培養氣血亦有色黯不起大便秘結脣舌燥赤者爲火邪內鬱白虎湯加黑參荆芥其有色白不分肉地惟點粒高聳時卽沒者邪熱本輕也然有表氣本虛而色白者調養溫煖越一二日自變紅活也若正出時爲風寒所遏而色白如膚必毛竅竅粟葛根解肌湯或瀉出成片一被風寒便變爲白身不發熱而反內攻煩躁腹痛痰喘氣急者危如毒攻於胃則嘔吐清水攻於脾則腹脹不食攻於肺則鼻塞喘促攻於心包

則唇舌焦燥。不省人事。搥頭掣手。攻於腎肝。則變黑而不救也。若色紫赤而黯。是火毒熾盛。頂起者可治。宜涼血飲子。識語煩躁者。黃連解毒湯調益元散。枯燥不起者。難治。若頂粒焦者。無論紅淡。皆為熱刺之候。並宜白虎湯重用石膏。乾燥無汗。加麻黃以汗之。大便秘者。涼膈散下之。亦有發如雲頭大片。其形有二。一者大片嫩赤。一者大片之上復有小紅點。皆火邪熾盛所致。白虎湯加黑參竹葉。若麻出斑爛如錦紋。或出膿血。腥臭不乾。心煩頭悶。此清水。身溫熱者。白虎湯加黃芩茅朮。若初發時有似斑而者。乃風寒在表。而感癰疹。宜疎解。俟癰一透。其疹自退。切勿誤認為斑。而與苦寒之劑。致癰內陷而難救也。

醫通卷十二

癰疹形色

癰疹

癰疹

癰疹

欬嗽。癰疹乾欬連聲不絕。是火邪凌燥肺金所致。然欬則

毛竅開而癰易出。故未出之先。最喜欬甚。發透其欬自己。若出盡及沒後而欬仍不止者。清咽滋肺湯。欬嗽多痰。去麥冬。加橘皮茯苓。其有屬風寒。欬嗽煩悶。嘔逆清水。眼赤咽痛。口舌生瘡者。甘桔湯加蒼朮。沒後見者。人參白虎湯去知母。易麥冬。以滋化之。

汗。癰發之際。常宜微汗。微汗則肌腠疎豁。而邪易透。不可復用升發。升發恐汗大泄。不無亡陽之慮。其有隱隱不透之壞證。用糠升發。得大汗而解者。此特語其變也。若壯熱無汗。而皮膚乾燥者。必風寒壅滯難出。多成內攻之候。或腹脹痛。或發喘促。宜與葛根解肌湯。冬月越脾三拗選用。但不可過劑。亦有因熱極火鬱。皮膚乾燥而難出者。必致唇舌燥裂。二便秘瀉。壯熱昏沉。或身體脹痛。喘促痰鳴。無論何時。意宜白

虎湯加黑參牛旁苓。梔竹葉之類。大抵癰證當以微汗為順。若如終無汗。雖沒後不無餘咎。其治法不逾此法也。

癰。癰疹初起而多嚏者。是內火因風。散傳而然。正出時有嚏者。其候必輕。如沒後尚有嚏者。邪熱盡解。可無餘患。夫如嚏而多涕者。濁壅得泄。肺氣自清。最為吉兆。若無嚏而鼻塞不通。必有風邪留滯。宜辛涼之劑以透達之。

嘔吐。癰之初起。吐瀉交作者。順乾霍亂者。欲吐不吐者。嘔吐是胃中熱邪不得發洩而作。梔梔湯解肌湯正出及正沒時見者。消毒飲加枳實黃連。多痰者。更加貝母。枯姜根。若沒後而嘔者。脾胃虛而熱滯也。石斛清胃散。其有嘔而吐。或

者。胃中痰熱膠固。無所養而上竄也。能食即定。如嘔出多而不能食。為胃敗。不治。

醫通卷十二

癰疹汗

癰疹

癰疹

泄瀉。泄瀉為癰疹之常候。熱邪得以開泄也。發熱時瀉而黃赤稠粘。小水短澀者。屬熱。四苓散加水通滑石。已出人參。白虎湯去知母。易麥冬。其證必多發渴。渴甚不止。熱甚不退。雖數劑無効。如瀉下清稀白沫。腹疼喜得瀉者。屬寒。胃苓湯去蒼朮。加煨薑。瀉利窘迫而腹痛脹滿。或發氣如敗卵者。為飲食停滯。枳殼湯加枳實木通。大抵癰疹泄瀉。屬熱者多。屬寒者少。辨治宜早。不可令其瀉久。瀉久則正氣下陷。或成腫滿。或變下利。並宜枳實理中之類。以理脾胃為主。癰後瀉利不止。口渴目閉。四肢不溫者。不治。嘔吐不食。洞泄不知者。不治。

目。癰疹發熱之時。眼光如水而多眵淚。或白睛微紅。此正候也。若沒後猶見紅赤。為肺經風熱未盡。瀉白散加荆芥薄荷。

荷黑參牛旁。閉不欲開。更加連翹木通。赤而腫痛者。風熱上壅也。導赤散加荆防黑參。若為風熱所侵。而眼眶赤爛者。柴胡飲子。急須治之。否則為終身痼疾。

發不出。初起發熱。欬嗽。渾身脹痛。有似發寒之候。惟乾欬連聲。目赤多淚。嘔惡便溏。確為痲疹之驗。若將發之際。或為風寒暴襲。或因肢體坦露。寒鬱熱邪。不能外出。此全盛之勢。未萌與出後沒早不同。如氣粗喘促。腹中脹痛。煩擾不寧。而不得出。急與麻杏甘石湯。或越婢湯去棗。重用石膏。輕則升麻湯以升發之。若因觸犯霧露風寒。隱現不能發出。以新猪矢冲湯。隔簾蒸之。冷則更添滾者。并取猪矢燒灰。葱白湯下。二三錢。乃痘瘡黑陷。用燒人矢之變法。即燒人矢亦能發之。發之仍不出者。神丹不能復圖矣。按古方痲疹。升發劑中。

醫通卷十二

痲疹目 發不出

思得堂藏

多用升麻。易知升麻性升。能升動陽氣。每致邪熱上浮。而作喘通。當以紫蘇葱白代用。非特升麻當慎。即桔梗初起。亦須酌用。恐其載引濁氣於上也。蓋痲疹宜涼宜潤。一切辛燥之味。咸為禁劑。用藥之機。可不為之慎重乎。

透表。痲疹無間。大小細小。必得透表。可無後患。其有一種。匪潤嫩赤成塊。塊上復有小粒平塌不起者。亦有一片如風毒。偏高紅腫。但頭粒不尖。二者雖透。其中必有熱邪留伏。防有他變。並宜竹葉石膏湯去半夏。以滋化之。縱有餘熱。從此潰散矣。

不透表。痲出而皮膚乾燥。毛髮疎濇。不能透表者。風寒鬱遏也。越婢湯葛根解肌湯。隨輕重取用。其有表虛不勝疎透者。一味葱白濃煎。時時與之。但得微汗。即解。若頭粒隱隱紅。

紫一片。而不透表者。火毒熾盛也。白虎湯加荆芥黑參。如肌膚不燥。膚色淡白。二便如常。而不透者。中氣本虛也。消毒散加連翹木通車前茯苓。雖有微熱。不可輕用寒涼。即用峻劑升發。亦必不能復透。但當解利。使之內化為主。亦有胸背腰腹。煖處起發。而紅頭面手足。乍有乍無。此蓋必經綿難已。且有沒後五七日。復發如前。兩三次而愈者。此氣候之異。當非不透之比。祇宜辛涼透表。漸次向安。欲求速効。轉有危殆。

沒早。痲出未經三日。或為風寒外鬱。或熱邪內陷。或誤食酸收之物。一日半日即沒。周身煖處。絕無紅影。終身危候。若雖沒早。肌膚煖處。尚未全沒。急需透表發之。不起。即當審其所觸。而與內解。如外為風寒所遏。邪反內攻。而沒早者。消毒飲加葱頭熱服。復透者吉。甚則加麻黃穿山甲。或越婢三拗。

醫通卷十二

痲疹變汗

思得堂藏

選用。若不急治。必喘脹而死。亦有偏身青紫。熱腫喘脹。氣急此毒滯血凝。半匿肌表。急投涼膈散。去芒硝。加麻黃石膏。以發越之。若腹脹喘促。溺瀦。胸突者。涼膈散加薄荷。庶幾可救。一二若內挾痰熱。大毒入劇。而伏匿煩躁。或腹脹喘急。不省人事者。白虎湯加黑參竹葉。若誤食酸醢收斂之物。伏匿壯熱。喘咳煩悶。以豬膽汁製甘草煎成。續續與之。得吐微汗。為効。或生甘草煎湯。灌之。亦能取吐。吐中使有發越之義。誤食羊肉。喘脹氣急。枳殼湯加山楂。以下毒之。誤食核桃。喘咳聲啞。消毒飲加石膏馬兜鈴。若得熱退身安。氣息漸調者。方可無慮。或大病之後。或洞泄不止。中氣本虛。不能發越。而沒早。惟當健運中氣。畧兼解表清熱。若沒後遍身搔癢者。露風早也。消風散以疎解之。

渴。渴乃肺胃熱盛之候。脣口必紅。二便必黃。冬甘露飲若二便清利。脣色不紅而但渴者。此必寒涼太過。脾虛不生津液而作渴也。七味白朮散去木香加桂木渴而煩躁者。是熱邪凌燄心包。白虎湯加麥冬竹葉。正渴時竹葉石膏湯去石膏而服者。本虛實滯爲難治也。

喘而喘者熱氣起肺鬱氣道阻塞而然其證有虛實之分

虛者難治實者易治。虛則小便清利大便溏泄。身無大熱。雖清痰潤肺多難獲効。實則大便堅燥小便赤澀。身發壯熱。竹葉石膏湯。大半夏加葦仁貝母。冬月量加薑炙麻黃。隨手而應。若喘而無痰。兼之鼻扇者。不治。大抵未化而喘者易治。沒後喘者難治。初發之時喘者。三拗湯加石膏芽茶。喘而鼻乾口燥者。白虎湯最捷。若見於瀉後。又宜清瀉。滋肺湯以滋肺胃。白虎湯又爲切禁。故曰。醫不執方。活法在人耳。

氣促。氣促多緣肺熱不清所致。初發正出時見之。清熱透肌湯在正沒沒後。清咽滋肺湯如喉中有痰壅塞而喘者。孰邪阻逆不得發越也。見於初發正出之間。陰熱清肺湯。正沒沒後見者。必邪熱未透。或露風沒早。餘熱內攻。而肺氣受傷也。難治。

搗。搗爲痰熱聚於心包。見於初發未發之時。清熱透肌湯加葦仁竹葉。沒後見者。難治。祇宜輕清之劑。調之。不可誤用金石。痰涎壅盛者。一味瓜蒂湧吐之。若搗無名腫。或目嚙指者。非真搗也。此爲正虛。不能上持。必死不治。蚬。蚬者。火邪熾盛。血隨火越。上行而溢於頭。瘡疹初起。是爲順候。其熱得以開泄。不治自己。若蚬之不止。或失而者。犀角地黃湯加荊芥穗。正沒及沒之後。蚬仍不止者。四物湯加茅根麥冬。以滋降之。

譴妄。譴妄是熱邪熾盛於心包。若發熱正出時見者爲小
醫通卷十二

邪內伏不得透表而致白虎湯加荊芥鼠粘子甚則加麻黃以發越之在正沒沒後並宜竹葉石膏湯去半夏加生地黃以清解之

咬牙。痘證咬牙。有寒熱之分。麻疹咬牙。皆爲熱例。乃陽證於陰。故多發渴而手足熱。喜飲冷者。麥門冬湯加丹皮。若手足不熱。而反厥冷。喜飲熱湯。此爲熱邪內亢。後必下血。咽喉作痛。痰鳴而死。卽與白虎湯。多不可救。

唇燥。唇燥多屬脾胃之熱。淡而燥者其熱輕。赤而燥者其熱深。紫黑而燥者熱劇而重也。隨輕重以清潤之。唇舌破裂。唇舌破裂者。心脾之火上衝也。其色必多深赤。初發正出時見之。白虎湯加苓連黑參。荊芥薄荷。若正沒沒後見者。爲心脾俱絕。及紫黑枯燥而血不活者。皆難治也。

口氣、口氣穢濁。乃熱邪蘊隆於胃。清胃散加石膏連翹生甘草。其有臭不可聞者。此胃敗也。不治。若其人本有是證。不在此例。

舌胎。舌者心之苗。麻木火候。心屬於火。故舌多有胎。白為肺熱。黃為胃熱。但當清解。利更急。小兒有為施治。純黑為心絕。黑而澤者。熱淫血分。黑而燥者。熱極。小兒皆為危候。並宜白虎湯。淫者加生地黃黑參。燥者加麥冬。竹葉。黑色漸退者吉。不退者死。

口疳。牙疳。齒爛。是熱留陽明。餘毒上衝所致。加來霜胃散。加石膏荆芥。大便秘者。當與散微利之。外用藥搗白皮煎湯。漱淨。以無比散。或燒鹽散吹之。如通眼色白者。自外延入內者。無膿血者。齒落口臭者。喘促痰喘者。皆為不治。若滿口屑。

麻疹口疳 舌胎 便毒 思得堂藏

舌黃赤白爛。獨牙。雖無恙者。此為口瘡。非牙疳也。亦胃中餘熱未盡。毒壅上焦。二便必多艱澀。導赤散以瀉心脾之火。外以綠袍散敷之。

腹痛。腹痛之由不一。總為火毒內鬱。或風寒壅遏。或飲食停滯。皆能致痛。於發熱正出時。風寒壅遏。毒反內攻。而腹痛者。急與疎表。毒透自已。若飲食過傷。腹滿脹痛者。力為消導。其痛自除。時常正沒沒未盡。而腹痛者。兼清中外。而痛自止。沒後見者。分利除熱。其痛自愈。又須驗其有無他證。屬虛屬實。而與治之。若熱邪內結。而腹痛者。通利大便為主。有後後脾氣不調。而致腹脹。面目四肢浮腫。分利小便為要。至老元氣大虛。陰陽不能升降。小水不利。遍身浮腫。喘促兼見者。難治。

便秘。大便秘結。火壅血燥。而耗津液。麻疹大非所宜。無論日期前後。速宜清潤。四順清涼飲。甚則涼膈散。以通利之。慎勿遲延。恐麻變焦。紫而難救也。大抵麻疹自出至沒。二便俱不宜秘。秘即微利可也。

溺瀉。小便赤澀。在初熱正出時。熱邪滯滲。是為正候。沒後見之。為餘熱下。匿勝。脫導亦散。加麥冬以滋氣化。利之。仍不通者。必大便秘鬱之故。大便一通。小便自利。

痢。痢之作。痢為熱邪內陷。在正沒或沒後。而痢下色白者。黃芩湯加防風枳殼。下膿血者。白頭翁湯去黃芩。加防風。或因食積而滯下者。枳殼湯加槿蘗木通。腹中作脹。時痛時止者。厚朴湯。亦有瀉久而成痢者。乾薑黃芩。黃連人參湯。自始至終。痢不微者。必有風毒留滯於內。則宜解毒行滯而兼疎。

醫通卷十二 麻疹下痢 痢 不食 思得堂藏

風實脾。熱幾克。應如痢下紫黯如癰。如屋漏水。如雞肝色。如黑豆汁之類。加之氣喘躁渴。熱甚發所。此為不食。麻色紫者。皆死不治。

下蟲。下蟲多見於沒後。此以胃熱少食。蟲不能安而下也。與過食傷中。蟲不能容而下不同。但須調其飲食自愈。非上出之比。不須治之。

睡。麻疹正出時。精神困倦。沉睡不醒者。為逆。蓋緣正氣虧損。邪火內鬱。正氣不勝所致。若沒後而沉睡不醒者。為氣血俱虛。補脾養血為要。如沒後煩躁而反不得寐。是餘火復燃。急當滋陰。陰虛陽自散。亦有昏睡不知起止。搖其夾車合谷。不知察痛。似寐非寐。無問正出沒後。良非吉兆。當察其兼見何證。而與施治可也。

不食。不食是胃中邪熱熾盛。不可強食。雖數日不食。亦無妨害。在初發正出時。白虎湯加荊芥。麻透熱清。自能食也。沒後不能食。石斛清胃散。涼加捷運之味。元氣委頓者。急需培補。防有虛糜之患。

鼻扇。鼻扇者。肺將絕也。若兼喘滿。此必不治。如咽喉清利。無喘滿而精神不減者。可治。宜滋培肺氣為主。沒後見者死。

胸高。痲疹胸高。肺熱熾盛而脹也。多見於正沒沒後。為肺經壞證。不治。

身冷。痲為肺胃邪熱所發。本屬於陽。肢體常宜溫暖。若反清冷如冰。是為逆也。其有沒後遍體溫涼如故。獨下體厥冷。過膝者。為腎敗。不治。如初出。屢已下不熱。毒不能透。而反漸

醫通卷十二

痲疹身冷 肺病 虛寒 思得堂藏

者。亦為逆候。當溫養脾胃。或有得生者。

痘。痲屬火候。最易墮胎。若初發正出時。須驗其色之紅淡。熱之重輕。而與疎解。疎解之中。佐以清涼。滋血安胎。為生四物湯加條芩。艾葉。荆芥。紫蘇之類。若胎氣上衝。急用芎根。艾葉煎湯。磨檳榔。續進以降之。一切實脾行氣溫燥之藥。既

痲疹。復傷子氣。成須禁之。

虛。痲患既平。形體羸瘦。精神倦怠。飲食減少。或欬嗽不止。或便泄不已。或身熱不除。皆與元陽損。恐成勞瘵。並宜雙和湯去川芎。以和之。嗽加橘紅。貝母。欬加麥冬。百合。瀉加白朮。藕。食難消化。加砂仁。穀芽。氣血俱虛。合四君子湯。隨證調之。切禁寒涼。犯脾胃之藥。專力資培。緩圖平復可也。痲瘡。瘡後發。多緣生冰。深浴太早。水氣留泊肌腠。而發。

但須日以荆防艾葉煎湯洗之。勿用生水。亦不可用瘡藥重塗。失治。必每歲依期而發。雖云小疾。亦須慎之。

水痘

水痘者。色淡漿稀。故曰水痘。色赤者。曰赤痘。將發之時。亦皆發熱。由紅點而水泡。有紅點。由水泡膿泡而結疔。但水痘則皮薄色嬌。赤痘則紅稠形較。不似正痘之根窠圓淨。紫束也。且見點起發。漸聚結。止於五六日之間。其邪氣之輕淺可知。皆由風熱鬱於肌表。而發。小兒肌肉嫩薄。尤多此證。當與大連翹湯解之。亦有夾疹而出者。有夾正痘而出者。若先水痘收後。而發正痘。其痘必輕。

附種痘說

痘本胎毒。根於先天。發則由於時氣。以故沿門合境。安危相

醫通卷十二

痘毒 水痘

思得堂藏

率與疫癘傳染無異。且多外挾風寒。內停宿滯。及乎跌撲驚恐。為患種種。匪可意料。自伏波迄今。天生天殺。莫可誰何。邇年有種痘之說。始自江右。達於燕齊。近則遍行南北。詳究其源。云自玄女降。亂之方。專取痘氣。熏蒸。發兒胎毒。於安寧無病之時。則開發之機。殆如不似正痘之天人合發。內外合邪。兩難分。解也。原其種痘之苗。則無他。惟是盜取痘兒標。拉之漿。收入棉內。納兒鼻孔。女右男左。七日其氣直通。熱發點見。少則數點。多不過一二百顆。亦有面部稍見微腫。胎毒隨解。大抵出順則順。必然之理。如痘痕不得盜痘。痘亦可發。苗痘亦無可痛。則以新出痘兒所服之衣。由他兒服之。亦能出痘。總取同氣。氣為胎毒之獨。其盜機也。天下莫能知。而聖功生焉。或有熱發出遲。點不即起。或新發於痲疹之中。須

藥扶持者。悉如正痘法調理。自安。當知胎毒有限。助虛無窮。況苗發之痘。既無邪鼓動血氣。勢無癰塌。問亂之虞。正氣內守。雖酒氣穢氣。略無妨礙。脫胎絕無癰痕。口鼻亦無殘廢之厄。尤為穩險。就安之捷徑。間有意外之變。此兒正氣內奪。加以客邪交迫。時動必潰。命之則在。氣道之理也。值此而與種痘。未有不告變者。故凡病後之兒。及顏色太嬌。骨幹太弱。肌理太疎者。皆未可以輕試也。其於痘證初行。疫邪方熾之時。切須避其銳氣。常俟大勢稍平。方可施補。天浴日之妙用。其間或有不順者。此必苗非順痘。醫非惜家。是不能無損苗。助長之憾。然皆方士之所為。人知其神之神。而不知不神之所以神。吾以靜眼觀之。易若順天隨時。不假強為之為愈也。

張氏醫通卷十二終

天思得堂藏

張氏醫通卷之十三

清 長洲石頭張

璣路玉

男

登徒

日本 大泉長巷前田安宅子仁

男

典子守

諸家類集方藥皆隨論次第。是編逐門但錄專方。其藉古方加減。各門可以通用者。彷彿祖劑之義。另自為卷於後。

中風門

侯氏黑散 金匱 治大風四肢煩重。心中惡寒不足。

菊花 三兩

白朮 一兩

防風 八錢

桔梗 六錢

黃芩 四錢

人參

醫通卷十三

中風

思得堂藏

茯苓

細辛

當歸

乾薑

芎藭

桂枝

牡蠣 熬

礬石 各二錢

右十四味。杵為散。酒服方寸匕。日三服。初服二十日。用溫酒調服。禁一切魚肉大蒜。常宜冷食。六十日止。即藥積在腹中不下也。熱食即下矣。冷服自能助藥力。外臺借此大風四肢煩重。脾土受風水之制。土氣內結。不能敷布於四末也。心下惡寒不足者。胸中為濁氣填塞。心火內蘊。不得發越。熱極反兼寒化也。方中用菊花。四十分為君。以解心下之蘊熱。防桂辛桔以升發陽理。參苓白朮以實脾杜風。芎藭以潤燥熄火。牡蠣礬石以固滯腸胃。使參朮之性留預不散。助其久功。乾薑黃芩。一寒一熱。寒為風之嚮導。

熱爲火之反間也用溫酒服者令藥性走表以開其痺也
冷食而禁諸熱物者恐鬱得熱而下不能盡其藥力以發
石柱得冷即止得熱則下也○郭壅曰黑散本爲滌除風
熱方中反用牡蠣礬石止瀉之味且令冷食使藥積腹中
然後熱食則風熱痰垢與藥漸次而下也
風引湯千金除熱癰痢并治大人風引小兒驚瀉
瘕瘕日數十發

大黃

乾薑

龍骨熱各一兩二錢

甘草

牡蠣熱各六錢

滑石

石膏各一兩八錢

赤石脂

紫石英

白石脂

寒水石如無石

桂枝各一兩
枝各一兩
心各一兩

右十二味并篩以葦葉燻之取三指撮并花水三升煮三

醫通卷十三

中風

二

思得堂藏

沸溫服一升葉氏借治火逆

風者外司厥陰內應肝木上隸手經下隸足經中見少陽
相火所以風自內發者由火熱而生也風生必害中土土
病則四末不用聚液成痰癰者風木挾痰注於四肢也癰
者風熱擾其經脈內應於心主也前方祛風外散此方引
風內泄故用大黃兼甘草桂枝滑石石膏以化風熱乾薑
以爲反謀使火無格拒之虞石莖寒水以潤血燥石脂龍
骨牡蠣以補塞其空絕風火復來之路也
千金三黃湯金匱治中風手足拘攣百節疼痛煩熱心亂
惡寒經日不欲飲食

麻黃

黃芩各三錢

獨活三錢

細辛一錢五分

黃耆六錢

右五味水煎溫服一服小汗二服大汗心熱加大黃錢半

腹滿加枳實一枚氣逆加入參二錢悸加牡蠣二錢渴加
栝蒌根二錢先有寒加附子一片石頑曰此方千金云仲
景三黃湯治惡寒經日不止不欲飲食全似內外虛寒之
候而方中反用黃芩之苦寒豈不礙麻黃輩之溫散乎既
用麻黃復用黃芩豈不礙表氣之閉拒乎曷知惡寒經日
不止雖有似手虛寒而實衛虛不能勝邪所致不欲飲食
亦是風熱內蘊之故觀煩熱心亂一語病情灼然故方中
雖以麻黃獨活細辛開發腠理於外即以黃芩清解風熱
於內更慮衛虛難於作汗乃以大劑黃耆助之與黃耆建
中之義不殊其用黃耆之意有二一以佐麻黃開發之權
一以杜虛風復入之路也方後復云心熱加大黃言服前

醫通卷十三

中風

三

思得堂藏

藥後心中煩熱不除知黃耆不能祛之外散即以本方加
大黃以引之下泄也其加枳實加入參加牡蠣加栝蒌等
法或治旺氣或助木元各隨標本而施加附子者專佐麻
黃之蒸發助黃耆溫經殊非陰寒之謂與麻黃附子細辛
湯同源異派○詳金匱以千金二字名方珍重之也千金
祖金匱之意而衡其集曰備急千金方不忘祖述之本也
竹瀝飲子千金治風非身無痛四肢不收志亂不甚者用
此方當先以竹瀝二十分生葛汁十分薑汁一分和服然後
用竹瀝飲子

芎藭

防尸

附子

人參

芍藥

黃芩

甘草

桂心各一分

羚羊角三分

石膏 六分

杏仁 十四

麻黃

防風 各分

右十三味水浸減半。內竹瀝十分。生薑汁五分。薑汁半。分三服取汗。間二三日更服一劑。三服後隨病進退增減。

地黃飲子 治腎氣不上交於心。舌瘡足癰。

熟地黃 三兩

巴戟天 酒浸

肉苁蓉 酒浸去

山茱萸 去核

石斛

附子 炮

白茯苓

石菖蒲

遠志 甘草湯

甜肉桂

麥門冬 去心各

五味子 五錢

共為麤末。每服五錢。生薑五片。大棗一枚。薄荷七葉。水煎。

日二服。服無時。

喻嘉言曰。方中桂附巴戟。原為驅逐海陰痰涎而設。不可

醫通卷十三

中風

思得堂藏

執已見而輕去之

天麻丸 治腎藏虛熱生風。

天麻

牛膝 二味酒浸

川草薢

黑參

羌活 各四兩

杜仲 酒炒

附子 炮去皮

當歸 十兩

生地黃 酒浸焙

為末。煉白蜜丸。侵晨沸湯。臨臥溫酒。送七十九。

方中雖以歸地補養陰血為君。其妙用全在大麻與牛膝。

同浸同焙。俾風痰濁淫。咸從下趨。而不致上逆。得力又在

附子之雄。引領歸地直入下焦。填補其空。使風邪無復入

之慮。第辭杜仲以祛在裏濕熱。羌活黑參以疎在表風熱。

標本合治有法。欲散各得其宜。此方具矣。

黃清心圓

治初中痰涎壅盛昏憤不省。語言蹇澀。

癰痰不遂。一切痰氣閉塞證。

牛黃

羚羊角 勿經大

茯苓

白朮 生用

桂心

當歸

甘草 各三

麝香

雄黃 鍊水飛淨

龍腦 錢半

人參

犀角 錢五

右十二味。各取淨末。配勻。蜜和成劑。分作五十九。金箔為

衣。待乾蠟。臨用開化。沸湯盪湯任下。原方尚有防風黃

芎藭。按杏仁芍藥附膠大豆黃卷諸藥。皆難去之。

清心牛黃圓 治暴中神昏不語。痰塞心包。口角流涎。煩熱

氣急。一切痰熱閉遏證。

西牛黃 三錢

陳膽南星 一兩

黃連 薑汁浸

當歸

甘草 錢五分

辰砂 五錢

醫通卷十三

中風

思得堂藏

為極細末。蒸餅和勻。分作五十九。金箔為衣。候乾蠟。臨

服。開。生薑湯薄荷湯。人參湯。量虛實選用調化服。

至寶丹 局方 治諸中卒倒。痰飲血氣俱閉。寒熱交錯者。

生烏犀角 鎊

硃砂 研水

雄黃 研水

生玳瑁 鎊

琥珀 各一兩

麝香 研

龍腦 研各

金銀箔 各五

西牛黃 研半

安息香 微火無灰酒飛過。去沙土。約取淨一兩。

右將犀玳瑁為細末。入餘藥研勻。將安息香重湯化。後入

諸藥和搜成劑。分作百九。蠟。臨服。開。用參湯調化。二九

卒中山嵐障氣。及產後惡血攻心。童便入薑汁化服。

蘇合香圓 局方 治傳屍殭屍。心腹卒痛。僵仆不省。一切氣

閉屬寒證。

下月左平肝膠口目左嚙

銀

子 50—506

附子 外臺作

杏仁 各六錢

薏苡仁

石膏

桂心 各九錢

麻黃 二兩

生薑 兩半

右十六味。水煎分三服。并鍼風池肩髃曲池支溝五樞。腰陵泉巨虛下廉各一。凡七穴。一劑覺好。更進一劑。即鍼一度。九劑九鍼。即瘳。灸亦得。

薏苡仁湯 治中風溼痺。關節煩疼不利。

薏苡仁 一兩

芍藥 酒洗

當歸 各錢

麻黃 去節

桂 各八分

蒼朮 去皮 炒一錢

甘草 炙七

生薑 七片

水煎服。無時。若自汗加石膏。煩熱疼痛加酒黃蘗。厥冷拘急加熟附子。

醫通卷十三

中風

八 思得堂藏

升麻胃風湯

治胃風能食。手足麻。目瞶面腫。

升麻

當歸

白芷

葛根 各六分

蒼朮 製八分

麻黃 去節

桑木

羌活

草豆蔻 研

蔓荆子 研各四分

柴胡

黃蘗 製各三分

甘草 炙五分

生薑 三片

大棗 一枚

水煎食遠服。

按風入胃府。大便清血四射。用人參胃風湯之桂芍祛之內散。風入胃經。面目瞶動而腫者。用升麻胃風湯之升葛麻黃祛之外散。不可不辨。

犀角升麻湯

治風熱頭面腫痛。煩上加糊。咽嗑不利。

犀角 錢三

升麻 五錢

防風

羌活 各一錢二分

白芷

黃芩

白附子 各六分

甘草 炙四

水煎食遠服。

烏藥順氣散 治暴中風氣攻注。遍身麻痺。語言蹇澀。口眼喎斜。喉中氣塞。有痰聲者。

麻黃 去節

橘皮

烏藥 各三

礞石 炒

川芎

枳殼

甘草 炙

白芷

枳實 各一

乾薑 五錢

右十味。為散。每服半兩。加生薑三片。大棗一枚。水煎熱服。吳鶴皋曰。此治標之劑。初病邪氣實者宜之。解風散 治風成爲寒熱。頭目昏眩。支體疼痛。手足麻痺。上

醫通卷十三

中風

九 思得堂藏

腸壅滯

人參 二兩

麻黃 去節 一兩

芎藭

獨活

細辛

甘草 炙 各

爲散。每服四五錢。入生薑五片。薄荷七葉。水煎服。按此本千金三黃湯。去蒼朮加參芎甘草。彼主杜風清熱。此主解散虛風。同源異派。今人但知人參爲補虛之藥。不知人參有祛邪蕩實之功。此證因虛風久襲。若獨用麻黃。無人參助其胃氣。必不能克効也。

古 錄驗續命湯

方祖

近効白朮附子湯

千金八風續命湯

方祖

千金獨活湯

三生飲

方祖

四物湯

四君子湯

方祖

二陳湯

方祖

方祖

方祖

方祖

方祖

方祖

小續命湯 <small>續命湯下</small>	三化湯 <small>承氣湯下</small>
六君子湯 <small>湯下</small>	大柴九湯 <small>湯下</small>
十全大補湯 <small>湯下</small>	大建中湯 <small>湯下</small>
人參養營湯 <small>湯下</small>	大省風湯 <small>湯下</small>
八味順氣散 <small>湯下</small>	千金附子散 <small>湯下</small>
省風湯 <small>湯下</small>	秦九升麻湯 <small>湯下</small>
瘧疾湯 <small>湯下</small>	涼膈散 <small>湯下</small>
星香湯 <small>湯下</small>	導痰湯 <small>湯下</small>
黑錫丹 <small>湯下</small>	補中益氣湯 <small>湯下</small>
麻黃附子湯 <small>湯下</small>	倉公當歸湯 <small>湯下</small>
胃苓湯 <small>湯下</small>	千金排風散 <small>湯下</small>
黃耆建中湯 <small>湯下</small>	小柴胡湯 <small>湯下</small>
當歸補血湯 <small>湯下</small>	
傷寒門	
香蘇散 <small>湯下</small>	治感冒四時不正之氣
香附 <small>湯下</small>	紫蘇葉 <small>湯下</small>
甘草 <small>湯下</small>	橘皮 <small>湯下</small>
為散每服半兩。加生薑三片。大棗一枚。水煎去滓熱服。服後取微汗。日三夜一服。以得汗身涼為度。	
胃蘇散 <small>湯下</small>	治三時感冒。偏於血分者。
半夏 <small>湯下</small>	茯苓 <small>湯下</small>
葛根 <small>湯下</small>	紫胡 <small>湯下</small>
川芎 <small>湯下</small>	枳殼 <small>湯下</small>
甘草 <small>湯下</small>	桔梗 <small>湯下</small>

為散。每服半兩。加薑棗煎服。取微汗効。	本方去川芎紫胡。加人參前胡木香名參蘇飲。治虛人感冒。偏於氣分者。
十神湯 <small>湯下</small>	治感冒頭痛。
麻黃湯 <small>湯下</small>	葛根 <small>湯下</small>
香附 <small>湯下</small>	橘皮 <small>湯下</small>
川芎 <small>湯下</small>	白芷 <small>湯下</small>
甘草 <small>湯下</small>	生薑 <small>湯下</small>
水煎去滓熱服。取微汗。	
大陷胸丸 <small>湯下</small>	治結胸項強如柔痙狀。下之則和。
大黃 <small>湯下</small>	芒硝 <small>湯下</small>
杏仁 <small>湯下</small>	芒硝 <small>湯下</small>
右四味搗篩二味。內杏仁芒硝。合研如脂。和散取如彈丸一枚。別搗甘遂末一錢七。白蜜二合。水二升。煮取一升。溫頓服之。一宿乃下。如不下更服。取下為効。禁如藥法。	
大陷胸湯 <small>湯下</small>	治結胸熱實。脈沉而緊。心下痛。按之石韌。
大黃 <small>湯下</small>	芒硝 <small>湯下</small>
右三味。以水六升。先煮大黃。取二升。去滓內芒硝。煮一兩沸。內甘遂末。溫服一升。得快利止後服。	
小陷胸湯 <small>湯下</small>	治小結胸。正在心下。按之則痛。脈浮滑者。
黃連 <small>湯下</small>	半夏 <small>湯下</small>
右三味。以水六升。先煮枳實取三升。去滓內諸藥。煮取二升。去滓分溫三服。	
葱白香豉湯 <small>湯下</small>	治時疫傷寒。三日已內。頭痛如破。及溫。

病初起煩熱

葱白連根

香豉三合

右二味水煎入童子小便一合日三服秋冬加生薑二兩

按本方藥味雖輕功效最著凡虛人風熱伏氣發溫及產後感冒摩不隨手獲効與產後病後用伏龍肝湯丸不殊既可救死生且免招尤取謗真危證解圍之良劑也

加減葱白香豉湯治三時風熱咳嗽咽喉腫痛難用葷蕪湯者用此代之

此即葱白香豉湯葱白減半加葷蕪二錢白薇青木香枳梗各一錢甘草薄荷各三分白蜜三七

葷蕪湯千金治風溫自汗身重及冬溫發熱咳嗽

葷蕪二錢

石青二錢

白薇

醫通卷十三

傷寒

三思得堂藏

青木香

麻黃湯

杏仁去尖

甘草炙

獨活

芍藥各一

右九味水煎日三服一力有葛

按千金葷蕪湯乃長沙麻黃升麻湯之變方為冬溫欬嗽咽乾痰結發熱自利之專藥以冬時有非節之暖則陽氣不藏少陰受病故首推葷蕪之酒燠止欬為君佐以白薇青木香苦鹹降泄即春時伏氣發溫更感於風之證亦不出此以葷蕪為少陰厥陰二經之嚮導也麻黃為發汗之重藥得石青則有分解寒熱互結之功倘病勢較輕不妨於中裁去麻黃石膏獨活為杏仁等味合以葱白香豉之類未為不可如果熱勢紛糾急須開泄者麻黃石膏又所必需在川方者臨病之權衡耳

犀角地黃湯千金

治傷寒濕病一應發汗而不得汗內畜

血及鼻衄吐血不盡內餘瘀血大便血面黃或中脘作痛

犀角

生地黃另搗

牡丹皮

白芍等分

右四味水煎去滓入地黃再煎數沸濃清服事忘知狂加大黃黃芩版大來遲腹不滿而自言滿者加當歸肉桂吐

衄加藕汁扁柏煎便

豬膚湯玉函

治少陰經伏熱咽痛

豬膚

五兩

治少陰經伏熱咽痛

水煎去滓加白蜜白粉熬香和相得溫分六服

黃連阿膠湯玉函

治熱傷陰血便紅

黃連五分

黃芩一錢

芍藥二錢

醫通卷十三

傷寒

三思得堂藏

阿膠三錢

雞子黃一枚

右三味水煎去滓入阿膠烱盡小冷入雞子黃攪勻服

葛根黃芩黃連湯玉函

治誤下痢不止脈促喘而汗出

葛根半兩

黃芩二錢

黃連三錢

甘草二錢

右四味先煮葛根次內諸藥去滓分溫再服

人中黃散治疔瘡瘰癧

人中黃一兩

雄黃

辰砂各一

為散每服二錢薄荷梗湯下日三夜二服

導赤瀉心湯治熱傳手少陰神昏

黃連酒洗

黃芩酒洗

山梔炒

滑石碎

知母

犀角

甘草生
我神錄一
燈心一握
人參
生薑三片
麥門冬三枚
大棗三枚

水煎服。

此湯專治傷寒熱傳少陰心經之證。蓋取金匱瀉心湯為主。以其熱在上而不在下。病在氣而不在血。故於本方裁去大黃。易入山梔。以清包絡之熱。知母犀角。以解肺胃之煩。人參麥冬。甘草茯苓。以安君主之神。滑石為導赤之嚮導。薑棗為散火之閒使。用犀角者。即導赤散中之地黃。用滑石者。即導赤散中之木通。雖無導赤散中藥味。而導赤散之功効。備其中矣。嘗見時師。畏人參動火。除去不用。此與驅熱而禦大敵何異哉。

醫通卷十三

國藥

十四 思得堂藏

桂枝湯方祖
大青龍湯方祖
挑核承氣湯方祖
承氣湯方祖
霍香正氣散方祖
大黃黃連瀉心湯方祖
梔子瀉心湯方祖
四逆湯方祖
白通湯方祖
黃耆建中湯方祖
越脾湯方祖
黃芩湯方祖
麻黃湯方祖
五苓散方祖
黃龍湯方祖
小柴胡湯方祖
瀉心湯方祖
附子瀉心湯方祖
枳實梔子瀉心湯方祖
當歸四逆湯方祖
通脈四逆湯方祖
枳實理中湯方祖
桂枝二越脾一湯方祖
白虎湯方祖

涼膈散方祖

黃連解毒湯方祖

三黃梔子瀉心湯方祖

人中黃九方祖

四逆加人參湯方祖

異功散方祖

附子理中湯方祖

同陽返本湯方祖

生脈散方祖

暑門

一物瓜蒂湯方祖

瓜蒂散方祖

右一味水煎去滓頓服。少頃即吐。不吐探之。

此方之妙。全在探吐。以發越鬱遏之陽氣。則周身汗出表

和。而在內之煩熱。得苦寒湧泄。亦蕩滌無餘。今人目睹其

方。而不知用。醫道之阻若此。

消暑十全散 治傷暑兼感風邪。發熱頭痛。

香薷二錢 藿豆 厚朴 薑製

陳皮 甘草 白朮

茯苓 木瓜 藿香

蘇葉 各一

水煎熱服。無時。取微汗効。

香薷飲局方 治傷暑腹中不和。煩渴引飲。

香薷二錢 厚朴一錢 藿豆 炒研一

雙解散方祖

三黃石膏湯方祖

清熱解毒湯方祖

生料六味丸方祖

保元湯方祖

乾薑人參半夏丸方祖

附子湯方祖

生熟黃連湯方祖

醫通卷十三

者

十五 思得堂藏

甘草 錄一

水煎并中沉令服之。身熱欲得汗者熱服。

黃連香需飲 活人 治傷暑大熱煩渴

香需二錢 黃連 酒炒 厚朴 薑製

水煎熱服。

導赤散 局方 治小腸實熱。小便赤澀。

生地黃 五錢 木通 甘草梢 生各

竹葉一握

右四味。水煎熱服。病血加辰砂五分。一方多燈草。

十味香需飲 治傷暑體倦神昏。頭重吐利。

香需二錢 人參 黃耆 酒炒

白朮 茯苓 甘草 炙

醫通卷十三

十六 思得堂藏

藕豆

陳皮 薑炒 厚朴 薑製

木瓜 錄各

水煎欲作汗熱服。欲利小便冷服。

六和湯 治傷暑霍亂煩悶。嘔吐瀉。

香需二錢 人參 茯苓 薑製

甘草 炙 藕豆 厚朴 薑製

木瓜 杏仁 泡去 半夏 醋炒 各

藿香 砂仁 炒研 各

大棗 一枚

水煎熱服。

清暑益氣湯 保元

五苓散 方祖 白虎加人參湯 湯下 白虎

益元散 方祖

竹葉石膏湯 湯下 白虎

藿香正氣散 散下 平胃

大順散 湯下 理中

藥水散 湯下 四逆

清燥湯 湯下 保元

蒼朮白虎湯 湯下 白虎

小半夏茯苓湯 湯下 二陳

桂苓丸 五苓散 湯下

錢氏白朮散 湯下 四君子

保元湯 方祖 湯下

淫門

醫通卷十三

淫

十七

思得堂藏

羌活勝濕湯 治風溼上衝頭痛。項似拔。腰似折。

羌活 獨活 防風 蔓荊子 碎

川芎 薑本 生薑 三片

甘草 炙各 水煎熱服。緩取微似汗。過汗則風去溼不去也。如無頭痛。

去蔓荊子。換蒼朮。除風溼羌活湯。治風溼相搏。一身盡痛。日晡發熱。

羌活 防風 柴胡

蒼朮 升麻 八分

生薑 一片 水煎空心熱服。覆暖取微汗。

按羌活勝濕湯。與除風溼羌活湯。同源異派。此治頭項之

溼。故用羌防芎藭一派風藥。以祛上盛之邪。然熱雖上浮。溼本下著。所以復用獨活透達少陰之經。其妙用尤在緩取微似之汗。故劑中加用甘草。以緩諸藥辛散之性。則溼著之邪。亦得從之緩去。無藉大開汗孔。急驅風邪之法。使肌腠餒弱無力濕邪。因之內縮。但風去而溼不告也。其有腰以下重。寒溼之邪。留於陰分也。本方加防已以逐溼。必兼生附以行經。或見身重腰沉。沉然溼熱之邪。過於陽分也。本方加蒼朮以燥溼。必兼黃芩以清熱。非洞達長沙。亦附桂附梔子。藥皮等方。不能效其法。其除風溼羌活湯。治外濕之溼。而無上衝頭項之痛。則川芎受劑無預也。亦無溼者腰疼之患。與獨活尤無交涉。故但用羌防芎藭。益入升柴。若尤關提局身關節。則溼邪自無所容而外散矣。

醫通卷十三

十八 思得堂藏

神木湯局方 治風木之邪。內干溼土泄利下血。

蒼朮 泔浸炒 藁本 川芎
羌活 各一錢 白芷 甘草
細辛 各五分 生薑 三片 葱白 二連

右九味水煎熱服。

按神木湯。純用風藥。與羌活勝濕相去不遠。如何可治泄利下血。蓋火瀉陽明之血。則燥金受傷。祇合清涼。最嫌風燥。若風乘太陰之血。則溼土被鬱。法當升散。切戒寒涼。當知陽明來者。色必鮮明。太陰來者。色必清稀。其源各異。故其治亦迥乎不侔。究其旨。不越風能勝溼之義。若木專主木邪乘土。故能治外內諸邪。以風水之邪。內干土藏。故用羌藁正辛等風藥。兼川芎以引入血分。甘草以調和胃氣。

胃氣敷布有端。泄利下血自止。蓋汗即血之液。奪其汗則血中之溼熱邪氣。悉從外泄。而無內滯之患矣。升陽除溼防風湯。治風溼發泄。及腸風滯下便血。

防風 二錢 蒼朮 泔浸炒 白朮 土蒸 茯苓 各一錢 生薑 一片

水煎熱服。取微汗。

陽陷於下。則成發泄。溼犯於上。則令頭痛。清濁倒置而然。故用風藥以勝溼也。然風木之病。稍加桂枝甘草。監製其功尤捷。

茵陳蒿湯 玉函 治溼熱發黃。便秘脈實。茵陳蒿 五錢 梔子 五枚 大黃 三錢

右三味水煎熱服。微利黃水去為度。未去起三日再服。

醫通卷十三

十九 思得堂藏

按茵陳蒿湯。其旨全在通利水道。不得不借幽門為嚮導。

清熱滲濕湯 治夏月濕熱發困。煩渴泄瀉溺赤。

黃芩 鹽酒炒 蒼朮 去皮炒 白朮 生 茯苓 澤瀉 黃連 酒炒各 甘草 炙五分 竹葉 十片

水煎熱服。小便利為。

老人虛人加肉桂少許。氣虛者之。加入參。厥虛合生散。內傷生冷加炮薑。

按此本二妙合五苓之半。加黃連甘草。以燥夏令之溼熱。良可法也。

常痛指痛湯 治濕熱走注。遍身骨節煩疼。胸膈不利。足脛

赤腫重痛。

羌活

茵陳酒炒各

升麻多汗易

歸身各六

知母於熱量

水煎熱服無時。

此澤熱疼腫之聖方。若不亦不腫痛。上不熱為寒。淫禁。

除淫湯

黃著建中湯

苓桂術甘湯

醫通卷十三

麻黃加術湯

敗毒散

防已黃著湯

白朮附子湯

桂枝湯

虎潛丸

瀉心湯

清燥湯

控涎丹

黑錫丹

濟生腎氣丸

燥門

甘草炙

人參

葛根

白朮薑製

猪苓

黃芩

苦參酒洗

蒼朮酒洗自汗

防風防已

澤瀉各八

五苓散

腎著湯

小建中湯

小青龍湯

麻黃杏仁薤白甘草湯

五積散

桂枝附子湯

甘草附子湯

桂苓甘露飲

神芎丸

六君子湯

春澤湯

地黃飲子

生脈散

五味子湯千金 治傷燥欬唾中有血引胸脇痛。皮膚乾枯

五味子炒研

紫苑草

桑根皮蜜炒各

右九味水煎空心服。秘旨加白蜜一匙。

麥門冬湯千金 治大病後火熱乘肺欬唾有血。胸膈脹滿

上氣羸瘦。五心煩熱。渴而便秘。

麥門冬去心

半夏

竹茹各一

五味子碎

右十一味水煎空心服。

石頑曰。按千金麥門冬湯。即五味子湯中。去續斷赤小豆。

加門冬麻黃半夏生薑。而五味子湯專治燥欬。方中反用

續斷以燥淫。麥門冬湯專治火熱乘肺欬唾有血。反用麻

黃半夏。世都莫解其故。是以并其方而置之。不知致燥之

由。皆緣經脈阻滯。非續斷不能通之。欬唾有血。是傷寒大

病後餘邪蘊積。火而乘於肺。非麻黃不能開之。痰涎氣

結。津液不行。非半夏不能祛之。與活人知母麻黃湯和劑

欬冬花散等。立法不殊。今人每謂半夏性燥。一切渴家亡

血家禁用。又謂半夏性溫。不當與門冬竹茹寒潤藥同用。

若爾則金匱麥門冬湯。竹葉石膏湯。俱不足法耶。

地黃煎千金 治風熱心煩。欬喘便秘。脾胃熱壅。食不下。

生地黃汁

枸杞子汁 二味酒搗

荆蘼

生薑汁各一

白茯苓八錢

右十一味以後五味爲細末入前六汁內調服方寸匕再服漸加以利爲度

服漸加以利爲度

生地黃煎千金

秘

歲廷

括樓根

生薑汁二升

生薑汁二合

右咬咀以水一斗二升先煮諸藥取汁三升去滓下竹瀝

醫通卷十三

燥

思得堂藏

竹瀝各半

人參

大黃酒蒸

天門冬去心各一兩

梔子各五錢

治積熱煩渴日晡轉劇喘欬面赤能食便秘

知母

疾神

鮮地骨皮各二

石膏四兩

麥門冬汁

竹瀝六合

燥

思得堂藏

地黃門冬汁緩火煎至四升下煉白蜜薑汁再煎數沸初服三合日三夜一服加至四合夏月爲散收薑汁竹瀝焙乾蜜丸服煎膏尤妙

奇嘉言曰此方生液涼血製火撤熱兼擅其長再加人參乃治虛熱之良劑然非能食便秘者斷不可施

通幽一治大便秘結便出堅黑

油當歸二錢

升麻三分

甘草生炙各五分

紅花少許

桃仁泥一錢

熟地黃

水煎將成用藥汁磨濃五分清入稍熱服

潤燥湯

通幽湯加麻仁大黃各一錢

清涼飲治上焦積熱肺氣不化口舌乾燥

黃連

黑參

甘草炙一

水煎入生白蜜一匕熱服大便秘結加酒蒸大黃

四順清涼飲

當歸

大黃酒蒸各一

水煎入生白蜜一匕熱服

按清涼飲治上焦之燥熱故用薄荷之辛散四順飲主下焦之燥結故用大黃之苦寒功用天淵

麻仁丸玉函治脾約大便秘結

厚朴薑汁

大黃四錢

右六味爲末煉白蜜丸梧子大飲服五十九日三服以利爲度

潤腸丸治大腸風熱血秘

麻仁

當歸各半

秦艽各半

除二仁另研外爲細末蜜丸梧子大每服五十九食前溫酒下本方加郁李仁防風名潤燥丸

酒下

猪膽導

大猪膽一枚瀉汁和醋少許以灌穀道中如一食頃當

猪膽導

猪膽導

猪膽導

醫通卷十三

燥

思得堂藏

右四味先內二硝於八升湯中。攪令消。以紙密封一宿。取清。內銅器中。別搗寒水石石膏。碎如豆粒。以絹袋盛之。納汁中。以微火煎。候其上有沫起。以箸投中。著著如凌雪凝。白。急下。湯貯盆中。符候取出。烈日曝乾。積熱困悶不巳者。以方寸匕。白蜜一合。和冷水五合。攪和令消。頓服。之日二熱定即止。武德中。黃高。人加金二兩。

八味丸 方祖

保元湯 方祖

解毒湯 三黃

火礬湯 升麻

瀉陰火升陽湯 保元

升陽散火湯 升麻

佐金丸 方祖

當歸龍薈丸 三黃

黑錫丹 金液

四君子湯 方祖

六味丸 八味

生脈散 方祖

滋腎丸 補陰

傷飲食門

六思得金藏

枳實導滯湯

傷飲食門

枳實 妙三

治傷濕熱之物痞悶不安。

枳實 妙三

白朮 妙焦

茯苓 三錢

黃芩 酒炒

黃連 妙三

澤瀉 妙二

大黃 酒炒

神麴 妙四

生薑 三片

水煎食透服。

此枳朮丸合三黃湯而兼五苓之製。以祛溼熱宿滯也。

木香化滯湯

治氣食痞結腹微痛。不思飲食。

半夏

甘草 炙

草豆蔻 一錢

柴胡

木香

橘皮 各六分

枳實 妙

黃芩 各四

紅花 一分

生薑 五片

水煎食透稍熱服。

保和丸 治宿食酒積。

山楂肉 二兩

半夏 汁

神麴 妙三

麥蘖 妙去

連翹

萊菔子

黃連 各五錢

為末。水泛為丸。每服二錢茶清送下。

本方加妙白朮二兩名大安丸。

按保和丸。大安丸中。多藥傷胃。服子傷脾胃之氣。恐非丸劑所宜。久服之品。當易枳實青芩子功用不殊。而不致傷。

犯先後天之真氣也。

紅九子 治宿食冷積作服。

紅九子 治宿食冷積作服。

傷飲食門

六思得金藏

荆三稜 妙

蓬莪朮 妙

青皮 妙

陳皮 妙

乾薑 妙

為末。陳酒麴糊丸。梧子大。礬紅。每服三五十九。食前。

沸湯下。小兒量減。

葛花 解酒湯

治傷酒嘔吐胸痞。小便不利。

青皮 妙

白豆蔻

砂仁 妙各

乾薑 各五

神麴 妙

澤瀉

橘紅

白朮 妙八

人參

木香 一分

茯苓

猪苓 各四

水煎服。但得微汗。則酒溼去矣。

按此雖本五苓四君子。益入葛花豆蔻等辛散之味。大損。

元氣世人不知。妄謂方中人參有補益之功。持此縱飲。是自伐其天也。

麴蘗丸 治酒積成癰。腹脇滿痛。復便積沫。

神麴 麥蘗各一兩。

黃連七粒。炒去巴豆。

為末。水泛為丸。梧子大。每服五十丸。食前薑湯下。○酒積下白沫。加炮薑二錢。下鮮血。倍黃連。下瘀血。加紅麴一兩。

塌氣丸 治肝氣乘脾腹脹。

胡椒一兩。

蠟尾去毒。煎酒去。

為末。麴糊丸。粟米大。每服二三十丸。米飲下。

神保丸 治心胸腹脇脹痛。大便不通。宿食不消。

塌氣丸加木香二錢五分。巴豆霜二分半。本方中明礬。

醫通卷十三

傷寒

六二思得靈藥

用二錢五分。歟用全者七枚。

為末。湯浸蒸餅丸。麻子大。硃砂為衣。每服五丸。空心薑湯。

醋湯沙糖湯任下。

酒癰丸 治酒癰腫痛下積。遇酒即吐。

塌氣丸去胡椒。加雄黃油煎。皂子大一枚。巴豆十五粒。

不去油。本方中礬稍用十五枚。不去盡。

為末。入白蠟二兩半。滴水丸。如豌豆大。候稍乾。入麴炒香。

每服二三丸。溫酒下。茶清亦可。

平胃散方祖

枳朮丸方祖

補中益氣湯保元

二陳湯方祖

荷蘇散方祖

霍香正氣散方祖

承氣湯方祖

備急丸方祖

白散 治傷寒。

七味白朮散 治傷寒。

枳實理中湯 治傷寒。

八味順氣散 治傷寒。

獨參湯 治傷寒。

涼膈散 治傷寒。

傷勞倦門

硃砂安神丸 治熱傷心胞氣浮。心亂虛煩不寧。

硃砂水 治傷寒。

當歸 治傷寒。

除硃砂共為細末。湯浸蒸餅為丸。黍米大。硃砂為衣。每服十五丸至三十丸。獨參湯或補中益氣湯送下。

凡言心經藥都屬心包。惟硃砂外稟離明。內含真汞。故能

交合水火。直入心藏。但其性徐緩。無迅掃陽焰之速。効是

以更需要黃連之苦寒。以直折其勢。甘草之甘緩。以款其

微。俾隔上之實火。虛火。悉從小腸而降泄之。允為勞心傷

神。動作傷氣。擾亂虛陽之的方。豈特治熱傷心包而已哉。

然其與又在當歸之辛溫。走血。地黃之濡潤。滋陰。以杜火

氣復熾之路。其動靜之機。多寡之制。各有至理。良工調劑

之苦心。其可忽諸。

黃耆建中湯 治傷寒。

小建中湯 治傷寒。

平胃散 治傷寒。

六君子湯 治傷寒。

六君子湯 治傷寒。

六君子湯 治傷寒。

六君子湯 治傷寒。

九味資生丸 治傷寒。

連理湯 治傷寒。

五苓散 治傷寒。

四君子湯 治傷寒。

六味丸 治傷寒。

六味丸 治傷寒。

六味丸 治傷寒。

六味丸 治傷寒。

六味丸 治傷寒。

六味丸 治傷寒。

六味丸 治傷寒。

六味丸 治傷寒。

六味丸 治傷寒。

六味丸 治傷寒。

六味丸 治傷寒。

六味丸 治傷寒。

六味丸 治傷寒。

六味丸 治傷寒。

六味丸 治傷寒。

六味丸 治傷寒。

六味丸 治傷寒。

六味丸 治傷寒。

六味丸 治傷寒。

六味丸 治傷寒。

六味丸 治傷寒。

<p>枳實理中湯<small>湯中</small></p> <p>當歸補血湯<small>湯下</small></p> <p>升陽順氣湯<small>湯下</small></p> <p>門冬清肺飲<small>湯下</small></p> <p>犀角地黄湯<small>湯下</small></p> <p>四君子湯<small>湯下</small></p> <p>十全大補湯<small>湯下</small></p> <p>虛損門</p> <p>薯蕷丸<small>金匱</small></p> <p>薯蕷二兩</p> <p>甘草二錢</p>	<p>八味丸<small>方劑</small></p> <p>調中益氣湯<small>湯下</small></p> <p>升陽補氣湯<small>湯下</small></p> <p>升陽益胃湯<small>湯下</small></p> <p>保元湯<small>湯下</small></p> <p>八珍湯<small>湯下</small></p> <p>六味丸<small>湯下</small></p> <p>治虛勞諸不足風氣百疾</p> <p>當歸</p> <p>乾地黃</p> <p>人參</p> <p>桂枝</p> <p>大豆黃卷<small>各七錢半</small></p> <p>阿膠<small>各五錢</small></p>	<p>背蕸</p> <p>白朮</p> <p>柴胡</p> <p>乾薑二錢</p> <p>右二十一味末之煉白蜜和丸如彈子大空心服下丸一</p> <p>百九為劑</p> <p>酸漿湯<small>金匱</small></p> <p>酸漿仁<small>炒半</small></p> <p>知母<small>炒</small></p> <p>右五味水煎溫分二服。後師加生薑便清去知母加入參服此盜汗不止去芍藥加芍藥怔忡去知母芍藥加入炙黃耆當歸陳皮蓮肉</p>
---	---	--

<p>大黃蘗蟲丸<small>金匱</small></p> <p>乾血肌膚甲錯兩目黯黑宜服此方攻其惡血然後補之</p> <p>大黃二錢</p> <p>桃仁一合</p> <p>芍藥四錢</p> <p>水蛭十枚<small>熬</small></p> <p>右十二味為末蜜丸如小豆大溫酒服五十丸日三服</p> <p>百勞丸<small>治一切勞瘵積滯痰不經藥壞者宜服</small></p> <p>當歸<small>炒</small></p> <p>人參二錢</p> <p>麻黃<small>四錢</small></p> <p>為末煉白蜜丸梧子大每服百丸百勞水下取下惡物為度服百勞十日百勞水以約湯之百遍然後煮沸即甘瀾水法也</p> <p>復玉膏<small>治虛勞乾咳喉中血腥腸中隱痛</small></p> <p>鮮地黃<small>四十兩</small></p> <p>沉香<small>另研</small></p> <p>先以地黃熬膏熬紙上不滲入人參茯苓末并入糖晶二十兩攪勻溶化離火再入琥珀沉香和勻磁罐收藏清長午前溫酒服數匙沸湯亦可</p> <p>四味鹿茸丸<small>治肝腎虛弱皆虛欲嗽吐血脈虛無力上熱下寒</small></p> <p>鹿茸<small>陳久另</small></p> <p>熟地黃<small>二兩</small></p>	<p>治五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食內有</p> <p>黃芩二錢</p> <p>杏仁一合</p> <p>杏仁一合</p> <p>乾漆<small>燉令烟</small></p> <p>蟅蟲一合</p> <p>蟅蟲半合</p> <p>乳香</p> <p>大黃四錢</p> <p>水蛭<small>十四枚</small></p> <p>沒藥<small>各一錢</small></p> <p>梔子<small>十四枚</small></p> <p>白茯苓<small>另為末</small></p> <p>琥珀<small>另研</small></p> <p>白茯苓<small>各十兩</small></p> <p>五味子</p> <p>當歸身<small>各一</small></p>
--	--

為細米酒和九梧子大每服四五十丸空腹溫酒送下
濟生鹿茸丸作湯各生 治腎藏真陽久虛下體痿弱疼痛
喘嗽水泛為痰

鹿茸酒炙 牛膝酒炙 五味子各二

石斛 巴戟肉 附子炮

川棟肉酒蒸 山藥 肉桂

杜仲酒炙 澤瀉各一兩 沉香另研

為末酒糊丸梧子大每服七十九丸侵晨溫酒下俗本尚多

白棘兔絲慈石陽起石四味

安腎丸 治腎虛風襲下體痿弱疼痛不能起立

肉桂 川烏頭炮各五錢 白茯苓炒去

巴戟天去骨 薯蕷汁 茯苓

醫通卷十三 恩得堂藏

石斛酒炒 川草薺炒 白朮

肉苁蓉酒浸 補骨脂炒各四

為末煉蜜丸梧子大每服七十九丸空腹溫酒下

腎藏為風寒所襲所以不安故用烏頭蒸去風散寒之

劑風去則腎自安原無事於溫補也其他桂苓木薺附戟

從解雖曰兼理脾腎而實從事乎祛淫利水祇緣醉飽入

房汗隨風散所以肢體沉重非藉疎通清泄病必不除因

彷彿地黃飲子而為製劑彼用地黃葛志冬味更附以交

心腎之氣此川草薺補骨脂烏頭以祛坎陷之風與崔

氏八味丸迥乎不同也

四烏鯁骨一鹿茸丸素問 治氣竭肝傷脫血血枯婦人血

枯經閉丈夫陰痿精傷

烏鯁骨四兩即 鹿茸一兩本草作
九以雀卵大如小豆以五丸為後飯飲以鮑魚汁利腸中
及傷肝也

內經之方不多見僅數方世都棄置不講況甲乙太素
誤作蘭茹致王太僕亦作蘭茹桂味訓解所以目睹其方
究竟不識為何物爾嘗考本草二味並皆走血故內經以
之治氣竭傷肝血枯經閉等證丸以雀卵飲以鮑魚汁者
取異類有情以暖腎調肝則虛中留結之乾血漸化黃水
而下矣後飯者先藥後飯使藥力下行也惟金水二殺除
虛陽擾喘嗽失血強中滑精者禁用以其專主溫散而無
涵養與陰之澤也

或問烏鯁茹鹿茸俱芫血之品如何可治血枯經閉之疾答

醫通卷十三 恩得堂藏

曰夫血枯經閉非純虛而經絕不行也良由氣竭肝傷乾
血內結以故營血不能內藏如胸脇支滿目眩血結肝部
也則腥臊妨於食血結胃脘也出清涕胃氣衰而濁逆清
道也凡崩淋胞痺諸證若沃以湯上為清涕皆陽衰不能
灌注精微敗殘之液悉化為涕得湯氣蒸而上走空竅也
是知血枯經閉必以清理乾血為首務故金匱治五勞虛
極羸瘦內有乾血用大黃廬蟲丸由此而推胞痺精傷亦
必清理敗濁為首務蓋大黃廬蟲丸一瓜瓞之味較烏
鯁鹿茸丸之蒐血猛峻百倍耳
又問雀卵以時而生恐霜未可必得奈何答曰大匠在乎
補墨不拘物料皆可成器雀卵功專煖腎如無雀肉煮梅
可代雞卵及肝亦可代雞屬寒而肝主血也活法在人可

執一哉

花藥石散 月方 治氣虛血凝。瘀積墜聚。胸膈作痛。宜用車

劑竭之

花藥石 五兩碎產硫黃山中狀如黃石中有黃點如花
上血時化水者真
欲試真偽者以花藥石中有一塊如花藥石者為真
硫黃二兩

右二味同入場成礮內鹽泥封固。煨一伏時。研如麴。每用
二錢。食遠童便調服。婦人產後血逆血氣。胞衣不下。或子
死腹中。俱宜服之。瘀血化為黃水。然後以獨參湯調之。
十灰散 治虛勞吐血咯血。先用此遏之。

大劑

薄荷

山梔

小劑

茜根

大黃

柏葉

茅根

牡丹皮

醫通卷十三

虛損

思得堂藏

機杼皮等分

各燒灰存性。紙裏蓋地上一夕。食遠服二三錢。童便調下。
花藥石散為破血之峻劑。功專化血為水。而世畏其峻。罕
能用之。葛可久言。暴血成升斗者。宜花藥石散。若病久涉
虛。及所腎二家之血。非其所宜。且與十灰散並舉而言。不
分寒熱主治。所以後世不能無誤用之失。當知十灰散專
主大炎上湧之血。倘誤用以治陰邪固結之證。為害猶輕。
若誤用花藥石散。治血熱妄行之病。為患莫測。況血熱妄
行。十常八九。陰邪固結。十無一二。所以舉世醫者病者。俱
畏之如讎。遂致置而不講。乃致一切陰邪暴湧之血。悉皆
委之莫救。豈其命耶。

瑞金丹 治虛勞吐血瘀結者

川大黃 酒拌炒黑至

真秋石 各一

右杵為細末。煮紅棗肉為丸。小豆大。空腹薄荷湯下。二錢。
瘀在心包。不時驚悸。面赤神昏者。加真鬱金三錢。皮色如
者。瘀在胃。吐血成盆者。犀角地黃湯送下。

童真丸 治虛勞吐血。氣虛喘嗽。

真秋石

川貝母 等分

右二味。煮紅棗肉為丸。空腹薄荷湯下。二錢。
如脈虛氣耗。加入人參。若脈細數為陰虛。禁用人參。加牡丹
皮。脾虛泄泄。加山藥茯苓。炙甘草。
龜鹿二仙膏 治腎任俱虛。精血不足。

鹿肉膠 一兩

龜版膠 中兩

枸杞 六兩

人參 四兩

桂圓肉 六兩

醫通卷十三

虛損

思得堂藏

右五味。以杞圓煎膏。煉白蜜收。先將二膠酒浸。拌杞圓膏
中。候化盡。加入人參末。磁罐收貯。清晨醇酒調服五六錢。
聚精丸 治腎虛封藏不固。

鯨膠 白膠者一兩。碎切。蛤粉或牡蠣粉
炒成珠。再用人參末。蛤粉炒。則不粘粉。

沙苑蒺藜 五兩。乳沒一兩。酒洗。乾炒。

為細末。煉白蜜中。加入陳酒。再沸。候蜜將冷。為丸。不可熱
搗。熱搗則膠粘難丸。丸如菉豆大。空心溫酒或白湯下。八

九十九。忌諸魚牛肉。

張景岳加五味二兩。

大補黃庭丸 治虛勞食少便溏。不宜陰虛者。

人參 一兩

茯苓 一兩

山藥 二兩

右為末。用鮮紫河車一具。用河水二升。稍入白蜜。隔水熬

右三味各爲細末和芎藭中另用乾山藥末六兩打糊衆

此本八珍湯去參之益氣膏之上竄地之膜膈而加入紫

胡陳皮薄荷以疎肝氣。量用煨者。取其守中而不致於辛散。帶上也。加丹皮山梔者。以清上下之火也。

芎藭血餘散 治傳屍勞瘵面赤五心煩熱。

室女頂門生髮 煨一團洗淨。

當歸三錢 木香

真安息香 如無蘇合。

全蠍三枚 不炙 降真香 五分

代之蘇合 一教 獾肝 一具 如無以

為散新汲水煎。月初五更空腹服。頭導日午服二導。

龜甲生犀散 治傳屍勞瘵脾虛而手足清。

天靈蓋 一具 炙男者色不赤黑 龜甲 九兩 者一

虎長牙 一教 安忌香

醫通卷十三

生犀角 鈔

思得堂藏

尖橫柳 各半 生犀角 鈔

甘遂 降真香

真阿膠 酒研各 雷丸 二錢

妙三 全蠍 三枚 乾漆 炒令

右為細末每服半兩。先用香豉四十九粒。連殼葱白七莖。

石臼杵爛。新汲水碗半。童便半碗。內藥末。煎取七分。入麝

香一字。月初五更空腹溫服。少時必瀉出蟲。以淨桶盛之。

鉗取付烈火焚之。如瀉不止。煨龍骨炒黃連等分為末。沸

湯下五錢。次日用白梅粥補之。

傳屍丸 治傳屍勞瘵初起元氣未敗者。

鰻鱺魚 半斤 煨

饒中先鋪薄荷葉四兩。入饒在內。抄乾山藥粗末。煎餘。饒

內入去心百部一觔。煮三炷官香。候鰻鱺極去薄荷。取饒與山藥連骨搗爛。焙為末。煉白蜜丸。侵晨晚兩時湯各服五錢。

桂枝龍骨牡蠣湯 桂枝

黃耆建中湯 桂枝

理中丸 方祖

集靈膏 二冬

犀角地黃湯 傷寒

保元湯 方祖

吳功散 四君子

納氣丸 八味

香茸八味丸 八味

醫通卷十三

甘草乾薑湯 理中

白鳳丸 散下

補中益氣湯 保元

增損柴胡湯 小柴胡

玉燭散 四物

四君子湯 方祖

桂枝人參湯 理中

澤木藥街湯 五苓

潮熱門

涼膈散 方祖

逍遙散 虛損

加味逍遙散 虛損

小建中湯 桂枝

八味腎氣丸 方祖即八味

固本丸 二冬

四物湯 方祖

獨參湯 保元

聖愈湯 保元

六味丸 八味

十補丸 八味

枳實理中湯 理中

思得堂藏

炙甘草湯 桂枝

生脈散 方祖

歸脾湯 保元

滋腎丸 大補

蘇合香丸 中風

六君子湯 四君子

當歸補血湯 保元

大柴胡湯 小柴胡

小柴胡湯 方祖

六味丸 八味

當歸補血湯 <small>保元湯下</small>	惡寒門	加減八味丸 <small>八味丸下</small>
大承氣湯 <small>小承氣湯下</small>	指迷茯苓丸 <small>二陳湯下</small>	
理中丸 <small>方祖</small>	升陽益胃湯 <small>保元湯下</small>	
補中益氣湯 <small>保元湯下</small>	枳實理中湯 <small>理中湯下</small>	
二陳湯 <small>方祖</small>	火鬱湯 <small>升麻湯下</small>	
升陽散火湯 <small>升麻湯下</small>	大建中湯 <small>保元湯下</small>	
金花湯 <small>三黃湯下</small>	六味丸 <small>八味丸下</small>	
生脈散 <small>方祖</small>	異功散 <small>四君子湯下</small>	
附子湯 <small>木附子湯下</small>	八味丸 <small>方祖</small>	
人參白虎湯 <small>白虎湯下</small>	清暑益氣湯 <small>保元湯下</small>	
杏桂朮甘湯 <small>桂枝湯下</small>	桃核承氣湯 <small>小承氣湯下</small>	
犀角地黃湯 <small>傷寒門</small>		
振寒門		
白虎加人參湯 <small>白虎湯下</small>	竹葉石膏湯 <small>白虎湯下</small>	
黃耆建中湯 <small>桂枝湯下</small>	桂枝加附子湯 <small>桂枝湯下</small>	
戰慄門		
大承氣湯 <small>小承氣湯下</small>	麻黃湯 <small>方祖</small>	
寒熱門		
小柴胡湯 <small>方祖</small>	柴胡四物湯 <small>小柴胡湯下</small>	
補中益氣湯 <small>保元湯下</small>	理中湯 <small>方祖</small>	
逍遙散 <small>保元湯下</small>		
外熱內寒外寒內熱門		
黃耆建中湯 <small>桂枝湯下</small>	越脾湯 <small>麻黃湯下</small>	

理中湯 <small>方祖</small>	上熱下寒上寒下熱門	火鬱湯 <small>升麻湯下</small>
梔子豉湯 <small>方祖</small>	桂苓丸 <small>五苓散下</small>	
既濟湯 <small>白虎湯下</small>	既濟解毒湯 <small>三黃湯下</small>	
八味丸 <small>方祖</small>	滋腎丸 <small>大補丸下</small>	
加減八味丸 <small>八味丸下</small>	五苓散 <small>方祖</small>	
瘧門		
蜀漆散 <small>全散</small>	治牝癰寒	
蜀漆散 <small>山茱萸</small>	雲母散 <small>雲母散</small>	龍骨 <small>等</small>
右枳為散發商以漿水調半錢	漿水散下	
溫瘧加蜀漆半分臨發時服一錢匕		
按蜀漆性升上湧痰最速雲母性溫開發陰邪最猛二		
味相需較之常山陽起石更捷又恐湧泄太過即以龍骨飲固其津仍取龍性純陽同氣相求佐上藥以發越陰分伏匿之邪則牝癰之寒自已與桂枝龍骨牡蠣湯火逆湯之義不殊其外臺牡蠣湯用牡蠣蜀漆麻黃甘草四味藥雖異而功用則同蓋蜀漆得雲母則溫散頑痰於內蜀漆得麻黃則溫散寒邪於外亦恐發泄太過即以牡蠣收斂陰津仍取其性入陰有軟堅散結之功也用甘草者令以協和中外則胃氣有據方得振祛邪作汗之力耳		
達原飲	治疲癯壯熱多汗而渴	
黃芩 <small>一錢</small>	甘草 <small>一錢</small>	白芍 <small>一錢</small>
知母 <small>二錢</small>	厚朴 <small>一錢</small>	檳榔 <small>二錢</small>
莖葉 <small>一錢</small>	生薑 <small>七片</small>	大棗 <small>一枚</small>

水煎發前熱服溫覆取微汗

或問疫邪初犯募原。吳又可以達原飲為主方。詳方中極
榔草果厚朴。俱屬清理腸胃之品。知母直瀉少陰邪熱。與
募原何預而用之。答曰。募原雖附軀殼。貼近於裏。為經絡
藏府之交界。況濕土之邪。從微而入。以類橫連。未有不入
犯中土者。所以清理腸胃為先。非若傷寒傳次表證未罷。
誤用裏藥。則有結胃傳裏之變。即尚未離表。但須得裏。佐
苓芍甘草以和解之。若見少陽陽明太陽。必兼柴胡葛根
羌活以開泄之。設裡氣不通。勢必盤錯於中。而內陷。則加
太黃以攻下之。又可專工瘟疫。歷治有年。故立此為初犯
募原之主方。其殿後則有白虎涼膈為足之任。以此推
原。其他變證。則三黃雙解。清熱解毒。人中黃九等方。可默

醫通卷十三

思得堂藏

識其微。而用之。必當矣。余嘗以此治疫癘。時癘。靡不應手

獲効。總藉以分解中外寒熱諸邪之力耳。

何首烏散 治癰積滯去後寒熱不止至夜尤甚

生何首烏 五錢 青皮

甘草 一錢 生薑 七片 陳皮 大棗 三枚

水煎露一宿侵晨熱服

多汗而渴加知母烏梅。虛人腹痛加入參厚朴木香。

七寶飲 治一切實癰服調理藥不止

厚朴 常山 醋炒 檳榔

陳皮 青皮 草果 錢

甘草 炙七 生薑 七片

水酒各半煎。露一宿侵晨熱服。一方多一半夏

常山飲 治癰發時。至夜熱不止。服實邪益香。

常山 醋炒 檳榔 青皮 炒

甘草 當歸 各一 穿山甲 八分 本分世

黑豆 四十 生薑 七片

水酒各半煎。露一宿侵晨熱服。

龜甲煎丸 金匱 治癰母一切癰積。

龜甲 二兩 柴胡 芍藥

牡丹 烏扇 燒 桂枝 千金作

鼠婦 煨 蛇蛻 四錢 桃仁

阿膠 各三 黃芩 半夏

乾薑 大黃 厚朴 峰房 各

人參 厚朴 思得堂藏

醫通卷十三

癰

思得堂藏

石葶 去毛 紫葳 各二 葶藶

瞿麥 各一 赤硝 一兩

右二十三味為末。取銀簍下灰一斗。清酒一斛。浸灰候酒

盡一半。濾去灰。著龜甲於中煮令泛爛如膠漆。絞取汁。納

諸藥末煎為丸。如梧子大。空心服七丸。日三服。千金無鼠

海藻 大棗 此方妙用。全在龜甲之用。灰淋酒煮如膠漆。非但龜甲消

積。酒淋灰汁亦善消積。較龜母丸之用。醋煮。功用百倍。

瘰癧母丸 治癰瘰結於左脇硬痛。

青皮 桃仁 神翅

麥芽 各一兩四 龜甲 三兩 山稜

蓬朮 海粉 各五錢 香附 二兩 五味

紅花 三錢

神麴糊丸。梧子大。每服七八十九。空心淡薑湯下。

白虎湯 方祖

白虎加桂枝湯 湯下

柴胡去半夏加栝蘆湯 湯下

柴胡桂枝湯 湯下

二陳湯 方祖

柴胡桂枝湯 湯下

人參養胃湯 湯下

清脾飲 湯下

補中益氣湯 湯下

人參黃蘗湯 湯下

白虎加人參湯 湯下

胃苓湯 湯下

理中湯 方祖

小建中湯 湯下

黃耆建中湯 湯下

六味丸 湯下

當歸內補建中湯 湯下

涼膈散 方祖

大柴胡湯 湯下

醫通卷十三

恩得堂藏

恩得堂藏

人參敗毒散 湯下

逍遙散 湯下

六君子湯 湯下

四獸飲 湯下

芎歸龍甲飲 湯下

清暑益氣湯 湯下

生薑瀉心湯 湯下

八味丸 方祖

厥門

四逆散 湯下

四逆湯 方祖

附子理中湯 湯下

加減八味丸 湯下

清暑益氣湯 湯下

犀角地黃湯 湯下

地黃飲子 湯下

八味丸 方祖

承氣湯 方祖

二氣丹 湯下

五苓散 方祖

白虎湯 方祖

人參七氣湯 方祖

氣門

烏沉湯 方祖 治一切冷氣及婦人血氣攻擊心腹脹痛。

天台烏藥 湯下

沉香 湯下

人參 湯下

甘草 湯下

右四味為末。每服半兩。入生薑三片。煎成人食鹽一字。熱服。

沉香降氣散 方祖 治一切氣滯胸膈不舒。婦人經勞不調。

少腹刺痛 湯下

沉香 湯下

甘草 湯下

香附 湯下

砂仁 湯下

右四味為散。每服二錢。入鹽一字。沸湯調服。

木香調氣散 治氣滯胸膈虛痞。嘔逆刺痛。

醫通卷十三

厥氣

恩得堂藏

白豆蔻 湯下

丁香 湯下

木香 湯下

檀香 湯下

藿香 湯下

甘草 湯下

砂仁 湯下

右為散。每服二錢。入鹽一字。沸湯調。如稠糊晨夕各一服。

或滴水為丸。服二錢。

本方加人參白朮。茯苓山藥。橘皮青皮。草澄茄。名育氣散。

治虛寒腹痛。進飲食。

四磨湯 治一切氣塞痞悶不舒。不時暴發。

沉香 湯下

烏藥 湯下

檳榔 湯下

人參 湯下

右等分。酒磨各約半錢。入鹽一字。沸湯煎服。或磨上三味。倍用人參煎湯入鹽調服。

六磨湯

四磨湯加枳殼木香

按四磨湯雖用人參實爲散氣之峻劑。蓋枳沉烏藥得人參助之其力愈峻。服後大便必有積沫下後即寬。若六磨更加破氣二味下氣尤速。近世醫人以氣滯不敢用參。但用諸破氣藥磨服殊失木方之旨。

沉香化氣丸 治食積痰氣痞脹妨食。

大黃酒蒸

條黃芩各二兩

人參

白朮各三兩

沉香五錢

右將前四味剉碎。用薑汁竹瀝七段七曬候乾爲末。和沉香末再研。神麴糊丸。水飛珠砂爲衣。曬乾勿見火。每服二錢。淡薑湯送下。小兒量減。

醫通卷十三

氣

聖一恩得堂藏

此做王隱君滾痰丸之製。去礞石加參朮以壯食積痰飲。雖較滾痰丸稍遜。然二費得參朮以鼓其勢。亦是突開猛帥。勿以其中有參朮視爲兼補漫施。以伐後天。爲害非淺鮮也。

四七湯 二陳湯方祖

局方七氣湯方祖

二陳湯 方祖

理中湯方祖

六君子湯 四君子湯方祖

蘇子降氣湯 七氣湯方祖

導痰湯 二陳湯方祖

神保丸 傷飲方祖

蘇合香丸 中風方祖

吳功散 四君子湯方祖

三因七氣湯 七氣湯方祖

八味丸 方祖

鬱門

越鞠丸 治諸鬱痞悶。

香附 童便

芥朮 治痰去邪 神效 童便浸

山梔 炒黑

神效 童便浸

滴水爲丸。紫豆大。每服百丸。白湯下。陰虛多火禁用。

越鞠者。若人鬱躬鬱伏。忽爾其氣發越也。香附理氣鬱。蒼朮開滯鬱。撫芎調血鬱。梔子治火鬱。神麴消食鬱。總以理氣爲主。若滯鬱加白朮茯苓。熱鬱加青黛黃連。痰鬱加半夏海石。食鬱加枳實山查。血鬱加桃仁肉桂。氣鬱加水香砂仁。此因病變通之大畧也。

火鬱湯 升麻

承氣湯 方祖

利金湯 枳殼

二妙散 九下

平夏厚朴湯 二陳湯方祖

逍遙散 虛損

佐金丸 方祖

四君子湯 方祖

醫通卷十三

聖一恩得堂藏

聖一恩得堂藏

六味丸 八味丸下

歸脾湯 傷元

蘇子降氣湯 七氣湯方祖

四烏湯 傷下

痞滿門

五膈寬中散 治七情鬱結。痰氣痞塞遂成五膈。

厚朴 薑汁炒

甘草 炙一兩

木香 五錢

白豆蔻仁 三錢

爲散。每服三錢。加生薑三片。水煎入鹽一字和滓服。

丁沉透膈湯

五膈寬中散。加丁香沈香。半夏草果。人參白朮香附。砂仁。生薑大棗水煎服。一方多青皮陳皮。神麴麥芽。

消損流氣飲 治諸氣鬱滯。胸膈痞滿面目浮腫。

半夏

赤茯苓

陳皮 各一錢

澤瀉

人參各五錢

甘草各一錢

湯浸蒸餅爲丸。梧子大。每服百丸。食後沸湯下。

脾胃氣滯。食積脹滿。加陳皮砂仁各五錢。經脈滯。腹皮

腿臂痛不可拊者。加片子薑黃一錢。肺熱氣化不行。溺秘

喘渴者。加知母三錢。

東垣分消湯丸。一主溫中散滯。一主清熱利水。原其立方

之旨。總不出內經平治權衡。去菴陳莖。開鬼門。潔淨府等

法。其方下所指寒脹。乃下焦陰氣逆滿。鬱遏中焦陽氣。有

似乎陰之象。故藥中雖用烏頭之辛熱。宜布五陽。爲辟除

陰邪之嚮導。即用連棗之苦寒。以降泄之。苟非風水膚脹

脈浮。證起於表者。孰敢輕用開鬼門之法。以鼓動其陰。雍

四塞乎。熱脹用黃芩之輕揚。以降肺熱。則用猪苓澤瀉以

醫通卷十三

腹滿

五十 思得堂藏

利導之。故專以潔淨府爲務。無事開鬼門。宜布五陽等法也。

附子梗米湯 金匱

治腹中寒氣。噎切痛。胸腹逆滿。嘔吐。

附子 薑汁

半夏 薑汁

甘草 各三錢

大棗 十枚

梗米 半升

右五味。以水五升。煮米熟湯成。去滓。溫服一升。日三服。

良方但用薑汁製附子一味。煮粥食之。

溫胃湯 千金

治胃氣不平。時服。效不能食。

附子

當歸

厚朴

人參

橘皮

芍藥

甘草 各三錢

乾薑 四錢

蜀椒 一合

右九味。咬咀。以水九升。煮取三升。分三服。

大承氣湯 小承氣湯

大此胡湯 小柴胡湯

厚朴七物湯 湯下

厚朴三物湯 湯下

當歸龍薈丸 湯下

四物湯 方煎

四君子湯 方煎

藿香正氣散 散下

沉香降氣散 氣門

局方七氣湯 方煎

生薑瀉心湯 心湯下

附子理中湯 湯下

濟生腎氣丸 丸下

枳實導滯丸 食門

水腫門

疏鑿飲 治水氣通身浮腫。煩躁喘渴。小便不利。

澤瀉

商陸

羌活

大腹皮 淨

木通

桑白

水煎頓服。

生薑 三片

禹切散 治陽水便秘。脈實。初起元氣未傷者。

黑牽牛 四兩

茴香 炒

爲散。每服二錢。加生薑自然汁。調如稀飲服。

木香 各一兩

沉香琥珀丸 治血結小腹青紫筋絆。喘急脹痛。

杏仁 一升

琥珀 另研

蘇木

赤茯苓

澤瀉 各五錢

郁李仁 去皮各

沉香 另研

防己 五錢

麝香 一錢

蜜丸。菜豆大。每服四五十九。加至百丸。空心人參湯下。

三白散 治陽水囊腫。二便不通。

<p>增損流氣飲門 務滿</p> <p>胃苓湯 散下</p> <p>歸脾湯 湯下</p> <p>越脾加朮湯 湯下</p> <p>桂枝加黃耆湯 湯下</p> <p>澤瀉湯 湯下</p> <p>滑川散 湯下</p> <p>神芎丸 湯下</p> <p>理苓湯 湯下</p> <p>濟生腎氣丸 湯下</p> <p>真武湯 湯下</p> <p>蘇子降氣湯 湯下</p> <p>防已黃耆湯 湯下</p> <p>防已茯苓湯 湯下</p> <p>麻黃附子湯 湯下</p> <p>鼓脹門</p> <p>雞矢醴 湯下</p> <p>鴈雞矢白 湯下</p> <p>右取八合微炒入無灰酒三升。煮取二升五合。五更熱服。如無以不落。雞內金炙鹿角末。荷葉。此方出黃帝內經。世本有加。大黃桃仁者。大謬。</p> <p>微咳湯 治肝腎俱虛。腹脹少食。</p> <p>人參</p> <p>白朮 湯下</p> <p>甘草 湯下</p>	<p>葶藶水香散 散下</p> <p>羌活勝濕湯 湯下</p> <p>金液丹 湯下</p> <p>著均桂酒湯 湯下</p> <p>桂枝去芍藥加麻辛附子湯 湯下</p> <p>枳朮湯 湯下</p> <p>神祐丸 湯下</p> <p>五苓散 湯下</p> <p>六君子湯 湯下</p> <p>金液丹 湯下</p> <p>小背龍湯 湯下</p> <p>除淫湯 湯下</p> <p>越脾湯 湯下</p> <p>蒲灰散 湯下</p> <p>杏子湯 湯下</p>	<p>醫通卷十三</p> <p>五二思得堂藏</p>
--	---	----------------------------

<p>肉桂 半錢</p> <p>肉果</p> <p>水煎溫服。</p> <p>氣滯硬滿者。去黃耆加厚朴。此方出醫林黃治。啟東之方不多見。僅一藥耳。</p> <p>散血消脹湯 治血脹小便多。大便溏黑光亮。</p> <p>歸尾 五分</p> <p>烏藥 五分</p> <p>川芎 二分</p> <p>紫蘇 三分</p> <p>水煎食前溫服。</p> <p>琥珀人參丸 治血虛。</p>	<p>茯苓 一錢</p> <p>沉香 八分</p> <p>附子 五錢</p> <p>乾薑 四分</p> <p>五靈脂 一錢</p> <p>甘草 五分</p> <p>半夏 一錢</p> <p>砂仁 一錢</p> <p>生薑 五片</p> <p>木香 六分</p> <p>蓬朮 八分</p> <p>生薑 五片</p> <p>赤茯苓 一錢</p> <p>穿山甲 三錢</p> <p>五靈脂 一錢</p> <p>附子 五錢</p> <p>沉香 八分</p> <p>中滿分消丸 湯下</p> <p>六君子湯 湯下</p> <p>五苓散 湯下</p> <p>小建中湯 湯下</p> <p>黑錫丹 湯下</p> <p>積聚門</p>	<p>人參</p> <p>肉桂</p> <p>川芎</p> <p>五靈脂 各一</p> <p>附子 五錢</p> <p>沉香</p> <p>穿山甲 三錢</p> <p>赤茯苓</p> <p>五靈脂 一錢</p> <p>附子 五錢</p> <p>沉香 八分</p> <p>中滿分消丸 湯下</p> <p>六君子湯 湯下</p> <p>五苓散 湯下</p> <p>小建中湯 湯下</p> <p>黑錫丹 湯下</p> <p>積聚門</p>
--	---	--

奔豚湯全區 治胃積上黃疝肺喘脹發熱。

甘草 芎藭 白芍

當歸 黃芩 半夏 生薑 三片

甘李根白皮 葛根 二錢 右九味水煎溫分四服日三夜一以積下小腹減為度不

應加戎鹽一字。千金無甘草黃芩有吳茱

赤丸 金匱 治寒積厥逆。

茯苓 半夏 各四兩一 烏頭 二枚

細辛 一兩千金 方用桂 半夏 各四兩一 烏頭 二枚

右四味為末內真朱砂為色蜜丸如麻子大先食酒下

三九日再夜一服不知稍增以知為度附子桂心射罔

普濟方用白鳳仙子一錢小川烏二枚半夏三枚杏仁四

十九粒各生搗為末紅棗肉九指子大黃丹為衣早暮各

服七丸俱溫酒下若治小兒丸如粟米大量用三五丸待

穀道血出住服忌大葷生冷腐腐等物此方與赤丸功效

相類故附於此

此方烏頭與半夏同劑用相友以攻堅積沉寒非妙達先

聖至理不能領畧其奧與胡洽治偏上積用十棗湯加甘

草大戟同一妙義而普濟方僅用烏頭半夏二味易白鳳

仙子杏仁黃丹為衣服七丸至穀道見血而止其取眩之

性可知蓋藥之相及相惡不過兩毒相激元非立能傷人

後世以為相反之味必不可同用隨哉

喬氏陰陽攻積丸 治寒熱諸積

吳茱萸 乾薑 炮 觀桂

川烏 炮 黃連 薑汁 半夏 薑製

茯苓 沉香 另研 延胡索 人參 各一

琥珀 五錢 巴豆霜 另研 為末皂角四兩煎汁糊丸菜豆大每服八分加至一錢五

分薑湯下與脾胃藥間服

此方出士材先生必讀先生向寓郭園曾以此方授之郭

姬云是喬三餘所定方中使桂走肝乾薑入脾烏頭達腎

專取辛烈以散五臟之固壅半夏茯苓以開痰蔽延胡琥

珀以散血結沉香以通氣閉巴霜以湯堅積黃連以除疳

氣人參以助諸味之力也其所授郭姬之方酒麴糊丸較

之皂角汁稍平妙用全在與脾胃藥間服予曾效用此方

每以六君去木倍苓加肉桂當歸米飲糊丸或朝服增損

六君夕用陰陽攻積或服攻積一日六君二三日隨人強

弱而施但初服未嘗不應積勢向衰即當待服所謂衰其

大半而止專力補脾可也

省婆萬病丸 治七種瘡塊五種癰病十種疰忤七種飛尸

十二種蠱毒五種黃病十二種瘧疾十種水病八種大風

雞聲不得眠飲食不作肌膚五藏滯氣積聚不消壅閉

不通心腹脹滿及連胸背鼓氣堅結流入四肢或復又心

膈氣滿時定時發十年二十年不瘥五種下痢疰蟲寸白

諸蟲上下冷熱久積痰飲令人多睡消瘦無力陰入骨髓

便成滯患身體氣腫飲食嘔逆腰脚酸疼四肢沉重行立

不能久婦人因產冷入子藏藏中不淨或閉塞不通胞中

醫通卷十三 五七 恩得堂藏

子 50-531

瘀血冷滯。出流不盡。時時疼痛為患。或因此斷產。并小兒赤白下痢。及狐臭耳聾鼻塞等病。此藥以三九為一劑。服藥不過三劑。萬病悉除。說無窮盡。故稱萬病丸。

牛黃

麝香

桑白皮 剉炒

茯苓

桂心

當歸

芍藥

甘草

蜀椒 去目及開口者炒出汗

細辛

巴豆 去心炒

前胡

蒲黃 微炒

草薢 炒

人參

朱砂

黃連 去須

大戟 剉炒

雄黃 油煎

禹餘糧 醋煨

石蜥蜴 一寸去頭足炙

羌花 各一錢六分 炒赤 蜈蚣 六節去頭足炙

芫青 十四枚 入糯米同炒 芫青 十四枚 入糯米同炒

右三十一味 搗碎 黃禹餘糧 巴豆 別研 餘者合搗 重絹下篩 以犀角 不砂確 黃禹餘糧 巴豆 別研 餘者合搗 重絹下篩 以

白蜜和。更搗三千杵。密封下。破除日平。且空腹酒服三丸。如梧子大。取微下三升。惡水為良。若卒暴病。不拘平旦早晚皆可服。但以吐利為度。若不吐利。更加一丸。或至三丸五丸。須吐利為度。不得限以九數。病強藥少。即不吐利。更非他故。若其發遲。以熱飲汁投之。若吐利不止。即以酢飯兩三升止之。服藥忌陳臭生冷酢滑粘食大蒜猪雞魚狗牛馬驢肉白酒行房。七日外始得。一日服二日補之。得食新米韭根汁。作羹粥腫飲食之。三四頓大良。亦不得全飽。

產婦勿服。吐利後以常須閉口少語。於無風處溫牀暖室將息。若旅行卒暴無欲。以小便送之為佳。若一歲以下小兒有疾者。令乳母服兩小豆。亦以吐利為度。近病及卒病皆用多。積久疾病即少服。常取微利為度。其和證服法金衍義醫府門本方下。

水香通氣散 治寒氣成積。腹痛堅滿不可忍。

木香

戎鹽

厚朴 薑製

枳實 炒

乾薑 炮

連朮 各二錢

為散。每服三錢。食前淡薑湯調下。

四味阿魏丸 治肉積發熱。

山楮肉 薑汁炒

連翹 仁

黃連 薑汁炒

各五錢

為末。另用阿魏一兩。醋炙糊丸。麻子大。每服二十九至三十丸。食前沸湯下。脾胃虛人。六君子湯下。

和血通經湯 治婦人寒客胞門。月事不來。結為石瘕。及一切血結成積。

當歸

熟地黃

三稜 炮

廣茂 炮

貫眾

肉桂 各八分

血竭 五分

蘇木 各

食前紅酒煎服。忌酸醋生冷之物。

水香

見現丸 治寒氣客於下焦。血氣閉塞而成石瘕。腹中堅人久不消者。

紅花 三分

附子 炮去皮

鬼箭羽 如無錢經甲代之。肥人

癰疽 癰疽 癰疽

癰疽 癰疽 癰疽

紫石英各三錢

澤瀉

肉桂勿見

延胡索

木香各二錢

檳榔五分

血竭一錢五分

水蛭一錢

桃仁三十粒

炒去

京三稜五錢

大黃同三稜

煅

右十三味。除血竭桃仁外同爲末。入另研二味和勻。紅酒打糊。九如桐子大。每服三十九。淡醋湯下。食前溫酒亦得。虛者去水蛭三稜。加入參一兩。當歸五錢。虛甚用十全大補湯送下。

阿魏麝香散 治腸單諸積痞塊。

阿魏五錢 麝香一錢

雄黃三錢

野水荭花子四兩 神麴炒

人參

醫通卷十三

積聚

思得堂藏

白朮生各一兩 肉桂五錢

右爲散。每服三錢。用烏羊即羊三箇。去皮搗爛和藥。早晚各一服。砂仁湯過口。

三因化氣散 治息積上下黃脹。

肉桂勿見 蓬水煨

青皮炒

陳皮火 乾薑炮

沉香另研

木香 甘草炙

丁香

胡椒 砂仁各二錢

茴香炒四錢

爲散。每服三錢。薑蘇鹽湯調下。婦人醋湯調服。

阿魏膏 治一切痞塊。

羌活 獨活

黑參

親桂

赤芍

穿山甲煨

生地黃

狼鼠糞

大黃

白芷

天麻各五錢

紅花

槐柳枝各三錢

土木鱉去殼

右用真麻油二匊。浸。春五夏三秋七冬十日。煎黑去滓。入亂髮雞子大一握。再熬。趁清。徐下真黃丹煎。較硬得中。入芒硝阿魏乳香沒藥各五錢。取起離火。再入蘇合香油。半兩。麝香三錢。調勻成膏。磁器收貯。臨用時取兩許。攤大紅紵上貼患處。內服從脾胃消積開鬱。凡貼背須正當痞塊。不可偏。偏則隨藥少處。遊去。即不得力。貼後以綿紙掩。用艾炷隨患處鋪半指厚。用熱熨斗熨一時許。日熨三次。硝耗再加。月餘藥力盡。其膏自脫。便愈。年久者連用二膏。無不消盡。若是肝積見於左脇。加盧薈末和硝熨之。倘積

醫通卷十三

積聚

思得堂藏

去。於所遷處再貼一膏。必仍歸舊窠矣。

普濟方無羌活黑參白芷天麻生地赤芍。多川烏南星半夏甘遂甘草人參五靈脂各五錢。

鰾鰒丸 治食魚鼈成痞。此方最捷。餘俱不効。

鰾鰒一隻 去毛水酒各半 煮爛入阿魏五錢 更

水荭花子六兩 白朮二兩 阿魏一兩

神麴 茯苓

橘紅 甘草各五錢

爲末。加生薑自然汁半杯。入煉白蜜九彈子大。細嚼下。九沸湯或溫酒過口。早暮各一服。

阿魏化痞散 治癰痞寒熱及痰癥。虛人禁用。

川芎

當歸

白朮

赤茯苓

紅花

阿魏各一

醋甲尖三錢

大黃八錢

蕎麥麪一兩

為散。每服四錢。好酒一盞。調稀糊服。服後三日。腹痛見膿。血為驗。忌生冷油膩。大輩溼麪等物。

金匱三物大建中湯湯下

金匱大黃附子湯湯下

大七氣湯局方七

六君子湯湯下

五苓散方

導痰湯湯下

理中湯方

十全大補湯湯下

痰飲門

甘遂半夏湯金匱

治病者脈伏。自利反快而渴。雖利心下

續堅滿。此為留飲欲去故也。

甘遂三枚

半夏十二枚

醫通卷十三

痰飲

空三思得堂藏

甘草如指大

右四味。水煎去滓。以蜜半杯和服。

按甘遂與甘草相及。而一方並用。乃瀉痰逐飲之峻劑。非

聖於治者。不敢擬議也。

水防已湯金匱

治支飲心下痞堅。脈沉而黑。吐下不愈者。

水防已三錢

石膏雞子大

桂枝二錢

人參四錢

水煎溫分再服。

水防已去石膏加茯苓芒硝湯金匱

水防已湯減防已一錢。去石膏加茯苓芒硝各四錢。

水煎去滓。內芒硝再微煎。分溫再服。微利則愈。

葶藶大棗瀉肺湯金匱

治支飲喘不得息。肺癰喘不得臥。

葶藶如黃指大

大棗十二枚

右二味。以水三升。煮取一升。分溫再服。則吐膿血。

已椒蘆黃丸金匱

治腹滿口乾燥。此腸胃閉有水

氣。

防已

椒目

大黃各一

右四味。末之。蜜丸如梧子大。先食飲服十九日。三服。稍加

口中有津液。渴者加芒硝半兩。

倍術丸局方

治五飲留伏。腹中鳴轉。漉漉有聲。

白朮二兩

乾薑炮

肉桂各一兩

神麴糊丸。每服五七十九丸。食前淡薑湯下。

青礞石丸

治中外老痰。胸膈痞悶。經絡四肢不遂。

醫通卷十三

痰飲

空三思得堂藏

青礞石五兩

半夏一兩

風化硝三錢

白朮生一兩

橘紅五錢

茯苓八錢

黃芩四錢

神麴糊丸。空心淡薑湯下一錢。

痰丸一名王隱君痰丸

治諸實熱積痰異證。

孕婦勿服。

青礞石色青者良

沉香另研

為末。水泛為丸。桑豆大。每服一錢至二錢。食遠沸湯下。原

錢張景岳倍之。

沉香化痰丸。治胸中痰熱。積年痰火。無血者宜服。

半夏八兩

黃連二兩

木香一兩 沉香一兩

為細末。甘草湯泛為丸。空心淡薑湯下二錢。

蓮痰丸 治脾虛熱痰堵塞。胸氣不舒。

沉香化痰丸 半料。合四君參朮茯苓各三兩。甘草一兩。

消痰餅子 治老痰結於喉中。燥不得出。

桔槩仁 堅去油 杏仁 研細脂 海石 煨 風化硝 等分

先用生薑自然汁少許拌。加煉白蜜九彈子大。不時噙化一丸。

倒倉法 治癰府腸胃輕格宿滯。諸藥不効者。

夏月三伏中。揀肥嫩黃牛肉四兩。各七八觔。切作小片。去筋膜。入砂鍋中。長流水煮爛。搗絞取汁。三次去滓。以汁

醫通卷十三

痰飲

思得聖藥

入鍋內。漫火熬至琥珀色為度。膠成。隔水頓鍋中。時添微火。則不冷不餒。須預先斷肉食。淡三日。前一日勿食晚飯。於明亮密室中。不通風處行之。置穢桶瓦盆。貯所下之物。以新磁瓶。盛示出之。瀉令病者入室。以膠汁飲一杯。少頃又飲一杯。積數十杯。自然吐利。視所出之物。必盡病根。乃止。吐利後必渴甚。不可與湯。以所出之瀉。乘熱飲之。以瀉滯餘垢。行後倦怠。覺微先以米飲。次與淡稀糜。三日後方可稍食米羹。調養半月。或一月。自覺精神煥發。形體輕健。沉痾悉去矣。自後於身須忌牛肉。永不復發。如有餘膠。熬如鹿角膠收。藏即散天膠。可入補劑。

瓜蒂散 治寒痰結於膈上。及淫熱頭重鼻塞。

瓜蒂一分 赤小豆二分

右二味。各別搗篩為散。已合治之。取一錢匙。以香豉一合。用熱湯七合。煮作稀糜。去滓。取汁和散。溫頓服之。不吐者。少少加。得快吐乃止。

苓桂朮甘湯 治痰下

十棗湯 方祖

小青龍湯 治痰下

厚朴大黃湯 治痰下

小半夏茯苓湯 治痰下

半夏厚朴湯 治痰下

二陳湯 方祖

刺金湯 治痰下

千船湯 治痰下

腎氣丸 九味

大青龍湯 治痰下

澤瀉湯 治痰下

小半夏湯 治痰下

五苓散 方祖

桂苓丸 五苓

六君子湯 治痰下

十味導痰湯 治痰下

涼膈散 方祖

醫通卷十三

痰飲

思得聖藥

八味丸 方祖

控涎丹 治痰下

小陷胸湯 治痰下

指迷茯苓丸 治痰下

外臺茯苓丸 治痰下

理中湯 方祖

加味逍遙散 治痰下

異功散 治痰下

真武湯 治痰下

枳朮丸 方祖

挂苓五味甘草湯 金匱

導痰湯 二陳

局方七氣湯 方祖

四七湯 治痰下

深師消飲丸 治痰下

溫膽湯 治痰下

加味導痰湯 治痰下

六味丸 九味

二冬膏 方祖

補中益氣湯 治痰下

救嗽門

治嗽逆氣從小腹上衝。

桂枝

五味子二錢

茯苓各四錢

甘草錢三

水煎去滓。溫分三服。

桂苓五味甘草湯。去桂加薑半湯。金匱

桂苓五味甘草湯。去桂枝。加乾薑細辛各三錢。

喘逆更加半夏二錢。形腫更加杏仁二錢。面赤如醉更加

大黃三錢。

射干麻黃湯。金匱

射干三錢

治欬而上氣。喉中水雞聲。

紫苑

款冬花各三錢

五味子一錢

半夏二錢

生薑四片

大棗二枚

先煮麻黃去上沫。內諸藥。湯成去滓。溫分三服。

厚朴麻黃湯。金匱

治欬而脈浮。上氣胸滿。喉中不利。如水雞聲。

雞聲。

厚朴半兩

麻黃四錢

石膏雞子大碎

杏仁半兩

半夏半兩

乾薑二錢

細辛一錢

五味子半錢

小麥一合

先煮小麥。去滓。內諸藥。湯成去滓。分溫三服。

按此本麻杏甘石。越婢半夏。及大小青龍之製。主以厚朴

辛溫散氣。使以小麥補肝助胃。西北二方發汗之首劑也。

澤漆湯。金匱

治欬而脈沉。上氣咽喉不利。

澤漆一兩

白芍半斤

紫參如無紫

桂枝半斤

人參

甘草

黃芩

生薑四片

右九味先煮澤漆。去滓。內諸藥。湯成去滓。溫服至夜盡。

麥門冬湯。金匱

治火逆上氣。咽喉不利。

麥門冬一兩

半夏半斤

粳米半合

人參一錢

甘草六分

大棗四枚

右六味。水煎溫分日三夜一服。

按此即白虎加人參湯。去石膏知母。加麥冬半夏大棗也。

金沸草散

治肺感風寒。欬嗽氣塞聲重。

旋復花半斤

麻黃半斤

前胡各七

甘草

荆芥穗

半夏

生薑三片

大棗一枚

水煎。去滓。溫服。

消風散。局方

治風熱欬嗽。遍身疥癩。小兒瘡疹餘熱。

川芎

羌活

防風

荆芥穗

薄荷

人參

茯苓

礞石

蟬蛻等分

甘草炙

陳皮

厚朴減半

右十二味。為散。每服三四錢。茶清調下。或用五錢水煎去

滓。服。如久病頭風目昏。每日三服。効。

此方妙用。全在厚朴人參。當知肌表之疾。無不由胃而發。

故用厚朴清理其內。即以人參助諸風藥。消解風熱於外。

則羌防荆芥。方始得力耳。

漫白散。治肺熱欬。手足心熱。

桑根皮。地骨皮。各一

甘草。各五

為散。每服四五錢。入梗米百粒。竹葉一托。水煎服。加橘紅。桔梗。名加味傷白散。有熱更加知母黃芩。如有客邪禁服。或問地骨皮。三焦氣分藥。瀉白用之何義。答言三焦屬腎。實則瀉其子也。門人曰唯。吾道一以貫之。

欬冬花

川貝母去心 肉桂

甘草炙各

驚管石五錢取即鍾乳之灰搗者

為極細末。以蘆管吸少許。喻化嚥之。日五七次。

此即宣明焚香透膈散之變法。彼用雄黃佛耳。此用桂心貝母甘草。彼取無形之氣。以散肺中之伏寒。此用有形之散。以搜肺絡之伏飲。藥雖相類。而用法懸殊。總取鍾乳欬冬之溫肺利氣也。

醫通卷十三

欬散

辛 恩得堂錄

補肺湯千金

治肺胃虛寒欬散

五味子一錢

乾薑

桂心

欬冬花

麥門冬去心各

桑白皮薑汁和蜜炙黃二錢

大棗三枚

水炙。溫分三服。

紫苑草湯改定

治傷寒後發熱中見血。

紫苑草三錢

茯苓

白朮煎生用

澤瀉各一錢

牡丹皮

麥門冬去心各

犀角八分

甘草炙三分

藕汁半盞

右九味。水煎食遠服。瘦人陰虛多火。忌用燥藥。去白朮。易白芍藥一錢。兼傷肉食。胸膈膨脹。去犀角芍藥。加炮黑山樵肉三錢。炒枳實一錢。

紫苑散 治欬唾有血。虛勞肺痿。

紫苑草

人參各二兩

麥門冬去心

桔梗

茯苓

阿膠

川貝母去心各

五味子

甘草炙各

為散。每服四五錢。水煎去滓服。

紫苑膏

治肺熱欬嗽。肌膚灼熱。面赤如醉。

紫苑草二兩

欬冬花一兩

杏仁泡去皮

枇杷葉刷去毛

木通

桑根皮蜜炙

大黃酒蒸各

熬膏。蜜收。不時喻化一二匙。中病即止。不可過服。久嗽去杏仁大黃。煎成加童便半盞。

小青龙湯

異功散四君子

醫通卷十三

欬散

辛 恩得堂錄

六味九

桂枝二越脾一湯桂枝湯下

小青龙加石膏湯桂枝湯下

炙甘草湯桂枝湯下

小柴胡湯方祖

理中湯方祖

桂枝湯方祖

華蓋散麻黃湯下

九寶湯麻黃湯下

芎藭散傷寒門

寧嗽化痰湯二陳湯下

小建中湯桂枝湯下

真武湯湯下

濟生腎氣丸八味湯下

嚴縫湯傷寒門

越脾湯麻黃湯下

古今錄驗續命湯方祖

涼膈散方祖

加減葱白香豉湯傷寒門

小陷胸湯傷寒門

麻黃加朮湯麻黃湯下

二陳湯方祖

千金湯二陳湯下

千金麥門冬湯燥門

千金五味子湯 <small>燥門</small>	桔梗湯 <small>方祖</small>
地黃煎 <small>燥門</small>	千金地黃煎 <small>燥門</small>
生脈散 <small>方祖</small>	二冬膏 <small>方祖</small>
麻杏甘石湯 <small>麻黃湯下</small>	保元湯 <small>方祖</small>
蘇子降氣湯 <small>湯下</small>	四七湯 <small>湯下</small>
歸脾湯 <small>湯下</small>	逍遙散 <small>湯下</small>
加味逍遙散 <small>湯下</small>	加味導痰湯 <small>湯下</small>
枳殼散 <small>湯下</small>	補中益氣湯 <small>湯下</small>
都炁丸 <small>湯下</small>	犀角地黃湯 <small>湯下</small>
平胃散 <small>湯下</small>	越鞠丸 <small>湯下</small>
四烏鯁骨一慮茹丸 <small>湯下</small>	百勞丸 <small>湯下</small>
溫肺湯 <small>湯下</small>	半夏溫肺湯 <small>湯下</small>
參蘇溫肺湯 <small>湯下</small>	黃耆建中湯 <small>湯下</small>
環玉膏 <small>湯下</small>	加減八味丸 <small>湯下</small>
生料鹿茸丸 <small>湯下</small>	門冬清肺飲 <small>湯下</small>
三拗湯 <small>湯下</small>	竹葉石膏湯 <small>湯下</small>
五苓散 <small>湯下</small>	局方七氣湯 <small>湯下</small>
瑞金丹 <small>湯下</small>	童真丸 <small>湯下</small>
烏骨雞丸 <small>湯下</small>	大溫經湯 <small>湯下</small>
肺痿門	
溫中生薑湯 <small>千金</small>	治肺痿虛寒喘吸胸滿。
生薑一兩	桂心
甘草	麻黃 <small>各一兩</small>
右五味以水一斗。先煮麻黃兩沸去沫。然後入諸藥。合煮。	

取二升半分三服。	生薑甘草湯 <small>千金</small>	治肺痿欬唾涎沫咽燥而渴。
	生薑 <small>半兩</small>	甘草 <small>二錢</small>
	大棗 <small>五枚</small>	人參 <small>三錢</small>
右四味水煎溫服。		
人參蛤蚧散	治肺痿失音。欬唾膿血。或面上生瘡。	
川蛤蚧 <small>十對</small>	治肺痿失音。欬唾膿血。或面上生瘡。	
川貝母 <small>去心</small>	治肺痿失音。欬唾膿血。或面上生瘡。	
人參	治肺痿失音。欬唾膿血。或面上生瘡。	
爲散。每服三錢。不拘時。茶清或蜜水調服。		
甘草乾薑湯 <small>湯下</small>	炙甘草湯 <small>湯下</small>	固本丸 <small>湯下</small>
切勞散 <small>湯下</small>	肺痿門	
越婢加半夏湯 <small>湯下</small>	小青龙加石膏湯 <small>湯下</small>	
生脈散 <small>湯下</small>	保元湯 <small>湯下</small>	
異功散 <small>湯下</small>	都炁丸 <small>湯下</small>	
局方七氣湯 <small>湯下</small>		
肺痿門		
皂莢丸 <small>湯下</small>	治欬逆上氣。時時唾濁。但坐不得眠。	
皂莢 <small>剉大皮炙</small>		
右一味末之。蜜丸梧子大。以蜜膏和湯服三九。日三夜一服。		
華蓋湯 <small>千金</small>	治肺痿胸中甲錯。	

蘇葉 加蘇葉取 慈苳仁 三合 桃仁 五十枚碎

瓜瓣 加無核蘇仁代之

右四味以水一斗先煮蘇葉得五升去滓內諸藥煮取二升溫服二升再服當吐如膿

皂莢滌肺胃濁垢蘇葉瀉肺下水氣葶藶通肺絡瘀塞治肺癰時三法

千金桂枝去芍藥加皂莢湯 桂枝湯下

枳梗湯方祖 十六味枳梗湯 枳梗湯下

葶藶大棗瀉肺湯 痰飲 葶藶蘇苳瀉肺湯 枳梗湯下

六味丸 八味丸下

瘧門

蘇葉膏酒千金 治肺氣虛寒癰風所傷語聲嘶塞欬唾上

氣喘嗽及寒鬱熱邪聲痞不出

酥

生薑汁 生百部汁 飴糖各一

杏仁 各半

柑皮 五具

右八味先將杏仁和水三升煮減半去滓入酥蜜薑飴等

味文火再熬取二升溫酒調服方寸匕細細嚥之日三服

七日痰色變二七日唾稀三七日嗽止

本方去百部柑皮加通草欬冬各二兩曹蒲人參竹茹各

一兩五味細辛桂心各半兩名通聲膏

肺癰爲風寒所襲而致喘欬上氣語聲嘶塞故用薑汁杏

仁柑皮百部溫散肺絡之結膠飴養肉乳酥崖蜜熬膏酒

服通行脾肺之津津回燥潤而聲自復矣於本方中除

去百部相皮之耗氣膠飴之助壅加五朮人參資肺之津

欬冬竹茹清肺之燥桂心細辛搜肺之邪通草曹蒲利肺

之痰仍取前方中酥蜜杏仁薑汁棗肉滋培津氣而通其

聲蓋酥蜜膏酒專滋肺胃之燥通聲膏專資脾肺之津津

本大腸所主故千金以此方賦諸大腸府門

消風散 欬嗽

二陳湯 方祖

生脈散 方祖

都燕丸 八味丸下

代抵當丸 抵當湯下

古今錄驗續命湯 方祖

十全大補湯 湯下

麻黃附子細辛湯 湯下

喘門

麻黃蒼朮湯 治秋冬感寒至夜大喘

麻黃

柴胡 各五

黃芩 三分

五味子 九粒

水煎臨臥熱服

麻黃定喘湯 治寒包熱邪哮喘痰嗽遇冷即發

麻黃 去淨

欬冬花 去梗

甘草 生炙各

清咽寧肺湯 湯下

導痰湯 二陳湯下

六味丸 八味丸下

異功散 湯下

麻杏甘石湯 湯下

黃真丸 湯下

桔梗湯 方祖

羌活 各八

防風

草豆蔻 炒研

甘草 生四分

水煎臨臥熱服

杏仁 十四粒

桑皮 蜜炙

黃芩

厚朴 蜜製

蘇子 各一錢

半夏 洗一錢

煎成去滓。以生銀杏七枚。搗爛入藥絞去滓。乘熱服之。去秋仰時暖覆取微汗勿。

人參定喘湯。局方。治遠年欬逆。上氣胸滿。痞塞聲不出。

人參

麻黃去節

甘草炙

阿膠

半夏麴各一

桑白皮炙

五味子碎各

罌粟殼二分

生薑三片

水煎食後服。溫覆取微汗。

八味丸方祖

追過散。虛損

佐金丸方祖

六味丸。八味

生脉散方祖

六君子湯。四君子

華蓋散。麻黃

參淫湯。理中

白虎湯方祖

二陳湯方祖

醫通卷十三

短氣

七品。思得堂藏

四七湯。二陳

越脾加半夏湯。麻黃

小背龍加石膏湯。桂枝

濟生腎氣丸。八味

靈砂丹。金液

蘇子降氣湯。七氣

參蘇溫肺湯。七氣

四磨湯。氣門

千船湯。二陳

導痰湯。二陳

神保丸。傷飲

三拗湯。麻黃

古今錄驗續命湯。方祖

九寶湯。麻黃

寧嗽化痰湯。二陳

短氣門

苓桂朮甘湯。桂枝

腎氣丸。八味

小背龍湯。桂枝

厚朴大黃湯。承氣

四君子湯。方祖

生脉散。方祖

少氣門

獨參湯。保元

保元湯。方祖

逆氣門

四磨湯。氣門

蘇子降氣湯。七氣

杏子湯。麻黃

麻黃附子細辛湯。麻黃

靈砂丹。金液

哮喘門

鐘乳丸。治冷哮喘。但有血者勿服。

濁乳石。伏時。少許。開光。亮如。金。為。度。

醫通卷十三

短氣

七品。思得堂藏

麻黃。焙。乾。泡。

杏仁。泡。去。皮。尖。仁。甘草。炙。等。

煉白蜜丸。彈子大。五更。臨。臥。各。食。化。下。九。去。秋。仰。臥。勿。開。

言。數。日。効。

此。即。麻。黃。湯。去。桂。枝。麻。杏。甘。石。湯。去。石。膏。而。易。鐘。乳。互。換。

一。味。寒。熱。天。潤。本。草。言。服。鐘。乳。人。一。生。忌。水。以。石。藥。燥。

悍。白。朮。壅。滯。犯。之。恐。有。暴。絕。之。虞。而。千。金。方。有。二。味。並。用。

者。又。非。庸。工。可。以。測。識。也。

冷。哮。九。治。背。受。寒。氣。遇。冷。即。發。喘。嗽。頑。痰。結。聚。胸。膈。痞。滿。

倚。息。不。得。臥。

麻。黃。泡。

川。烏。生。

細。辛。

蜀。椒。

白。礬。生。

牙。皂。去。皮。炙。

半夏。麴。

陳。膽。星。

杏。仁。泡。去。皮。尖。仁。者。

甘草 生各一兩

紫苑茸

款冬花 各二兩

右爲細末。薑汁調神麴末打糊爲丸。每遇發時。臨臥生薑湯服二錢。羸者一錢。更以三建膏貼肺俞穴中。服後時吐痰。痰胸膈自寬。服此數日後。以補脾肺藥調之。候發如前再服。

按此少變麻黃附子細辛湯之法。而合稀涎散以涌泄其痰。開發肺氣之剛劑。但氣虛少食及痰中見血。營氣受傷者。禁用。以其專司疎泄。而無溫養之功也。觀方下所云。服此數日後。以補脾肺藥調之。候發如前再服。擒縱緩急之妙。盡在乎此。

三建膏 治陰疽及肉不化

天雄

附子

川烏 各一

醫通卷十三

辛

思得堂藏

桂心

觀桂

桂枝

細辛

乾薑

蜀椒 各二兩

右切爲片。麻油二觔浸。春五夏三秋七冬十日煎熬去滓。攪淨再熬。徐下黃丹。不住手攪。滴水不散爲度。陰疽以葱湯洗淨。攤成加銀粉少許。貼患處。腹痛少食泄瀉。攤成加丁香末少許。貼臍中及中脘。陽衰精冷。攤成加阿芙蓉少許。貼臍中及丹田。冷哮喘嗽。攤成加麝香阿魏少許。貼患處。蓋臍中。癰疽冷積。攤成加麝香阿魏少許。貼患處。

小青龙湯 桂枝湯下

越脾加朮湯 桂枝湯下

滾痰丸 痰飲

張氏醫通卷十三終

張氏醫通卷十四

清

長洲石頭張

璐路玉

登誕

倬飛

日本

大泉長菴前田安宅子仁

男

典子守

噎膈門

開關利膈丸 實錄名入參利膈丸

治腸胃壅滯。噎膈不通。大便燥結。

木香

當歸 酒洗

枳實 炒各一兩

滴水爲丸。梧子大。每服三五丸。食後米飲下。

醫通卷十四

噎膈

思得堂藏

按此本小承氣加入參歸等味。意在養正祛邪。而實攻多於補。惟熱壅隔塞用之。庶爲得宜。然噎膈之燥結。皆由五志抑鬱。傷耗精氣而成。非有熱邪留結。可攻下而除也。用方者審諸。

五噎丸 千金

治胸中久寒。嘔逆妨食。結氣不消。

乾薑

桂心

白朮 各二兩

附子 炮一枚

古爲細末。煉白蜜丸。梧子大。酒服十五丸。日三服。漸加。

三十九

止瀉九千金

治飲食不得下。手足冷。上氣喘息。

麥門冬三兩 去心 甘草二兩 蜀椒炒去
 遠志肉 各 桂心 細辛
 乾薑炮各 一兩 附子一枚 人參二兩
 右為細末。煉白蜜丸。彈子大。先食含一丸。細細嚥之。喉中
 胸中當熱。藥丸稍盡。再含一丸。日三夜二。服七日愈。
 五噎五膈。二九同用。參附椒辛薑桂之屬。一以肝氣上逆。
 胃氣不下而嘔噎。故用黃橘以疎肝降逆。蒼朮以健胃通
 津。一以腎氣不蒸。肺胃枯槁而不納。故用冬草以滋肺和
 胃。遠志以補火生土。又嘔噎而藥食可進者。頻與小丸調
 之。膈塞而飲食不納者。時用大丸嚥之。其立法之詳。若此
 可不辨而忽諸。
 旋復代赭石湯玉兩 治胃虛噎氣不除
 醫通卷十四 二 思得堂藏

施復花二錢 代赭石煅一 人參二錢
 甘草二錢 半夏三錢 生薑半兩
 大棗四枚
 右七味水煎去滓。分溫日三服。
 六君子湯湯下 異功散湯下
 四君子湯湯下 指迷七氣湯湯下
 局方七氣湯湯下 四物湯湯下
 代抵當丸湯下 理中湯湯下
 越鞠丸湯下 八味丸湯下
 二陳湯湯下
 反胃門
 藿香安胃散 治脾胃虛弱。飲食不進。嘔吐不腐。

藿香 人參一兩 橘紅各半 丁香三錢
 為散。每服二錢。生薑三片。水煎溫。食前和滓服。
 四逆湯湯下 小半夏湯湯下
 大半夏湯湯下 理中湯湯下
 茯苓澤瀉湯湯下 六君子湯湯下
 異功散湯下 平胃散湯下
 四君子湯湯下 桂苓丸湯下
 七味白朮散湯下 二陳湯湯下
 開胃利膈丸湯下 固本丸湯下
 逍遙散湯下 歸脾湯湯下
 八味丸湯下 黑錫丹湯下
 醫通卷十四 三 思得堂藏

六味丸九下 代抵當丸湯下
 甘草粉蜜湯金匱 治吐涎心痛。發作有時。毒藥不止吐就
 者。
 甘草半兩 粉三錢 蜜一兩
 右三味以水三升。煮甘草取二升。去滓內粉蜜攪令和煎
 如薄粥。溫服一升。瘥即止。
 吳茱萸湯湯下 治胃氣虛寒。乾嘔吐涎沫頭痛。
 吳茱萸取開口者湯泡七次 人參半錢
 大棗四枚 生薑半兩
 右四味水煎去滓。溫分日三服。
 通草橘皮湯千金 治傷寒胃熱嘔逆。

通草三錢

橘皮錢半

梗米一合

生薑根汁半合

右四味水煎熱服。不瘥更作。

本方去通草橘皮。加竹茹生薑汁。千金名。虛根飲子。治傷寒後嘔。噦反胃乾嘔。

麥門冬理中湯千金

治漏氣上焦熱。腹滿不欲飲食。食則

先嘔後瀉。身熱痞悶。

麥門冬去心

白朮各五錢

甘草炙

茯苓各二錢

人參

橘皮

導心

麥門冬各三錢

蘆根一握

竹茹一握

生薑四錢

陳米一合

右十二味水煎。溫分日三服。

醫通卷十四

嘔吐噦

思得堂藏

澤瀉湯千金

治上焦飲食下胃。胃氣未定。面背身中皆熱。

名曰漏氣。

澤瀉

半夏

柴胡

生薑各三錢

桂心

甘草炙各

茯苓

人參各二錢

地骨皮五錢

石膏八錢

竹葉一把

導心五錢

右十二味水煎。溫服日三。

八參湯千金

治下焦熱。氣逆不續。嘔逆不禁。二便不通。名曰走嘔。

人參

黃芩

知母

萎蕤

茯苓各三錢

白朮

梔子薑汁

陳皮

蘆根各四錢

石膏八錢

右十味水煎。溫服日三。半錢多。

走嘔漏氣。皆屬火淫於內。火性急速。故得食則既吐且利。是名漏氣。若得食即嘔。而便溺不通者。則為走嘔。總是胃

虛火逆所致。觀麥門冬理中湯。人參湯二方可知。不可誤

認虛寒。輕用溫補之劑也。

安蛇散。治吐衄血色。赤成團。而活屬熱者。

烏梅肉三錢

黃連

蜀椒

蒼香

檳榔各一

胡粉

白礬各半

為散。每服三四錢。水煎如糊。空腹服之。差即止。

半夏瀉心湯方

猪苓散五錢

醫通卷十四

嘔吐噦

思得堂藏

小柴胡湯方

大黃甘草湯承氣

文蛤湯方

橘皮湯二陳

橘皮竹茹湯二陳

半夏乾薑湯二陳

二陳湯方

理中湯方

小半夏湯二陳

大半夏湯二陳

蕤附湯四逆湯下

黑錫丹丹全液

追遠散門

六君子湯四君子

橘皮半夏湯二陳

小青龍湯桂枝

小承氣湯方

猪苓湯五苓

橘皮乾薑湯七氣

黃芩湯桂枝

黃芩加半夏生薑湯

佐金丸方

連理湯方

補中益氣湯保元

<p>附子理中湯 方祖 理中</p> <p>五苓散 方祖</p> <p>四君子湯 方祖</p> <p>歸脾湯 方祖</p> <p>霍亂門</p> <p>理中湯 方祖</p> <p>胃苓散 方祖</p> <p>平胃散 方祖</p> <p>香薷散 方祖</p> <p>五苓散 方祖</p> <p>二陳湯 方祖</p> <p>連理湯 方祖</p> <p>醫通卷十四</p>	<p>平胃散 方祖</p> <p>烏梅丸 方祖</p> <p>異功散 方祖</p> <p>四逆湯 方祖</p> <p>養正氣散 方祖</p> <p>六和湯 方祖</p> <p>竹葉石膏湯 方祖</p> <p>漿水散 方祖</p> <p>黃芩加半夏生薑湯 方祖</p> <p>天水散 方祖</p> <p>醫通卷十四</p>	<p>導痰湯 方祖</p> <p>六君子湯 方祖</p> <p>關格門</p> <p>人參散 方祖</p> <p>人參 五錢至一兩</p> <p>爲散水煎和洋分二三溫服</p> <p>此雲岐子治噎膈胃反關格不通九方之一用獨參湯峻補其胃稍加脂麝以發越其氣得補中寓瀉之至訣乃肥盛氣虛痰壅中脫及酒客淫熱鬱痰固結之專劑以中有腦麝善能開結利氣散鬱也若瘦人津枯不能出納而大便秘結者即以此方去脂麝加蘆根汁竹茹未嘗不爲合散也</p>
---	--	--

<p>二陳湯 方祖</p> <p>補中益氣湯 方祖</p> <p>生料八味丸 方祖</p> <p>呃逆門</p> <p>丁香煮散 方祖</p> <p>丁香 三七</p> <p>生薑 七片</p> <p>水一碗半煮熱去薑服</p> <p>此做附子梗米湯之制彼用梗米此用糯米皆取其直達胃府雖其勢稍平亦是突圍之將局方無連肉絲米而多川烏紅豆青皮陳皮甘草乾薑良薑益智胡椒等味爲散煮湯入鹽一字調服</p>	<p>醫通卷十四</p> <p>關格</p> <p>呃逆</p> <p>四君子湯 方祖</p> <p>黃連湯 方祖</p>	<p>栝子仁湯 治胃虛關格脈虛微無力</p> <p>人參 錢半</p> <p>白朮</p> <p>陳皮 各一錢</p> <p>甘草 分三</p> <p>麝香 一字</p> <p>生薑 五片</p> <p>茯苓</p> <p>栝子仁 研三</p> <p>水煎去滓入麝調服</p> <p>此雲岐第二方取用異功加栝仁麝香其法稍平而胃中津枯大便艱澀者最宜亦可加蘆根汁竹茹或竹瀝俱妙</p> <p>既濟丸 治關格脈沉細手足厥冷</p> <p>熟附子 一兩</p> <p>人參 三兩</p> <p>麝香 少許</p> <p>爲細末陳米飲糊丸梧子大每服十九至三十九米飲下此雲岐第三方用參附加麝單刀直入以破中下二焦之結藥雖峻而用法最緩不可不詳此義而擅改作湯也</p>
--	---	---

異功散 四君子湯下

理中湯 方

越鞠丸 錢門

四逆加入參湯 四逆湯下

連理湯 理中湯下

調中益氣湯 理中湯下

黑錫丹 金液丹下

射干湯 治人迎逆而盛

射干 去毛

升麻 各一兩

右為粗末

每服五錢

水二盞煎

去滓入地黃汁一合再煎

溫日再服

日晡發熱

每服加犀角丹皮各一錢

甘草二分

太乙膏 治內外一切癰瘍

黑參

肉桂

生地黃 各二兩

右切為片

麻油二碗浸

春夏三秋七冬十日煎熟去滓

淨再熬

徐下黃丹

不往手攪

六味丸 八味丸下

橘皮竹茹湯 二陳湯下

附子梗米湯 慶清湯下

羌活附子散 四逆湯下

旋復代赭石湯 理中湯下

蘇子降氣湯 七氣湯下

胃脘癰門

射干 去毛

梔子仁 炒黑

赤芍藥 兩半

白朮 生半兩

赤茯苓 去皮

白朮 生半兩

赤芍

歸身

大黃

生地黃 各二兩

右切為片

麻油二碗浸

春夏三秋七冬十日煎熟去滓

淨再熬

徐下黃丹

不往手攪

滴水不散為度

內癰可丸服之

金匱排膿湯 枳椇湯下

犀角地黃湯 傷寒諸見血門

栝葉湯 金匱

栝葉 炒三錢

右三味水煎

入馬通汁一杯

合煮取一盞

分溫再服

如無通

血逆不止

當貴之於火旺

故用栝葉治其旺氣

即兼薑艾之辛溫散結

使無留滯之患

更加馬通導之下行

非近世專用栝葉

樓灰血餘之屬可比

黃土湯 金匱

治陰絡受傷

血從內溢

先血後便

及吐血衄

血色瘀晦者

并主產後下痢

白朮

乾地黃

附子 炮

阿膠

黃芩 各半

甘草

治吐血不止

乾薑 炮一錢

艾 一握

水煎

分溫再服

如無通

血逆不止

當貴之於火旺

故用栝葉治其旺氣

即兼薑艾之辛溫散結

使無留滯之患

更加馬通導之下行

非近世專用栝葉

樓灰血餘之屬可比

黃土湯 金匱

治陰絡受傷

血從內溢

先血後便

及吐血衄

血色瘀晦者

并主產後下痢

白朮

乾地黃

附子 炮

阿膠

黃芩 各半

甘草

治吐血不止

乾薑 炮一錢

艾 一握

水煎

分溫再服

如無通

血逆不止

當貴之於火旺

故用栝葉治其旺氣

即兼薑艾之辛溫散結

使無留滯之患

更加馬通導之下行

非近世專用栝葉

樓灰血餘之屬可比

黃土湯 金匱

治陰絡受傷

血從內溢

先血後便

及吐血衄

血色瘀晦者

并主產後下痢

白朮

乾地黃

附子 炮

阿膠

黃芩 各半

甘草

治吐血不止

乾薑 炮一錢

艾 一握

水煎

分溫再服

如無通

血逆不止

當貴之於火旺

故用栝葉治其旺氣

即兼薑艾之辛溫散結

使無留滯之患

更加馬通導之下行

非近世專用栝葉

樓灰血餘之屬可比

黃土湯 金匱

治陰絡受傷

血從內溢

先血後便

及吐血衄

血色瘀晦者

并主產後下痢

白朮

乾地黃

附子 炮

阿膠

黃芩 各半

甘草

爲散。半饑時麥門冬湯調服三錢。日三服。
而熱足冷。心懸如飢。下焦陰火也。加肉桂末一錢五分。渴
不能飲。自覺膈滿者。瘀血也。加犀角丹皮。氣虛少食。二便
如常者。獨參湯服之。兼感微風。發熱頭痛者。葱白香豉湯
服之。虛煩不安。不時悶熱者。梔子或湯服之。素有偏風。頭
痛異常者。黑豆荆芥灰淋酒服之。驟則不止者。茅花湯服
之。久痢不時舉發者。烏梅湯服之。

小烏沉湯局方 治血氣不調。心中刺痛。

香附 童便浸 甘草 錢一

烏藥 錢半

右三味。水煎。即用藥汁磨沉香五分。入鹽一字。熱服上三
味。在婦科名抑氣散。合四物。即四烏湯。乃局方烏沉湯之
變法。方中去參。壘而易香附。其破氣之力。雖峻而功力稍

醫通卷十四

血

十一 思得堂藏

遜故以小字加之。立方之意微矣。

黑神散局方

治吐血衄血。屢發不止。

甘草 炙二兩

乾薑 炮

肉桂 各一兩

熟地黃 四兩

當歸

蒲黃 各三兩

白芍 酒製二兩

右爲散。每服四錢。用細黑豆半合。微炒香。淋酒半盞。和水
半盞。煎至半盞。入童便半杯。和服。世本以黑豆炒熟。去
之。切全。氣虛加人參三兩。黃耆六兩。以固衛氣。庶無
脫之患。

當歸湯千金 治衄血吐血。

當歸 一錢

乾薑 炮五錢

芍藥

阿膠

黃芩 各錢

右五味。水煎。日再服。

小安腎丸

治風寒襲於腎經。下體沉重。夜多小便。耳鳴咬

視。牙齦動搖出血。小腹寒疝作痛。

香附 童便製

川烏頭 炮淨

藁香 青鹽微

川椒 炒去口者

熟地黃 四兩

川棟子 酒蒸取

酒糊丸。梧子大。空心鹽湯。臨臥溫酒。各服三錢。

清胃散

治胃中蘊熱。中脘作痛。痛後人氣發泄。必作寒熱

乃止。及齒齦腫痛出血。痛引頭腦。

生地黃 四錢

升麻 錢半

牡丹皮 五錢

當歸

川連 酒蒸各

爲散。分三服。水煎。去滓。細細呷之。半日再服。

犀角地黃湯。專以散熱爲主。故用犀角。此則開提胃熱。故

醫通卷十四

血

十一 思得堂藏

用升連。其後加味清胃。則兼二方之制。但少芍藥耳。

加味清胃散 治斑疹口舌生瘡。齒齦腐爛。

清胃散加犀角連翹生甘草

麻黃湯局方

越婢湯局方

四物湯局方

理中湯局方

三黃補血湯局方

犀角地黃湯局方

常歸補血湯局方

保元湯局方

補中益氣湯局方

小建中湯局方

五苓散局方

六味丸局方

蘇子降氣湯局方

歸脾湯局方

黃耆六一湯局方

生脈散局方

消風散局方

調胃承氣湯局方

<p>柴胡清肝散 <small>小柴胡</small></p> <p>獨參湯 <small>保元</small></p> <p>當歸六黃湯 <small>三黃</small></p> <p>既濟湯 <small>白虎</small></p> <p>吐血門</p> <p>柴胡疎肝散 <small>治怒火傷肝脇痛血菀於上</small></p> <p>芍藥</p> <p>香附 <small>醋炒</small></p> <p>水煎食前溫服吐血加童子小便半盞</p> <p>犀角地黃湯 <small>傷寒</small></p> <p>十灰散 <small>虛損</small></p> <p>參蘇飲 <small>傷寒</small></p> <p>四君子湯 <small>方祖</small></p> <p>桂苓甘露飲 <small>五苓</small></p> <p>六君子湯 <small>四君子</small></p> <p>獨參湯 <small>保元</small></p> <p>烏骨雞丸 <small>虛損</small></p> <p>桃仁承氣湯 <small>小承氣</small></p> <p>黑神散 <small>門血</small></p> <p>生脈散 <small>方祖</small></p> <p>理中湯 <small>方祖</small></p> <p>都悉丸 <small>八味</small></p> <p>四烏鯁骨一蘆茹丸 <small>虛損</small></p>	<p>梔子豉湯 <small>方祖</small></p> <p>黃耆建中湯 <small>桂枝</small></p> <p>桃核承氣湯 <small>小承氣</small></p> <p>楊皮 <small>醋炒各</small></p> <p>枳殼 <small>炒各</small></p> <p>山梔 <small>汁炒</small></p> <p>千金當歸湯 <small>門血</small></p> <p>花榮石散 <small>虛損</small></p> <p>六味地黃丸 <small>八味</small></p> <p>五苓散 <small>方祖</small></p> <p>新定紫菀茸湯 <small>欬嗽</small></p> <p>枳實理中湯 <small>理中</small></p> <p>歸脾湯 <small>保元</small></p> <p>巽順丸 <small>虛損</small></p> <p>小烏沉湯 <small>門血</small></p> <p>十全大補湯 <small>保元</small></p> <p>保元湯 <small>方祖</small></p> <p>異功散 <small>四君子</small></p> <p>加減八味丸 <small>八味</small></p> <p>加味歸脾湯 <small>保元</small></p>	<p>醫通卷十四</p> <p>正血</p> <p>思得堂藏</p>
--	---	------------------------------------

<p>切勞散 <small>四物</small></p> <p>滾痰丸 <small>痰飲</small></p> <p>黃耆建中湯 <small>桂枝</small></p> <p>補中益氣湯 <small>保元</small></p> <p>洩血門</p> <p>辰砂妙香散 <small>局方</small></p> <p>黃耆 <small>蜜炙</small></p> <p>桔梗</p> <p>茯神</p> <p>辰砂 <small>另研水飛</small></p> <p>右十一味為散每服二錢不拘時溫酒調服有無水香</p> <p>本方去黃耆山藥桔梗木香加龍骨益智即王荆公妙香散</p> <p>六味丸 <small>八味</small></p> <p>五苓散 <small>方祖</small></p> <p>異功散 <small>四君子</small></p> <p>下血門</p> <p>導赤散 <small>生脈</small></p> <p>四味鹿茸丸 <small>虛損</small></p> <p>沉香降氣散 <small>氣門</small></p> <p>當歸</p> <p>大黃</p> <p>草龍膽 <small>等分</small></p> <p>滴木為丸空心茶清下七八十九至百丸</p> <p>戒連丸 <small>治大便秘下血正赤日久不止若血色晦淡者禁用</small></p>	<p>瓊玉膏 <small>虛損</small></p> <p>靈砂丹 <small>丹金</small></p> <p>滴心湯 <small>三黃</small></p> <p>黑錫丹 <small>丹金</small></p> <p>治心脾不足恍惚不睡盜汗遺精衄血</p> <p>人參 <small>各二</small></p> <p>山藥</p> <p>茯苓 <small>各一</small></p> <p>茯苓 <small>另研</small></p> <p>麝香 <small>一錢</small></p> <p>甘草 <small>炙</small></p> <p>遠志 <small>去心</small></p> <p>木香 <small>五分</small></p> <p>三</p> <p>思得堂藏</p>	<p>醫通卷十四</p> <p>正血</p> <p>思得堂藏</p>
---	--	------------------------------------

宣黃連一兩酒

右用嫩豬臟二尺。泡去油膩。入黃連末。線紮兩頭。同韭菜蒸爛。搗作餅。焙乾。為末。米糊為丸。如桐子大。每服四五十九。食前米湯或烏梅湯下。一方加槐花二兩。但不用黃連。

升陽除溼和血湯 治腸風下血如澀者。

生地黃

熟地黃

當歸身各一

甘草

白芍

黃耆三錢

升麻

蒼朮

秦艽

肉桂

陳皮

丹皮

水煎食前稍熱服。秘旨無蒼朮有防風。

斷紅丸 治下血久不止。虛寒色淡晦者。

醫通卷十四

下血

思得堂藏

創治藥抄香

川續斷酒炒各

鹿茸一具

前三味為細末。醋煮阿膠為丸。每服四五十九。烏梅湯入。

參湯米飲湯任下。

逍遙散

人參胃風湯

小烏沉湯

黑神散

升陽除溼防風湯

升陽益胃湯

人參敗毒散

十全大補湯

四君子湯

赤小豆當歸散

黃土湯

附子理中湯

四物湯

桃核承氣湯

補中益氣湯

理中丸

代抵當丸

畜血門

香散散 治畜血暴起。胸脇小腹作痛。

香附

枳殼

陳皮

烏藥

蓬朮

歸尾

甘草

赤芍藥

為散

紅花

桃枝

枝光活

復元通氣散

治閉挫氣血凝滯。腰脇引痛。

茴香

穿山甲

白牽牛

陳皮

木香

甘草

為散

復元活血湯

此胡

當歸

穿山甲

大黃

紅花

枳殼

水二

赤芍藥

止三五日

生地黃

當歸活血湯

治按血如見紫狀

當歸

桃仁

桂心

枳殼

枳殼

甘草

為散

復元

復元

復元

復元

復元

乾薑 四分

紅花 二分

右除生地水煎去滓入地黃再煎數沸加陳酒服之不應加茅山甲五分又不應加附子三分有實熱難用附子者須與大黃錢許同用

滑血丸 治肥人多年內傷血直於胃難於痰涎諸藥不効者

人參

白朮 生

赤茯苓 各一

甘草 炙四

半夏 麩炒七錢

浮石 五錢

牡丹皮 五錢

當歸 身四錢

桃仁 三錢 乾漆 炒去漆

穿山甲 三錢

桂枝 三錢 附子 生用

為末紅麴糊丸溫酒下三錢瘦人去半夏浮石加生地黃蓬朮蜜丸服之

醫通卷十四

大思得堂藏

犀角地黃湯 治熱

桃枝承氣湯 治下

抵當湯 方服

抵當丸 湯下

下瘀血湯 抵當湯下

代抵當湯 湯下

越鞠丸 治鬱門

平胃散 方服

理中湯 方服

變通抵當丸 湯下

補中益氣湯 保元湯下

六味丸 九下

頭痛門

茸珠丹 治腎虛火炎頭痛必先服黑頭旋

辰砂 別研

草烏頭 一作川 瞿麥穗

黃藥子 各一

右除辰砂以三味為粗末用瓷碗一箇將薑汁塗烘數次入砂在碗鋪諸藥末以蓋蓋之掘地一窟安碗在內用熟

炭五觔煨令火盡吹去藥灰取砂研細用鹿茸一對燼去

毛酒浸切片焙乾為末煮棗肉丸梧子大每服三四十丸空心入參湯或黑豆淋酒下弱者倍加贏者量減用之

羌活附子湯 治大寒犯腦厥逆頭痛齒亦痛

麻黃 一錢

黃耆 二錢

蒼朮 五

羌活 七分

防風

甘草 炙各三分

生附子 一錢

白芷

燭蠟

黃藥子 炒各五分

水煎去滓食後溫服每服加佛耳草五分

選奇湯 治風火相煽眉稜骨痛

羌活 錢半

防風 一錢

黃芩 酒炒錢半

甘草 炙一錢

生薑 一片

醫通卷十四

大思得堂藏

水煎去滓食後稍熱緩緩服之冬月去黃芩加香豉三錢葱白二莖

如痛連魚尾為血虛加黃耆三錢當歸一錢日晡發熱為

血熱加白芍一錢五分目赤加菊花鼻塞加細辛夏月近

火痛劇為伏火加石膏三錢頭風疼熱不止加石膏麻黃

不應屬血病也加川芎芽茶

羌活甘草之辛甘發散僅可治風未能散火得黃芩以協

清之乃分解之良法也黃芩雖苦寒專走肌表所以表藥

中廢不用之觀仲景黃芩湯柴胡湯及李陽明白湯可知

川芎茶調散 治久風化火頭痛及偏正頭風

川芎

白芷

羌活

防風

荆芥

薄荷

甘草 炙各一兩

香附 童便浸炒二兩

爲散。食後茶清調服二錢。日三服。婦人產後豆淋酒服。輕者三服。重者五七服。効。

山牛湯 治微瘧頭痛不止

土茯苓 四兩

忍冬 三錢

防風

天麻

黑參 各一錢

辛黃仁 一撮

川芎 各六分

黑豆 九粒

芽茶 一撮

水煎溫服

半夏蒼朮湯 卽柴胡

治素有風證。目赤頭疼眩暈。胸中有痰。兀兀欲吐。如居煖室。則微汗出。其證乃減。見風其證復作。當先風一日痛甚。

升麻

柴胡

葉本 各五

大 思得堂製

醫通卷十四

頭痛

茯苓

半夏 各二錢

神麴 薑汁炒 各一錢

蒼朮 消製 各一錢

水煎食遠稍熱服。

清空膏 治頭風溼熱上盛。遇風卽發。

羌活 三兩

防風 二兩

甘草 炙兩

黃芩 三兩

黃連 一兩

柴胡 七錢

川芎 五錢

共爲細末。每服五錢。盛盞內。以茶清半盞調勻。隔湯煮如膏。臨臥湯送下。此卽選奇湯。加下三味也。

芎辛湯 治熱厥頭痛

川芎 錢半

細辛 半錢

甘草 炙六分

生薑 五片

水煎食後熱服。有熱加酒黃芩一錢五分。不應更加生石

膏三錢。烏頭二分。胃虛者去白芷。易白朮。使邪無內賊之患。兼犯客邪。加葱白香豉。產婦用豆淋酒煎服之。

三因芎辛湯 治寒厥頭痛

川附子 去皮生用

川烏頭 去皮生用

天南星 薑湯泡

乾薑 生用

細辛 連葉

川芎 各一錢

甘草 炙半

生薑 七片

芽茶 一撮

水煎放涼時服。面赤戴陽。加葱白二莖。童便半杯。不應更加酒炒黃連三分。

大追風散 治一切頭風。攻注屬虛寒者。

川烏頭 炮

防風

羌活

川芎 各一兩

全蠍 去毒酒炒黃

地龍 去土炒

醫通卷十四

頭痛

十九 思得堂製

南星 炮

天麻 煨各五錢

荆芥 各一錢

甘草 炙

麴蠶 炒黃

石膏 煨各八錢

爲散。每服二錢。鹽茶清調服。

局方多白附子白芷各五錢。乳香沒藥草烏雄黃各一錢五分。

大三五七散 千金 治頭風眩暈。口喎目斜耳聾。及八風五

痺。癱瘓脚氣。緩弱。

天雄 三枚炮

細辛 三兩

山茱萸肉

乾薑 五兩

防風

茯苓 各七

右爲散。每服二錢。食前溫酒調服。

本方去細辛乾薑防風茯苓。加薯蕷。卽小三五七散。然入

雄川熟附

子三枚

頭風摩散 治大寒犯腦頭痛

大附子煨一故 鹽等分

爲散。沐後以方寸匕摩痛處。

半夏白朮天麻湯 治痰厥頭痛目眩。

黃藥薑汁炒 乾薑炮三

天麻煨切 黃耆炒汁

蒼朮泔製 神麴炒

半夏麴炒 橘紅

茯苓八分 生薑三片

水煎稍熱食遠服。

寶鑑石膏散 治風熱頭痛。

石膏生碎 麻黃去節泡

何首烏生晒

葛根各七

爲散。每服四五錢。入生薑三片。井茶一撮。水煎服。取微汗。

効。春夏麻黃量減。不可執。

透頂散 治偏正夾腦風。一切頭風。遠年近日者皆効。并治

鼻塞不聞香臭。

細辛三莖 瓜蒂七枚 丁香七粒

糯米七粒一作 龍腦半分 麝香一分

前四味并爲細末。入麝同研。置小口罐中。緊塞罐口。令

患人口含清水。隨左右搖。一豆大許於鼻中。良久涎出。卽

安。不愈三日後再搗。

草麻貼法 治氣攻頭痛不可忍。

草麻仁 乳香等分

右同搗爛作餅貼太陽穴上。如痛定。急於頂上解開頭髮。

一字散 治頭風。

雄黃 細辛各一 川烏尖生三

爲散。不拘時茶清調服。一字。日三服。

滴金 治首風偏正頭風。

人中白煨 地龍等分

右爲細末。羊膽汁爲丸。芥子大。每用一丸。新汲水一滴。化

開滴鼻內。

火筒散 治頭風鼻塞不利。

蚯蚓煮四錢 乳香二錢 麝香二分

爲散。用紙筒自下燒上。吸煙搐鼻內。

清震湯 治雷頭風。頭面疙瘩。憎寒壯熱。如傷寒者。

升麻 蒼朮泔浸去皮 薄荷片大

水煎食後熱服。

加味導痰湯 治二陳

消風散 治二陳

六君子湯 治四君子

稀涎散 治中風

涼膈散 治方祖

既濟解毒湯 治三黃

當歸四逆湯 治桂枝

補中益氣湯 治保元

外臺茯苓飲 治四君子

羌活勝濕湯 治門

瓜蒂散 傷食門

黃連解毒湯 三黃

越鞠丸 鬱門

六味丸 八味

導痰湯 二陳

星香湯 方祖

敗毒散 小柴胡

十全大補湯 保元

葛根湯 麻黃

獨參湯 保元

八味丸 方祖

歸脾湯 保元

附子湯 保元

犀角升麻湯 中風

越鞠丸 鬱門

心痛胃脘痛門

九痛丸 金匱

附子三兩

吳茱萸湯 乾薑

右六味為末 煉白蜜九梧子大溫酒送下

二九日三服 兼治卒中惡腹脹痛口不能言

冷流注心胸痛并冷衝上氣落馬墜車血痰等皆主之

口如常法

論嘉言曰九種心疾乃客邪之劇證即腎邪乘心胸氣衝

胃通卷十四

面痛門

補中益氣湯 保元

生狼牙 炙香即

人參

巴豆霜 熬并淨

藿香正氣散 散下

追遠散 虛損

小柴胡湯 方祖

玉真丸 金丹

二陳湯 方祖

蒼朮白虎湯 白虎

大柴胡湯 小柴胡

大建中湯 保元

桂枝湯 方祖

保元湯 方祖

鹿茸丸 虛損

面痛門

補中益氣湯 保元

生狼牙 炙香即

人參

巴豆霜 熬并淨

右六味為末 煉白蜜九梧子大溫酒送下

二九日三服 兼治卒中惡腹脹痛口不能言

冷流注心胸痛并冷衝上氣落馬墜車血痰等皆主之

口如常法

論嘉言曰九種心疾乃客邪之劇證即腎邪乘心胸氣衝

胃通卷十四

面痛門

補中益氣湯 保元

生狼牙 炙香即

人參

巴豆霜 熬并淨

右六味為末 煉白蜜九梧子大溫酒送下

二九日三服 兼治卒中惡腹脹痛口不能言

冷流注心胸痛并冷衝上氣落馬墜車血痰等皆主之

心之別名也痛久血瘀陰邪搏結溫散藥中加生狼牙巴

豆吳茱萸驅之從陰竅而出以其邪據胸中結成堅壘非

搗其巢邪終不出耳

金鈴子散 治熱厥心痛或作或止久不愈者

金鈴子 即川楝子酒

為散每服三錢溫酒調下

煮黃丸 治心胸腹脇痰食積癥脹急冷痛但屬熱結唇日

燥渴小便赤澀者禁用

雄黃 研二

入白麩二兩研勻滴水為丸梧子大滾漿水煮十二丸以

浮為度溫入冷漿水內沉冷每服一九涼茶下逐時服之

一日服盡以微利為度不必盡劑

水煎金花丸 治食積痰飲結聚年久不散

煮黃丸去巴霜加南星半夏各一兩天麻五錢

如前法製每服五十九淡薑湯送下日二服

高良薑湯 千金 治心腹絞痛如刺兩脇脹滿

高良薑 厚朴薑製 當歸

桂心 各二 生薑 三片

右五味水煎溫服若一服痛止不須更作虛人加芍藥半

夏甘草人參乾薑蜀椒黃耆

崔氏烏頭丸 治風冷邪氣入乘心絡或府藏暴感寒氣卒

然心痛或引背脊經久不瘳

附子 炮去 川烏頭 炮去

蜀椒 炒去 桂心

赤石脂 各三

乾薑 炮各

胃通卷十四

心痛胃脘痛

三 思得堂藏

子 50-552

右六味料為細末煉白蜜丸梧子大每服三九冷酒下覺

至痛處痛即止若不止加至五六九以知為度若早服無所覺至午再服三九若久心痛每旦三九加至十九劑終不發忌猪肉生葱

清中錫痛湯 治中脘火鬱作發即寒熱

山梔 薑汁炒五分 乾薑炮三

黃連 薑汁炒五分 橘紅各五

蒼朮 薑汁炒五分 神麴一錢

生薑 三片 大棗一枚

水煎食前熱服

清中湯 治胃熱作痛

黃連 薑汁炒 山梔 薑汁炒

醫通卷十四

心痛胃脫痛

陳皮

茯苓

甘草 煅粉

水煎食前熱服

延胡索

沒藥 等分

為散每服三錢不拘時熱酒調服或用熬熟砂糖作丸溫酒送下七十九

越脾湯 治中脘死血作痛好飲熱酒人多此

木附湯 方祖

大柴胡湯 小柴胡

理中湯 方祖

涼膈散 方祖

二陳湯 方祖

小建中湯 桂枝

三物大建中湯 理中

四七湯 二陳

小半夏茯苓湯 二陳

導痰湯 二陳

五苓散 方祖

六君子湯 四君子

四物湯 方祖

歸脾湯 保元

胸痺門

栝實薤白白酒湯 金匱

栝實薤白湯 一枚

右三味合煮取二升分溫再服

栝實薤白半夏湯 金匱

栝實薤白湯 一枚

右四味合煮取四升溫服一升日三服千金無白酒

枳實薤白桂枝湯 金匱

枳實 四枚

桂枝 三錢

右五味以水五升先煮枳實厚朴取二升去滓內諸藥煮數沸分溫三服

茯苓杏仁甘草湯 金匱

茯苓 一兩

杏仁 五十

甘草 炙三

右三味以水一斗煮取五升溫服一升日三服

橘皮枳實生薑湯 金匱

蘇子降氣湯 七氣

半硫丸 金匱

胃苓湯 平胃

沉香降氣散 氣門

代抵當丸 抵當

來復丹 金匱

平胃散 方祖

治胸痺喘息欬唾胸背痛

薤白 三兩

白酒 七升

治胸痺不得臥心痛徹背

薤白 三兩

厚朴 二錢

枳實 一枚

治胸痺室塞短氣

枳實 一兩

杏仁 五十

甘草 炙三

治胸痺胸中痞滿噎塞

枳實 一兩

厚朴 二錢

枳實 一枚

治胸痺胸中痞滿噎塞

枳實 一兩

如獲喉中漚燥吐沫

橘皮一兩

枳實二枚

生薑一兩

右三味以水五升煮取二升分溫再服

意苒附子散金匱

治胸痺緩急

薤白仁五兩

大附子一枚

右二味并為散服方寸匕日三服

桂枝生薑枳實湯金匱

治心中痞逆心懸痛

桂枝

生薑各一兩

枳實五枚

右三味以水六升煮取三升分溫日三服

烏頭赤石脂丸金匱

治心痛徹背背痛徹心

蜀椒去

赤石脂各二兩

烏頭一枚

附子一枚

乾薑一兩

醫通卷十四

附方

失思得堂藏

右五味為末蜜丸梧子大先食服十九日三服不知稍加

服

細辛散千金

治胸痺連背痛

細辛

甘草各六兩

枳實

生薑

桔梗實

乾地黃

白朮各一兩

桂心

茯苓各兩

右九味為散酒服方寸匕

前胡湯千金

治胸中逆氣心痛微背少氣不食

前胡

桂心

半夏

芍藥各二兩

黃芩

當歸

人參

甘草各一兩

生薑三片

大棗三枚

竹葉一握

右十一味水煎去滓日三服方無竹葉多飲

方以前用取者取其下氣氣下則寒熱諸邪解散無餘并開通經絡使氣從外分解心手之靈若此非拘於繩墨者之可測識也

下氣湯千金

治胸腹閉滿上氣喘息

杏仁

大腹楸榔

右二味以水五升煮取二升分溫日再服

熨背法千金

治胸背疼痛而悶

烏頭

細辛

附子

羌活

蜀椒

桂心各錢半

苦藥一錢

右七味為末布裹熨火炙令煖以熨背上取瘰止慎生冷

醫通卷十四

附方

老思得堂藏

物

治中湯理中

入參湯理中

生薑半夏湯下

腹滿門

調肝散

治鬱怒傷肝腹痛或小腹偏左結痛

半夏一兩

辣桂

木瓜

當歸

川芎

牛膝各五錢

細辛

石菖蒲

酸棗仁

甘草三錢

石菖蒲

酸棗仁

為散每服四錢入薑五片棗二枚水煎去滓熱服

理中湯方祖

真武湯方祖

當歸四逆湯桂枝

芍藥甘草湯桂枝

當歸四逆湯桂枝

芍藥甘草湯桂枝

黃芩湯 桂枝湯下

藿香正氣散 散下

五苓散 方祖

枳實導滯湯 傷飲食門

人參養胃湯 散下

十味香薷飲 散下

調胃承氣湯 散下

七氣湯 方祖

保和丸 傷飲食門

承仁丸 傷飲食門

靈煎導滯門

藿香湯 散下

醫通卷十四

濟生腎氣丸 八味丸下

當歸生薑羊肉湯 傷門

道通散 散下

六味丸 八味丸下

膏肓門

龍膽瀉肝湯

柴胡稍

木通

生地黃 二錢

生薑 三片

水煎食遠熱服 更以美饌壓之

此本導赤散加柴胡磨草之屬入肝以清淫熱也

治右脇疼服不食

六君子湯 四君子湯下

桃核承氣湯 承氣湯下

控涎丹 散下

平胃散 方祖

二陳湯 方祖

胃苓湯 散下

小建中湯 散下

麝香丸 散下

大承氣湯 散下

通幽湯 散下

豬膽導滯門

代抵當丸 散下

十全大補湯 保元湯下

越鞠丸 散下

佐金丸 散下

治中湯 散下

治肝經淫熱 厥瀉瀉瀉 小便赤澀

澤瀉 各錢

當歸稍

車前

草龍膽 各錢

生薑 三片

水煎食遠熱服 更以美饌壓之

此本導赤散加柴胡磨草之屬入肝以清淫熱也

治右脇疼服不食

片子薑黃 散下

甘草 二錢

為散 每服二三錢 加薑棗水煎 去滓溫服

小柴胡湯 方祖

枳實理中湯 散下

增損流氣飲 散下

柴胡疏肝散 散下

抑青丸 散下

復元活血湯 散下

導痰湯 散下

神保丸 散下

六君子湯 散下

醫通卷十四

十棗湯 散下

桃核承氣湯 散下

加減八味丸 散下

加味導痰湯 散下

腰痛門

摩腰膏 治老人虛人腰痛婦人帶下清 水不臭者

附子

蜀椒

丁香 各錢

右為末 蜜丸 彈子大 每用一丸 生薑自然汁化開 如摩處 手掌上烘熱 摩中痛處 印以煖帛束定 少頃其熱如火 每日飽後用一丸 有來少來

每日飽後用一丸

有來少來

肉桂 各五錢

枳殼 煮散 散下

分氣 紫蘇飲 散下

當歸 龍薈丸 散下

二陳湯 方祖

佐金丸 散下

大黃 附子湯 散下

熱涎升 散下

煮黃丸 散下

小青龍湯 散下

六君子湯 散下

醫通卷十四

十棗湯 散下

桃核承氣湯 散下

加減八味丸 散下

加味導痰湯 散下

腰痛門

摩腰膏 治老人虛人腰痛婦人帶下清 水不臭者

附子

蜀椒

丁香 各錢

右為末 蜜丸 彈子大 每用一丸 生薑自然汁化開 如摩處 手掌上烘熱 摩中痛處 印以煖帛束定 少頃其熱如火 每日飽後用一丸 有來少來

每日飽後用一丸

有來少來

三痹湯 治風寒濕氣合病氣血凝滯手足拘攣

人參

黃耆 酒炒

白朮

當歸

川芎

白芍

茯苓 各一

甘草 炙

桂心

防己

防風

烏頭 炮各五分

細辛

生薑 二片

紅棗 二枚

水煎。不拘時熱服。

此方合保元四君。內補建中。防己黃耆防己茯苓湯。千金防己湯等方。但加防風以搜氣分之風。川芎以搜血分之風。細辛以搜骨髓之風。於原方中刪去生地牛膝。杜仲續斷。奈凡獨活。增入防己白朮烏頭以祛除風濕。則參附香附。附木附桂。附真武等法。俱在其中。彼用附子之雄以搭真

醫通卷十四

風濕

三十一 思得堂藏

陽此藉易頭之烈以祛邪。蓋難合之氣須難合之方。方為合劑。弟恐地黃牛膝。陰柔之藥。難振迅掃之威。是不得不稍為裁酌。用方者。毋以攷攷成方為妄也。

燒羊腎 千金

治腎虛而受寒淫。腰疼不得立。

甘遂

桂心 一作

杜仲

人參

右四味等分。治下。篩以方寸匕。內羊腎中。炙之令熟。服之。

青娥丸 局方

治腎虛腰膝季脇痛。

補骨脂 炒香

杜仲 鹽酒炒斷

右二味為末。連皮胡桃肉三丁。杵。青鹽土炒。上淨一兩。同

搗成膏。稍入煉白蜜。和丸。每服一丸。空心溫酒化。

虎骨散 治腰膝連脚膝腰夜疼

虎骨 酥炙

敗龜板 酥炙

當歸

川椒 炒

牛膝 各二

川芎

肉桂

羌活 各一

為散。每服四錢。空心溫酒調下。亦可用蜜丸溫酒服之。

二至丸 治老人腎虛腰痛。不可屈伸。頭旋眼黑。下微痿軟。

附子 炮

桂心 一兩

杜仲 鹽酒

補骨脂 炒各

鹿茸 酥炙

藥茸 酥炙各

右為細末。青鹽半兩。熱酒中化去砂土。入鹿角膠一兩。細九。如梧子大。每服七十丸。空心醇酒同胡桃肉一枚。細嚼送下。惡熱去附子。加肉從蓉一兩。龜板膠一兩。倍杜仲補骨脂。

醫通卷十四

風濕

三十一 思得堂藏

按鹿是山獸。性稟純陽。其角乃陽中之陽。夏至得一陰之氣而解。麋是澤獸。性稟至陰。其角乃陰中之陽。冬至得一陽之氣而解。此方二茸並用。故名二至。加以杜仲杜仲補骨脂。峻溫腎肝。允為老人調補下元。虧損虛火上乘要藥。但糜鹿二茸。世罕能辨。鹿茸則毛色黃而角門窄。項骨薄。糜茸則毛色黑而角門闊。項骨厚。世人貴鹿。而粗大短壯。圓滿鮮澤者。為之非。不知粗大者。多是糜茸。若鹿茸則大者絕少。即帶馬鞍樣鹿茸。亦佳。縱獨條而枯瘦太短。血氣不多者。無足取也。更觀茸下有節。若只一層者。其鹿少壯。力優。茸茸如筍芽者。則鹿老而力遜矣。

小續命湯 續命

乾薑 附子 湯下

小續命湯 續命

乾薑 附子 湯下

小續命湯 續命

乾薑 附子 湯下

小續命湯 續命

乾薑 附子 湯下

小續命湯 續命

乾薑 附子 湯下

小續命湯 續命

乾薑 附子 湯下

小續命湯 續命

乾薑 附子 湯下

小續命湯 續命

乾薑 附子 湯下

大柴胡湯小柴胡湯下

木附湯方和

羌活勝濕湯門

復元活血湯門

八味順氣散門

柴胡疎肝散門

桃核承氣湯門

六味丸門

腎著湯門

板附散治項背強痛不可以顧

附子一枚炮

醫通卷十四

腎著湯

三思得堂藏

為散每服二錢用川椒三十粒生薑七片水一盞煎至七分去椒入鹽一字空心熱服有熱加川羌活一握面赤戴

陽加葱白二莖火炎頭痛悶熱加臘茶一撮

地龍湯治瘰癧太陽經中腰脊痛不可忍

羌活二錢

黃蘗各一錢

當歸各一錢

水煎食遠熱服

六味丸八味

麻黃湯方和

一陳湯方和

滲淫湯門

二妙散門

復元通氣散門

烏藥順氣散門

導痰湯門

調肝湯門

腎氣丸門

八味丸門

安腎丸門

附子一枚炮

醫通卷十四

腎著湯

三思得堂藏

羌活勝濕湯門

五苓散門

二妙散門

麻黃六分

獨活

肉桂各五

甘草各五

蘇木八分

羌活勝濕湯門

五苓散門

二妙散門

肩背痛

通氣防風湯保元

升陽散火湯保元

羌活勝濕湯保元

補中益氣湯保元

神保丸保元

指迷茯苓丸保元

六君子湯保元

龍薈丸保元

臂痛手痛

獨痺湯治風溼相搏身體煩疼手足冷四肢沉重

當歸

赤芍藥

黃耆

片子薑黃

生薑三片

水煎熱服無時

五積散保元

導痰湯保元

二陳湯保元

近効白朮附子湯保元

加味逍遙散保元

腿痛門

虎骨四筋丸治肝腎虛寒而扶風溼足膝疼痛

頭暈散保元

十全大補湯保元

消風散保元

當歸拈痛湯保元

近効白朮附子湯保元

導痰湯保元

聖愈湯保元

胃苓湯保元

臂痛手痛

獨痺湯治風溼相搏身體煩疼手足冷四肢沉重

當歸

赤芍藥

黃耆

片子薑黃

生薑三片

水煎熱服無時

五積散保元

導痰湯保元

二陳湯保元

近効白朮附子湯保元

加味逍遙散保元

腿痛門

虎骨四筋丸治肝腎虛寒而扶風溼足膝疼痛

牛膝各一

附子二

天麻

肉從容酒洗

虎脰并掌骨一具

附子二

天麻

肉從容酒洗

虎脰并掌骨一具

附子二

天麻

肉從容酒洗

虎脰并掌骨一具

附子二

天麻

肉從容酒洗

虎脰并掌骨一具

附子二

天麻

肉從容酒洗

虎脰并掌骨一具

附子二

天麻

肉從容酒洗

虎脰并掌骨一具

上四味以醇酒五升浸。春五夏三秋七冬十日。取出焙乾。切片曝燥。同附子虎骨爲細末。用浸藥酒打糊爲丸。梧子大。每服五七十丸。食前鹽湯。臨臥時用浸藥酒送下。浸藥酒完。以陳酒服之。如無虎骨。隨前後左右用掌骨亦可。鹿茸四兩九。肩方。治腎肝俱虛。筋骨痿弱頭掉。

虎骨四兩九。去附子虎骨。加鹿茸二具。兔絲子熟地黃。杜仲各半兩。蜜丸梧子大。每服六七十丸。空心淡鹽湯。臨臥溫酒送下。

川芎肉桂湯 治宿於寒溼地。血凝腰痛。不能轉側。

羌活 錢半 此胡 川芎

當歸稍 甘草 肉桂 防風 各五

蒼朮 錢一 獨活 防風 各五

醫通卷十四 思得堂藏

漢防已 酒洗 三分 桃仁 七箇 研

水酒各一升煎八合。食遠熱服。

六味丸 八味 下

除風溼羌活湯 羌活 門

導痰湯 二陳 湯下

二陳湯 方祖

補中益氣湯 保元 湯下

安腎丸 虛損 門

十全大補湯 保元 湯下

除溼湯 軟下 門

膝痛門

附子丸 治溼痺一身。如從水中出。

舒筋三聖散 門中風

白朮附子湯 湯下 門

當歸拈痛湯 門

虎潛丸 九下 大補

八味丸 方祖

三鞭湯 門腰痛

二妙散 九下 大補

溼淫湯 湯下 中

附子地 川烏頭 地 觀桂

川椒 葛蒲 甘草 四兩

骨碎補 切薑汁 天麻 煨 白朮 二兩

煉白蜜丸。梧子大。每服三五十丸。溫酒下。侵晨食前臨臥。各一服。

活絡丹 肩方 治寒溼凝於經絡而痛。肢體不能屈伸。

川烏頭 地 地龍 地土 兩星 炮各

乳香 沒藥 酒研飛定兩 兩

右五味爲末。酒麴糊丸。如彈子大。乾透煨。臨服剖開。空腹。荆芥湯。或陳酒。或四物湯化下。痛處色紅腫者勿用。

鐵彈丸 治筋攣骨痛。麻臂不仁。

川烏頭 地一兩 乳香 沒藥 各一

醫通卷十四 思得堂藏

五靈脂 酒研澄去砂石 麝香 一錢

爲末。滴水爲丸。彈子大。食後薄荷湯。臨臥溫酒。各服一丸。按此與活絡丹。通治寒溼作痛。肥人風痰流入經絡者。則宜活絡丹。瘦人風毒入傷血脈者。則宜鐵彈丸。若溼熱赤腫煩疼。及癰毒疔成腫痛。二方皆在切禁。

換骨丹 治風痰痺弱。寒溼風氣。鶴膝風等證。

當歸 一兩 虎脰并掌骨 酥炙 羌活

獨活 防風 川草薢 各二

秦艽 四兩 龜版 酥炙 牛膝

晚盤沙 炒 枸杞子 油松節 各五

白茄根 上蒸 若木 炒淨四兩

右用無灰酒一大罇。將絹囊盛藥。懸於酒內封固。候十四

日開鐘取酒不可以面對鐘口恐藥氣衝入而目每飲盡
詩勿令藥力斷絕飲盡病痊將藥晒乾爲末米飲糊丸梧
子大每服七八十九空心溫酒下忌食動風辛熱之物此
藥可以常服但煥赤腫痛甚於春夏者多屬淫熱非其所
宜

史國公藥酒 治風溼疼

換骨丹去龜版芥術加醋甲芥耳子

二妙散 九下

虎潛丸 九下

當歸拈痛湯 溼門

川芎肉桂湯 腿痛

虎骨四助丸 腿痛

鹿茸四助丸 腿痛

六味丸 九下

八味丸 方祖

導痰湯 九下

補中益氣湯 九下

醫通卷十四

身痛

思得堂藏

十全大補湯 保元

腎著湯 九下

身體痛門

麻黃復煎湯 治風溼倦怠常微汗出

麻黃 去節

用水三盞先煎令沸去上沫至二盞入下項藥

黃耆 二錢

白朮

人參 各錢

柴胡

防風

羌活

黃藥 薑汁炒

生地黃 各一

甘草 生二分 炙三分

杏仁 皮去

右十味入麻黃湯中煎至一盞時半饑熱服不可飽服

後微汗爲度不可過汗過汗則熱不止而煩擾不寧也

子鼓湯解之

甘草附子湯 溼下

補中益氣湯 保元

當歸拈痛湯 溼門

小續命湯 續命

逍遙散 虛損

六和湯 暑門

十全大補湯 保元

五苓散 方祖

二妙散 九下

防已黃耆湯 方祖

厚朴七物湯 小承氣

痺門

烏頭湯 金匱

治病歷節痛不可屈伸及脚氣疼痛

麻黃 去節

黃耆 薑汁和 芍藥 酒炒各

甘草 炙一

川烏頭 煎取五合以蜜一升

右除烏頭咬咀四味以水三升煮取一升去滓內蜜煎中

更煎之分二服不知盡服之

醫通卷十四

痺門

思得堂藏

附子湯 千金 治溼痺緩風身體疼痛如欲折肉如錐刺刀

附子 一枚

芍藥

桂心

甘草

茯苓

人參 各一

白朮 二錢

右七味咬咀以水八升煮取三升分二服

除溼蠲痛湯 治身體沉重痠疼天陰即發

蒼朮 洗切

白朮 同蒼朮炒

羌活

茯苓 洗切

澤瀉 各錢

陳皮 一錢

甘草 炙五

水煎入薑汁竹瀝各數七熱服取微汗効

摩風膏 治風毒攻注筋骨疼痛

子鼓湯解之

草麻子

去殼

川烏頭

生去皮

乳香

半研

右以豬脂研成膏。烘熱塗患處。以手心摩之。覺熱如火効。

犀角散千金

治熱毒流入四肢。歷節腫痛。

犀角

二兩

羚羊角

一兩

前胡

黃芩

二兩

梔子仁

一兩

大黃

一升

升麻

五兩

射干

各四兩

鼓一升

右九味為散。每服五錢。水煎食後熱服。

通痺散 治風寒溼三氣。蟻於足三陰經。腰以下至足冷如

冰。不能自舉。

天麻

三兩

獨活

一兩

藥本

白木

當歸

二兩

川芎

一兩

白木

各二兩

為散。每服二三錢。熱酒調。晨昏各一服。

醫通卷十四

痺

八

思得堂藏

右編用川烏一兩。酒煎製天麻中。蒼朮一兩。黃藥半兩。酒

煎。製白朮中。深得三氣。蟻於陰經之旨。

羚羊角散

治筋痺肢節束痛。

羚羊角

一兩

肉桂

世本作

附子

炮各

白芍

一兩

獨活

一兩

防風

各七錢

川芎

一兩

當歸

一兩

為散。每服四五錢。入生薑三片。水煎食遠熱服。

人參丸

治脉痺大熱。經脉不利。

人參

一兩

麥門冬

去心

茯神

龍齒

煨

石菖蒲

一兩

遠志

肉

黃耆

一兩

當歸

半兩

地黃

二兩

為末。煉白蜜丸。梧子大。每服五七十九丸。食前清米飲醇酒。

任下

吳茱萸散

治腸痺寒溼。內搏腹痛。脹急。大便澀滯。

吳茱萸

取開口者

肉豆蔻

七次

乾薑

炮黑

甘草

炙各

砂仁

炒

神麴

炒

白朮

炒各

厚朴

薑汁

陳皮

良薑

各三錢

為散。每服三錢。食前臨卧各一服。米湯送下。

腎瀝湯 治胞痺溺瀝。不通。纏積為熱。小腹急痛。

麥門冬

去心

桑白皮

炙酒

犀角

一兩

杜仲

鹽酒

桔梗

赤芍藥

木通

各錢

桑螵蛸

二錢

水二盞。入羊腎二枚。去脂膜。竹刀切片。入竹瀝少許。同煎

醫通卷十四

痺

九

思得堂藏

至一盞。空心頓服。留二導。臨卧服之。右編無赤芍藥。多

赤茯苓。詳芍藥酸收。不若茯苓清心利小便之為愈也。

按此各腎瀝者。形容胞中之氣。痺而不化。水道滴瀝不出。

甚則結塊。阻塞溺孔。艱苦異常。乃虛熱壅滯。膀胱氣化不

行所致。桑皮螵蛸。咸為治肺而設。不可誤認腎氣虛寒。而

用溫補之劑。若淋瀝而靜坐頻數。臨事相忘。睡則遺出不

知者。方是腎氣虛寒之候。又非此湯可治也。

茯苓丸 治胞痺小腹膀胱按之內痛。若沃以湯。溫於小便。

上為清涕。

赤茯苓

一兩

細辛

五錢

澤瀉

五錢

肉桂

五錢

紫苑

茸一兩

附子

炮三

生地黃

一兩

牛膝

酒浸

山茱萸

肉五錢

乾山藥

爲末。蜜丸。梧子大。每服五七十九。食前米飲。臨卧溫酒送下。

按此方。雖以茯苓通利爲名。全賴牛膝地黃。山茱山藥。調補津液爲主。更需桂附之辛。以行牛膝地黃之滯。深得若沃以湯。濡於小便之旨。其用紫苑者。上滋化源。下利膀胱也。妙用更在細辛一味。開發上竅。專主上爲清涕而設。九味相配。成方更無遺議。世本尚多黃耆白朮。甘草芍藥。花粉半夏。防風獨活等味。不特滋繁。而且滯氣耗陰。因從右編削去。

巴戟丸 治胞痺虛寒。臍腹痛。漫數不利。睡則遺尿。

巴戟 去骨 生地黃 酒焙各 桑螵蛸 切破

醫通卷十四

海

四十 思得堂藏

肉苁蓉 酒洗 切碎

山藥

山茱萸 肉桂 各五錢

兔絲子 酒煮各 附子 炮

遠志 甘草湯泡 石斛 去根

鹿茸 酥炙

爲末。煉白蜜丸。梧子大。每服三五十九。空心卧時米飲溫酒任下。羊腎湯亦佳。黃絲湯尤妙。

按巴戟丸。治胞痺虛寒之候。詳漫數不利。當是膀胱熱壅。何以見其虛寒。而用桂附巴戟。從容鹿茸等大熱之劑。當知其人腎氣久虛。寒氣乘虛而入。所以臍腹痛。巨陽之氣化不行。縱溺積鬱化爲熱。非溫補不能蒸動氣化。因彷彿地黃飲子之製。稍兼生地石解。爲假熱之使。不必更用利水藥也。右編止十二味。世本尚多杜仲續斷。龍骨五味子等藥。得無轉助酸收之患乎。

已戟天湯 治冷痺脚膝疼痛。行步艱難。

已戟天 去心 附子 炮

石斛 當歸 錢各

肉桂 生薑 三片

水煎空心溫服。

黃耆 桂枝 五物湯 桂枝 湯下

桂枝 芍藥 知母湯 桂枝 湯下

神効黃耆湯 保元 湯下

二陳湯 方 湯下

桂枝 附子湯 桂枝 湯下

防已黃耆湯 方 湯下

五苓散 方 湯下

附子丸 湯下

獨活湯 湯下

補中益氣湯 保元 湯下

越脾湯 湯下

烏頭湯 湯下

導痰湯 湯下

潛行散 湯下

千金大棗湯 湯下

附子理中湯 湯下

甘草 炙

牛膝 酒炒

防風

五加皮 酒洗

茯苓

川草薢 各錢半

防已 五分

甘薑 芥木湯 湯下

連脾 加木附湯 湯下

指迷 茯苓丸 湯下

導痰湯 湯下

烏藥 順氣散 湯下

活絡丹 湯下

當歸 拈痛湯 湯下

三痹湯 湯下

虎骨散 湯下

安腎丸 湯下

敗毒散 湯下

四物湯 湯下

倉公當歸湯 湯下

千金防已湯 湯下

千金犀角散 湯下

痛風

思得堂藏

烏藥順氣散中風

五積散平胃

麻木門

二陳湯方祖

補中益氣湯保元

生脈散方祖

清燥湯保元

桃核承氣湯小承氣

二妙散九下

三痺湯方祖

追遙散虛損

六味丸九下

紫雪火門

痿門

金剛丸改定

川草薢鹽酒

杜仲鹽酒

免絲子酒煮

巴戟肉酒煮

右爲細末

隔水熬膏

通卷十四

思得堂藏

十九空心

脾虛少食

加入參二兩

乾山藥三兩

兩

精氣不固者

補血榮筋丸

治肝衰筋緩

肉從蓉酒製

兔絲子酒煮

牛膝酒煮

鹿茸酒煮

木瓜酒汁

五味子酒煮

爲末

蜜丸梧子大

送下

每服七十九

虎潛丸九下

清肝益氣湯保元

二陳湯方祖

四物湯方祖

四君子湯方祖

六君子湯方祖

導痰湯二陳

都氣丸九下

八味丸方祖

五苓散方祖

腎者湯理中

小龍湯桂枝

清燥湯保元

安腎丸虛損

加味虎潛丸九下

滋腎丸九下

滑行散九下

二妙散九下

補中益氣湯保元

百合門

治百合病發汗後者

百合知母湯金匱

知母三錢

先以水洗百合

漬一宿

煎取一升

去滓別以泉水二升

煎取一升

去滓別以泉水二升

取一升

分溫再服

滑石代赭湯金匱

治百合病下之後者

百合七枚

滑石一兩

煎法如前

代赭石碎

百合雞子湯金匱

治百合病吐之後者

百合七枚

雞子黃一棗

煎百合如前

去滓內雞子黃攪勻

煎五分

溫服

百合地黃湯金匱

治百合病不經吐下發汗

煎百合如前

去滓內地黃汁

煎取一升

分溫再服

百合洗方金匱

治百合病渴不差者

煎百合如前

去滓內地黃汁

煎取一升

分溫再服

以導鼓也

枯藁牡蠣散 金屑 治百合病渴不差者

枯藁根 牡蠣等

爲散飲服方寸匕日三服

百合滑石散 金屑 治百合病變發熱者

百合 滑石 一兩

爲散飲服方寸匕日三服當微利者止服熱則除

生脈散方 佐金丸方

脚氣門

竹瀝湯千金 治兩脚痺弱或轉筋皮肉不仁腹脹起如腫

按之不陷心中惡不欲食或患令

竹瀝 升 甘草 秦尤

醫通卷十四

脚氣

思得堂藏

葛根

黃芩

麻黃

防已

細辛

桂心

乾薑 各三錢

茯苓 六錢

防風

升麻 各四錢

附子 一枚

杏仁 三十枚

右十五味咬咀以水七升合竹瀝煮取三升分三服取汗

如卒中風口噤不能言四肢緩縱偏痺瘳急風經五藏

恍惚驚怒無常手足不隨本方去秦尤附子乾薑杏仁加

獨活芍藥白朮芎藭人參石膏身熱生薑如風毒入人

五內短氣心下煩熱手足煩熱四肢不舉皮肉不仁口噤

不能語本方去防已杏仁乾薑加芎藭當歸人參白朮蜀

椒生薑

風散千金

治風虛而青黑土色不見日月光脚氣痺弱

菊花 一兩

人參

薯蕷

澤瀉

秦尤

菖蒲

乾地黃

乾薑

右二十四味爲散酒服方寸匕日三服不効加至二匕

風引湯千金 治兩脚痺弱或不仁拘急不得行

麻黃

茯苓 各六錢

石膏

獨活

秦尤

防風

附子

人參

細辛

桂心

防已

防風

芎藭

白朮 一兩

甘草 各三錢

乾薑 四錢

杏仁 六十枚

右十七味咬咀以水一斗六升煮取三升分三服取汗服

後勢緩本方去麻黃石膏吳茱萸秦尤細辛桂心芎藭防

已白朮杏仁加當歸石斛大豆各小風引湯并治中風腰

脚痺弱

麻黃湯千金 治惡風毒氣脚弱無力頑痺四肢不仁失

不能言毒氣衝心

麻黃 三錢

大棗 二十枚

茯苓 一兩

杏仁 三十枚

防風

白朮

石斛

附子

續斷

遠志

石菖蒲

杜仲

防風

草薢 各三錢

烏頭 錢半

白朮

茯苓

白朮

茯苓

附子

細辛

防風

甘草 各三錢

杏仁 六十枚

右十七味咬咀以水一斗六升煮取三升分三服取汗服

後勢緩本方去麻黃石膏吳茱萸秦尤細辛桂心芎藭防

已白朮杏仁加當歸石斛大豆各小風引湯并治中風腰

脚痺弱

麻黃湯千金 治惡風毒氣脚弱無力頑痺四肢不仁失

不能言毒氣衝心

大棗 二十枚

茯苓 一兩

防風

白朮

天雄 各四錢半

甘草 各半

黃芩

細辛

牛膝

茯苓

白朮

烏頭 錢半

白朮

茯苓

獨活

附子

桂心

芎藭

乾薑 四錢

杏仁 六十枚

右十七味咬咀以水一斗六升煮取三升分三服取汗服

後勢緩本方去麻黃石膏吳茱萸秦尤細辛桂心芎藭防

已白朮杏仁加當歸石斛大豆各小風引湯并治中風腰

脚痺弱

麻黃湯千金 治惡風毒氣脚弱無力頑痺四肢不仁失

不能言毒氣衝心

大棗 二十枚

茯苓 一兩

防風

白朮

當歸

芍藥

麥門冬

右十四味。咬咀。以水九升。清酒七升。合煮取二升半。分四服。日三夜一。覆令小汗。粉之。莫令見風。

犀角。旋復花湯。千金。治脚氣初起。兩脰腫滿。或入腹不仁。

喘息上氣。

犀角

栝皮

茯苓

香豉

右八味。咬咀。以水八升。煮取二升七合。分三服。相去十里久服之。以氣下。小便利為度。

久服之。以氣下。小便利為度。

久服之。以氣下。小便利為度。

久服之。以氣下。小便利為度。

久服之。以氣下。小便利為度。

久服之。以氣下。小便利為度。

久服之。以氣下。小便利為度。

久服之。以氣下。小便利為度。

久服之。以氣下。小便利為度。

久服之。以氣下。小便利為度。

久服之。以氣下。小便利為度。

久服之。以氣下。小便利為度。

久服之。以氣下。小便利為度。

久服之。以氣下。小便利為度。

久服之。以氣下。小便利為度。

升麻

黃芩

甘草

桂心

芍藥

麥門冬

犀角

栝皮

茯苓

香豉

右八味

咬咀

以水

八升

煮取

二升

七合

分三

服

相去

十里

久服

之

以氣

下

芍藥

桂心

甘草

升麻

黃芩

麥門冬

犀角

栝皮

茯苓

香豉

右八味

咬咀

以水

八升

煮取

二升

七合

分三

服

相去

十里

久服

之

以氣

下

芍藥

桂心

甘草

升麻

黃芩

麥門冬

犀角

栝皮

茯苓

香豉

右八味

咬咀

以水

八升

煮取

二升

七合

分三

服

相去

十里

久服

之

以氣

下

葛根

乾薑

右十二

味

以水

五升

清酒

一升

煮取

三升

分溫

三服

治風

冷痺

疼痛

不可

屈伸

烏頭

甘草

桂心

茯苓

獨活

右十四

味

以水

人參

附子

乾薑

右十二

味

以水

五升

清酒

一升

煮取

三升

分溫

三服

治風

冷痺

疼痛

不可

屈伸

烏頭

甘草

桂心

茯苓

獨活

右十四

味

甘草

黑豆

附子

乾薑

右十二

味

以水

五升

清酒

一升

煮取

三升

分溫

三服

治風

冷痺

疼痛

不可

屈伸

烏頭

甘草

桂心

茯苓

獨活

右十四

甘草

黑豆

附子

乾薑

右十二

味

以水

五升

清酒

一升

煮取

三升

分溫

三服

治風

冷痺

疼痛

不可

屈伸

烏頭

甘草

桂心

茯苓

獨活

右十四

桑白皮量汁 橫柳 赤茯苓各二
為散每服半兩入生薑五片葱白五莖水煎去滓空心熱服。

犀角散 治脚氣風毒生瘡

犀角 鎔

天麻 煨

羌活

枳殼 炒

防風

黃耆 生

黃芩

白茯苓 炒去

白蘚皮 酒洗各

橫柳 一兩

甘草 炙半

烏蛇 酒浸

為散每服八錢生薑五片水煎去滓食前溫服。

蟬麻葉法千金 治脚氣初發從足起至膝腰骨腫疼。

取蟬麻葉切搗蒸薄裹之日二三易即消若冬月無蟬麻取蒲蘆根搗研和酒糟三分根一分合蒸熱及熱封

醫通卷十四

脚氣

思得堂藏

裏腫上如前法日一即消亦治不仁頑痺。

續命湯麻黃

越婢加朮附湯麻黃

葛根湯麻黃

四七湯二陳

香薷散傷寒

越婢加朮湯麻黃

除淫湯平胃

麻附細辛湯麻黃

清燥湯保元

敗毒散小柴胡

八味丸方祖

羌活導滯湯承氣

當歸拈痛湯逐門

崔氏八味丸方祖

蘇子降氣湯居方七

小背龍湯杜枝

養正丹錢氏

五苓散方祖

平胃散方祖

錫膠風門

十全大補湯保元

五積散平胃

四物湯方祖

活絡丹膝痛

八味丸方祖

換骨丹膝痛

大防風湯四君子

六君子湯四君子

逍遙散虛損

婦脾湯保元

補中益氣湯保元

加味逍遙散虛損

六味丸九下

安腎丸虛損

腎氣丸九下

癩風門

樺皮散 治癩風肺壅風毒遍身搔痒。

樺皮 四兩

荆芥穗

枳殼 炒

杏仁去皮尖另

甘草一兩生

亞麻 三兩

醫通卷十四

癩風

思得堂藏

為散每服四五錢食後溫酒米湯任下。

再造散 治大風惡疾營血受病先起於足者。

謬金五錢如無真者

大黃皂角刺

大皂角刺錢五

白牽牛取頭末淨六

為散分五服五更時以無灰酒調服服後當下惡物禁一切厚味發毒動風物及鹽醬糟醋椒薑蔥麪等。

醉仙散 治癩風遍身麻木衛氣受病先起於面者。

亞麻俗名大

鼠粘子炒

蔓荊子炒各

白蒺藜炒去

防風

枯蔓根錢五

為散每用末一兩五錢入輕粉二錢拌勻每服一錢茶清調晨午各一服服至五七日齒縫中出臭涎令人如醉或

下膿血病根乃去。量病者強弱用。病重者須先以再造散下之。候五七日元氣將復。方用此藥。忌一切炙烤厚味。止食淡粥時菜。烏梢蛇酒煮。淡汁食之。以助藥力。或用水泛為丸服之。免傷口齒。此真眩之藥。中病即已。不可過劑。以取糜傷口齒之患。

必勝散 治瀉風惡疾。管衛俱病。上下齊發。

赤檳榔

皂角刺 炒各五錢

大黃 酒服一兩

白牽牛 生取頭末六錢 以一半炒

甘草 生炙各一錢

輕粉 二錢

為散。壯年者分五服。中年者分七服。每服入黑糖或白蜜二匙。薑汁五匙調服。臨臥時腹中稍空。薑湯送下。至三更遍身麻木如鍼刺。頭目齒縫俱痛。此藥毒病根。重者七日

醫通卷十四

瀉風

辛 思得堂藏

行一次。稍輕者十日半月行一次。以三五遍為度。病退後眉髮漸生。肌肉如故。如齒縫中有血。以黃連買煎湯漱之。

九龍丸 治瀉風癰腫癢痛

當歸

苦參 各二兩

防風

荆芥

羌活 各兩

蟬蛻

川芎 各五錢

全蠍 滾水炮去一錢

大楓仁 八兩

右九味俱木臼內逐味杵為細末。紅米飯為丸。如梧子大。不得見火。日陰乾布囊盛之。每服三錢。茶清送下。月三服。病起一年者服一料。十年餘者服十餘料。一方少川芎蟬蛻。多大胡麻二兩。風濕一兩。如下體甚者。加牛膝二兩。防已一兩。

漆黃丸 治瀉風赤腫。硬痛不癢。

生漆

雄黃 另研

皂角刺 各四兩

蟬蛻

麝香 另研各三錢

右五味以水三升。先入皂角刺煎至一升。去滓下漆。煎沸如八成。銀花相似。候漆浮花盡。則水乾不粘手。即離火。却下雄麝蟬蛻。木槌研碎。象手丸。菜豆大。每服五十九。午時五更各一服。熱酒下。木形人服之。身瘡音啞者。急以生薑搗汁頻進。并塗患處以解之。

希發丸 治瀉風脚弱

希發 五月取赤莖者。陰乾以淨。蒸酒九蒸九晒。一劑。

芍藥

熟地 各二兩

川烏 黑豆製淨六錢

羌活

防風 各一兩

醫通卷十四

瀉風

辛 思得堂藏

蜜丸每服二錢。空心溫酒下。

白花蛇丸 治大風惡疾。癰赤腐爛。

防風

金銀花

枸杞子

蟬蛻

苦參 各二兩

荆芥穗 酒洗兩半

黃連 酒炒

全蠍 滾酒泡炒黃

牛膝

何首烏 鐵器不犯

牛蒡子

連翹

白蒺藜

細辛

胡麻 即亞麻

蔓刺子 各一兩

漏蘆 去苗

白花蛇 一條去尾。中搗白。不犯鐵器。

紫雲風

烏梢蛇 一條去尾。中搗白。不犯鐵器。

右十九味除烏梢蛇外。預為末。同蛇搗和。焙乾。重為末。米飲糊丸。梧子大。每服五七十丸。茶清送下。日三服。如頭面上腫。加白芷一兩。肌肉潰爛。加皂角刺一兩。

鴉片散 治瀉風惡疾赤腫腐爛

番木鱉 一兩 乾漆 三錢

苦參

白鴉毛 一錢 燒存 皂角刺 各二兩

右爲散分作五十服。侵晨溫酒。或茶清送下。亦可用蜜作

丸分五十服

蜈蚣散 治瀉風赤腫

蜈蚣 五十條 雄黃 二錢

穿山甲 生漆 一兩

牛膝 生 薏苡仁 炒各一兩

爲散酒服二錢出汗連服三日効

萬靈丹 治癰疽狀若傷寒頭痛發熱嘔渴渾身拘急疼痛

并治瀉風麻木不仁

茅朮 川烏頭 地土

何首烏 生各二兩

醫通卷十四 瀉風

至一思得堂藏

全蠍 醋泡

石斛

天麻 煨

當歸

甘草 炙

川芎

羌活

荆芥 穗

防風

麻黃

細辛 各一兩

明雄黃

硃砂 水飛淨 各六錢

右爲細末煉白蜜杵勻每兩大者分作四丸中者六丸小

者八丸硃砂爲衣磁礮收貯隨年歲老弱病勢緩急諒用

以葱白香鼓湯空心調服服後以稀粥助令作汗避風寒

忌生冷戒房室孕婦禁用

湯黃散 治胃熱口臭煩渴引飲

藿香葉 七錢

山梔 薑汁炒 一兩

甘草 生炙各半兩

石膏 煨一兩

防風 八錢

爲散每服四五錢水煎去滓入生白蜜少許調服

涼膈散 方祖

消風散 方祖

雙解散 方祖

升麻胃風湯 方祖

千金普濟萬病丸 方祖

小柴胡湯 方祖

地黃丸 方祖

犀角地黃湯 方祖

黃連解毒湯 方祖

七味白木散 方祖

越婢加朮湯 方祖

柴胡四物湯 方祖

加味逍遙散 方祖

四物湯 方祖

補中益氣湯 方祖

人參養胃湯 方祖

清燥湯 方祖

當歸補血湯 方祖

四順清涼飲 方祖

加減八味丸 方祖

清胃散 方祖

醫通卷十四 瀉風

至一思得堂藏

胃風門

小柴胡湯 方祖

白虎加人參湯 方祖

芍藥湯 方祖

人參胃風湯 方祖

升麻胃風湯 方祖

破傷風門

九味羌活湯 方祖

治太陽經感冒風邪

羌活 獨活

蒼朮 炒去皮 各一錢

細辛 五分

防風

生地黃

川芎

葱白 二錢

黃芩 各八分

水煎溫服復取微汗

生薑 三片

石膏湯

白芷

治破傷風便秘溺赤

大棗 一枚

川芎 黃芩 各錢 甘草 錢一

葱白 四莖 香豉 一合

水煎溫服服取微汗

大芎黃湯

芎黃湯去甘草加酒大黃三錢先活錢半

左龍丸 治破傷風牙關緊

左龍丸 雄黃一錢 白礬 錢半 綠膠 各五錢

為末飯糊丸梧子大每服十五丸溫酒下日三服如證重

不已每藥末一錢飯糊中加入巴豆霜五粒每服中加一

丸如此漸加至十九丸以利為度

護心散 治癰毒攻心口乾煩躁嘔吐

醫通卷十四 五言 思得堂藏

真桑豆粉一兩 乳香末三錢 生甘州一錢

硃砂 錢一 硃砂 錢一

右并為散早暮各服二三錢沸湯調服

按護心散原為預防毒氣入心而設故用硃砂以為心經

之嚮導然其性最沉重不若易以沒藥而無鎮固毒邪之

患也

忽刺法 治癰腫被風發熱脹痛

用大葱一握隔湯蒸熟以線紮切平其根乘熱熨背上

冷即更迭互換得微汗為効倦則止之來日再熨如前

此法大能祛風散寒活血止痛消腫解毒之捷法也

小柴胡湯方祖 升麻湯方祖

諸膽汁導方祖 蜜煎導方祖

四物湯方祖

導赤散方祖

萬靈丹方祖

跌撲門

桃仁湯千金

桃仁

大黃

桂心

右九味水煮取三升分三服

調管活絡飲

腹急痛

大黃酒浸

牛膝生

桃仁二錢

生地黃酒浸

肉桂各五

水煎食前溫服臨服入地龍末一錢如病久不能取効如

生附子尖炮穿山甲末各半錢人參一錢

當歸導氣散

大黃酒浸

為散每服三錢熱酒調日三夜一服

自然銅散

自然銅

沒藥

除淫湯方祖

葱白香豉湯方祖

保元湯方祖

治從高墮下腹中瘀血滿痛

桃仁 各三

大黃 各三

桂心 各三

甘草 各二

蒲黃 五兩

荆芥 半兩

當歸 五兩

當歸尾

赤芍藥

羌活 各三

紅花

當歸 三錢

麝香 三分

乳香

羌活 等分

當歸身

當歸身

當歸身

當歸身

當歸身

當歸身

搗絞取汁沖服。

乳香定痛散

治跌撲傷筋

乳香

沒藥各半

白芷

赤芍

丹皮

生地黄

甘草

為散。每服四錢。醇酒和童子小便調。日再服。大便秘加酒。

大黃。筋傷用生牛膝半兩。酒浸搗絞。取汁沖服。

紫金丹 治金瘡出血不止。敷此無癰痕。

琥珀屑

降真香末

血竭等分

為極細末。敷傷處。

香散散門

復元通氣散

復元活血湯

小烏沉湯

醫通卷十四

跌撲

至六 思得堂藏

黑神散

症門

葛根湯

桂枝湯方祖

大承氣湯

麻黃附子細辛湯

桂枝附子湯

真武湯

附子湯

芍藥甘草附子湯

桂枝加附子湯

甘草附子湯

乾薑附子湯

炙甘草湯

十全大補湯

祛風導痰湯

小柴胡湯

蒼附湯

木附湯

參附湯

附子散

合公當歸湯

聽察門

神砂妙香散

導赤散

歸脾湯

加味逍遙散

補中益氣湯

局方香薷飲

續命煮散

保元湯

六君子湯

十全大補湯

頭振門

平補正心丹

治心血虛少。驚悸顫振。夜卧不寧。

龍齒

人參

遠志

茯神

酸棗仁

柏子仁

石菖蒲

生地

醫通卷十四

聽察

顫振

至七 思得堂藏

山藥

五味子

麥門冬

硃砂

五子

麥門冬

右十四味。為末。煉白蜜丸。梧子大。硃砂為衣。每服三五十丸。未湯參湯。龍眼湯。醇酒任下。空心臨卧。各一服。

龍齒清魂散 治心虛扶血。振悸不寧。產後敗血衝心。哭哭如狂。

龍齒

遠志

人參

歸身

茯神

麥冬

桂心

甘草

延胡索

細辛

甘草

延胡索

為散。每服四五錢。薑三片。紅棗一枚。水煎。日再服。此即平

補正心丹。去棗仁。栝仁。菖蒲。生地。山藥。五味。硃砂。加延胡

細辛甘州

瀉青九門下血

道遙散門下

六君子湯四君子

八味九方祖

擊門

黃耆九治刺勞經脈拘攣疼痛少眠

黃耆

白茯苓

酸棗仁炒

狗杞子

防風

醫通卷十四

學

五十八思得堂藏

煉白蜜丸梧子大每服五七十九半饑時溫酒下

木瓜散治筋脈拘攣縮急脣青而白爪疼痛

木瓜酒浸七

當歸

人參

甘草錢五

為散每服四五錢薑五片水煎去滓執服

續斷九局方

續斷薑酒

防風兩半

煉白蜜丸彈子大醇酒細磨一九

六味九八味

瓜蒂散散飲

六味九八味

導痰湯二陳

補中益氣湯保元

十補九八味

熟地

人參

山茱萸肉

羌活

羚羊角錢各七

遠志肉甘半兩

意苡仁各一

當歸身

桂心

醫通卷十四

賦

五十九思得堂藏

羌活勝濕湯門

增損四物湯四物

桂枝湯方祖

眩暈門

正元散治命門火衰不能生土吐利厥冷有時陰火

上衝則頭面赤熱眩暈惡心渴氣逆滿則胸脇刺痛脘腹

脹急

人參

橘皮

甘草

去川芎

右六味除茯苓文火緩焙乾勿炒傷藥性并為散每服

五積散下

舒筋三聖散中風

安腎丸虛損

白朮

黃耆

羌活

白朮

黃耆

羌活

白朮

黃耆

羌活

白朮

黃耆

羌活

白朮

黃耆

羌活

白朮

黃耆

羌活

白朮

黃耆

羌活

白朮

黃耆

羌活

白朮

二陳湯方祖

青礞石丸 痰飲

補中益氣湯 湯保元

附子理中湯 湯理中

佐金丸 方祖

癰門

定志丸 千金

人參

大遠志 甘草湯泡去

右四味為末。蜜丸梧子大。飲服七十九。亦可作湯服。血

虛加當歸。有痰加橘半。甘草生薑。

防已地黃湯 千金

醫通卷十四

防已一錢

防風 錢三

上四味酒浸一宿。絞取汁。銅器盛之。地黃另咀蒸之。加斗

米飯久。亦絞取汁。并入薑汁和分三服。

半夏茯苓散 治癰妄因思慮不遂。妄言妄見。神不守舍。初

病神氣未衰者。用此散服効。

半夏

膽星

廣皮

礞石 八錢各

右為散。每服三錢。水一盞。煎散沸。入生薑汁數匙。空心和

黑錫丹 金液

理中丸 方祖

六君子湯 湯四君子

六味丸 九味

靈砂丹 金液

定志丸 千金

治言語失倫。常常喜笑發狂。

決神 各三

石菖蒲

治癰癩語言錯亂。神氣昏惑。

思得堂藏

妙功丸 治蟲積在內。使人多疑善感。而成癰癩。

丁香

乳香 研

白丁香 研

白雷丸

大黃 兩半

巴豆 研

為細末。蕎麥一兩作糊。每兩作十丸。硃砂為衣。陰乾。每用

一丸。溫水浸一宿。去水。再用溫水化開。空心服之。小兒減

服。久年病。一服即愈。未愈後。三五日再服。重不過三服。

控涎丹 湯下

稀涎散 湯下

醫通卷十四

涼膈散 方祖

滾痰丸 痰飲

狂門

生鐵落飲 治狂妄不避親疎

鐵落 用生鐵火燒赤。沸上。鐵之有花。紛紛墜

石青 二兩 龍齒 煅 白茯苓

防風 各兩 黑參 秦艽 各兩

為粗末。入鐵落汁中。煮取五升。去滓。入竹瀝一升。和勻。溫

服二合。日三服。

來蘇膏 治遠近風痼。心病風狂。牙關不開。痰涎潮塞。

皂角 二兩。大挺 不拘。用酸漿水二升。浸透。搗汁。砂鍋內以文武火熬。用槐柳枝

木香

麝香 另研

陳皮 去白各

赤小豆 勿洗。半

硃砂 一兩。為衣

為細末。蕎麥一兩作糊。每兩作十丸。硃砂為衣。陰乾。每用

一丸。溫水浸一宿。去水。再用溫水化開。空心服之。小兒減

服。久年病。一服即愈。未愈後。三五日再服。重不過三服。

控涎丹 湯下

稀涎散 湯下

醫通卷十四

涼膈散 方祖

滾痰丸 痰飲

狂門

生鐵落飲 治狂妄不避親疎

鐵落 用生鐵火燒赤。沸上。鐵之有花。紛紛墜

石青 二兩 龍齒 煅 白茯苓

防風 各兩 黑參 秦艽 各兩

為粗末。入鐵落汁中。煮取五升。去滓。入竹瀝一升。和勻。溫

服二合。日三服。

來蘇膏 治遠近風痼。心病風狂。牙關不開。痰涎潮塞。

皂角 二兩。大挺 不拘。用酸漿水二升。浸透。搗汁。砂鍋內以文武火熬。用槐柳枝

沉香 各半

熊膽 各二

鶴虱 勿洗。胡

輕粉 四錢

赤小豆 勿洗。半

硃砂 一兩。為衣

為細末。蕎麥一兩作糊。每兩作十丸。硃砂為衣。陰乾。每用

一丸。溫水浸一宿。去水。再用溫水化開。空心服之。小兒減

服。久年病。一服即愈。未愈後。三五日再服。重不過三服。

控涎丹 湯下

稀涎散 湯下

醫通卷十四

涼膈散 方祖

滾痰丸 痰飲

狂門

生鐵落飲 治狂妄不避親疎

鐵落 用生鐵火燒赤。沸上。鐵之有花。紛紛墜

石青 二兩 龍齒 煅 白茯苓

防風 各兩 黑參 秦艽 各兩

為粗末。入鐵落汁中。煮取五升。去滓。入竹瀝一升。和勻。溫

服二合。日三服。

來蘇膏 治遠近風痼。心病風狂。牙關不開。痰涎潮塞。

皂角 二兩。大挺 不拘。用酸漿水二升。浸透。搗汁。砂鍋內以文武火熬。用槐柳枝

攪熬成似膏藥。攤夾紙上陰乾。如遇病人。取掌大一片。用溫漿水化在盞內。將小竹管盛藥。扶病人坐定。微擡起頭。以藥吹入左右鼻孔內。良久扶起。涎出為効。受溫鹽湯一二口。其涎即止。忌雞魚生硬淫麪等物。

三聖散 藏人 治淫痰壅塞

瓜蒂 炒 各二

防風 各二

藜蘆 半兩

為散。每服四五分。以薑汁三盞。緩火熬至一盞。去滓澄清。放溫徐徐服之。以吐為度。不必盡劑。

洗心散 局方

治心經積熱痰盛。口舌生瘡。不大小便。

麻黃 連節 一兩

常山 二兩

大黃 酒拌 剉 三兩

白朮 生用 一兩

芍藥

荆芥 各一

甘州 炙 二兩

醫通卷十四

在

三思得堂藏

為散。每服三四錢。生薑三片。薄荷七葉。水煎去滓。溫服。或茶清調服。三錢。日再服。又方。無白朮。芍藥。荆芥。甘草。多生地黃二兩。黃連木香各五錢。

勝金丹 治癡病狂怒。叫號。遠年近日皆効。但失心風癲。悲愁不語。元氣虛人禁用。

白礞 一錢

萊豆 三百六十粒。水浸去殼。同白礞研如泥。陰乾。

肥梔子 四十枚。去殼晒

雄黃 各一錢。急性子。去皮。研二錢。

雌黃 各一錢。和勻。磁罐收藏。每服七八分。強人至一錢。臨

服入西牛黃五七釐。冰片三五釐。細細研勻。入糕餅內食之。一方加珍珠。琥珀。狗寶各一錢。分作二十服。臨服亦如上方。入西牛黃五釐。冰片三釐。上好白麪一兩五

錢。將麪勻作二分。先將一半入白糖霜一錢半。拌藥為餅。一半再入白糖錢半。裏外作餅。煨熟與食。食後薑湯過。少頃即上吐下瀉而愈。不可以肥皂肉一錢。搗水灌吐。吐後銹釘磨水。頻進六七次。以鎮其神。永不復發。但藥中有砒。大忌燒酒。又須在團餅內以搜頑痰。方始得方。然有一服即應者。有服二三服應者。胃氣厚薄不同故也。

清神湯 治心肺虛熱。痰迷膈上。

黃連

茯苓

酸棗仁 生研

石菖蒲

栝子仁

遠志肉 各錢

甘草 炙 五

薑汁 少許

竹瀝 半杯

水煎食遠服。

肺虛加入參一錢。肺熱加沙參二錢。痰壅加半夏南星各

醫通卷十四

在

三思得堂藏

一錢。橘紅。枳殼。各六分。

大承氣湯 小承氣

涼膈散 方祖

龍齒清魂散 方祖

小柴胡湯 方祖

當歸活血湯 方祖

芎辛湯 方祖

喘脾湯 方祖

痢門

涼膈散 方祖

戴人三聖散 在門

安神丸 方祖

承氣湯 方祖

清神湯 方祖

妙功丸 方祖

十全大補湯 方祖

六味丸 方祖

渴得丸 方祖

導赤散 方祖

四七湯 方祖

靈砂丹 方祖

養正丹 金液
導痰湯 二陳
煩躁門
黑錫丹 金液
補中益氣湯 保元

葶藶苦酒湯 治汗後熱不止發狂煩躁面赤咽痛

葶藶一合

以苦酒即米一升煎葶藶至半升入生艾汁半合再煎三

五沸去滓溫服如無生艾以乾艾

附子理中湯 理中

四逆湯 方祖

涼膈散 方祖

虛煩門

竹葉湯 千金 治五心煩熱口乾唇燥胃中熱悶

竹葉

小麥各三 知母

醫通卷十四

煩躁 虛煩 循衣摸床

在四 思得堂藏

石膏 兩各一

茯苓

黃芩

麥門冬 各六錢

人參 五錢

生薑 一兩

栝蒌根

半夏

甘艸 各三錢

右十二味以水一斗二升煮竹葉小麥取八升去滓內藥

煮取三升分三服老幼分五服

八珍湯 四君子

當歸補血湯 保元

殊砂安神丸 傷勞

生脈散 方祖

六味丸 八味

溫膽湯 二陳

竹葉石膏湯 白虎

梔子豉湯 方祖

五苓散 方祖

橘皮竹茹湯 一陳

識妄門

清神湯 狂門

平補正心丹 額振

涼膈散 方祖

六君子湯 四君子

循衣摸床門

生地黃黃連湯 四物

承氣湯 方祖

喜笑不休門

黃連解毒湯 三黃

怒門

生鐵落飲 狂門

柴胡疎肝散 吐血

四磨湯 氣門

七氣湯 方祖

醫通卷十四

喜笑不休

怒

在四 思得堂藏

悲門

甘麥大棗湯 金匱

治藏燥善悲

甘草 三錢

小麥 三合

大棗 十枚

右三味以水六升煮取三升溫服一升日三服

生脈散 方祖

二冬膏 方祖

驚門

獨活湯 治肝虛內風卧則魂散不收若驚悸狀

獨活

羌活

柴胡 各一錢

細辛 半錢

茯苓

人參 各一錢

五味子

半夏

沙參 各一錢

棗仁 炒研

甘草 炙一錢

生薑 三片

烏梅肉 一箇

水煎食前熱服

珍珠母丸 治肝虛不能藏魂驚悸不寐

珍珠母 印石次明七孔者良 煅赤脂七錢五分

沉香 另研多見人參 各五錢

梔子仁 犀角 鎊各

當歸身 熟地黃 各二

右爲細末煉白蜜丸梧子大每服五七十丸臨

睡薄荷湯送下

遠志丸 治因事有所大驚夢寐不寧神不守舍

遠志 甘草湯 石菖蒲

茯苓 一作 龍齒 各一兩

煉白蜜丸梧子大每服五七十丸空心沸湯臨卧

溫酒送下精隨不守者加五味子半兩陽事不舉者加山

藥炙肉各一兩肉桂半兩自汗不時者倍棗仁加黃耆一

兩

補脂防風湯 治脂虛風發驚悸不眠

防風 一錢 人參 錢半

甘艸 炙 茯神 細辛 五分

前胡 川芎 各八

紅棗 二枚 生薑 三片

水煎去滓熱服。時多驚魔遺洩者本方加羌活桂枝脂

寒者去川芎前胡加熟棗仁遠志肉桂白朮有痰加半夏

白朮天麻

妙香散 治血

龍齒清魂散 治驚

四七湯 治下

來復丹 治下

特門

半夏麻黃圓 金匱

半夏 湯下

右二味爲末蜜丸如小豆飲服三十丸日三服

茯神湯 千金 治心虛神氣不寧煩熱驚悸

茯神 芎藭 半兩

右五味以水一斗煮取二升半分三服

半夏茯苓湯 二陳

千金定志丸 治下

喘脾湯 保元

二陳湯 方祖

天王補心丹 生脈

炙甘草湯 桂枝

溫膽湯 二陳

人參養營湯 保元

恐門

六味丸 八味

遠志丸 驚門

加減八味丸 八味

平補正心丹 治下

溫膽湯 二陳

異功散 治下

喘脾湯 保元

特門

治寒飲停蓄作悸脈浮緊者

麻黃湯 治下

右二味爲末蜜丸如小豆飲服三十丸日三服

茯神湯 千金 治心虛神氣不寧煩熱驚悸

茯神 芎藭 半兩

右五味以水一斗煮取二升半分三服

半夏茯苓湯 二陳

千金定志丸 治下

喘脾湯 保元

二陳湯 方祖

天王補心丹 生脈

炙甘草湯 桂枝

溫膽湯 二陳

人參養營湯 保元

恐門

六味丸 八味

遠志丸 驚門

加減八味丸 八味

八味丸方和

健忘門

千金茯苓神湯 傳門

人參養榮湯 保元

滋陰湯 二陳

六味丸 九下

辰砂妙香散 門

入魔走火門

獨參湯 保元

滋腎丸 九下

貴壽建中湯 佳枝

養正丹 丹下

靈砂丹 金液

養性門

西嶽真人靈飛散

雲母 秋露清養七晝夜

鐘乳 水飛七次取淨七兩

人參 千金製作 續斷

菊花 去心 乾地黃 十二

右九味爲末 天門冬乾者五兩

蒸之一斛 奈末下 米熟出藥

服至七十日 煉白蜜丸服之

專心服此 他疾自除

孫真人曰 此仙人隨身常所服藥也

瑞脾湯 保元

遠志丸 傳門

天王補心丹 生脈

四君子湯 方家

代抵當丸 抵當

六味丸 九下

天王補心丹 生脈

枳實理中湯 理中

保元湯 方和

黑錫丹 丹下

茯苓 八兩

栢子仁 各七

桂心 各七

茯苓 八兩

栢子仁 各七

桂心 各七

茯苓 八兩

栢子仁 各七

桂心 各七

茯苓 八兩

栢子仁 各七

桂心 各七

三紀頃面色美而悅之疑而未敢措手積年詢訪屢有名
人曾領得力遂常服之一如方說但能業之不己功不徒
棄耳服藥母人忌

彭祖藥角丸 附 培理身心專事永年者服此

藥角丸 附 培理身心專事永年者服此

通草 附 培理身心專事永年者服此

菟絲子 附 培理身心專事永年者服此

右以藥角檳榔二末共煎一食時頃藥似稠粥即止火少

待熱氣歇即投後六味散攪令相得仍待少時漸稠粘堪

作丸如梧子大空腹酒下三十九日加一九至五十九爲

度且暮二服百日內忌房室服經一月腹內諸疾自相驅

逐有微利勿怪修合時勿令雞犬婦人孝服等見

石頑曰藥角走腎脈而補陰中之陽檳榔行腹內而破陰

中之滯兼通草秦九通血脈而運通身之氣菟絲從容填

補腎藏人參以助諸味之力也

或問服食諸方宗派各立獨以靈飛散爲之首推願聞其

旨云何答言靈飛一方上真心印第凡夫目之則與毫山

隻展無異是以近世慕道之士往往留心藥角丸專取血

肉之味培理色相之軀焉知真類有情之屬豈若山靈無

情之品足以蕩練性靈孫公服之尸解良由雲母性善飛

揚與性靈結成一片爾其藥角丸方彭君餌之得力長享

遐齡但以血肉性滯不能上升終歸地肺不能使人無疑

以意推之此雖平時修德之力亦由宿昔根器使然吾因

洞哲其微彭君以塵緣羈絆艱於脫凡孫公以功行易滿

速於遷化。是豈羣迷之可以窺測哉。雖然世之預功累行以祈天仙者。未之見也。心慕長生而欲求地仙者。在在有之。故以藥角九方。附之靈飛散後。各從其尚可也。

泄瀉門

四柱飲 局方 治瀉利滑脫不止

人參一兩 茯苓

附子炮

木香 煨各五錢

右爲細末。每服四錢。入生薑五片。大棗一枚。煎如稀糜。入鹽一字調服。

六柱飲 治滑脫不止。瀉利完穀。

四柱飲加訶子肉豆蔻減半。

二神丸 治腎藏陽虛。五更泄瀉。

醫通卷十四

七十 思得堂藏

補骨脂 炒 肉豆蔻 生用 等分

爲細末。蒸餅丸。梧子大。每服二錢。米湯溫酒任下。

四神丸 治腎虛肝氣逆滿。不能消冠。腹脹泄瀉。

二神丸加吳茱萸木香。減半。如陰虛惡燥去木香。以五味子代之。

半夏瀉心湯 方祖

生薑瀉心湯 半夏瀉心湯下

甘草瀉心湯 半夏瀉心湯下

乾薑黃芩黃連人參湯 半夏瀉心湯下

厚朴生薑半夏甘草人參湯 二味湯下

薑附湯 四逆湯下

升陽除溼湯 散下

香砂六君子湯 湯下

胃苓湯 散下

枳實理中湯 湯下

黃芩芍藥湯 仲黃芩湯 桂枝湯下

保和丸 傷飲 食門

五苓散 方祖

漿水散 湯下

四君子湯 方祖

平胃散 方祖

理苓湯 湯下

茯苓甘草湯 湯下

加減八味丸 九味

備急丸 方祖

木香散 湯下

越鞠丸 湯下

醫通卷十四

泄瀉

主 思得堂藏

補中益氣湯 湯下

八味丸 方祖

異功散 湯下

痢門

桃花湯 金匱 治下利便膿血。

赤石脂 四兩 一半銼末

粳米 三合

右三味以水七升。煮米令熟去滓。溫七合。內赤石脂末一方寸匕。日三服。若一服愈。餘勿服。

白頭翁湯 金匱 治熱利下重。

白頭翁

秦皮 各一兩

黃連

黃檗

二陳湯 方祖

附子理中湯 湯下

理中湯 方祖

連理湯 湯下

治中湯 湯下

葛花解酲湯 湯下

木香調氣散 湯下

錢氏白朮散 湯下

養正氣散 湯下

道遙散 湯下

枳木丸 湯下

九味資生丸 湯下

六味丸 湯下

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈更服。
紫參湯 金匱 治下利肺痛。

紫參三兩 甘草一兩

右二味以水五升先煮紫參取二升內甘草煮取一升半分溫三服如無紫參以紫苑代之以。

訶梨勒散 金匱 治下利失氣爲氣下泄。

訶梨勒十枚

右一味爲散粥飲和頓服。

養藏湯 局方 治泄痢膿血有如魚腦後重脫肛臍腹痛。

人參 白朮 炒焦各 肉桂 肉豆蔻

訶子肉 木香 錢半 肉桂 肉豆蔻

罌粟殼 蜜炙 五分

醫通卷十四

藥

生一思得堂藏

右七味水煎分二次服忌生冷魚腥溼麪油膩等物夜起

不差者加附子五分不應加一錢。

溫脾湯 千金 治積久熱痢赤白。

大黃 四錢 人參 甘草

炮薑 各二錢 熟附子 一錢

右五味水煎溫服。冷痢去甘草加桂心三錢倍人參薑

附減大黃一錢。

此本大黃附子湯加薑桂人參以溫中緣垢也。

羊脂煎 千金 治久痢不瘥。

羊脂 一斤 白蠟 二斤 黃連 半斤 烏梅肉 二兩

酢 七合 蜜 七合 煎 取五合

亂髮 洗去垢 末一升

右七味合內銅器中湯上煎之。梔可丸。飲服如梧子大三十九日。三。梧子大小如方寸七。

詳羊脂性滑利入千金用治久痢不瘥專取滑利以通虛

中留滯也。其後且有羊脂阿膠蜜蠟黍米作粥方深得炎

帝本經補中寓湯之旨。

附子湯 千金 治暴下積日久不止。

熟附子 阿膠 各三錢 酸石榴皮 一枚

龍骨 煨通 甘草 炙 烏藥 炒各

炮薑 六分 黃連 炒黑 黃芩 各七

右九味加粳米一握水煎分溫三服。

白頭翁加甘草阿膠湯 全 治按熱利下膿血及產後利

不止。

醫通卷十四

藥

生一思得堂藏

白頭翁 黃連 炒黑 黃藥 炒黑

秦皮 甘草 炙各 阿膠 三錢

右六味先煮上五味去滓內膠烱盡溫分三服。

桃花圓 千金 治冷痢。臍下攪痛。

乾薑 赤石脂 分

右二味蜜丸。蠶豆大。服十九日。三服。加至二十九。

大桃花湯 千金 治下痢久脫虛冷。白帶腹痛。

赤石脂 乾薑 當歸

龍骨 炙 牡蠣 煨各

芍藥 炒 白朮 附子 炮四

甘草 炙二 人參 各三

右十味水煎分三服。腹稠加厚朴。嘔加橘皮。

厚朴湯千金 治一二年熱痢不止

厚朴

乾薑

阿膠各四錢

黃連六錢

石榴皮

艾葉各五錢

右六味水煎日再服。

椒艾丸千金

治久痢完穀不化肌肉消盡。

蜀椒三百粒

烏梅二百粒

熟艾一觔

乾薑三兩

赤石脂二兩

右五味椒薑艾下篩入石脂淨末梅著末下蒸熟去核令
馬豆和丸梧子大服十九日三服不應加至二十九不瘥
加黃連。

三奇散 治痢後下重。

枳殼二兩

黃耆二兩

防風一兩

通卷十四

痢

思得堂藏

為散每服二錢米飲調服。

西根丸

治毒痢下血如雞肝心煩腹痛。煎注下血。

茜根

升麻

犀角

地榆

當歸

黃連

枳殼

白芍等分

為細末醋煮紅麴丸如梧子空心米飲下七十九。

黃芩湯外臺

治乾嘔下利。

黃芩

人參

乾薑各一兩

桂枝三錢

大棗十二枚

半夏二兩

右六味以水七升煮取三升溫分三服。

三物湯艾湯千金

治壯脈血痢。

酸石榴皮各一兩

阿膠

右三味水煮去滓內膠令烊盡分三服。

欲痢輒先心痛腹脹滿日夜五六十行者加黃連黃連各一兩防已乾薑各半兩附子一枚麴半兩蜜丸梧子大飲

服二十九日三漸加至三四十丸。

伏龍肝湯丸 治胎前下痢產後不止及元氣大虛發熱小

腹結痛不勝攻擊者。

炮黑查肉一兩

然脂黑糖二兩

右二味一半為丸一半為末用伏龍肝二兩酒洗代水煎

末二錢送前丸二錢日三夜二服一晝夜令氣虛加入

參二三錢以獨取之虛熱加炮薑肉桂各半甘草兼感風

寒加葱白香豉膈氣不舒磨沉香汁黃連之類服。

黃連犀角散 治狐惑肛門生瘡。

通卷十四

痢

思得堂藏

犀角一兩

黃連五錢

木香錢半

烏梅十箇

為散每服二錢水煎和滓日再服。

大承氣湯小承氣湯

小承氣湯方祖

枳子豉湯方祖

通脈四逆湯方祖

附子理中湯方祖

黃芩芍藥湯方祖

香連丸方祖

枳殼承氣湯方祖

胃苓湯方祖

小建中湯方祖

理中湯方祖

大黃黃連瀉心湯方祖

枳木丸方祖

胃風湯方祖

神木湯方祖

補中益氣湯方祖

升陽除淫湯方祖

二陳湯方祖

十全大補湯

主司齊生腎氣丸

加吟琴子初

水道瀉痛

甘草生
肉桂各二錢半

此金匱葵子茯苓散加後四味也

生附子散 治冷淋小便秘澀數起不通。穀中疼痛。憎寒凜凜。或飲水過多所致。

附子 生用 去皮 脂

滑石 各半

瞿麥

半夏 湯泡 七次

木通 各半

爲散。每服三錢。薑七片。燈心二十莖。水煎入鹽半匙。空心冷服。

參苓琥珀散 治小便淋瀝。莖中痛引脇下。

人參

延胡索 各五

丹皮 一作

茯苓 各四

川棟子 皮去

琥珀 各二

澤瀉

當歸 稍

甘草 稍 生各

爲散。每服四錢。長流水煎。去滓熱服。日進二服。

醫通卷十四

蘇

七九 思得堂藏

補灰散 益元

滑石 白魚散 益元

茯苓戎鹽湯 五苓

白虎加人參湯 白虎

豬苓湯 五苓

紫雪 火門

補中益氣湯 保元

六味丸 八味

犀角地黃湯 傷寒

沉香降氣散 氣門

四磨湯 氣門

聚精丸 虛損

金匱腎氣丸 八味

八味丸 方祖

導赤散 暑門

滋腎丸 大補

辰砂益元散 益元

生料鹿茸丸 虛損

腎瀝湯 痔門

茯苓丸 痔門

巴戟丸 痔門

五苓散 方祖

清心蓮子飲 生脈

生脈散 方祖

歸脾湯 湯下

辰砂妙香散 湯下

黃芩清肺飲 梔子散

都炁丸 九味

小便不禁門

固脬丸 治虛寒小便不禁。

兔絲子 酒浸一宿。焙乾。兩

桑螵蛸 蜜炙

茴香 去子

附子 炮

桑螵蛸 蜜炙

戎鹽 各半

爲末。乾山藥末糊丸。梧子大。空心酒下五十九。

加減桑螵蛸散 治陽氣虛弱。小便頻數。或遺溺。

桑螵蛸 三十枚

黃耆 三兩 蜜

麥門冬 兩半

五味子 半兩

補骨脂 蜜炒

人參

厚杜仲 鹽酒炒

爲散。每服三錢。空心半腎煎湯調服。并用紅酒細嚼。半腎

醫通卷十四

小便不禁

七九 思得堂藏

或羊腎湯泛爲丸。空心酒下三錢。

縮泉丸 治肝氣不足。小便頻數。晝甚於夜。

益智仁 鹽拌炒

烏藥 等分

爲末。酒煮乾山藥糊丸。梧子大。每服五七十九。空心淡鹽湯送下。

草薢分清飲 治白濁凝如膏糊。小便頻數。

益智仁 鹽水拌

烏藥

石菖蒲 鹽水

川草薢 等分。大塊。色白。葉黃。咀

爲散。每服四錢。入鹽一捻。水煎熱服。

精通尾骨。漫出膀胱。涇渭攸分。源流各異。詳漫便之不禁。乃下焦陽氣失職。皮用益智之辛溫。以約制之。得鹽之潤。

下。并烏藥亦不致於上竄也。濁是胃中濁滯下滲。非草薢

無以清之兼蓄滯以通九竅利小便畧不及於收攝腎精之味厥有旨哉

六味丸 八味丸

八味丸 方祖

生料鹿茸丸 虛損

生料五苓散 方祖

加減八味丸 八味

補中益氣湯 保元

五苓散 方祖

黃芩清肺飲 湯下

滋腎丸 大補

龍膽瀉肝湯 湯下

白虎加入參湯 白虎

茯苓甘草湯 湯下

腎瀝湯 脾門

地黃飲子 湯下

小便黃赤門

導赤散 湯下

四君子湯 方祖

五苓散 方祖

生脈散 方祖

保元湯 方祖

清暑丸 二陳

清燥湯 湯下

補中益氣湯 保元

六味丸 八味

龍膏丸 三黃

竹葉石膏湯 湯下

滋腎丸 大補

竹葉石膏湯 湯下

遺精門

豬苓丸 治肥人淫熱傷氣遺精便濁瀉痛

半夏 破如豆大 豬苓 去黑皮切片以朱糊

先以豬苓末一兩同半夏炒勿令焦放地上出火氣取半

夏篇末打糊同炒過豬苓篇丸梧子大候乾更以豬苓末

一兩同炒微裂。薏蘆收貯。空心淡鹽湯下三四十九未申

間溫酒再下一服

此方以半夏利痰猪苓導水通因通用之法也

威喜丸 局方 治洩瀉如注泄瀉夢泄便濁屬火鬱者

蜂蟻

白茯苓 各四

右以茯苓為小塊如骰子大用猪苓二兩煮汁一升去滓

煮入茯苓內汁盡晒乾為末溶蠟為丸如彈子大空心細

嚼滿口生津徐徐嚥下以小便清為度忌米醋尤忌怒氣

勞力

還少丹 治老人心脾腎三經精血不足精流不固

厚杜仲 鹽水

川牛膝 酒浸

山茱萸肉 炒

肉苁蓉 酒浸

遠志肉 甘草

五味子 各二

乾山藥 製

枸杞子 各二

石菖蒲 各一兩

茴香 鹽水炒

煉白蜜同紅棗肉為丸梧子大每服五七十九清晨鹽湯

卧時溫酒送下。精滑去牛膝加續斷二兩即打老兒丸

金鎖玉關丸 治心腎不交遺精白濁

芡實

蓮肉 去心

白茯苓

乾山藥 等分

五味子 減半

藕節粉

為朱金櫻子熬膏代蜜搗二千下丸如梧子大每服五十

九龍時酒米湯任下

九龍丹 治斷衰太過敗精夫道消泄不禁

枸杞子

金櫻子 去皮

蓮肉 去心

芡實

山茱萸肉

常喘身

熱地黃

白茯苓

爲末酒糊九梧子大每服百丸或酒或鹽湯下

經進華仙丸 康熙癸酉太常伯王人崔進

沙苑藥丸 八兩淘淨隔紙微焙取末四兩

山茱萸 酒蒸去核和末四兩同金櫻子蒸膏

代之 枸杞子 四兩 白蓮藥 四兩酒洗

川續斷 去酒 覆盆子 去酒酒浸九蒸

金櫻子 去淨毛

右八味共爲細末以所留藥熬粗末同金櫻子熬膏入前

細末拌勻再加煉白蜜爲丸如梧子大每服八十丸漸加

至百丸空腹淡鹽湯送下

珠砂安神丸 傷勞

醫通卷十四

遠病

全思得堂藏

四七湯 二陳

遠志丸 驚門

六味丸 八味

溫膽湯 二陳

縮泉丸 小便不

聚精丸 虛損

二陳湯 方祖

小建中湯 桂枝

喘胖湯 肺元

赤濁白濁門

二陳湯 方祖

五苓散 方祖

八味丸 方祖

辰砂妙香散 瀉血

滋腎丸 大補

濟生鹿茸丸 虛損

加減八味丸 八味

痰痰丸 痰飲

桂枝龍骨牡蠣湯 桂枝

安腎丸 虛損

清心蓮子飲 生肌

九龍丹 遺精

豬苓湯 五苓

清心蓮子飲 生肌

生肌散 方祖

補中益氣湯 傷元

四苓散 五苓

桂枝加龍骨牡蠣湯 桂枝

前陰諸疾門

柴胡勝濕湯 治外腎冷陰汗羸瘦陰囊溼癢腫氣

柴胡

澤瀉

黃藥 錢半

麻黃根

水煎食前稍熱服忌酒醋淫慾

四逆湯 方祖

枳實理中湯 理中

龍膽瀉肝湯 肝熱

滋腎丸 大補

二陳湯 方祖

防已茯苓湯 防已黃

柴胡清肝散 小柴胡

疳門

大烏頭煎 金匱

者

川烏頭 皮腐後八片

右以水三升煮取一升去滓內蜜一升煎令水氣盡取一

妙香散 瀉血

龍膽瀉肝湯 肝熱

六味丸 八味

逍遙散 虛損

當歸內補建中湯 桂枝

黃藥 錢半

升麻

甘草 一錢

當歸 梢

漢防己 酒洗各

五味子 熟碎

黃藥 連中湯 桂枝

小柴胡湯 方祖

八味丸 方祖

六味丸 八味

桂枝湯 方祖

舒筋三聖散 中風

全思得堂藏

升強人服五合弱者三合不差明日再服

當歸生薑羊肉湯 金匱 治腹中寒痛虛勞不足并治產後

腹中疼痛

當歸 一兩

生薑 兩半

羊肉 二斤

先煮羊肉去滓及沫取清者煮上二味溫分三服若寒多者倍生薑痛多而偏者加橘皮白朮血積不止千金去生薑換乾薑加生地黃產後虛羸喘乏自汗腹中絞痛千金加桂心芍藥芍藥乾地黃甘草冬茯苓甘草大棗黃耆桂心乾地黃芍藥麥門冬茯苓甘草大棗

抵當烏頭桂枝湯

金匱 千金 各烏頭湯

治寒疝腹痛逆冷手足不

仁身體疼痛

烏頭 大者一枚炮去

醫通卷十四

症

全 思得堂藏

右一味以蜜一觔煎減半以桂枝湯五合解之令得一升餘初服二合不差即服三合又不知服至五合其知者如醉狀待吐者為中病桂枝湯即桂枝芍藥甘草薑棗本方

烏頭梔子湯

金匱

治疝瘕少腹緩急痛處按之即減

川烏頭 大者一枚

梔子 各三錢

右二味水煎空心故冷服不差再服

酒煮當歸丸

一名丁香

治寒束熱邪疝瘕諸痛及婦人帶

下瘕聚

當歸

附子 炮

茴香 各一

川棟子 酒煮去皮

按五錢

右四味以酒三升煮酒盡焙乾入後四味

丁香

木香 各三

延胡索 醋炒

全蠍 十四枚

共為細末酒糊丸梧子大每服五七十九至百丸食前溫

酒送下

天台烏藥散

治疝瘕小腹引控墜而痛

烏藥

木香

茴香 鹽水

青皮 醋炒

良薑 各五

檳榔 二枚

川棟子 大者二十枚

酒浸去皮核取

為散每服二錢溫酒調服痛甚者薑汁酒送下

蜘蛛散

金匱

治陰狐疝氣偏有大小時時上下者

大蜘蛛 十四枚

肉桂 半兩

為散每服一錢日再服溫酒送下蜜丸亦可

寶鑑當歸四逆湯

治厥疝脇下久寒結痛

醫通卷十四

症

全 思得堂藏

當歸 錢半

附子 炮

肉桂

茴香 炒

延胡索

柴胡 各一

芍藥

茯苓 各八

澤瀉

川棟肉 各六

水煎空心稍涼服

香橘散 治羣九偏墜

茴香 鹽水

橘核 去殼研

山查肉 炒各

兩

為散每服三四錢空心溫酒調服羣九腫大痛甚左右

移換者加木香沉香各三錢川棟肉青鹽各二錢荔枝枝

十枚燒灰

木香棟子散 治偏墜久藥不愈淫熱者

川楝子 三十枚同巴豆三十粒炒去	川草薢 五錢 石菖蒲 一兩 青木香 一兩	荔枝核 二十枚 茴香 炒六錢	為散每服二錢半入麝香少許空心鹽酒送下	喝起丸 治疝腎虛腰痛	杜仲 鹽水炒 葫蘆巴 同炒 補骨脂 炒	懷香 鹽水 川草薢 各一	右為細末入連皮胡桃肉三十枚青鹽半兩同研如泥入煉白蜜丸如彈子大空腹細嚼二丸溫酒送下卧時再服二丸	此本背蟻丸入懷香葫蘆巴草薢三味故謂王腎虛腰痛小腹疝瘕	醫通卷十四 交陽 陽鳴 全六 思得堂藏	加味通心散 治小腸疝痛水道不通	瞿麥穗 一兩 木通 連翹 梔子仁 酒炒 甘草梢	黃芩 川楝肉 車前 各五錢 肉桂 三錢	為散每服五錢加燈心二十莖竹葉十片水煎服	立効散 治疝因食積作痛	山查肉 醋浸炒 川楝肉 酒浸 藜香 鹽水 炒 香附 醋炒	枳實 炒 蒼朮 和皮炒 吳茱萸 去閉口 炒 三錢	山梔 鹽汁 青皮 半兩 各	為散每服五錢加生薑三片水煎	九味蠅蔥散 治疝因風寒淫氣壅九腫痛	延胡索 一兩 肉桂 五錢 乾薑 炮二錢
-----------------	----------------------	----------------	--------------------	------------	---------------------	--------------	--	----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------	---------------------	-------------	------------------------------	--------------------------	---------------	---------------	-------------------	---------------------

丁香 一錢 茯苓 六錢 甘草 炙	蒼朮 泔洗 枳殼 羌活 各三錢	為散每服五錢入連翹葱白二莖水煎食前熱服取微汗効不愈再服腹脹便秘有食積梗痛去羌活加三稜蓬朮縮砂仁	縮砂仁	禹功散 水腫 桂苓丸 五苓散 二砂散 九下	五苓散 方祖 龍膽瀉肝湯 門 桂枝湯 方祖	八味丸 方祖	代抵當丸 熱下	交陽門	五苓散 方祖 芎歸湯 湯下 四七湯 湯下	香連丸 九下	醫通卷十四 陽鳴 全七 思得堂藏	滾痰丸 痰飲 陽鳴門	升陽除溼湯 散下 二陳湯 方祖	枳實理中湯 湯下 六君子湯 湯下 平胃散 方祖	半夏瀉心湯 方祖	聖應木香散 五苓散 附子梗米湯 腹瀉 牽廬丸 水腫	胃苓湯 散下	腸瀉門	薤白附子散 治腸瀉初起 附子 二錢	薤白 一兩	為散取方寸七水煎頓服小便當利	敗醬 正錢一各鹿 腸瀉入以之
------------------	-----------------	---	-----	-----------------------	-----------------------	--------	---------	-----	----------------------	--------	------------------	------------	-----------------	-------------------------	----------	---------------------------	--------	-----	-------------------	-------	----------------	----------------

慈苡敗醬湯千金 治腸癰未潰

慈苡仁

桔梗

麥門冬各一兩

敗醬

牡丹皮

茯苓

甘草

生薑各六兩

丹參

芍藥各一兩

生地黃兩半

右十一味水煮分三服日三

慈苡瓜瓣湯千金

治腸癰

慈苡仁三合

牡丹皮

桃仁各一兩

瓜瓣六合

右四味水煮分再服。崔氏有芒硝六錢云腹中痞痛不安或服滿不下飲食小便澀此病多是腸癰人都不識婦人產後虛熱多是此病。縱非癰疽便服此方無傷損也。

赤小豆當歸散諸見

桃核承氣湯小承氣

大黃牡丹湯湯下

千金托裏散湯下

太乙膏

脫肛門

補中益氣湯保元

人參胃風湯四君子

人參固本丸二冬

痔漏門

與痔散治內痔不出

草烏頭生用

食鹽

爲散先用溫湯洗淨

刺蝟皮燒存性

麝香五分

冰片三分

填入肛門片時

卽出去藥上護痔膏

護痔膏

白芨

石膏

黃連各三

冰片

麝香各二

爲細末雞子清入白蜜少許調成膏護四邊好肉方上粘

痔散如痔旁肌肉堅者不必用此

枯痔散凡痔瘡突出卽用此藥

白礬二兩

煨酥二錢

輕粉四錢

砒霜一兩

天靈蓋背鹽水浸水浸七次四錢

共研極細末入小新鐵鍋內上用磁碗密蓋鹽泥封固炭

火煨至二炷香待冷取藥研極細末鉛罐收貯每日上午

慈湯泥津用津唾調拾如鐵厚貼痔上令著以薄紙貼接

醫通卷十四

痔漏

公九思得堂藏

輕掩上捲束其藥不使侵好肉上若內痔至晚再換一次

至六七日其痔枯黑堅硬住藥待其裂縫自落換落痔湯

洗之

落痔湯一名起

黃連

黃藥

黃芩

大黃

防風

荆芥

梔子

槐角

苦參

甘草各一

朴硝五錢

右作三服用水煎洗待痔落之後搽生肌散如痔傍肉不

赤腫枯黑卽落不必用此

生肌散

乳香

沒藥各一

海螵蛸水煮

黃丹四錢

赤石脂七錢

龍骨四錢

血竭三錢

熊膽四錢

輕粉五錢

冰片一錢

麝香八分

珍珠二錢

爲極細末。鉛罐收貯。早晚搽二次。有掩漸飲而平。

洗痔消腫方

蕤菜一名魚腥草

苦楝根

朴硝

馬齒莧

瓦礫花各一

用水十碗煎至七八碗。先薰後洗。諸痔腫痛可消。故附錄之。

胡連追毒丸 治痔漏不拘遠年近日。有漏通腸。污從孔出。

先用此丸追毒服盡。

胡黃連一兩切 刺楸皮一兩切 麝香三分

醫通卷十四 痔漏 辛 思得堂藏

爲末。陳米爛飯爲丸。麻子大。每服一錢。食前溫酒下。服後

如膿水反多是藥力到也。勿懼之。候膿水將盡。服黃連閉

管丸。

黃連閉管丸

胡黃連五錢

穿山甲麻油內煮黃色

石決明煨

棉花微炒各五錢

爲末。煉白蜜丸。麻子大。每服一錢。晨昏各一服。米飲下。至

重者四十日愈。如漏之四邊有硬肉突起者。蠶繭二十枚

炒末。和入藥中。治遍身諸漏皆効。

黃線方 治瘰癧及痔根細者。

芫花半兩勿 壁錢二錢

用細白扣線三錢。同上二味。川水一飯盛。貯小磁罐內。殺

火煮至湯乾爲度。凡遇前患。用線一條。大者用

二條。雙扣紫於根帶。兩頭留線。日漸緊之。其患自然紫黑。

冰冷不熱爲度。輕者七日。重者十五日。後必枯落。後用珍

珠輕粉。韶粉。冰片。爲散。收口至妙。一方用芫花根洗淨

搗汁。入壁錢浸線用之。

六味丸八味丸下

補中益氣湯保元湯下

張氏醫通卷十四終

醫通卷

辛 思得堂藏

清 長洲石頭張

璐路王父

男 以柔安世

男 謝選言

日本 大泉長卷前田安宅子仁

男 典子守

目門

磁珠九千金 治神水寬大漸散光采不收及內障後腎

不能消用此鎮之

磁石 能吸鐵 磁砂

先以磁石置巨火中煨七次每煨必淬以醋研細水飛澄定晒乾取淨二兩磁砂亦研細水飛晒乾取淨一兩用生

神麴末三兩與前二味和勻更以神麴一兩水和作餅煮浮搜入前藥為丸如菉豆大每服三四十九空心米飲送下

按千金磁珠丸方本指南之製而立昔黃帝征蚩尤尤善布毒霧障蔽宇宙莫能破之因是玄女授帝指南以定方隅而滅之於涿鹿指南之象是此而傳於世法用神砂雄黃拌鐵入生雁脰骨空中煨鍊而成煨過必置磁石之上蓋珠巢南方離火之氣而中懷嬰姪磁巢北方坎水之精而外發氣真真正辟惡之靈物也用雁脰者以其生於漠北而性必旅南得陰陽二氣之交所以入水不濡戾天能飛用以佐磁珠而製鐵則最重之質置水能浮隨磁吸引以為指南之準則近世以雁脰難得用白雄雞血磁砂

雄黃拌鐵入活雁魚首煨過同磁石收貯取其準上午下子者用之與雁脰之義不殊凡羽禽之目皆自下視而交上視性皆升舉所以能飛非若毛獸之目悉自上視而交下視也吾嘗靜觀龍走升沉之理於茲可默識矣千金爰悟其旨取磁珠之重以鎮神水之不清而收陰靈之障蔽用生麴者藉以發越丹石之性猶雁脰鼓躍二氣之義也意崇古立方之聖莫如長沙長沙之後唐進士一人而已

皂莢丸 治外內一切障膜腎瘕不宜錢撥者此丸與生熟

地黃丸並進

蛇蛻 七條

穿山甲 炮

茯苓

蟬蛻

當歸

殺精草

元精石

白朮 生

木賊

白菊花

赤芍

人參 一兩

刺楸皮 炒粉

連翹 各兩

川芎 半兩

龍膽草

獐猪爪 三十枚 炒

共為細末一半入牙皂十二挺燒存性和勻煉白蜜九梧子大每服一錢五分空心食前杏仁湯送下一半入仙靈脾即送一兩每服三錢用猪肝三片批開夾藥煮熟臨卧細嚼用原汁送下

生熟地黃丸 治肝虛目痛膜入冰輪內外諸障

生地黃 八兩

牛膝 四兩

防風

熟地黃 十二兩

菊花 六兩

杏仁 湯洗去

百濟散 水

羌活

枳殼 各二

蜜九梧子大每服五七十九以黑豆三升炒令烟盡淬好

酒六升。每用半盞食前送下。鹽湯亦可。或用生雞肝搗爛為丸尤妙。

此即明目地黃丸。加菊花羌活。其間防風杏仁枳殼。與地黃牛膝同用者。以其久風襲入寒水之經也。若精血虧人。則當去此三味。易白茯苓當歸枸杞。未為不可也。

夏枯草散 治肝虛目珠痛。至夜疼劇。

夏枯草花 一兩

香附 二兩

甘草 三錢

為散。每服四錢。茶清調。日三服。或加茅茶煎服。痛久血傷。加當歸六錢。白芍四錢。生地黃一兩。黃耆二兩。每服五錢。入茅茶一撮。水煎去滓服。

沈肝散 治方

治風毒上攻。暴赤腫痛。

薄荷

常歸

羌活

防風

山梔

思得堂藏

大黃 二兩

川芎 八錢

甘草 一兩

為散。每服三錢。沸湯調。日二三服。

酒煎散 治暴赤眼生翳。

漢防已 酒洗

防風

甘草 三錢

荆芥穗

當歸

赤芍藥

牛蒡子

甘菊 五分

為散。每服五六錢。酒煎。食後溫服。

大黃當歸散 治眼腫。瘀血凝滯不散。攻厥見翳。

大黃 酒蒸

黃芩 一兩

紅花 二錢

蘇木屑

當歸

梔子 酒炒

木賊 各五

為散。每服四五錢。水煎。食後服。

瀉肺湯 治暴風客熱外障。白睛腫脹。

羌活

黑參

黃芩 各一

地骨皮

桑白皮

大黃 酒蒸

芒硝 各一

甘草 八分

水煎。去滓。半饑溫服。皮多者。桑白皮。芒硝。各一。

蜜蒙花散 治方

治皆淚昏暗。

白茯苓 炒去

蜜蒙花 各一

甘菊花 去蒂

石決明 磨

白芍藥 各一

羌活

白茯苓 炒去

木賊 去節

甘草 各半兩

為散。每服二三錢。茶清調服。治男子風毒上攻。眼目赤腫。怕日羞明。

還睛圓局方

治男子風毒上攻。眼目赤腫。怕日羞明。

思得堂藏

思得堂藏

思得堂藏

多饒。眵淚。隱澁難開。眶痒赤痛。臉紫紅爛。瘀肉侵睛。或成暴赤眼。睛疼不可忍者。併服立効。

白朮 生

羌活 去節

白茯苓 炒去

木賊 去節

羌活 去節

青箱子 去土

蜜蒙花

防風 去蘆

甘草 各分

右為末。煉蜜圓如彈子大。每服一圓。細嚼白湯下。日三服。又治偏正頭風。頭目眩暈。

石膏散 治頭風患眼。

生石膏 三兩

白朮 生

羌活 三兩

白朮 生

甘草 各半

白茯苓 炒去

為散。每服四五錢。熱茶清調。空腹臨臥。各一服。

通肝散 治曉曉轉關。臉硬睛疼。風熱瞽障。

梔子 炒黑

白茯苓 炒去刺

羌活 二兩

荊芥穗

當歸

牛蒡子 炒研

甘草 炙各一兩

爲散。每服三錢。食後竹葉湯調服。世本無羌活。當

將雪膏。即黃蠟。治昏暗癰痛。墜瀉。難開。將淚生。管

爐。消石。四兩。銀。兩。內。固。清。水。煎。汁。入。童。便。半。盞。將。消。石。火。當

如。彈。子。多。刺。以。孔。吸。赤。汁。入。童。便。半。盞。將。消。石。火。當

礞。砂。研。細。水。調。上。一。宿。去。火。氣。收。貯。待。用。

明。乳。香。性。暖。研。烏。賊。骨。性。寒。研。白。丁香。直。者。各

應。香。應。粉。各。五。分。煉。白。蜜。四。兩。先。下。藥。淨。爐。消。石。末。一。兩。不。住。手。攪。次。下。後

七。味。攪。至。紫。金。色。不。粘。手。爲。度。捻。作。挺。子。每。用。少。許。新。水

磨化時時點之。忌酒醋蕎麥。

又方

用。爐。消。石。一。兩。煨。赤。以。羊。膽。汁。青。魚。膽。汁。等。汁。梨。汁

人。乳。白。蜜。等。分。相。和。淬。之。再。煨。再。淬。汁。盡。爲。度。入。冰。片

麝。香。青。鹽。礞。砂。各。二。分。研。勻。每。用。少。許。井。花。水。調。點

兩。背。

石。燕。丹。點。外。障。諸。醫。

爐。消。石。四。兩。用。黃。連。一。兩。身。木。賊。羌。活。蘇。合。五。錢

取。淨。一。兩。水。二。升。煮。便。一。升。同。煮。去。滓。製。法。如。絲。雪。膏

硃。砂。水。飛。各。取。一。兩。石。燕。丹。一。兩。一。錢。如。無

冰。片。碎。砂。水。飛。各。取。一。兩。麝。香。各。分。白。丁香。代。無

右。爲。極。細。末。每。用。少。許。點。大。眇。如。枯。流。無。淚。加。熊。膽。一。分

白。蜜。少。許。血。管。加。其。阿。魏。黃。腎。加。雞。內。金。風。熱。腎。加。麝。仁。

熱。腎。加。珍。珠。牛。黃。冷。腎。加。附。子。尖。雄。黃。老。腎。倍。礞。砂。加。豬

膽。子。

助。陽。和。血。湯。治。氣。血。不。和。痛。如。鍼。刺。

黃。耆。生。三。錢。當。歸。三。錢。

防。風。各。一。錢。白。芷。八。分。

升。麻。各。六。分。柴。胡。八。分。

水。煎。食。後。服。趙。以。德。加。赤。芍。藥。七。分。

白。蒺。藜。散。治。肝。腎。虛。熱。生。風。赤。澀。多。淚。

白。蒺。藜。炒。去。菊。花。甘。草。炙。

草。決。明。青。箔。子。或。半。

爲。散。每。服。三。四。錢。水。煎。去。滓。熱。服。

羌。活。勝。溼。湯。治。目。疾。一。切。風。熱。表。證。

羌。活。錢。半。白。木。一。錢。

桔。梗。枳。殼。

柴。胡。前。胡。

白。芷。六。分。防。風。五。分。

薄。荷。三。分。甘。草。炙。四。分。

水。煎。食。後。熱。服。世。本。無。細。辛。

瀉。肝。散。治。肝。熱。目。赤。腫。痛。一。切。表。證。

梔。子。仁。荆。芥。

甘。草。等。分。

大。黃。

爲。散。每。服。四。五。錢。水。煎。熱。服。

此治肝熱。不用赤芍。磨草當歸。反用梔子清肝。則血熱疼腫。何能便退。詳此四味。治白睛赤痛。則可。治風輪赤痛。則不可。

春雪膏局方 治風熱生翳

麝仁去皮研極細包壓去 右取淨麝仁五錢入龍腦五分。煉白蜜一錢五分。再研勻。磁罐收貯。每用少許。著頭點大背。

麝仁膏 治風熱眼生赤脈。癢痛無定。

麝仁去皮研極細包壓去

右取淨麝仁五錢。濃煎桑皮汁調和。隔紙瓦上焙熟。有焦者去之。塗淨碗內。以艾一錢分作三團。每團中置蜀椒一粒。燒烟起時。將碗覆烟上。三角墊起。薰之。烟盡晒乾。再

醫通卷十五

目

七

思得堂藏

研入硃砂麝香各半錢。磁餅收貯。每用麻子大點大背。日二度。如點老翳。加硃砂少許。一方但用麝仁研壓去油。淨五錢。麝香硃砂水飛各五分。每用少許。點大背。効。

碧雲散 治外障攀睛。淚淚稠粘。

鴛不食草一兩喫之即愈者真

青黛

川芎各半

爲散。先將水滿口。每用菜豆許。搗鼻內。以嚏淚爲効。搗無時。一方加北細辛牙皂末各一錢。

宣明丸 治瘀血灌睛。赤腫流痛。

赤芍

常山

大黃酒蒸

黃芩各二

生地黃三兩

黃連

川芎

薄荷各一

蜜九梧子大。每服五十九。食後米飲服。羌活除腎湯 治太陽腎膜遮睛。

麻黃根

薄荷各五

當歸

川芎

知母

荆芥各六

防風八分

羌活錢半

細辛各三

川椒炒去

水煎食前稍熱服。忌酒醋淫麪炙燥。龍膽飲 治肝經淫熱。目赤腫痛。

黃芩

犀角

車前

黃連

梔子炒黑

大黃

木通

黑參各一

芒硝各錢

醫通卷十五

目

八 思得堂藏

龍膽草 淡竹葉各八

黃蘗酒炒

水煎食後分二次熱服。

清涼膏 治打撲傷眼腫服。

大黃

芒硝

黃蘗

赤芍

細辛五分

薄荷八分

爲細末。用生地黃一兩。酒浸搗絞汁。入雞子清一枚。白蜜半兩。同調貼太陽及眼胞上。

四生散 治腎風上攻。耳中鳴。目癢。竹花。

白附子

黃耆

白茯苓各分

獨活

爲散。每服二錢。用諸腎此開入藥。淫紙裏煨熟。稍入鹽花。

細嚼酒送下

萬應蟬花散 治奇經客邪目病

蟬蛻 半兩 蛇蛻 三錢 川芎 甘草 炙

防風 羌活 茯苓 赤芍

當歸 石決明 煨一伏 蒼朮 切 蘇油 炒 各兩半

為散 每服二三錢 食後臨卧茶清送下 秘旨無名木多白

痰聚

保命羚羊角散 治陷臂久不得去 用此散發

羚羊角 兩二 升麻 兩半 細辛 一兩

甘草 五錢

半蜜丸 一半為散 以泔水煎 吞九子五七十九 食後熱

服 承散為前導 丸為後合也

阿魏掃鼻法 去星翳

阿魏 三錢 雞內金 一錢 冰片 三分

蜜和燕著頭上 令中空通氣 外裹烏金紙 去著 每夜塞鼻

中星翳自退

撥雲退翳丸 治陽暗受邪內皆赤膜攀睛

蔓荊子 木賊 去節 蜜蒙花 各二

川芎 白蒺藜 炒去 當歸 各兩

菊花 荆芥 穗 各一 豬寶 子

薄荷 蜀椒 黃連 酒洗 甘草 炙 各

蟬蛻 各五 蛇蛻 各五 甘草 三錢

蜜丸 每兩分作八丸 食後卧時細嚼一丸 茶清送下

熊膽膏 治一切老翳

爐甘石 煨過水龍九如彈子大每尊一兩分作十九用

川黃連 三錢 琥珀 五分 瑪瑙 三錢

二錢 珊瑚 水龍 珍珠 煨 淨 硃砂 五分

冰片 二分 麝香 二分

和勻 磁罐收貯 每用少許點大管上 日二三次

照水丹 治攀睛翳障

烏賊骨 一錢 辰砂 半錢

為散點之 白翳加冰片少許 赤翳加五靈脂少許

蠟附散 搐鼻退冷翳

驚不食草 一兩 青黛 細辛 一作 生附子 尖

薑黃 薄荷 全蠍 各五

醫通卷十五 目 十 思得堂藏

為散 口含冷水搽少許

神消散 治黃膜上衝

黃芩 蟬蛻 甘草 炙

木賊 各一 蒼朮 煨 便浸 穀精草 各二

蛇蛻 四條 犀角 炒

為散 每服二錢 臨卧新汲水調服

爐甘石散 治爛冷風眼

爐甘石 三兩 煨過水龍九如彈子大每尊一兩分作十九用

川黃連 三錢 琥珀 五分 瑪瑙 三錢

二錢 珊瑚 水龍 珍珠 煨 淨 硃砂 五分

冰片 二分 麝香 二分

陽風瀉肝散 治蟹眼睛赤 鍼去惡水用之

防風

羌活一作遠志

桔梗

羚羊角一錢

赤芍

黑參一作人參

黃芩各一兩

細辛

甘草各五錢

爲散。每服二三錢。沸湯調服。

羚羊角散與局方不同

治內外腎障。但痰涎清。不熱不腫者。

羚羊角一錢

白菊花

川烏頭炮

川芎

車前

防風

羌活

半夏

薄荷各半

細辛二錢

爲散。每服二錢。生薑湯調。薄荷湯送下。

陷腎加升麻五錢。肉桂二錢。

補腎丸。治腎虛。眼目無光。

醫通卷十五

目

十一 思得堂藏

巴戟肉

山藥

補腎脂鹽酒炒

牡丹皮各二兩

茴香一兩鹽水炒

肉苁蓉酒浸去

枸杞子各四兩

青鹽半兩

肉苁蓉酒浸去

蜜丸。梧子大。每服五七十丸。空心鹽湯。溫酒任下。

羚羊角湯。治肝熱生風。內障。

羚羊角一錢

人參各一錢

黑參

地骨皮

羌活

車前各一錢

水煎。食前熱服。

羚羊角飲子。治風輪熱。及黑泡如珠。

羚羊角一錢

五味子二十粒

細辛三分

防風

大黃酒蒸

知母各一錢

芒硝七分

水煎。食前溫服。

龍木。羚羊角。飲子。羚羊角散。羚羊補肝散等方。並以羚羊

爲主。丹溪云。羚羊力能舒筋。入厥陰經。甚捷。惟腎在風輪

者。用之爲宜。若不在風輪。漫投。寧不引邪入犯耶。

黃連。羊肝丸。治目多赤脈。

黃連一兩

白羯羊肝一具

先以黃連爲細末。用竹刀將羊肝刮下。如糊。除去筋膜。

盆中研細。入黃連末。攪和爲丸。如菰豆大。每服三四十九

茶清送下。暗痛者。當帶湯下。忌豬肉冷水。其膽冬月以

生白蜜相和。盛湯。掛當風。膽外漸生黃衣。雞翅刷下。點

赤脈熱。皆良。

補腎微石丸。治腎虛肝氣上攻。目昏漸成內障。

微石補腎丸

甘菊花

石決明煨各一兩

兔絲子酒煮焙

肉苁蓉酒浸去

石決明煨各一兩

補爲末。雄雀十五枚。去皮。留腸。以青鹽二兩。水三升。煮雀

至爛。汁盡爲度。攪如膏。和藥爲丸。梧子大。每服二三十丸。

空心溫酒送下。

羚羊補肝散。治肝風內障。

羚羊角一錢

人參各三錢

茯苓

防風各二兩

細辛

黑參

車前

黃芩

羌活各一兩

爲散。食後米湯調服。二錢。

除風湯。治五風變成內障。

羚羊角一錢

車前

人參

芍藥

茯苓

大黃 屑蒸

黃芩

芒硝 鎔

蝎尾 三錢

水煎食後服。

夜光椒紅丸

治火衰目無精光至夜皆暗

川椒 去白

生地黃

熟地黃 各四兩

枸杞子 四兩

牡丹皮 三兩

麥門冬 四兩

蜜丸梧子大每服五七十九溫酒鹽湯任下

又方用椒紅四兩已乾肉二兩金鈴子肉熟附子茴香各一兩另研乾山藥末二兩酒蒸糊丸梧子大每服三十九

空心鹽酒送下

前方治陰血虧而具火離散後方治陽精傷而具火無光不可不試其故而為施治也

醫通卷十五

目

十五 思得堂藏

蛤粉丸 治雀目日落後不見物

蛤粉

黃臘 等分

右蟬腹搜蛤粉成劑捏作餅子每餅重三錢用豬肝一片

重二兩竹刀批開裏藥一餅麻線纏入砂鍋內以泔水煮

熟乘熱蒸自至溫與肝并汁以愈為度楊氏家藏方用

烏賊骨淨末六兩黃臘三兩制服同此方

養肝散 治雀目盡明

夜明砂 兩

青蛤粉 即蚌殼粉

穀精草 各一兩

為散每服三錢以豬肝竹刀批開勿犯鐵攤藥在內麻線

纏定米泔水一碗煮肝至熟取出湯傾碗內煎取肝分三

次細嚼用煮肝湯熱下一日服之

決明夜鹽散 治高風內障至夜則昏

石決明 時一錢 夜明砂 淘淨另研

為散用豬肝二兩竹刀批開入藥以線纏定用泔水二碗

砂鍋中煮至半碗先煎取候溫臨卧連藥汁服之

防風飲子 治倒睫拳毛皆驗赤爛

蔓荊子

黃耆 生

黃連 各錢

甘草 炙

防風

芎藭 各一錢

細辛 三分

鹿人加入參一錢當歸七分

水煎食遠熱服

柴胡飲子 治風熱眼赤赤爛

柴胡

羌活

防風

赤芍

桔梗

荆芥

生地黃 各一錢

甘草 炙五分

醫通卷十五

目

十五 思得堂藏

水煎熱服

止淚補肝散 治肝虛迎西北風流淚不止

白礬 礱去

當歸

熟地黃 各二錢

川芎

白芍

木賊

防風

羌活 各一兩

香附 童便製

為散每服三錢入生薑三片紅棗一枚肥人加夏枯草

兩瘦人加桂枝一兩水煎去滓熱服

菊花散 治目風流淚見東南風則甚漸生翳膜

菊花 半兩 治目風流淚見東南風則甚漸生翳膜

木賊 去節

草決明

荆芥

旋覆花

甘草 炙

菊花 去蒂各

為散每服二錢濃茶調空心臨卧各一服有翳者加蛇蛻

一錢。蟬蛻三錢。

人參 補虛散 治眼漏。腹水不止。

黃耆 三兩 防風 兩半

人參 遠志 甘草 湯

赤茯苓 各二 黃芩

為散。每服四五錢。水煎食後服。

竹葉湯經湯 治皆內聚如鍼孔。津津腹出。

柴胡 梔子 羌活

升麻 甘草 炙

黃連 大黃 各八

草決明 茯苓 車前

澤瀉 各六 竹葉 十片

水煎食後熱服

加減地芝丸 治目能遠視。不能近視。

生地黃 四兩 天門冬 炙熱去

甘菊 二兩 熟地黃 四兩

山茱萸肉 各三 當歸身 二兩

蜜九梧子大。每服百丸。沸湯溫酒任下。

加味定志丸 治目能近視。不能遠視。

大遠志 甘草 湯

茯苓 三兩 石黃蒲 各二

蜜九梧子大。每服百丸。空心米湯溫酒任下。

加減駐景丸 治腎虛目眩。如無所見。

熟地黃 六兩 常歸 肉桂 一兩

車前 五味子 各二 楮實 五兩

椒紅 各一 兔絲子 酒煮

蜜九梧子大。每服七十丸。空心鹽湯。即時溫酒下。

決明散 治痘瘡入目

草決明 赤芍藥 甘草 炙

枯蔓根 等分

為散。入麝少許。三歲兒一錢五分。米泔調。食後服。以愈為度。

蜜蒙散 治小兒痘疹熱毒入目。

蜜蒙花 青箱子 決明子

車前 等分

為散。每服一二錢。日用生羊肝一片。竹刀切開。搽藥末。麻

醫通卷十五 目 六 思得堂藏

款。淫紙裏煨。空心食之。以愈為度。

穀精散 治痘瘡入目生翳。

穀精草 豬蹄退 炙

蟬蛻 白菊花 等分

為散。每服二三錢。食後米泔煎湯調服。

神功散 治痘入目生翳。

蛤粉 穀精草 各一 羌活

蟬蛻 各五 萊豆皮 四錢

為散。每服二三錢。至四錢。以豬肝一片。批開入藥末。線

煮熟。不拘時與汁同服。

羚羊散 治痘後餘毒攻目生翳。

羚羊角 一兩 黃芩

草决明

車前

升麻

防風

大黃

芒硝各五錢

爲散。每服二三錢。水煎食後服。

决明雞肝散 治小兒疳積等症。及一切疳積等症。

决明子

治小兒疳積等症。

治小兒疳積等症。

右將雞肝搗爛和决明末。小兒一錢。大者二錢。研勻同酒

礪一盃。飯上蒸服。如日昏無覺。腹脹如鼓。用無莢末一錢。

同雞肝酒礪頓服。腎虛腹脹。用雞內金無莢末。决明末。同雞

肝酒礪頓服。若小便如油者。用黃風同雞肝酒礪頓服。風

熱腎障。加白茯苓一錢。輕者數服。重者三十服。劇者四五

十服。無不愈也。或用生雞肝研糊丸服亦可。

又方

醫通卷十五

目

老思得堂藏

火硝一兩

硃砂三錢

右二味爲末。每服四分。用不落水雄雞肝一箇。竹刀剖開。

入藥茶好。同酒釀半盞。飯上蒸熟。空腹服之。輕者一料。重

者不過二三料。則腎腹推去半邊而退也。

保元湯方祖

六味丸九味

生脈散方祖

六君子湯四君子

瀉青丸下血

還奇湯頭病

洗心散狂門

普濟消毒飲三黃

六味丸九味

神効黃耆湯保元

五苓散方祖

導赤散頭病

益元散方祖

清震湯頭病

清空膏頭病

三四号半湯頭病

冲和養胃湯保元

大追風散頭病

涼膈散方祖

四物湯方祖

益氣聰明湯保元

芎辛湯頭病

梔子藥皮湯保元

黃耆建中湯保元

八味丸方祖

渴黃散頭病

金花丸湯下

天王補心丹散下

犀角地黃湯保元

耳門

桂辛散治風虛耳鳴。

辣桂

川芎

石菖蒲

細辛

白茯苓

爲散。每服四錢。加葱白一莖。蘇葉五片。水煎去滓食前服。

一方加全蠍去毒三錢。

黃耆丸治腎風耳鳴及癢。

黃耆酒炒

附子一枚生

礞石滾痰丸頭病

黃連解毒湯三黃

雙解散頭病

三黃湯方祖

八珍湯四君子

滋腎丸九味

補中益氣湯保元

川芎茶調散頭病

追遠散頭病

神芎丸三黃

千金托裏散保元

升陽除濕防風湯頭病

金匱腎氣丸九味

當歸

麻黃去節另爲

甘草五錢

白芷各兩

白芷各兩

白芷各兩

白芷各兩

白芷各兩

白芷各兩

白芷各兩

白芷各兩

白芷各兩

爲末。用羯羊腎一對。去脂膜勿犯鐵。酒煮搗爛絞汁。糊丸。梧子大。空心鹽湯。臨卧溫酒下五十九。

蠶蠟散 治腎虛氣塞耳聾。

全蠟 四十九箇。去殼。水泡去鹹。以糯米三升。煮瓦上。結至蠟焦。去。生薑四十九片。置蠟再

爲末。三五日前。每日先服黑錫丹一服。臨服時。夜飯

半飽。隨其酒量。勿令大醉。服已。熱睡勿叫。醒。令人輕輕

喚。如不聽得。浪煎葱白湯一碗。令飲。五更耳中聞百十攢

笙響。自此得聞。

犀角飲子 治風熱上壅。耳內腎腫。脹痛流膿。

犀角屑 木通 石菖蒲 甘草 赤芍

甘菊 黑參 赤芍

醫通卷十五 耳 十九 思得堂藏

赤小豆 炒 甘草 生薑 三片

水煎。不拘時熱服。

燒腎散 治腎虛耳聾。

磁石 煨赤脂 附子 一枚 地 蜀椒 炒去汗取 二

巴戟肉 一兩 爲散。每服一錢。用豬腎一枚。去筋膜細切。葱白鹽花和勻。

裹十重。淫紙於帶灰中煨熟。空心細嚼。溫酒送下。以粥壓

之。十日効。

通神散 治耳聾。

全蠟 泡 地龍 煨蝦 各三

明礬 生半 雄黃 分五 麝香 一字

爲散。每用少許。葱白蘸藥。引入耳中。閉氣面壁坐一時許。

三日一次。

草麻丸 治久聾。

草麻仁 二十 皂角 煨取肉 五分 地龍 大者 煨飛

全蠟 二 遠志 肉 磁石 煨飛

乳香 各二 麝香 少許

爲末。穿黃蠟爲丸。塞耳中。

梔子清肝散 治寒熱腦痛。耳內作癢生瘡。

柴胡 梔子 炒黑 牡丹皮 兩

茯苓 川芎 白芍 甘草 炙

爲散。每服五錢。水煎去滓。半飯熱服。

排風湯 治風熱上壅。耳內作癢生瘡。復元通氣散 治耳聾。二十一 思得堂藏

養正丹 丹金液 四物湯 方祖

龍薈丸 湯下 滾痰丸 痰食

溫膽湯 湯下 補中益氣湯 湯下

小柴胡湯 方祖 加減八味丸 九下

正元散 門 黑錫丹 金液

安腎丸 門 四生散 門

涼膈散 方祖 柴胡清肝散 湯下

加味逍遙散 門

鼻門 犀澤通氣湯 治久風鼻塞。

羌活 獨活 防風 葛根 各八

蒼朮 去皮切碎 升麻

<p>麻黃<small>連翹</small> 川椒<small>五分</small> 白芷<small>一錢</small></p>	<p>黃耆<small>錢半</small> 甘草<small>錢七</small> 生薑<small>三片</small></p>	<p>大棗<small>二枚</small> 葱白<small>三寸</small></p>	<p>水煎食遠服。冬月倍麻黃加細辛三分。夏月去芎藭活加石</p>	<p>膏三錢。忌一切冷物。及風涼處坐卧。</p>	<p>芎藭散 治鼻鼾</p>	<p>川芎 檳榔 辣桂</p>	<p>麻黃 防己 木通</p>	<p>細辛 石菖蒲 白芷<small>各一兩</small></p>	<p>木香 川椒 甘草<small>各一兩</small></p>	<p>爲散。每服三四錢。生薑三片。蘇葉一握。水煎去滓熱服。</p>	<p>辛夷散 治鼻塞不聞香臭。涕出不止。</p>	<p>辛夷仁<small>一兩</small> 細辛<small>三錢</small> 藁本<small>七錢</small></p>	<p>升麻 川芎 白芷</p>	<p>木通 防風 甘草<small>各五錢</small></p>	<p>爲散。每服二錢。食後茶清調服。</p>	<p>通草辛夷指鼻法<small>千金</small> 治鼻塞腦冷涕出。</p>	<p>通草 辛夷<small>各錢半</small> 細辛</p>	<p>甘遂 桂心 芎藭</p>	<p>附子<small>錢各一</small></p>	<p>右七味爲末。蜜丸綿裹內鼻中。</p>	<p>指鼻法<small>千金</small> 治鼻鼾</p>	<p>通草 細辛 附子</p>	<p>右三味等分爲末。蜜和綿裹少許內鼻中。又方加甘遂。</p>
--	--	--	----------------------------------	--------------------------	----------------	-----------------	-----------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-----------------	-----------------------------------	------------------------	--	-----------------------------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------	---------------------------------

<p>用白雄大膽丸取涕瘡</p>	<p>礬石藜蘆散<small>千金</small> 治鼻中息肉不得息。</p>	<p>礬石 藜蘆<small>各六錢</small> 瓜蒂<small>二七</small></p>	<p>附子<small>十二</small></p>	<p>右四味各搗篩令和。以小竹管吹藥如小豆許於鼻孔中。</p>	<p>以綿絮塞之。日再。以愈爲度。</p>	<p>升麻湯<small>方祖</small> 補中益氣湯<small>保元</small></p>	<p>香蘇散<small>傷寒</small> 當歸內補建中湯<small>桂枝</small></p>	<p>六味丸<small>九下</small> 生脈散<small>方祖</small></p>	<p>雙解散<small>涼服</small> 涼膈散<small>方祖</small></p>	<p>甘露飲<small>二冬</small> 消風散<small>散下</small></p>	<p>瀉青丸<small>下血</small> 升陽散火湯<small>升麻</small></p>	<p>口門 思得堂藏</p>	<p>蘭香飲<small>子白虎</small> 滾痰丸<small>痰飲</small></p>	<p>三黃丸<small>三黃</small> 加減八味丸<small>八味</small></p>	<p>補中益氣湯<small>保元</small> 龍膽瀉肝湯<small>肝痛</small></p>	<p>小柴胡湯<small>方祖</small> 佐金丸<small>方祖</small></p>	<p>生脈散<small>方祖</small> 六味丸<small>九下</small></p>	<p>甘露飲<small>二冬</small> 六君子湯<small>四君子</small></p>	<p>附子理中湯<small>理中</small> 連理湯<small>理中</small></p>	<p>涼膈散<small>方祖</small> 金花丸<small>三黃</small></p>	<p>五苓散<small>方祖</small> 導赤散<small>方祖</small></p>	<p>理中湯<small>方祖</small> 蘇子降氣湯<small>七氣</small></p>	<p>養正丹<small>丹下</small> 瓜蒂散<small>痰飲</small></p>
------------------	---	--	----------------------------	---------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

神祐丸 湯下

清川散 湯下

齒門

齒散 治齒齦赤腫疼痛及骨槽風熱

茵陳

連翹

荊芥

麻黃

升麻

羌活

薄荷

環玢各五

細辛二錢

大黃

紫牛頭末各一

爲散每服三錢先以水一盞煎沸入藥攪之煮傾出食後和滓熱服

世本多半夏黃芩射干獨活丹皮

當歸龍膽散 治齒齦寒熱身疼

升麻

麻黃

生地黃

醫通卷十五

生二思得堂藏

當歸稍

白芷

草豆蔻

草龍膽

黃連

羊脛骨灰等分

爲散每用少許擦牙疼處良久有涎吐去

五倍子散

治牙齒爲物所傷動搖欲落

川五倍

乾地龍末等分

先將生薑擦牙齦後以藥敷之七日不得嚼硬物用骨碎

補濃煎時時漱之如齒初傷欲落時以膏擦藥貼齒槽中

至齒上即平如故

烏金膏

治牙齒動搖髮黃赤用此即齒牢髮黑

生薑

半斤搗取自然生薑一兩酒浸一宿

大皂莢

小兒者十枚利去黑皮將汁和蒸

右將皂莢同地黃澤人微細內煨有性爲末牙齒初搖用

藥熱銀如髮髮黃赤以銀器盛藥末三錢湯調過三日將藥汁蘸擦髮髮隨時用之次早即黑三夜一次其黑如漆不傷髮

長春年牙散 烏髮髮去牙風除口氣

升麻

川芎

細辛

白蔞紫

甘松

丁香

五倍子

皂礬

青鹽各半

訶子肉

沒石子各三

麝香五分

爲散早鼻擦牙次以水漱吐出洗髮髮

承氣湯方風

涼膈散方風

清胃散方風

越麴丸方風

六味丸方風

八味丸方風

消風散方風

羌活附子湯方風

補中益氣湯方風

犀角升麻湯方風

小安腎丸方風

還少丹方風

黑錫丹方風

桃核承氣湯方風

甘露飲方風

桃核承氣湯方風

七寶美髯丹

補腎元烏髮髮延齡益壽

赤白何首烏

補腎元烏髮髮延齡益壽

川牛膝

補腎元烏髮髮延齡益壽

赤白茯苓

補腎元烏髮髮延齡益壽

地絲子

補腎元烏髮髮延齡益壽

當歸

補腎元烏髮髮延齡益壽

西

補腎元烏髮髮延齡益壽

拘杞子八兩

共為細末。硬白蜜丸。龍眼大。每日清晨。午前。臨卧。用鹽湯。沸湯。溫酒。各磨一丸。忌寒。蕪。豬。血。糟。腐。

烏金丹染髮無久

清煙好。一塊。故大紅風仙。梗中。仍將刻下者。掩紫好。以泥塗之。有花摘上。勿令。結子。候兩月餘。自壞取出。又將青柿。去蒂。縛空入墨。仍將柿蒂。掩紫好。埋馬矢中。七晝夜。收。細盆中。磨用。以雞尿。磨搽。則黑透。髮根。經月不白。不傷髮。

取龜尿法。用三脚竹架。頂起龜腹。令足無著。不得扒動。置大盆中。以受其尿。將豬腰。喉。壓。應。香。細末。熬入鼻孔。其尿即出。或用麝香。熬紙。條。燒。烟。煮。其。尿。亦。出。

醫通卷十五

聖藥

聖

思得堂藏

赤金散 染髮黑潤不燥。久不傷髮。

紅銅落打紅銅。落。下。者。滾水。淘淨。銅。片。中。炒。赤。未。醋。煨。七。次。每。料。用。三。錢。

川五倍如。麥。角。者。佳。碎。如。豆。粒。去。末。無。油。鍋。內。炒。先。赤。可。太。過。則。色。綠。第一。受。火。候。得。宜。將。淫。膏。布。一。方。包。壓。地。下。灰。塊。每。料。一。兩。

何首烏乾。者。碎。為。粗。末。炒。黑。在。性。忌。犯。鐵。器。 枯礬 三錢

沒石子碎。如。未。熟。炒。黑。在。性。

右五味。各為極細末。入飛麩三錢和勻。每用二三錢。量發多少。隨用。每錢入食鹽一錢。濃煎茶漿。調如稀糊。原水噴發。候氣如。貴。光。如。漆。再。調。勻。先。將。肥。皂。洗。淨。髮。上。油。膩。拭。乾。聚。熱。將。刷。子。脚。搽。上。稍。令。則。不。黑。以。指。捏。髮。細。細。碾。勻。搽。完。以。紙。掩。之。晨。起。以。溫。水。洗。淨。須。連。用。二。三。夜。即。黑。亮。如。漆。過。半。月。後。髮。根。漸。白。只。用。少。許。如。法。調。搽。白。根。上。黑。

處不必再染。又方無沒石子何首烏有青鹽三錢細辛一錢。

一錢。

黃耆建中湯持枝湯下

四君子湯方祖

腎門

六味丸八味丸下

柴胡清肝散小紫樹湯下

犀角升麻湯中風門

喘脾湯保元湯下

竹葉石膏湯白虎湯下

十全大湯保元湯下

舌門

黃連瀉心湯三黃湯下

源脈散方祖

金沸草散欬嗽門

面門

鼠粘子散治面上風癢。生兩

鼠粘子生兩

荆芥

蔓荊子

蟬蛻

為散。每服四錢。加生薑一片。葱白一莖。水煎。苦。服。

硫黃膏治面上生瘡。及鼻臉赤風粉刺。

生硫黃

白芷

括萎根

面

六 思得堂藏

鈴粉 各五

芫青 七枚去

全蠍 一枚

蟬蛻 七枚

爲細末。麻油黃臘各半兩。熬煉離火。入諸藥末調勻。磁器收貯。久則愈妙。至夜洗面後。以少許細細擦之。擦過即拭去。否則起泡。近眼處勿擦。三四日間。瘡腫自平。赤色自消。風刺粉刺。一夕見效。

消風散 方祖

涼膈散 方祖

升麻湯 方祖

犀角升麻湯 門中風

升麻胃風湯 門中風

調胃承氣湯 小承氣

桂苓五味甘草湯 門中風

常喘龍薈丸 湯下

加減八味丸 八味

地黃飲子 門中風

附子理中湯 湯下

補中益氣湯 湯下

醫通卷十五

思得堂藏

四逆湯 方祖

通聖散 方祖

六君子湯 湯下

六味丸 八味

人參養營湯 湯下

羌活勝濕湯 湯下

咽喉門

礪砂丹 治纏喉風。風熱喉痺。

礪砂 生研

白礬 生研各

西牛黃

人瓜甲 各一分

爲極細末。以爛白霜梅肉三錢。研糊分作四丸。嚥化。取湧

利膈湯 本事

治脾肺積熱。咽喉生瘡。

薄荷葉

荆芥穗

防風

桔梗

人參

牛蒡子

甘草 等分

水煎。不拘時緩緩服。

如口瘡甚而多痰涎者。加殭蠶。壯熱脈實。去人參。加黑參。犀角山豆根。

烏龍膏 治一切纏喉急證。

皂莢 二錢。去皮。炙。子。地。碎。水。三。升。泡。一。時。許。搗。汁。去。渣。少。許。內。熟。成。膏。人。牙。酒。一。合。攪。令。稠。入。下。項。藥。

百草霜

煅研

礪砂

人參 另爲極細

右四味拌勻。入白霜梅肉一錢細研。入皂莢膏內。以少許

雞翎蘸喉中。搽盡頑痰。即嚥甘草二寸。嚥汁吞津。若木舌

先用青布蘸水揩之。然後用藥。

六味丸 八味

腎氣丸 八味

醫通卷十五

咽喉

思得堂藏

王樞丹 腹瀉

稀涎散 門中風

涼膈散 方祖

普濟消毒飲 湯下

荆防敗毒散 小柴胡

桔梗湯 方祖

都炁丸 八味

半夏厚朴湯 湯下

異功散 湯下

瘰癧門

治命飲 治一切癰毒赤腫。未成者消。已成者潰。但漫腫色

白不起。及膿出而痛不止。元氣虛者禁用。

穿山甲 炮

白芷

防風

乳香

沒藥

甘草節

赤芍

枳椇根

歸身

貝母 去心

陳皮

皂角刺 各一

金銀花 三錢

水酒各半煎服。

清熱解毒湯 治瘡瘍癰腫赤痛形病俱實。

黃連 酒炒

山梔 炒黑

連翹

當歸 各錢

芍藥

生地黃 各一

金銀花 二錢

甘草 六分

水煎熱服。

豆豉餅 治瘡瘍腫而不潰潰而不斂。

江西淡豆豉

右一味為末。唾和成餅。如錢大。三四錢厚。置患處。以艾壯於餅上。炙乾。即易之。如瘡大作。餅覆患處。以艾鋪上。炙之。未成者即消。已成者祛逐。毒邪則愈。如鬱證敗瘻失道。漫

醫通卷十五

瘡疽

三十一 思得堂藏

腫不赤不潰者。以香附一味為細末。唾調作餅。如上。灸之。或先用葱一握。切碎焙熟。敷之。冷則更迭而敷。使血調和。毒邪振發。然後灸之尤妙。

竹葉黃耆湯

治氣虛。胃火盛而作渴。

淡竹葉 一握

黃耆 生

生地黃

麥門冬 去心

當歸

川芎

甘草

黃芩

芍藥

人參 錢半

石膏 錢二

芍藥

水煎熱服。

烏金膏

治潰瘍肉死不腐。若有毒根。以紙捲蘸藥。即斂。

巴豆 炒黑

一味研如膏。貼於肉上。臨用修合。則不乾。

珍珠散 治不拘何疾。潰爛不肯長肉者。

煅甘石 製如目門將雪

珍珠 煅碎

琥珀 淨末

赤石脂 煅水飛

鐘乳石 甘草湯煮一伏

硃砂 水飛

麒麟竭 二分

硃砂 五分

右九味。務令極細。每藥一錢。入冰片二分。研勻和調。敷上立長。

三白丹 治瘰癧結毒。

水銀 一兩

煅硝 各二

白礬

右三味。內鐵鉢中。以厚磁碗合定。鹽泥固濟。壓定碗足。支火煨三炷香。昇在碗內。取出放地一夕。以出火毒。磁鉢收貯。經年後方可用之。每服三分。入飛麩三錢。壯者分三服。

醫通卷十五

瘰癧

三十一 思得堂藏

中者分五服。羸者分七服。每日以土茯苓半觔。槌碎。用水七碗。煮至五碗。去滓。入前丹一服。再煎至三碗。一日服盡。明日如前法再服。二三日後。瘰癧腫痛。齒齦出水。七日毒盡自愈。腫甚者。用黃連犀角骨碎補各一錢。黑豆一合。煎湯漱之。

加味三白丹 治元氣虛寒人結毒。

本方加滴乳石一兩。天靈蓋二兩。服法如前。

五寶丹 治虛人結毒。不勝三白丹。及服三白丹。餘毒未盡者。

細粉 三錢 鋼杓內隔紙焙黃

珍珠 勿見火

滴乳粉 煨淨末

琥珀 淨末

硃砂 水飛

右五味。拌勻。湯浸蒸餅為丸。桑豆六分。作七服。弱者分十

服每服用土茯苓四兩煎湯服之

歸善飲 治膈疽背癰。毒盛喉腫。及虛入肛門發瘻。

當歸 重八錢 生一錢

綿黃耆 生

金銀花 各五錢

甘草 生三錢

水酒各碗半。煎至二碗。分三次熱服。一日令盡。在上者加

升麻三分。在下者加牛膝三錢。

四順清涼飲 煨門

參香內托散 保元

千金托裏散 保元

十全大補湯 保元

六君子湯 四君子

八珍湯 四君子

加減八味丸 八味

保元湯 方祖

異功散 四君子

獨參湯 保元

人參敗毒散 小柴胡

托裏消毒散 保元

醫通卷十五

蘇履

思得堂藏

四君子湯 方祖

四物湯 方祖

六味丸 八味

歸脾湯 保元

補中益氣湯 保元

梔子清肝湯 耳門

內補黃耆湯 保元

當歸補血湯 保元

涼膈散 方祖

竹葉石膏湯 白虎

參苓白朮散 四君子

理中湯 方祖

四柱飲 門

六柱飲 門

二神丸 門

四神丸 門

連理湯 門

萬聖丹 門

汗門

澤木薇衛散 案問

治酒風汗出如浴。惡風短氣。

澤瀉

水各十

薇衛 五分

右三味合為散。以三指撮水煎為饑飯。後飯者先服。

當歸六黃湯 三黃

黃耆建中湯 生枝

耆附湯 木附

米附湯 方祖

參附湯 木附

真武湯 木附

玉屏風散 保元

補中益氣湯 保元

當歸補血湯 保元

逍遙散 虛損

都燕丸 八味

涼膈散 方祖

羌活勝濕湯 淫門

防己黃耆湯 方祖

桂枝湯 方祖

五苓散 方祖

參蘇飲 傷寒

附子理中湯 理中

二陳湯 方祖

十全大補湯 保元

生脈散 方祖

靖脾湯 保元

醫通卷十五

汗

三

思得堂藏

二妙散 大補

小柴胡湯 方祖

葛根湯 麻黃

白虎湯 方祖

犀角地黃湯 傷寒

桃核承氣湯 小承氣

茵陳蒿湯 淫門

保和丸 食門

理中湯 方祖

龍膽瀉肝湯 腸痛

當歸龍薈丸 三黃

人參養營湯 保元

大建中湯 保元

小續命湯 續命

小建中湯 桂枝

承氣湯 方祖

不得臥門

半夏湯 望樞 治痰飲客於膈府。自汗不得眠。

半夏 五合 薑 秫一升

右二味。以流水揚之。萬遍。煮秫米取湯內半夏煮。去滓飲。

一孟日三。稍益以知爲度。

此靈樞方也。後世方書。以此湯加入黃連。遠志。生地。棗仁。乾生薑。仍用流水煎服。

六君子湯 四君子

竹葉石膏湯 白虎

溫膽湯 二陳

獨活湯 獨門

梔子豉湯 方祖

益元散 方祖

六味丸 八味

胃苓湯 散下

不能食門

酸棗湯 產前

茯苓甘草湯 桂枝

導痰湯 二陳

珍珠母丸 驚門

硃砂安神丸 傷勞

補中益氣湯 傷元

十全大補湯 傷元

升陽益胃湯 傷元

胃苓湯 散下

保和丸 傷食

六君子湯 四君子

導痰湯 二陳

二陳湯 方祖

六味丸 八味

補中益氣湯 傷元

不能語門

導痰湯 二陳

牛黃丸 中風

消瘰門

文蛤散 玉函

治渴欲飲水不止

黃耆建中湯 桂枝

枳朮丸 方祖

枳實理中湯 傷中

二神丸 泄瀉

異功散 四君子

人參白虎湯 白虎

八味丸 方祖

至寶丹 中風

蘇合香丸 中風

川文蛤 印蛤蜊中一種殼厚色蒼而滑者火燉用

右一味。杵爲散。沸湯服方寸匙。

腎氣丸 八味

白虎加人參湯 白虎

六味丸 八味

加減八味丸 八味

生脈散 方祖

清心蓮子飲 生脈

易老門冬飲 散下

甘露飲 二冬

七味白朮散 四君子

加味導痰湯 二陳

醫通卷十五

佐金丸 方祖

你元湯 方祖

痰火門

玉竹飲子 新定

養火 痰涎湧盛。欬逆喘滿。

養氣 一名玉

桔梗 一錢

川貝母 三錢

右八味。長流水煎。人熟白蜜二七分。分二服。

氣虛加入人參二錢。虛火加肉桂半錢。客邪加細辛三分。香

豉三錢。咽喉不利。腫膿血。加阿膠三錢。藕汁半盞。頭額痛

加葱白二莖。便溺用伏龍肝擊碎煎湯。澄清代水煎服。氣

塞。臨服磨沉香汁數匙。

五苓散 方祖

調胃承氣湯 小承氣

八味丸 方祖

理中湯 方祖

千金朴硝煎 火門

宣明麥門冬飲子 生脈

蘭香飲 白虎

瀉黃散 瀉風

固本丸 二冬

六君子湯 四君子

滋腎丸 大補

獨參湯 傷元

思得堂藏

<p>香蘇散<small>傷寒</small> 沉香降氣散<small>氣門</small> 局方七氣湯<small>方祖</small> 六味地黃丸<small>八味</small> 靈飛散<small>養性</small> 黃輝門 消石禁石散<small>金匱</small> 硝石<small>等分</small> 為散大麥粥飲和服方寸匙日三服病隨大小便去小 正黃大便正黑是其候也 大黃硝石湯<small>金匱</small> 大黃 黃藥<small>各四</small> 硝石 治黃瘧腹滿小便不利白汗 黃藥<small>各四</small> 硝石 治腎瘕額上黑 禁石<small>等分</small> 身重 思得堂藏</p>	<p>全既枳實湯<small>方祖</small> 真功散<small>四君子</small> 六君子湯<small>四君子</small> 生脈散<small>方祖</small> 右四味水煎去滓內硝更煮分二服 豬膏髮煎<small>金匱</small> 治女勞瘵及陰吹正噎 豬膏<small>三兩</small> 右二味合煮髮消藥成分二服病從小便出 桂枝加黃耆湯<small>桂枝</small> 肥子大黃湯<small>肥子</small> 香芍桂酒湯<small>桂枝</small> 麻黃連翹赤小豆湯<small>麻黃</small> 補中益氣湯<small>保元</small> 大黃附子湯<small>小承氣</small> 茵陳附子乾薑湯<small>茵陳</small> 全既枳實湯<small>方祖</small> 真功散<small>四君子</small> 六君子湯<small>四君子</small> 生脈散<small>方祖</small> 右四味水煎去滓內硝更煮分二服 豬膏髮煎<small>金匱</small> 治女勞瘵及陰吹正噎 豬膏<small>三兩</small> 右二味合煮髮消藥成分二服病從小便出 桂枝加黃耆湯<small>桂枝</small> 肥子大黃湯<small>肥子</small> 香芍桂酒湯<small>桂枝</small> 麻黃連翹赤小豆湯<small>麻黃</small> 補中益氣湯<small>保元</small> 大黃附子湯<small>小承氣</small> 茵陳附子乾薑湯<small>茵陳</small></p>	<p>醫通卷十五 身重 思得堂藏</p>
--	--	------------------------------

<p>桃核承氣湯<small>小承氣</small> 蜜糖丸<small>散下</small> 桂枝二越婢一湯<small>桂枝</small> 瓜蒂散<small>養性</small> 六君子湯<small>四君子</small> 越鞠丸<small>等分</small> 導痰湯<small>二陳</small> 四君子湯<small>方祖</small> 抑青丸<small>佐金</small> 補中益氣湯<small>保元</small> 六味丸<small>八味</small> 滋陰湯<small>平胃</small> 胃苓湯<small>平胃</small> 防己黃耆湯<small>方祖</small> 甘薑杏木湯<small>理中</small> 解你門 虎潛丸<small>大補</small> 脫管門 益氣養榮湯<small>八珍</small> 過儀胃竭門 保元湯<small>方祖</small> 藥藥門</p>	<p>滋中丸<small>二陳</small> 越婢加朮湯<small>麻黃</small> 理各湯<small>五苓</small> 桂苓丸<small>五苓</small> 保和丸<small>傷食</small> 二陳湯<small>方祖</small> 你金丸<small>方祖</small> 枳朮丸<small>方祖</small> 逍遙散<small>肝氣</small> 四神丸<small>門起</small> 身重門 身重 思得堂藏</p>	<p>醫通卷十五 身重 思得堂藏</p>
--	--	------------------------------

獨參湯保元湯下

當歸補血湯保元湯下

臭毒門

玉樞丹一名紫

治一切樂毒食毒瘡毒蟲毒疫毒癰毒臭毒疫毒瘰癧並用水磨內服外敷無不神効惟正氣虛人及孕婦忌服

川文蛤形如菱角者佳

霜一

山慈如草一兩

雄黃明淨者水

麝香子三錢

右爲細末以糯米糊搗成劑分作四十餅於端午七夕或辰日於石臼中杵千下勿令雜犬婦人孝服者見一水飛珠砂

醫通卷十五

臭毒

七

思得堂藏

照眼砂一名人馬

治時疫毒氣臭毒癰腫腹痛

冰片

硃砂水磨令

麝香

雄黃水磨

共爲極細末磁瓶收貯男左女右以少許點目大背立効用此入時疫病家則不沾染并治六畜瘟亦照眼大背

越鞠丸雙門

藿香正氣散平胃散下

香蘇散傷寒

黃芩湯桂枝

白虎湯方祖

嶺南瘴毒門

蒼朮連湯治瘴癘流熱

蒼朮黃芩半

木香

柴胡

厚朴薑製

甘草炙七

水煎溫服

蒼朮羌活湯

蒼朮製

半夏

羌活

生薑三片

黃連薑汁

枳實

升麻

桔梗

生薑三片

治瘴癘腹痛寒熱

黃芩

柴胡

陳皮等分

甘草減半

黃連薑汁

半夏

川芎

木通各一

生薑三片

枳實

川芎

甘草減半

醫通卷十五

嶺南瘴毒

七

思得堂藏

水煎溫服

蒼朮柴胡湯

柴胡錢半

黃芩酒炒

半夏

生薑三片

水煎清晨服

藿香正氣散平胃散下

四君子湯方祖

蒼朮白虎湯方祖

理中湯方祖

治瘴癘

知母

葛根

川芎各一

烏梅肉一箇

蒼朮薑汁

陳皮

甘草減半

平胃散方祖

補中益氣湯保元湯下

茵陳五苓散五苓散下

梔子散方祖

瘴門

泰川剪紅丸 治蟲積為患。腹反胃不能食。

雄黃 油煎 木香 各五錢 檳榔

三稜 煨 蓬朮 煨 貫衆

椒紅 各一 大黃 酒蒸 乾漆 煨 各三錢

神麴糊丸 萊豆大每服五十丸。五更用雞湯送下。方中椒

紅。世本皆作陳皮。惟何繼冲載本作椒紅。乃合立方命名

之意。方後五更用雞湯送下。亦與世本

化蟲丸 局方 治蟲積肚腹常熱。

鶴蝩 即天名 檳榔 苦楝根 各一

胡粉 炒半 白礬 一錢 為末。米飲糊丸。梧子大。一服兒五丸。大人七八丸。酸漿

水入麻油少許和勻送下。消米湯亦可。痢時用蜀椒湯調

通卷十五 九一思得堂藏

化服

集幼丸 治蟲積四肢常冷。

木香 鶴蝩 檳榔 大黃 一兩

訶子肉 燕莢仁 炒各 烏梅肉 枚 十四

熟附子 炮薑 各三 煉白蜜丸。梧子大。每服三五丸。食前陳皮湯下。婦人隨

湯下。孕婦勿服。

萬應丸 治腹中諸蟲血積。

黑牽牛 頭末 大黃 赤檳榔 各一

白雷丸 醋炒 木香 沉香 各半

右將牽牛二處為末。檳榔雷丸木香大黃一處為末。沉香

另自為末。以大皂莢苦楝皮各四兩煎汁。泛丸。如萊豆大。

每服四五十丸至百丸。小兒量減。孕婦忌服。

遇仙丹 治腦上痰氣蟲積。

白牽牛 頭末 炒一兩 白檳榔 一兩

茵陳 三稜 醋炒 蓬朮 醋炒

大皂莢 去皮炙子 各三錢 沉香 另末 勿見

為末。醋糊丸。萊豆大。每服四五十丸。五更時茶清送下。天

明宿有所下。有積去積。有蟲去蟲。小兒量減。孕婦忌服。

膠艾霜噴湯下。全 治蟲蝕肛門癢痛。

阿膠 當歸 青柏子 各六

艾葉 一握 右四味水煎分三服

雄黃 半兩 桃仁 一兩 青柏子 三兩

黃連 一兩 苦參 一兩 又方

雄黃 皂莢 麝香

硃砂 等分 右四味為末。蜜丸。梧子大。內下部日二。

烏梅丸 醋下 九痛丸 門痛

妙功丸 麝門 龜龜散 千金

白礬 醋半 治蟲毒初中在膈上者。以此藥吐之。

建茶 各一

為散每服五錢新汲水頓服服一時許當吐出毒此藥入
口其味甜不覺苦澀者即有蠱毒也

雄朱九千金 治蠱毒從酒食中下者

雄黃 硃砂 赤脚蜈蚣 去足

續隨子 各一兩 麝香 另研

右五味拌勻再研以糯米粥和丸如芡實大每服一九熱
酒吞下毒當與藥俱下端午日修合尤妙

太乙追命九千金 治百病若中惡氣心腹脹滿不得喘息
心腹積聚腹脹痼疾宿食不消吐逆嘔噦寒熱瘧瘵蠱毒

婦人產後餘疾

蜈蚣一枚 丹砂 附子 雄黃 葵蘆

醫通卷十五 聖 思得堂藏

鬼臼 各一分 巴豆 二分

右八味蜜丸如麻子服二九日一陰毒傷寒遍身疼痛瓜
甲青黑服一九當汗出綿裹兩九塞兩耳中下痢服一九

下部塞一九蠱毒服二九在外膏和摩病上在膈上吐膈
下利有瘡以一九塗之毒自出產後餘疾服一九耳聾綿

塞耳中

五香散千金 治嶺南毒氣惡核射工中人暴腫生瘡

甲香 即螺 薰陸香 丁香 沉香 青木香 黃連 犀角 黃芩 各四 鹿甲 甘草 烏犀 各四

升麻 羚羊角 鹿甲 甘草 烏犀 各四

吳茱萸二錢

右十六味治下飾水服方寸匕日二并以此和少許洗之

仍以雞子白和散塗瘡上乾即易之

解毒飲子千金 治人忽中谿礪水毒手足指冷或至肘

膝

吳茱萸 湯泡七 升麻 犀角

橘皮 各六 生薑 三兩 烏梅肉 枚十四

水煎分三服或以生犀磨汁服尤効身上赤斑退為度

玉樞丹 臭毒 千金耆婆萬病丸 積聚

理中湯 方風 生脈散 方風

六味丸 八味 婦人門上

醫通卷十五 婦人門上 聖 思得堂藏

旋覆花湯 金匱 治虛風入勝脫筋漏鮮血不止

施覆花 三錢 葱 五莖 新絳 生用

右三味水煎頓服 施復性專下氣兼葱則能散結祛風佐以繭絲專補勝脫
加以紅藍紫流深得本經散結氣之旨

磐石九金匱 治婦人經水不利下白物

磐石 用絲色者 杏仁 一錢

右二味蜜丸棗核大內陰中 土瓜根散 金匱 治瘀積經水不利或一月再見及陰腹腫

土瓜根 芍藥 肉桂 蠱蟲 等分

右四味為散酒服方寸匕日三服

土瓜根黃瓜根也。藥舖不收。往往以替蔓根代用。致之本經枯槁。根性味雖同。苦寒而無散瘀血通月閉之功。此治雖專。惜乎其力緝緩。故以桂枝瀉之。芍藥監之。與旋復花湯之用新絳不殊。

婦附丸 治氣亂經期或前或後。

當歸 四兩

香附 八兩 童便浸透 眼乾再加酒醋煎四製

爲細末。醋糊丸。空心砂仁湯下三錢。

血虛加熟地八兩。虛寒加桂附各一兩。帶下氣腥加吳茱萸。斬艾各一兩。臍下冷痛加桂附沉香各一兩。丁香三錢。

經行少腹先痛。或血色紫黑結塊。加醋煮我茂二兩。沉香一兩。經後少腹虛痛。加參耆阿膠各四兩。斬艾二兩。經水色淡。加雞桂各二兩。人參四兩。

醫通卷十五 婦人上

思得堂藏

醋煎散 治經行少腹結痛。產後惡露不行。

三稜

蓬朮

香附

烏藥

赤芍

甘草

肉桂 等分

通用醋炒爲散。每服三錢。空心砂糖湯調服。

管丸 治肝疳口舌生瘡。牙齦腐爛。遍體生瘡。及婦人熱結經閉。作塊上衝梗痛。

蘆薈

青黛

硃砂 另研水飛 各三錢

麝香 一錢

大皂莢 去皮洗

乾蟾 各一兩 同皂莢

爲細末。蒸餅糊丸。麻子大。每服三五丸。空心米湯下。

防風丸 治風入胞門。崩漏下血。色清淡者。

防風 多見

爲末。醋丸。梧子大。空腹葱白湯下二錢五分。

子本丸 治風熱入犯肝經。崩漏下血。色稠紫者。

條黃芩 酒炒

爲末。酒丸。梧子大。空腹烏梅湯下三錢。

茯苓補心湯 千金 治心氣不足。善悲愁。患怒。衄血面黃。煩悶。五心煩熱。獨語不覺。婦人崩中面赤。

茯苓 六錢

桂枝 三錢

甘草 二錢

紫石英 碎如米 一兩

人參

麥門冬 去心 各五錢

大棗 四枚

赤小豆 一合

水煮日三服。

小牛角肥散 千金 治帶下五崩下血。外實內虛之病。

牛角肥 一枚 燒

鹿茸

烏餘糧

醫通卷十五 婦人上

思得堂藏

當歸

乾薑

續斷 各二兩

阿膠 三兩

烏劍骨

龍骨 各一兩

赤小豆 六合

右十味爲散。空腹溫酒服方寸匕。日三服。

伏龍肝湯 千金 治勞傷衝任。崩中去血。赤白相兼。或如豆汁。臍腹冷痛。口乾食少。

伏龍肝 如雞子 大七枚

生薑

生地黃 各兩

甘草

艾葉

赤石脂

桂心 各六

右七味改咀。以水一斗。煮取三升。分四服。日三夜一。

失笑散 治婦人瘀結。少腹急痛。

五靈脂 酒研 半

蒲黃 酒洗 半

爲散每服二錢半酒煎入砂糖少許和滓服少頃再服
結腹痛經水反多元氣虧弱藥力不行者用人參二三錢
調服以擊持之

七子散千金 治丈夫風虛目暗精氣衰少無子補不足

五味子 鍾乳粉 杜刺子

菟絲子 車前子 枳實子

石斛 乾地黃 薯蕷

杜仲 鹿茸 遠志各入

附子 蛇林子 芎藭各六

山茱萸 天雄 人參

茯苓 黃耆 牛膝各五

桂心十銖 從容銖十一 巴戟天銖十二

醫通卷十五

婦人上

四六二思得堂藏

右二十四味治下節酒服方寸匕日二不知增至二七以
知爲度禁如藥法不能酒者蜜丸服亦可

紫石門冬圓千金 治全不產及斷緒方

紫石英 大門冬各二 當歸

芎藭 紫葳 卷柏

桂心 烏頭 乾地黃

牡蛎 禹餘糧 石斛

辛夷各二 人參 桑寄生

續斷 細辛 厚朴

乾薑 食茱萸 牡丹

牛膝各一兩 栝子仁一兩 薯蕷

烏賊骨 甘草各一

右三十六味爲末蜜和丸如梧子大酒服十九日三漸增
至三十丸以腹中熱爲度不禁房室夫行不在不可服禁
如藥法比來服者不至盡劑即有娠

慶雲散千金 治丈夫陽氣不足不能施化無成

覆盆子 五味子各一 菟絲子二升

天雄一兩 石斛 白朮各三

桑寄生四兩 天門冬八兩 紫石英一兩

右九味治下節酒服方寸匕先食服日三素不耐冷者去

寄生加細辛四兩陽氣不少而無子者去石斛加檳榔十

五枚

朴硝益胞湯千金 治婦人立身已來全不產及斷緒久不

產二三十年者

醫通卷十五

婦人上

四六二思得堂藏

朴硝 牡丹 當歸

大黃 桃仁三錢 厚朴

桔梗 人參 赤芍藥

茯苓 桂心 甘草

牛膝 橘皮各二 附子六銖

蠶蟲 水蛭各十

右十七味以清酒五升水五升合煮取三升分四服

日三夜一每服相去三時更服如常覆被取少汗汗不出

冬日若火籠之必下積血及冷赤腹如赤小豆汁本爲

人子宮內有此惡物使然或天陰臍下痛或月水不調爲

有冷血不受胎若斟酌下盡氣力弱大困不堪更服亦可

二三服即止如大悶不堪可食酢飯冷漿一口即止然恐

去惡物不盡。不大得藥力。若能忍服盡大好。如無水經用。漆塗灸。脫代也。

白微九千金

治月水不利。閉塞絕產。

白微

細辛各一兩

人參

杜衡

牡蒙

厚朴

半夏

白蠟蠶

當歸

紫苑各十

小膠

沙參

乾薑

秦苑各半

蜀椒

附子

防風各半

右十七味爲末。蜜和丸。如梧子大。先食服三九。不知稍增。至四五九。此藥不可長服。覺有淚即止。用之大驗。

孫真九 治房勞太過。腎氣虛。精寒不能生子。

醫通卷十五

婦人上

思得堂藏

鹿角膠 八兩。即鹿角。霜拌炒成珠。

杜仲 藍水拌炒三兩

乾山藥 微焙

白茯苓 人乳拌蒸晒

熟地黃

山茱萸肉 各三

北五味

益智仁 藍水炒

遠志 甘草湯洗

川棟子 酒煮去

川巴戟肉 酒炒

補骨脂

胡蘆巴 鹽酒洗

益母草 酒煮

沉香 五錢。另爲末。勿見火。

右十四味共爲細末。入沉香和勻。以肉苁蓉四兩。洗去皮。若切開。心有黃膜去之。取淨二兩。好酒煮爛。搗如糊。同煉蜜拌勻。凡如梧子。每服五七十九。空心溫酒下。以美物壓之。稍薄者加膠六兩。

此方不用桂。附壯火助陽。純月溫養精血之味。獨以沉香。益智鼓其氣。又以棟子抑其陽。引諸陽藥。導之下元。

深得廣嗣之旨。

千金種子丹 此方服之令人多子。并治虛損。遺白濁。

沙苑蒺藜 取淨末四兩。水一

覆盆子 去核。取淨末二兩

龍骨 五錢。淨

右用伏案一觔。以紙粘去浮沫。滴水成珠者。止用四兩。

將前五味藥末。先以茯苓膏和作一塊。再入煉蜜。搗千杵。

丸如豌豆大。每服三十九。空心鹽湯送下。忌房室二十日。

此藥延年益壽。令人多子。

五子衍宗丸 此藥添精補髓。疏利腎氣。不問下焦虛實。寒熱服之自然平秘。

甘州枸杞子

兎絲子 酒蒸。搗成餅。各八兩

醫通卷十五

婦人上

思得堂藏

北五味子 二兩

右五味俱擇道地精新者。焙晒乾。共爲細末。煉蜜丸。如桐子大。每日空心服九十九。卧時服五十九。沸湯鹽湯任下。

忌師尼。緣寡之人及雞犬見。

煉真丸 治高年體豐。痰盛。飽飲肥甘。恣情房室。上盛下虛。及髓藏中多者。酒淫。精氣不純。不能生子者。服之垂効。

大腹子 七兩。切

茅山蒼朮 去皮。酒洗

人參 各三

茯苓 各三

鹿茸 對酥炙

淫羊藿 去刺。羊脂拌炒

白蓮鬚 酒洗

金鈴子 即川棟子。酒煮

厚黃藥 三兩。童便

大茴香 一兩

蛇牀子 酒炒

五味子 各一

鳳眼草 一兩。即

子一轉形如銀眼故

右為末用乾山藥末調糊代蜜為丸。空心鹽湯送下三四錢。臨卧溫酒再服二錢。

煉真者。煅煉精氣。使之純粹也。故方中專以大腹佐黃檗。茅木。滌除身中素蘊。淫熱。則香尊幽香。不致反助濁淫痰。

氣。何處年高艱嗣哉。

抑氣散。治婦人氣盛於血。所以無子。尋常頭目眩暈。膈滿。

香附製炒淨。

陳皮焙二

茯苓

甘草炙各

右為細末。每服二三錢。不拘時白湯調下。

秦桂丸。治婦人子宮虛寒。不能攝精成孕。

醫通卷十五

婦人上

四十九 思得堂藏

熟附子二枚

桂心勿見

厚朴薑汁

厚杜仲炒酒

細辛

秦瓦焙洗

白薇

川牛膝酒淨

沙參各二

茯苓

人參各四

煉白蜜丸。梧子大。空心溫酒下。五七十九。得孕二三月不可更服。忌牛馬肉。犯之難產。

此方鄭心芥手裁。較世本減附子四兩。細辛三兩。茯苓二兩。削去乾薑。易人當歸。以和陽藥之性。不致陽無以化。且免經水紫黑。胎息不肅之虞。其秦瓦。朴牛。尋理。痰積。沙參。勝薇。專清濁。使子戶溫和。陽施陰化。孕自成矣。

藏血丸。局方。治婦人血海虛冷。百病變生。氣血不調。時發。

寒熱。或下血過多。或久閉不通。崩中不止。帶下赤白。癥瘕。癰塊。攻刺疼痛。小腹緊滿。脇肋脹痛。腰重脚弱。而黃體虛。飲食減少。漸成勞怯。及經脈不調。胎氣多損。胎前產後一切病患。無不治療。

熟地黃

甘菊去心

茴香去子

當歸身

延胡索炒

赤芍藥

桂心

蒲黃取淨

蓬朮

牛膝

香附炒去毛酒浸三

右十一味。為末。用細黑豆一升。醋煮候乾。為末。再入米醋三碗。煮二碗。為糊。和丸。梧子大。每服二十丸。溫酒或醋湯下。血氣攻刺。癥瘕。癰塊。下。癥瘕。絞痛。當歸酒下。忌鴨肉。羊血。方以藏血。命名。取醋之酸。引藥歸宿。子藏。以收攝精氣也。

醫通卷十五

婦人上

五十 思得堂藏

益血海之虛寒。皆緣肝藏生陽氣衰。不能宣散。濁陰。而致子藏不淨。子藏不淨。烏能攝精而成胎息乎。故立方專以推陳致新。為綱旨。是以清熱散瘀之劑。反過於婦地桂。茵等味。使子藏安和。生生之機不竭矣。大抵婦人之百病。變生。總屬氣血不調。即寒熱虛怯。經閉崩中。靡不因血海不淨所致。其妙用尤在醋煮烏豆。以血得酸。則飲。不致滑脫。參得辛。則散。不致留蓄。更慮陰寒內結。勢必熱留經。又需月菊花。以清在上之虛陽。令積胞門。勢必熱留經。又需牛膝。赤芍。輩。以祛在經之積熱。與秦桂丸中用厚朴。秦瓦。白薇。沙參。之意。不殊。良工苦心。非深究其旨。何以獲此。立方之旨。哉。但服此。而得坤儀。多良。由純厚血藥。血偏旺。而氣偏餘。是不能無慮。服之。過宜於方中。增入人參一。

味或等分。或倍加隨質而助陽和之力。鼓氣氣之氣為乾道之基。未始其為不可也。

再詳廣嗣諸方。男子世稱保真丸。婦人首推養桂丸。然服之有驗有不驗者。質之偏勝不同也。益男子腎藏陽衰。婦人血海虛冷。則二方為專藥。若男子體肥疾盛。精氣不純。婦人瘀積留者。子戶不淨。豈可純以煖腎溫經為事哉。又需疎真丸之大腹芽未全。鈴結滯難。致血丸之達未牛膝甘菊。清解熱為合劑。耳用方者審諸。

大黃九千金 治帶下百病無子。服藥十日。下血二十日。下

長蟲及青黃汁。三十日。病除。五十日。肥白而能成孕。

大黃 破如豆 五兩

柴胡

芒硝 各一

芍藥 五兩

乾薑

蜀椒 各一

醫通卷十五 婦人上

五十二 思得堂藏

茯苓 雞子大 一枚

右七味為末。蜜和丸。如梧子大。先食米飲服七丸。加至十丸。以知為度。五日微下。

桂心茯苓丸 金匱 治妊娠癰瘕下血。胎動在於臍上。

桂心

茯苓

牡丹皮

桃仁 去皮 尖然

赤芍藥 等分

右五味蜜丸。如兔屎大。每日食前服一丸。不知加至三丸。

當歸貝母苦參丸 金匱 治妊娠煩熱小便難。

當歸

貝母 去心

苦參 等分

右三味蜜丸。如小豆大。飲服三丸。加至十丸。

葵子茯苓散 金匱 治妊娠小便不利。惡寒頭眩。

葵子 五兩 向日

茯苓 一兩

右二味為散。飲服方寸匕。日三服。

白朮散 金匱 治妊娠胎寒帶下。

白朮

芍藥 各二

蜀椒 三分 炒

牡蠣 熬 五

右四味為散。酒服一錢匕。日三服。

半夏茯苓湯 千金 治妊娠惡阻。心煩頭眩。惡寒汗出。少食。

半夏

生薑 各四

乾地黄

茯苓 各二

橘皮

旋覆花

細辛

人參

芍藥

芍藥

枳椇

甘草 各一 錢

右十二味。水煎服二劑。便急。使服茯苓丸。令能食便強健也。

醫通卷十五 婦人上

五十三 思得堂藏

茯苓丸 千金 治妊娠惡阻。心中煩悶。不能健運。

茯苓

人參

桂心 熬

乾薑

半夏

橘皮 各一

白朮

葛根 煨

甘草 熬

枳實 各二

右十味為末。蜜和丸。如梧子大。飲服二十九丸。漸加至三十丸。日三。妊娠忌桂故熱。

乾薑地黃散 治妊娠漏胎下血。

乾薑 炮 一

乾地黄 六兩 切 焙 兩

右二味為散。酒服方寸匕。日三服。

香桂散 治子死腹中。胞衣不下。服片時。如手推出。

肉桂 三錢

麝香 三分

為散酒煎和滓服加生川烏三錢為下私胎猛利
鯉魚湯 千金 治妊娠通身浮腫胎間有水氣

白朮

茯苓

芍藥 各三錢

橘皮 一錢

常帶

生薑 五片

活鯉魚 重兩許

右六味先煮鯉魚至熟澄清取汁內藥煎汁分五服日三夜二虛加入參一錢五分

竹瀝湯 千金

治妊娠子煩

竹瀝 一盞

麥門冬 去心

防風

黃芩 各三錢

茯苓 四錢

右五味以水四升合竹瀝煮取二升分三服不瘥更作

加味竹瀝湯

治妊娠心煩不解各曰子煩

醫通卷十五

婦人上

五五 思得堂藏

白茯苓 錢半

麥門冬 去心二錢半

黃芩 一錢

人參 一錢

竹葉 五片

梗米 一握

水煎空腹熱服肥人加半夏生薑原方無人參變未入

石膏大青湯 千金

治妊娠傷寒頭寒壯熱肢節煩疼

石膏 八錢

大青

黃芩 各三錢

蔥白 四莖

前胡

知母

梔子仁 各四錢

右七味水煎去滓溫服

此方既可散邪又能安胎尤為妊娠傷寒溫熱時行神方非千金不能立也

膠艾桐皮湯 千金

治妊娠利下不止

阿膠

艾葉

酸石榴

右三味水煎溫服

鍾乳湯 千金

治婦人胎前虛寒乳汁不通

石鍾乳 四錢

甘草 二錢

漏蘆 二錢

通草

括蕋根 各五錢

右五味水煎溫服一方有桂心

麥門冬散 千金

治婦人寒熱阻逆乳汁不通

麥門冬

通草

理石 即石青

石鍾乳 等分

右四味為散先食酒服方寸匕日三如有熱去鍾乳加漏蘆

白薇散 千金

治妊娠肺熱遺尿

白薇

白芍 等分

醫通卷十五

婦人上

五五 思得堂藏

右二味為散酒服方寸匕日三夜二服

芍藥芍藥湯 千金

治妊娠腹中滿痛又手不得飲食

黃芩 二錢

白朮 六錢

白芍 四錢

右三味水煎分三服半日令盡微下水則易產日飲一劑

為善

公生白朮散 治妊娠子腫

白朮 一兩

薑皮

大腹皮 去外殼

橘皮

茯苓 各半兩

為散每服三錢水煎和滓日三服

此方較諸家五皮湯稍善中間惟白朮易桑皮而功用懸殊點鐵成金手也

范廣九

治妊娠難產難生第一神方

麝香取常門 明乳香二錢 母丁香二錢

右爲細末揀臘月天醫日修合活勞鬼屬爲丸如艾實大
硃砂爲衣。吼和收。待臨盆。腹痛兒下。能下。用白湯。開圖
送下。共子立產。鬼用。小者爲真。若形如鬼而大者。乃得也。
誤用。則不驗。即真鬼之死者。亦不驗。修合時。忌見雞犬。婦
人孝服及諸魔物。

瘦胎飲印和 治妊振體肥胎氣不運在九箇月服。

黃芩酒炒 白朮一兩 枳殼錢半

爲散。每服二錢。饑時砂仁湯下。不可多服。恐傷正氣。瘦弱
者勿服。

琥珀黑龍丹 局方 治死胎胞衣不下。敗血逆冲。

五靈脂酒研 當歸 川芎

醫通卷十五 婦人上 五五 思得堂藏

乾地黃 良薑各三

右五味入煬成罐內。鹽泥封固。炭火煨通紅。去火候冷。研
細。入下項藥。

琥珀 百草霜 硫黃各三

花藥石 煨 乳香各三

右五味逐爲細末。同前藥和勻。未醋和丸。如彈子大。臨服
以炭火煨通紅。投入生薑自然汁內。浸碎研化。以無灰酒
入。麝香少許。不時頻服。二。加童子小便尤宜。
二味參蘇飲 治惡露入胞。服大不能出。及產後敗血衝肺。
喘滿而赤。大便泄瀉者。禁用。

人參 蘇木碎各

水煎入童子小便熱服。

牛膝湯千金 治兒產胞衣不下。

牛膝 通草各兩 滑石二兩 當歸 葵子半升

右六味水煎分三服。一方無滑石。
有桂心一兩。

四烏鯁一應茹丸鹿損 膠艾湯四物

大黃甘遂湯小承氣 抵當湯抵當

當歸芍藥散四物 小建中湯桂枝

溫經湯四物 加味逍遙散虛損

歸脾湯保元 小柴胡湯方祖

四物湯方祖 補中益氣湯保元

十全大補湯保元 六味丸八味

八珍湯四君子 大溫經湯四物

醫通卷十五 婦人上 五六 思得堂藏

逍遙散虛損 導痰湯二陳

滾痰丸痰飲 七氣湯方祖

保元湯方祖 養血正氣散干胃

八物湯四君子 艾煎丸四物

養胃湯干胃 四烏湯四物

桂枝湯方祖 增損四物湯四物

六君子湯四君子 大建中湯保元

腎氣丸八味 加減龍薈丸三黃

加減腎氣丸八味 獨參湯保元

人參養營湯保元 三補丸三黃

硃砂安神丸勞倦 生料八味丸方祖

參苓白朮散四君子 養順丸虛損

烏骨雞丸 門虛損	加減四物湯 四物湯下	平胃散 方祖	草解分消飲 小便不 禁門	越鞠丸 鬱門	清心蓮子飲 生脈散下	四七湯 二味湯下	佐金丸 方祖	控涎丹 十散湯下	滋腎丸 九下大補	乾薑人參半夏湯 湯理中	理中湯 方祖	紫蘇飲 四物湯下	加味歸脾湯 湯保元	七味白朮散 湯四君子	香薷散 湯血	當歸活血湯 湯血	香蘇散 門傷寒	葱白香薷湯 門傷寒	枳實理中湯 湯理中	黃連解毒湯 湯三黃	人參白虎湯 湯白虎	甘草乾薑湯 湯理中	
異功散 湯四君子	二陳湯 方祖	內補當歸建中湯 湯桂枝	局方七氣湯 方祖	大補丸 方祖	清胃散 湯血	香砂六君子湯 湯四君子	二妙散 九下大補	聚精丸 湯虛損	附子湯 湯木四	當歸散 湯四物	沉香降氣散 湯氣門	當歸補血湯 湯保元	升陽除濕湯 湯平胃	胃風湯 湯四君子	下瘀血湯 湯小承氣	聖愈湯 湯保元	胃苓湯 湯散下	涼膈散 方祖	承氣湯 方祖	桂枝白虎湯 湯白虎	厚朴湯 湯平胃	厚朴生薑半夏甘草人參湯 湯二	黃芩芍藥湯 湯桂枝

香連丸 <small>佐金丸下</small>	千金三物膠艾湯 <small>痛門</small>	白頭翁加甘草阿膠湯 <small>痛門</small>	導赤散 <small>暑門</small>	五苓散 <small>方祖</small>	川芎茶調散 <small>頭痛</small>	生地黃黃連湯 <small>四物湯下</small>	大七氣湯 <small>局方七氣湯下</small>	達生散 <small>四物湯下</small>	五積散 <small>四物湯下</small>	婦人門下	枳實芍藥散 <small>金匱</small>	枳實 <small>燒令黑勿太過</small>	芍藥等分	右二味枳實為散服方寸七日三服并主癰腫以麥粥下之	方中枳實燒黑全是散逐瘀積故癰腫亦能主之	藥湯金匱	治產後中風發熱面赤喘滿而頭痛	竹葉一把	葛根	防風	人參	生薑三片	甘草 <small>灸一錢</small>	右九味水煎服溫後使汗出項強加附子嘔者加半夏	此桂枝湯去芍藥加竹葉葛根枳實人參因方後所加附子向來混入方內故此者明不便婦人方祖以混檢閱	竹皮大丸 <small>金匱</small>	治產後虛煩嘔逆	生竹茹	石膏 <small>各半兩</small>	甘草 <small>灸一錢</small>
連理湯 <small>理中湯下</small>	駐車丸 <small>方祖</small>	生脈散 <small>方祖</small>	加味清胃散 <small>血</small>	黃芩清肺飲 <small>子散</small>	千金托裏散 <small>保元湯下</small>	黑神散 <small>血</small>	代抵富丸 <small>抵當湯下</small>	佛手散 <small>四物湯下</small>	加味佛手散 <small>四物湯下</small>	治產後腹痛煩滿不得卧	治產後腹痛煩滿不得卧	五十八	思得堂藏																	

桂枝

白薇各半

右五味末之。黃芩四兩。和丸。彈子大。以飲服。一九。日三夜二。服。有熱倍白薇。煩滿加枳實。

千金三物黃芩湯。全原。治產後煩熱。

黃芩一錢

苦參二錢

乾地黄四錢

右三味水煎熱服。

上三味。皆純陰苦寒。傷月滿血之藥。產後雖有煩熱。難以輕用。當時立方。必有實壯氣盛。脈證俱實。能食便數者。始堪任此。用者審之。千金。義見中風門。千金三黃湯下。

抵聖散。治產後腹痛滿悶嘔吐。

人參

半夏各一

赤芍藥六錢

澤瀉藥四錢

橘皮三錢

甘草三錢

醫通卷十五

婦人下

五十一思得堂藏

為散。每服四五錢。水煎入薑汁數匙。和滓熱服。日二三度。以嘔吐止為効。有瘀加炮黑山查肉半兩。按方中赤芍。性味酸寒。非產後嘔吐者所宜。宜易赤茯苓下水止嘔為當。此必傳寫之誤耳。

遠志湯。千金

治產後心悸恍惚。語言錯亂。

遠志肉

麥門冬

人參

甘草炙

當歸

桂心

芍藥各一

茯苓一錢

生薑三片

大棗四枚

右十味。水煎去滓。溫服。心膈逆氣。加半夏七枚。

張氏清血散。治產後氣虛血暈。

人參

川芎各一

荆芥穗二兩

澤蘭葉

甘草炙各

為散。沸湯溫酒各半盞。調服。二錢。童便尤良。

辰砂七珍散。治產後血虛不語。

人參

蒼朮各一

川芎七錢

細辛二錢

防風四錢

甘草炙三錢半

辰砂三錢

為散。每服三錢。薄荷湯調服。肥人加。夏後神效。痰人加常山。蠟尾鈎藤。

調經散。局方。治產後敗血乘虛停積於。滯經流於。四肢。留滯日久。深腐壞如水。積致身體面目浮腫。或因產敗血。上干於心。心不受觸。致心煩躁。臥起不安。如見鬼。神。口語顛倒。並宜服之。

醫通卷十五

婦人下

六十一思得堂藏

赤芍藥

沒藥別研

桂心

琥珀別研

當歸各一

麝香別研

細辛半錢

右七味。為末。和勻。每服一錢。溫酒入生薑汁少許。產後虛浮。膈人不識。便作水氣治之。凡治水氣多。藥極是虛入。夫產後既虛。又以藥虛之。是謂重虛。往致枉入。但服此藥。血行腫消即愈。

當歸芍藥湯。千金。治產後虛羸。

當歸身錢半

芍藥

人參各二

乾地黄二錢

桂心

甘草各一

生薑三片

大棗五枚

右八味。水煎去滓。溫分三服。

琥珀地黃圓 治產後惡露未淨胸腹痛小便不利

琥珀另研

延胡索同糯米

當歸各一

蒲黃四兩生

生地黃乾者

生薑一兩

右將地黃咀碎酒浸生薑切片各持取汁留滓無油杓中

用薑汁炒地黃滓地黃汁炒薑滓各乾爲末忌犯鐵器煉

白蜜丸彈子大每服一九空腹當歸煎湯調服

甘竹茹湯千金 治產後內虛煩熱短氣

甘竹茹一把

人參

茯苓

甘草 錢各三

右五味水煎分三服

知母湯千金 治產後乍寒乍熱手足身溫心胸煩滿

知母六錢

芍藥

黃芩各四

醫通卷十五

婦人下

六十二思得堂藏

桂心 錢各二

右五味水煎分三服

淡竹茹湯千金 治產後虛煩頭痛短氣欲絕心中煩亂不

解

淡竹葉一把

麥門冬一兩

甘草三錢

小麥一撮

生薑三片

大棗三枚

右六味水煎分三服虛悸不已加人參少食加穀米氣逆

加半夏

當歸芍藥湯千金 治產後煩滿不安

當歸三錢

芍藥

人參

麥門冬去心

乾地黄各半

桂心二錢

生薑三片

大棗三枚

粳米一撮

右九味水煎分三服

茯神湯千金

治產後衝悸忘意恍惚語言錯謬

茯神

人參

芍藥

當歸各六

桂心

甘草各三

生薑三片

大棗三枚

右八味水煎分三服

人參丸千金

治產後大虛心悸忘意不安恍惚恐畏虛煩

不眠少氣

人參

茯苓

麥門冬去心

薯蕷各二

澤瀉

甘草

舊蒲

乾薑

桂心各一

右九味爲末蜜和棗膏丸如梧子大空心酒服二三十丸

醫通卷十五

婦人下

六十三思得堂藏

日三夜一服

蜀椒湯千金

治產後心痛大寒

蜀椒二合炒

芍藥

當歸

半夏

甘草炙

桂心

人參

茯苓各二

蜜一合

生薑汁半合

右十味先煮蜀椒令沸內諸藥去滓入薑汁蜜禁勿冷食

此本金匱三物大建中但當與蜜稍變耳

大嚴蜜湯千金

治產後心痛

乾地黄

當歸

獨活

甘草炙

芍藥

桂心

遠志肉

細辛各二

吳茱萸去閉口

乾薑炮一 蜜半盞

右十一味水煎去滓內蜜重煎溫分二服

羊肉生地黃湯千金 治產後三日腹痛補中益氣力消血

羊肉一觔 生地黃二兩 人參

當歸 芍藥各一 桂心

芎藭 甘草各半

右八味先煮羊肉去滓煎藥分四日三夜一服。有風熱去人參地黃肉桂加防風黃耆生薑。咳嗽本方加紫苑款冬細辛五味。腰痛木力加杜仲黃耆白朮附子草薢。

鹿茸散千金 治婦人漏下不止 烏賊骨 醋炒

鹿茸 酥炙 阿膠 各三兩 思得堂藏

醫通卷十五 婦人下 空一

當歸 各二 蒲黃 篩淨二兩

右五味為散溫酒調服方寸七日三服。本方去阿膠烏

賊骨各蒲黃散治同前

狼毒牙一兩

右一味水煎取汁半盞以綿纏著頭如蘭浸湯濕陰中日三四遍

小柴胡湯方祖

大承氣湯小承氣

下瘀血湯抵當

白頭翁加甘草阿膠湯刺門

佛手散四物

十全大補湯保元

八珍湯四君子

黑龍丹上木門

龍齒清魂散刺門

五積散散胃

來復丹丹金液

理中湯方祖

六君子湯四君子

四烏湯四物

膠艾湯四物

地黃飲子中風

獨參湯保元

當歸補血湯保元

醫通卷十五 婦人下 空一

六味丸九味

醋煎散上木門

增損柴胡湯小柴胡

指迷七氣湯局方七

逍遙散虛損

越鞠丸鬱門

小建中湯桂枝

金匱旋覆花湯上木門

都糸丸九味

四君子湯方祖

黃耆建中湯桂枝

敗毒散小柴胡

二陳湯方祖

失笑散上木門

花榮石散虛損

平胃散方祖

二味參蘇飲上木門

沉香降氣散氣門

桃仁承氣湯小承氣

當歸芍藥散四物

導痰湯二陳

柴胡清肝散小柴胡

四物湯方祖

補中益氣湯保元

增損四物湯四物

參蘇飲傷寒

柴胡四物湯小柴胡

局方七氣湯方祖

香砂六君子湯四君子

桔梗湯方祖

異功散四君子

生脈散方祖

靈砂丹金液

婦脾湯保元

香蘇散傷寒

葱白香豉湯傷寒

伏龍肝湯丸 利門	烏骨雞丸 度損
人參養營湯 保元	玉燭散 四物
大柴胡湯 下	五苓散 方祖
四神散 四物	川芎茶調散 頭痛
養胃湯 散下	甘草乾薑湯 理中
枳實理中湯 理中	千金伏龍肝湯 本門
代抵當丸 下	四七湯 下
紫蘇飲 下	當歸拈痛湯 淫門
加味逍遙散 下	加味歸脾湯 伏元
清胃散 下	千金芍藥湯 下
腎氣丸 下	千金鍾乳湯 本門
千金麥門冬散 本門	豬肩髮煎 下

醫通卷十五 婦人下 空五 思得堂藏

益氣養營湯 四君子	八味丸 方祖
豆豉餅 下	龍膽瀉肝湯 下
加減八味丸 下	
小兒門上	
紫九千金 治小兒變蒸發熱不解并扶傷寒溫熱汗後熱不歇及腹中有痰癖嘔乳不進乳則吐乳食瀉先寒後熱	
赤石脂 去五枚	代赭石 各一
杏仁 去皮尖	巴豆 三十粒
右四味為末加蜜少許蜜器中收三十日兒麻子大一丸與少乳令下食頃後與乳勿令多至半日當小下熱除五日兒如小豆一丸夏月多熱善令發疹慎用紫九無所不療雖下不虛入	

照散千金 治小兒變蒸中扶時行溫病或非變蒸時而得時行者

麻黃二錢 杏仁二錢 大黃一錢

右三味和勻內蜜器中一月兒服小豆大一枚以乳汁和服抱令得汗汗出溫粉粉之勿見風百日兒服棗核大一枚溫粉方用龍骨牡蠣各煨為細末取淨三錢入生黃耆末三錢和粳米粉一兩稀糊包緩緩撲之

大連翹湯 治淫毒利小便

連翹 瞿麥 車前 木通 滑石 當歸 赤芍 防風 柴胡 黃芩 黃連 黃柏 黃蘗 黃櫨 黃連 黃柏 黃蘗 黃櫨

山梔 炒黑 甘草 炙各 水煎食前熱服熱甚加酒大黃見小量與本方去山梔加紫草名連翹防風湯治痘疹熱毒壅閉小便不通

鈎藤散 治胎驚夜啼

鈎藤 茯神 茯苓 川芎 木香 芍藥 當歸 甘草 炙各 為散每服一錢七入薑棗煎服心經有熱面赤去木香加硃砂少許驚搐加蝎尾五分

柳華散 治口瘡赤爛

黃連 黃柏 黃蘗 黃櫨 黃連 黃柏 黃蘗 黃櫨

青黛

醫通卷十五 小兒上 空六 思得堂藏

人中白粉過

為散。歸川加冰片少許。再研敷之。

辰砂膏 治口禁日閉。喘聲不出。吐乳不化。

辰砂 牙硝各一

珍珠 麝香各三

共為細末。入生白蜜研膏。每用豆大許。薄荷湯下。潮熱甘

草湯下。月內兒空乳頭。令兒吮之。

胡黃連丸 治熱疳

胡黃連 川黃連各半 硃砂二錢

為末。填入豬膽中。以絲紫懸掛銚中。酸漿水煮熟。取出

入蘆薈麝香各二錢。飯糊丸如麻子大。每服一二十丸。米

湯下。若熱疳生蟲。去硃砂加燕薹仁。鶴虱。青皮。雷丸。

醫通卷十五 小兒上 三七 思得堂藏

貼臍法 治百日內嬰兒發搐。

麝香一分 喉尾 蜈蚣各去足

牛黃三分 青黛三分 薄荷葉各五分

右除牛黃。先搗喉尾等五味。各取淨末。再入牛黃細研。以

紅棗肉和成膏。塗臍上。四邊各出一指。以手烘煖。頻

頻熨之。

安神丸 治心經虛熱。睡中驚悸夜啼。

人參 棗仁 茯苓

半反製各 當歸 橘紅

芍藥各七 五味子七粒 甘草各三

為末。薑汁和丸。芡實大。每服一丸。薄荷湯化下。

天黃膏 治驚風吐瀉身溫。

天麻 錢半

乾薑 三錢 烏梢蛇肉酒煮焙 天竺黃 二錢

麝香 三分 硃砂各五分

為末。生白蜜和膏。每服豆大許。月中兒半粒。薄荷湯化下。

或塗乳頭吮之。

鉤藤飲 治用虛傷風。身熱足冷。欲成慢驚。

鉤藤 防風

人參 麻黃 白礬各炒

八麻 蠍尾去毒各 川芎

甘草各三分 麝香一分

水煎。溫分二三服。

愚按。慢驚屬脾胃虧損所致。而方乃辛溫散表之藥。無謂

醫通卷十五 小兒上 三八 思得堂藏

補之功。須審而用之。徐用誠云。小兒脾虛傷風。身熱足冷。

欲成慢驚。用鉤藤飲。然必大便實者為宜。若吐瀉痰逆。身

無大熱。而四肢清冷。當用烏蠍六君。此湯非所宜也。

抱龍丸 局方 治急驚。

陳膽南星 一兩 天竺黃 三錢 辰砂飛淨半入

雄黃各錢 麝香 五分

右五味為末。甘草湯丸。皂角子大。辰砂為衣。每服一丸。薄

荷湯化下。服後嘔吐稠痰即愈。如痘疹發驚。去辰砂易現。

珀三錢。

利驚丸 治急驚發熱。喘脹腹滿。大小便秘。

天竺黃 輕粉 青黛各一

黑牽牛頭末微

為末。蜜丸。豌豆大一歲兒服一九。薄荷湯化下。
羌活散。治傷寒驚熱。

羌活

獨活

柴胡

前胡

川芎

茯苓

桔梗

枳殼

廣皮

天麻

人參等分

甘草減半

為散。每服一二錢。加生薑一片。薄荷五葉。水煎去滓。稍熱服。取微汗効。

射干湯。千金。

治小兒發熱喘嗽。喉中水雞聲。

射干

麻黃

紫菀

甘草

半夏

桂枝各

生薑一片

大棗三枚

醫通卷十五

小兒上

李九思得堂藏

右八味水。煮分三服。服後熱除而喘嗽不已。本方去麻黃。

射干大棗。加細辛。款冬。阿膠。白蜜。

龍膽湯。千金。

治嬰兒出腹。血脈盛實。寒熱溫壯。四肢驚掣。

發熱大吐。呢者。若已能進哺。食入不消。壯熱及變蒸驚瀉。

方悉主之。

龍膽

鈞藤鈎

柴胡

黃芩

桔梗

芍藥

茯苓

甘草各一

燒蠟二枚

大黃三錢

右十味。以水一升。煎五合。兒生一日至七日。分一合為三服。兒生八日至十五日。分一合半為三服。兒生十六日至二十日。分二合為三服。兒生二十一日至三十日。分三合。

為三服。兒生三十一日至四十日。盡以五合為三服。即止。勿再服也。

益黃散。局方。

治脾虛乳食不化。

陳皮一兩

青皮

訶子肉煨

甘草炙各

丁香二錢

右為散。每服二三錢。水煎服。或黑糖調服一錢。

益黃不用補益。中州。反用陳皮。二橘。辟除陳氣。其旨最微。嬰兒久瀉。連綿不已。乳食積滯於內。故用二皮。專理肝脾。

宿陰。即兼訶子。以兜瀉下脫。丁香。以溫理中州。甘草。以和脾氣。深得瀉中寓補之法。非洞達斯義。難與言至治也。

肥兒丸。局方。

治食積五疳。頭項結核。瘰癧。髮稀。發熱。作渴。口疳。目昏。小便色白。腹大青筋等證。

醫通卷十五

小兒上

李九思得堂藏

肉豆蔻煨

史君子法製

麥藥炒

黃連。黑色。汁炒。

神麴。炒。各五兩。

檳榔。二十枚。見火。

木香。二兩。勿火。

右七味。為末。蒸餅調糊。稍加白蜜。丸如彈子大。每服一丸。

空心米飲調服。江石山加白木五兩。

此方近世所傳。尚多胡黃連。而九蕪。美等味。大苦大寒。大傷元氣。而四名誤實。故世喜服之。意謂有益於兒也。不知

立方之義。本為疳熱腹脹。羸瘦。故用祛熱伐肝之劑。消去

疳積。元氣得復。兒自肥矣。若本無疳熱。服之。與引經破家

何異。昔見富有之家。從幼好服此丸。至十歲外。漸至羸瘦。

咳嗽。益發。真為虧損。不能救生。貧乏之全。而反童勞者不少。

奈何。習俗成風。多所束縛。因特表而出之。

加味陷胃丸 治痰積痞滿熱喘嗽

黃連 薑汁

半夏 薑製

枳實 蜜炙

煨白蜜丸 炙實大

大兒五六丸 周歲兒一丸

沸湯調化服

蟾蜍丸 治無辜瘡

蟾蜍 大者 數枚

以黃蠟三杓置桶中以尿浸之將蟾活搗爛與蛆食之一晝夜用布袋盛蠟置急流水中漂淨取出瓦上焙乾入麝少許陳米飯丸麻子大每服二三十九米湯或砂糖湯服之。一服虛熱退二服煩渴止三服瀉利愈或用陳米炒為粉入糖霜作餅服之亦可。

馬陽散 治口舌生瘡痘後疳爛

醫通卷十五

小兒上

七十一 思得堂藏

人中白 煨一錢

蠶退紙 如無蠶代之

五倍子 生牛 煨半

白礬 生半

礞砂 生半 煨半

為散先以青布蘸水拭淨用鷄翎管吹口中患處

蘭香散 治鼻疳赤爛及癰風證

蘭香葉 二錢 即 銅綠

輕粉 各五

為散乾揀患處乾者香油調敷

白粉散 治諸疳瘡

烏梅 三錢 白芨 二錢

輕粉 一錢

為散藥水洗拭乾敷之

如聖丸 治熱府善食腹大

史君子肉 二錢 胡黃連

川黃連

白燕黃仁 炒各 乾蟾 五枚 煨

麝香 五分

右為朱蜜丸彈子大每服一丸人參湯化下

木香丸 治冷泄瀉少食

木香 一錢

肉豆蔻 三錢

為朱蜜丸彈子大每服五九至十五九薄荷湯送下虛者去續隨子加薑桂參朮

止汗散 治睡中多汗

故蒲扇 煨存

為朱每服一二錢溫酒或烏梅湯調服

蒲灰止血利小便與蒲黃不異汗即血之液故取多胃清汗之舊扇燒灰主治睡汗同氣相求之妙世醫都未悟也

石南散 治小兒通睛

石南葉 一兩

為細末每用少許吹鼻中

龜胸丸 治龜胸高起

大黃 酒煨

桑皮 薑汁

甜葶藶 微炒

上七味為細末以杏仁芒硝同研如脂蜜和九如大實大

每服一丸葱白湯化下

昔蒲丸 治心氣不足不能言語

石昔蒲 三錢

丹參 二錢

遠志 肉桂 各半

天門冬 煨去心

甘草 炙

醫通卷十五

小兒上

七十一 思得堂藏

藜蘆 三分

瓜蒂 七枚

麻黃 去節

水通

杏仁 炒黑

芒硝 等分

枳殼

百合

人參 五錢

麥門冬 去心

遠志 肉桂 各半

天門冬 煨去心

甘草 炙

宣風散 治痘毒腫乘腎腹脹黑陷

尖椒柳二個 橘皮 青皮

甘草各二 牽牛頭末四錢

為散三歲兒一錢七家水調服

紫草飲 治痘疹血熱口渴不能起發

紫草一錢 甘草五分 黃耆錢半

糯米一撮 水煎日再服。一方無黃耆糯米多人參蟬蛻穿山甲治

氣虛血熱。一方無黃耆糯米多歸芍藥黃治血熱復感

風寒不能起發 按紫草飲本方係保元湯去參易紫草之製更迭一味而

氣血攸分且補中寓發直是大匠運斤足補桂若未逾

醫通卷十五 小兒下 七十五 思得堂藏

消毒飲 治痘疹咽痛而起發遲

鼠粘子一錢 甘草五分 荊芥一錢

水煎日二服

化毒湯 治痘已發毒盛不能起脹

紫草一錢 甘草 升麻 地骨皮 黃芩各七

蟬蛻各五

糯米一撮

水煎日再服

加味四聖散 治痘灌漿時熱渴引水或作痰

紫草一錢 甘草五分 黃耆一錢 木香三分

水通七分

人參一錢

川芎五分 蟬蛻七枚

水煎熱服

紫草木通湯 治痘疹行漿時氣虛血熱小便不利不能起

紫草一錢 甘草五分 木通六分

茯苓各一

糯米一撮 水煎不時溫服

快斑湯 治痘毒盛起發遲而作痰

紫草一錢 甘草五分 木通六分

人參一錢

芍藥一錢 蟬蛻七枚 水煎熱服。一方多當歸防風。一方無芍藥多當歸防

風水香

鼠粘子湯 治痘疹咽喉腫痛

醫通卷十五 小兒下 七十六 思得堂藏

鼠粘子一錢 甘草五分 荊芥七分

防風六分

水煎不時溫服

如聖飲 治痘出不快咽喉不利

鼠粘子一錢 甘草五分 荊芥七分

桔梗六分

防風五分

竹葉十片 水煎不時溫服。一方無竹葉有黑參

獨聖散 治痘疹毒盛伏匿

鼠粘子 蟬蛻炒研 紫草一錢

水煎日二三服

陳氏木香散 治痘瘡泄瀉後虛寒腹痛

木香

大腹皮

肉桂

半夏

青皮

柴胡

人參

赤茯苓

甘草

訶子肉

丁香

爲散每服一二錢加薑棗煎服。○自汗瘰癧去腹皮青皮

柴胡加黃耆白朮糯米

陳氏吳功散 治痘瘡灰白伏陷大渴泄瀉

木香

當歸身

茯苓

肉桂

肉豆蔻

丁香

熟附子

人參

白朮

半夏

厚朴

橘皮

爲散每服二三錢入薑棗煎服

參香四聖散

人參

黃耆

白朮

紫草茸

茯苓

芍藥

當歸七分

木通

防風

甘草

川芎

粳米

水煎熱服

白螺散

治痘瘡不脫

白螺散

治痘瘡不脫

爲散

治痘瘡不脫

爲散

治痘瘡不脫

金華散

治痘後肥瘡

黃連

黃芩

黃藥

大黃

黃丹

輕粉

參香少許

爲散瘡澤則純疹燥則豬脂調敷

生肌散 治疔蝕不斂膿血難流

黃連

黃藥

甘草

五倍子

地骨皮

爲散乾搽瘡上

白虎化斑湯 治痘爲火悶不得發出

石膏

知母

生甘草

蟬蛻

麻黃

大黃

黃芩

連翹

黑參

竹葉

水煎大劑頓服

大黃甘草湯

大黃一倍

甘草

水煎頓服取吐不應更服

金匱本方用大黃四倍於甘草治食已即吐專取大黃之

沉降以泄逆滿之滯此用大黃再倍於甘草治痰悶痘閉

反倍甘草之上溢以涌固結之積一方小變而功用不同

若此

椒梅丸 治痘爲蟲悶不得發出

秦椒三錢

烏梅

爲末

爲末

爲末

爲末

爲末

爲末

爲末

爲末

小豬尾尖上刺血數滴入冰片少許辰砂末一錢同研
成膏分作三五服木香湯化下。

柴胡飲 治痘瘡初起熱甚表裏俱實。

柴胡 防風 荊芥

黑參各八分 大黃二錢 黃芩

滑石各錢 甘草五分

水煎不時服

犀角消毒飲 治痘瘡發疔胃熱咽腫便秘。

犀角七分

連翹

荊芥六分

甘草

鼠粘子各一錢

防風各五分

水煎不時服

醫通卷十五、小兒下

七十九思得堂藏

羌活湯 治痘疹未報點時熱甚不發頭痛腹脹。

羌活

防風各八分

荊芥

紫蘇各七分

川芎四分

赤芍六分

枳殼八分

山楂一錢

木通五分

甘草生三

葱白一垂

生薑一片

水煎熱服

珍珠散 治痘疔。

珍珠生研

菜豆生研

豌豆燒存

髮灰等分

為散。胭脂調銀針挑破口含清水吮去毒血塗之。○一方無菜豆加冰片少許。

三仙散 治痘疔。

紫花地丁 番白草 當歸尾

為散。水煎溫服。

升均湯 治痘出隱隱不起面上紅暈成片根窠頑屑者。

人參蘆

白木蘆

茯苓

甘草生

防風蘆

桔梗蘆

水煎頓服取吐。痰出氣升痘自起矣。○一方無防風有升麻。

羚羊解毒湯 治痘初起根窠不分。賴賴一片如朱塗。以此湯分之。

紫草

荊芥六分

黑參各一錢

柴胡八分

紅化三分

蟬蛻四分

川芎五分

山查一錢

連翹八分

醫通卷十五、小兒下

八十思得堂藏

木通七分

羚羊角尖一錢細

水煎去滓入羚羊角末攪勻服之。

化斑湯 治痘與斑夾出。用此消斑起痘。

黑參二錢

鼠粘子一錢

紫胡八分

荊芥

防風各六分

連翹七分

木通八分

枳殼七分

蟬蛻五分

生甘草四分

燈心二十

淡竹葉十五

水煎溫日二三服。

解毒飲子 治痘為風寒所遏而起發遲。

柴胡八分

紫草六分

防風七分

白芷五分

荊芥七分

鼠粘子一錢

川芎

蟬蛻

木通各五分

水煎熱服

本方去白芷加黃芩羌活名劑防解毒飲
透肌散透肌散 治痘發遲作癰大便不實

人參

白朮

茯苓

芍藥

紫草

甘草

蟬蛻七枚

當歸

木通

糯米一撮

水煎日再服

紫草快斑湯

治痘色不紅活不能起發

紫草

芍藥

甘草

木通六分

蟬蛻七枚

水煎熱服日再

醫通卷十五

小兒下

八十一

思得堂藏

二寶散

治痘頂色白肉紅腫而痘及不腫或黑陷不起

生肌散

犀角

等分

爲散入豬心血少許紫草湯調服

大鼠粘子湯

治痘色紅根散不長發

鼠粘子

甘草

當歸

黃耆

連翹

柴胡

黃芩

地骨皮

水煎溫服

四聖散

治痘出不快將欲倒靨

紫草

黃耆

甘草

木通六分

水煎熱服日三。大便秘加枳殼大便如常加糯米氣虛

少食加入參

按四聖散乃起痘乾紫倒靨之專藥其功在於紫草一
味世醫咸用紫草代充是以用多不効原夫紫草草本名
紫錦乃蟻穴麒麟竭樹脂凝結而成不但可以活血起脹
兼得蟲毒攻發內陷之邪最銳且無鹹寒過潤作瀉之虞
益緣紫錦之功甚於紫草故有紫草草之名其實非一物
也。

奪命丹 治痘屬邪黑陷不起

麻黃

升麻

山豆根

紅花

大力子

連翹

蟬蛻

紫草

人中黃

爲末蜜酒和丸反砂爲衣兒大者二錢中者錢半小者一

醫通卷十五

小兒下

八十一

思得堂藏

錢薄荷湯化下

紫草

黃耆

鼠粘子

連翹

木通

當歸

甘草

桂枝

川芎

防風

水香

蟬蛻

淡竹葉

十片

水煎溫服

羌活散苦湯 治痘頭面太多及大頭證

羌活

白芷

川芎

薄荷

防風

枳殼

黃芩

連翹

升麻

芝蔴

人中黃等分

水煎不時熱服。

攻毒湯 治痘出不快。伏陷倒靨。大便秘者宜之。

大鯽魚頭。升雄雞頭。鮮笋尖各三五枚。加生薑三五片。

淡水煮熟。加酒釀少許。令兒先飲汁。次食雞冠笋尖。餘

俱不用。

豆蔻丸 治痘出氣虛吐利不止。

肉豆蔻

木香

砂仁

龍骨

訶子肉

赤石脂

枯礬

為末。神麴糊丸。黍米大。周歲兒二十九丸。米飲下。

常啼丸 治熱入血分。大便秘結。三五日不通。

當歸五錢

小兒下

全一思得堂藏

紫草三錢

黃連二錢

大黃酒蒸

甘草一錢

先取當歸紫草熬成膏。以三味為細末。膏和為丸。彈子大。

每用一丸。水煎三五沸。和滓服之。不下再服。以利為度。

加味消毒飲 治痘疹血熱咽嗑不利。

鼠粘子錢半

甘草五分

荆芥七分

紫草一錢

防風六分

糯米一撮

水煎不時服。

解毒防風湯 治痘乾燥毒盛。

防風

地骨皮

黃耆

芍藥

荆芥

鼠粘子

枳殼等分

水煎不時熱服。一方多升麻葛根。

神應奪命丹 治痘癰寒邪肌表固閉。黑陷不起。

辰砂以細藥線繫著上。同升麻麻黃紫草連翹四味。

研細。將藥汁灌下。麻黃連翹八分。蟬蛻三分。展砂

紫草五分。紅花五分。真蟾酥三分。

穿山甲五分

為末。用醇酒打和。分作十丸。周歲兒半丸。二歲者一丸。大

者不過三丸。熱酒化下。煖覆取汗。汗出痘亦隨發也。必擇

天醫生氣日。修合佳。

神授散 治痘黑陷咬牙。昏熱悶亂。煩躁不寧。

人牙散

苦參各五

紫草

生地黃

犀角

麥門冬

醫通卷十五

小兒下

全一思得堂藏

黃芩酒炒

燒人矢

為散。醇酒調服一錢五分。日二夜一。良久痘起光潤而惡

候除。不能酒者。糯米飲調服。

至寶丹 治痘脾胃虛寒。腹冷不食。伏陷不起。

以生糯米與黃色雄狗飽食。取矢中米淘淨。炙乾研細。

每兩入麝香三分。隨證用溫補脾胃藥。或獨參保元送

下

無價散 治痘毒傷胃黑陷。

取臘月人矢乾者。燒灰為散。砂糖湯調服方寸匕。服後

即變紅活。

人牙散 治痘癰寒閉毒邪干腎。而黑陷手足清。

人牙燒存性。為極細末。每服四五分至一錢。獺豬尾血

調紫草湯下。古方入麝少許酒釀調服。○錢氏云痘

疹最怕麝與酒釀。恐防發癰。

珍珠人牙散 治痘疹毒伏心胃黑陷神昏

人牙散五 珍珠一錢 血竭五分

爲散每服四五分酒釀調服。

桑蟲漿 治痘氣虛毒盛白陷不起。

生桑樹內蟲一二枚蒸熟酒釀搗絞頓服之。

地龍酒 治痘血熱毒盛黑陷不起。

活地龍五七枚同烏芋持絞入酒漿少許頓熱服之。

雞冠血 治痘青乾紫黑陷血熱毒盛者。

穿山甲炮研極細每用五六分至一錢刺老雄雞冠上

血數滴酒釀調勻頓熱服。

醫通卷十五

小兒下

公五

思得堂藏

牛李膏一名必 治痘黑陷不起。

牛李子一名鼠李子又名易轉

一味熬膏收乾九如皂子大挑膠煎湯化下如無鮮者乾

者熬膏用之。

瘻變百拜丸 治痘瘡黑陷便秘。

大棗十枚 大戟二兩

右二味煮爛太火候將棗搗九如棗見大周歲兒十九紫

草湯或木香湯下從少至多以利爲度。

周天散 治痘黑陷項強直視喘脹發搐。

地龍 乾二兩 蟬蛻 各二兩

爲散每服半錢至一錢乳香湯調下日三夜一痘起爲効。

周天之名因軫水壅爲二十八宿之木故取此義與地龍

酒勿用稍有不同若但黑陷喘脹用地龍酒最捷如兼作

癰則周天散爲合劑耳。

水楊浴法 治痘出頂陷漿滯不行或爲風寒所侵俱宜用

之如初出及收斂時癰塌破損者勿用。

用水楊五觔三時用葉冬用枝以長流水一大釜煎六

七沸取三分之一置浴器內候溫浴之內服應用之藥

然後浴洗漸次加湯良久乃以燈照紫雲然有起勢陷

處覺重有絲此紫影也後必滿足如未滿足又浴如前

力弱者只浴頭而手足若無起勢則氣血敗而津液枯

矣必難救治。

白花蛇散 治痘瘡寒白陷毒匿不起。

白花蛇三錢 丁香十枚

爲散每服三五分熱酒調下。

薰穢散

蒼朮 細辛

川芎 乳香 甘松 降香等分

爲散燒烟解血脈及諸穢氣。

辟穢香

大黃一倍 蒼朮減半

爲散燒烟辟尸厥諸穢。

芍藥湯 治痘將發時微發

白芍 甘草 黃芩等分

伏苓 意苡仁 倍用

水煎熱服。

橘皮末連散 治痘疹初起乾咽而噤

橘皮六錢

吳茱萸三錢

黃連一兩同煎

竹茹一團

為散每服一錢水煎服

前胡枳殼湯 治喘嗽上氣煩渴引飲便實溺赤

前胡

枳殼

赤茯苓

大黃酒煮

甘草分

為散每服三錢水煎溫服身溫服微者禁用

補肺湯 治氣虛痘毒乘肺致嗽不已

黃耆

鼠粘子各一錢

阿膠八分

馬兜鈴

甘草各五分

杏仁各七枚

桔梗七分

糯米一撮

醫通卷十五

小兒

思得堂藏

水煎溫服

黃芩瀉肺湯

治肺熱喘嗽裡實便秘

黃芩酒炒

大黃

連翹

山梔熬黑

杏仁各六分

枳殼

桔梗

薄荷

生甘草

水煎溫服

射干鼠粘子湯

治痘不起發咽喉疼痛

鼠粘子錢半

甘草五分

射干六分

升麻四分

水煎不時服之

紫草消毒飲

治痘疹血熱咽痛

紫草

連翹

鼠粘子各一

荆芥七分

甘草

山豆根各五

水煎不時溫服

生津烏根湯 治痘疹發渴

烏根

桔梗根

麥門冬各心

生地黃等分

升麻

甘草生

用糯米泔水煎去滓入前投自然汁一合服之

人參酸漿湯 治心脾虛熱煩躁不寧

人參

桑仁炒研

山梔熬黑

生地黃

麥門冬各心

當歸等分

甘草各錢

水煎溫服

梔子仁散 治痘疹毒盛色紫便秘

醫通卷十五

小兒

思得堂藏

梔子仁熬黑

白鮮皮

赤芍藥

升麻各五錢

寒水石如無石

甘草各錢

為散每服一二錢水煎溫服小兒大小調紫草草末半錢七服

之 移痘丹 治痘出目中初見點時用此移之

守宮十枚太頭足配

辰砂一錢陳乾

珍珠

茯苓

遠志肉各一錢

琥珀五分

為末紫草膏和丸如梔子大每服一錢二分欲移在手足

觀桂枝湯仙煎湯下欲專移在足牛膝木瓜煎湯下微汗

為度再用後藥二服

川芎

藥本

荆芥

白芷各五

蟬蛻三合

防風

甘草 減半

水煎溫服。○ 膠神浮。○ 馬兜鈴。有薄荷。

清熱透肌湯。治麻疹未透。熱甚而救。

黑參

石膏

鼠粘子

荊芥

防風

前胡

葛根

杏仁 等分

生甘草 減半

水煎熱服。

葛根解肌湯

治麻疹初起。發熱致嗽。或乍涼乍熱。

葛根

前胡

荊芥

鼠粘子

連翹

赤芍

蟬蛻

木通 等分

生甘草 減半

水煎熱服。

小兒

小兒

今九一思得堂

涼血飲子。治麻疹火毒熾盛。紫赤而露。

生地黃 錢半

黃連 五分

黃芩

荊芥

黑參 各一

紅花 三分

赤芍

丹皮 各八

木通 七分

水煎溫服。

甘桔湯。治麻疹咽痛。口舌生瘡。

甘草

桔梗

山豆根

黑參

鼠粘子

荊芥 等分

麥門冬 倍用

水煎溫服。

石斛消胃散

治麻疹後嘔吐。胃虛不食熱滯。

石斛

茯苓

橘皮

生薑 一片

葱白 一掌

水煎溫服。○ 血熱者加紫草連翹。

此方出麻城家秘。黃石峯極言其神。而吾吳以痘疹名世者。莫不以守宮為方士異端。曷知醫學正傳。聖濟總錄。衛生寶鑑。丹溪摘玄。聖惠方等。咸取入劑。豈可以方士目之耶。

排毒散。治痘後餘毒發癰。能食便秘。

大黃 酒蒸

白芷 七錢

沉香 另研

木香 各二錢

穿山甲 炮三

歸尾 五錢

為散。每服二三錢。忍冬花煎湯調。日三服。虛者減大黃。加

荊防連翹甘草節。欲托加黃耆防風。

解毒內托散。治痘後發癰。

小兒

小兒下

今

思得堂

黃耆

當歸

防風

荊芥

連翹

赤芍

木通 等分

甘草節 減半

忍冬花 倍用

水煎入醇酒少許服之。

真人解毒湯。治痘母

木通

連翹

防風

荊芥 各三

忍冬花 半角

甘草節 一兩

水酒各半煎。溫分三服。以腫消痘出為度。

清咽滋肺湯。治麻疹餘熱。咳嗽聲啞。

黑參

鼠粘子

荊芥

葛根

貝母 去心

桔梗

馬兜鈴

桔梗

麥門冬 等分

<p>枳殼 丹皮 赤芍等分 甘草 減半</p> <p>爲散每服三四錢。加生薑一片。水煎服之。</p> <p>門冬甘露飲 治淋疹熱甚而渴。</p> <p>麥門冬 二錢 黑參 各一錢</p> <p>栝實根 連翹 各一錢</p> <p>燈心 甘草 竹葉 各一錢</p> <p>生甘草 五分</p>	<p>除熱清肺湯 治淋疹盡透而壯熱咳嗽。大便秘結。</p> <p>石膏 三錢 黑參 生地黃 各一錢</p> <p>赤芍 貝母 栝實根 各一錢</p> <p>麥門冬 太心 甘草 五分</p>	<p>水煎溫服</p> <p>射干消毒飲 治淋疹咳嗽聲啞。咽喉腫痛。</p> <p>射干 黑參 連翹 等分</p> <p>荆芥 鼠粘子 甘草 減半</p> <p>水煎溫服。</p> <p>當歸散 治口舌生瘡。牙根毒發。大便秘結。</p> <p>當歸 赤芍 各一錢</p> <p>大黃 三錢 甘草 五分</p>	<p>無比散 治淋後牙疳腐爛。</p> <p>取黃牛乳吸存性。入龍腦少許。研細吹之。</p> <p>燒鹽散 治牙疳潰爛。</p>
---	--	--	--

<p>取橡斗大者。實鹽滿。合起鐵絲。茶定。燒存性。以碗覆地。入麝少許。研細敷之。</p> <p>蘇袍散 治一切口瘡腐爛。</p> <p>荆芥穗 薄荷 研砂 各二錢</p> <p>玄明粉 百藥煎 二錢</p> <p>青黛 各二錢</p> <p>甘草 錢半</p>	<p>爲散。點舌上。令其自化。</p> <p>雙和湯 治淋後虛羸。</p> <p>熟地黃 白芍 酒炒 各一錢</p> <p>當歸 各七錢</p> <p>肉桂 三分 有 生薑 一片</p> <p>水煎溫服。</p> <p>犀角地黃湯 治寒</p> <p>參蘇飲 治寒</p> <p>人參敗毒散 治小兒</p> <p>麻黃湯 方祖</p> <p>大連翹湯 本門</p> <p>小柴胡湯 方祖</p> <p>保元湯 方祖</p> <p>和解湯 升麻</p> <p>生脈散 方祖</p> <p>參苓白朮散 四君子</p> <p>紫草承氣湯 小承氣</p> <p>桃核承氣湯 小承氣</p>	<p>四順清涼飲 治門</p> <p>惺惺散 四君子</p> <p>升麻湯 方祖</p> <p>益元散 方祖</p> <p>理中湯 方祖</p> <p>甘露飲 二冬</p> <p>六君子湯 四君子</p> <p>四君子湯 方祖</p> <p>解毒湯 四物</p> <p>怡梗湯 方祖</p> <p>四苓散 五苓</p> <p>大承氣湯 湯下</p>	<p>小兒下</p> <p>九十二 思得堂藏</p>
--	--	--	----------------------------

十全大補湯	保元	枳殼湯	平胃	胃苓湯	平胃	黃連解毒湯	三黃	小兒下	九十三	思得堂藏
寬中散	四物	麥門冬湯	四物	人參固肌湯	保元	八珍湯	四君子	地黃丸	八味	九下
潤燥湯	保元	鍾氏白朮散	四君子	人參白虎湯	白虎	婦科湯	保元	黃芩湯	保元	九下
錢氏興功散	四君子	獨參湯	保元	加味逍遙散	虛損	清胃散	保元	枳實梔子散	保元	九下
涼膈散	方祖	桂枝湯	方祖	二陳湯	方祖	枳朮丸	方祖	黃芩湯	保元	九下
小建中湯	桂枝	導赤散	暑門	平胃散	方祖	瀉黃散	本門	黃連解毒湯	三黃	九下
補中益氣湯	保元	大柴胡湯	小柴胡	葛根黃芩黃連湯	傷寒	桂枝大黃湯	桂枝	八珍湯	四君子	九下
參耆內托散	保元	活命飲	癰疽	五苓散	方祖	小承氣湯	方祖	婦科湯	保元	九下
枳實梔子散	保元	四物湯	方祖	三黃丸	三黃	密煎導燥門	本門	清胃散	保元	九下
黃芩湯	保元	連翹升麻湯	升麻	連翹防風湯	本門上	豬苓湯	本門	瀉黃散	本門	九下
地黃丸	八味	生聖散	保元	龍膽瀉肝湯	本門	三奇散	本門	瀉黃散	本門	九下
保和丸	食門	保和丸	食門	消風散	本門					

芎藭散	傷寒	芩子散	方祖	柴胡飲子	目門	乾薑黃芩黃連人參湯	傷心	小兒下	九十四	思得堂藏
清肺湯	桔梗	白虎湯	方祖	白頭翁湯	本門	厚朴湯	散下	枳實理中湯	理中	九下
清心丸	三黃	當歸補血湯	保元	乾薑黃芩黃連人參湯	傷心	厚朴湯	散下	枳實理中湯	理中	九下
附子理中湯	理中	化蟲丸	本門	乾薑黃芩黃連人參湯	傷心	厚朴湯	散下	枳實理中湯	理中	九下
馬鳴散	本門	穀精散	目門	乾薑黃芩黃連人參湯	傷心	厚朴湯	散下	枳實理中湯	理中	九下
決明散	目門	蜜蒙散	目門	乾薑黃芩黃連人參湯	傷心	厚朴湯	散下	枳實理中湯	理中	九下
神功散	目門	羚羊散	目門	乾薑黃芩黃連人參湯	傷心	厚朴湯	散下	枳實理中湯	理中	九下
十宣散	保元	托裏消毒散	保元	乾薑黃芩黃連人參湯	傷心	厚朴湯	散下	枳實理中湯	理中	九下
枳實導滯湯	傷飲	大青湯	白虎	乾薑黃芩黃連人參湯	傷心	厚朴湯	散下	枳實理中湯	理中	九下
竹葉石膏湯	白虎	加味清胃散	本門	乾薑黃芩黃連人參湯	傷心	厚朴湯	散下	枳實理中湯	理中	九下
越脾湯	本門	三拗湯	本門	乾薑黃芩黃連人參湯	傷心	厚朴湯	散下	枳實理中湯	理中	九下
枳實理中湯	理中	白散	本門	乾薑黃芩黃連人參湯	傷心	厚朴湯	散下	枳實理中湯	理中	九下

清

長洲石頑張

醫路王

男

以柔安世

日本

大泉長卷前田安宅子仁

男

典子守

夫字有字母方有方祖自伊尹湯液一脈相傳與釋氏傳燈無異苟能推源於此自然心手合轍諒非時師所能測識也

桂枝湯玉函

治風傷衛氣脈浮緩發熱自汗管衛不和

桂枝三錢

白芍三錢

甘草二錢

生薑五片

大棗四枚

醫通卷十六

桂枝

思得堂藏

右五味水煎溫服喉熱稀粥一盞以助藥力覆被取微汗効不汗少頃再服

小建中湯玉函

治風木乘脾寒熱腹痛

桂枝湯倍芍藥加膠飴三錢

黃耆建中湯金匱

治虛勞感寒發熱自汗

桂枝湯加黃耆發半膠飴一合千金多人參二錢

桂枝湯和營表藥倍芍藥加膠飴便能建立中氣以芍藥之酸歛護營血膠飴之甘培養中土更加黃耆以資衛氣

管衛職府俱和而益多矣千金於小建中方加入當歸

名曰內補建中其調和中外之力可知

陽旦湯千金

治冬溫脈浮發熱煩強頭痛

桂枝湯加黃芩錢半

陰旦湯千金

治冬溫內寒外熱肢節疼痛中寒食

桂枝湯加黃芩錢半乾薑五分

陰囊四塞非平旦之氣無以開散陽和桂枝湯原名陽旦

開散陽邪之藥也千金於中加黃芩之苦寒性輕以治

冬溫在表之邪熱仍以陽旦和之若兼寒食再加乾薑

之辛溫散結以治中土之停滯遂因之曰陰旦與經絡之

陰陽風馬牛不相涉也

獨活湯千金

治風發奄忽不知人咽中閉塞不能言四肢

不收手足痺曳

桂枝湯桂枝易桂心去大棗加獨活括蕁根生葛發其

汗不得汗去獨活括蕁根生葛加防已防風麻黃瘡癰

不語並皆治之

醫通卷十六

桂枝

思得堂藏

當歸四逆湯玉函

治陽邪入犯厥陰四肢厥逆

桂枝湯去生薑加當歸三錢細辛通草各一錢

邪犯厥陰之界有人無出雖有熱邪勢必從陰而為厥逆

故厥陰篇中有厥深熱深之例以振發傳經之變端病邪

至此最為緊迫醫者苟無成識於胸中臨病將何措指南

陽先師乃毫不以厥逆為意仍取太陽例中桂枝湯加

入當歸協濟芍藥以護厥陰之營細辛引領桂枝以為厥

陰嚮導通草通利膀胱以疏厥陰出路與桂枝平分力量

為分解之捷徑雖厥陰與太陽兩經接壤邪既入陰斷無

復傳陽經之理先輩六經例有不罷再傳之說大可噴飯

而桂枝方中獨去生薑者恐辛辣性暴不待氣味入陰便

從太陽開發轉虛其衛再有何力以振驅邪之任歟由是

廣推大小青龍。大小柴胡。和解管衛兩岐。表裏交界之邪。必用薑棗為一定之法。若麻黃湯則專主寒傷管證。便與生薑無預。逮至三陰等治。從無一方泛用生薑者。生薑為手頭常用之物。尚爾若此之慎。況有不察厥深熱深之旨。一見四肢厥冷。漫投薑附四逆。於此能無戚戚乎。內補當歸建中湯。千金。治產後血虛。虛羸不足。腹中刺痛。少腹中急。或感寒發熱。

桂枝湯桂枝易肉桂。加當歸二錢。膠飴六錢。崩傷內舛不止。加地黃六錢。阿膠二錢。產後一月服四五劑。令人強壯。

桂枝龍骨牡蠣湯。玉函。治虛勞夢泄。惡寒發熱。

桂枝湯加龍骨。牡蠣。各錢半。

醫通卷十六

桂枝

三。思得堂藏

桂枝大黃湯。玉函。治太陰中風誤下。引邪入內。腹滿痛。

桂枝湯加大黃一錢。

桂枝湯表藥也。以其誤下。引邪入內。賊而腹滿痛。渾是表邪。在內不解之故。故仍用桂枝湯。畧加大黃。因勢利導。病既變。則藥亦不得不隨之而變也。

桂枝葛根湯。玉函。治太陽經柔痙。自汗脈浮。

桂枝湯加葛根二錢。

桂枝湯加金匱。治瘧太陽證。備身體強。凡凡然脈沉遲。

桂枝湯加枳實根二錢。

桂枝加附子湯。玉函。治亡陽漏風。肢體屈伸不和。

桂枝湯加熟附子一錢。

桂枝加黃耆湯。金匱。治黃汗發熱。身冷。勝以上汗出。下無。

注。

桂枝湯加黃耆二錢。

蒼芍桂酒湯。金匱。治汗如漿。汗。肢體虛。發熱汗出而渴。

桂枝湯太甘草。金匱。加黃耆五錢。苦酒和水煎。

黃耆桂枝五物湯。金匱。治血痺。身體不仁。如風狀。

桂枝湯太甘草。加黃耆等分。千金。桂枝湯桂心。加人

參。名黃耆湯。

茯苓甘草湯。玉函。治風邪入犯膀胱。氣分。小便不利。

桂枝湯去芍藥。加茯苓二錢。

苓桂朮甘湯。玉函。治心下有支飲。胸腹支滿目眩。

桂枝湯去芍藥。加茯苓二錢。白朮二錢。

此僅用桂枝湯之半。以流劫中外之支滿。乘四君子之半。

醫通卷十六

桂枝

四。思得堂藏

以運行在裏之痰氣也。

桂枝去芍藥加皂莢湯。金匱。

治肺癰吐涎沫。初起有表邪者。

桂枝湯去芍藥。加皂莢一錢。去芍藥。蘇久。

桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯。金匱。治氣分心下如盤。

桂枝湯去芍藥。加麻黃附子各一錢。細辛半錢。

病在氣分。非麻桂不能分解。病氣盤結。非辛附不能破結。

去芍藥者。惡其酸收也。

小青龙湯。玉函。治溢飲喘咳。自利發熱。當發其汗。

桂枝湯去薑棗。加麻黃三錢。半夏二錢。炮薑細辛五味子各半錢。

小青龙加石膏湯。金匱。

治喘嗽上氣煩躁。心下有水氣。

小黃龍湯加石膏雞子大一枚。

桂枝麻黃各半湯玉函 治太陽證脈微惡寒。

桂枝湯加麻黃杏仁。

桂枝二越婢一湯玉函 治營衛俱傷風多寒少而煩滿。

桂枝湯本方各二錢加麻黃二錢石膏三錢。

桂枝芍藥知母湯金匱 治肢節痛脚腫如脫。

桂枝湯去大棗加麻黃二錢白朮半兩知母防風各四錢熱附子二錢。

炙甘草湯玉函 治傷寒脈結代心動悸及肺痿唾多心中

溫溫液液虛勞不足汗出而悶。

桂枝湯去芍藥倍甘草加入參二錢生地三錢麥門冬

二錢麻子仁一錢阿膠二錢。

醫通卷十六

桂枝

五 思得堂藏

混是清潤調補藥中。但用桂枝一味以流動經脈之滯。麻

仁一味以滋潤腸胃之結。而脈虛結代。心虛動悸。一切虛

勞不足。得以榮養。則脈虛自復。心悸自寧矣。

芍藥甘草湯玉函 治營血受傷熱不止。

桂枝湯去桂枝薑棗。

芍藥甘草附子湯 治發汗病不解反惡寒及瘡家發汗成

瘰。

桂枝湯去桂枝薑棗加附子一錢炮。

黃芩湯玉函 治伏氣發溫太陽少陽合病自利。

桂枝湯去桂枝生薑加黃芩三錢。

黃芩加半夏湯玉函 治伏氣發溫內扶痰飲痞滿欬逆。

桂枝湯去桂枝加黃芩三錢半夏二錢。

黃芩湯本治春夏溫熱熱自內發故於桂枝湯中除去桂

枝生薑之辛溫易以黃芩之苦燥轉溫散為涼解大匠運

斤妙用不可思議後世借以治下利身熱亦不出此其黃

芩加半夏湯治自利而嘔與夏秋下利白沫若合符節與

病同治總不出兩陽之裡聖也。

麻黃湯玉函 治寒傷骨氣脈浮發熱無汗而喘骨節痛。

麻黃湯去節 治寒傷骨氣脈浮發熱無汗而喘骨節痛。

杏仁二十枚 治寒傷骨氣脈浮發熱無汗而喘骨節痛。

右四味水煎溫服。暖覆取微汗。不須發粥。以寒邪入傷營

氣營氣起於中焦恐較氣反助邪熱也。

麻黃加朮湯金匱 治淫家身體煩疼日晡發熱。

麻黃湯加白朮四錢。

醫通卷十六

麻黃

六 思得堂藏

淫家身疼煩熱。淫是軀殼受傷。即用麻黃湯開發肌表。不

得白朮健運脾氣。則淫熱雖從汗泄。而水穀之氣依然復

為痰淫。流滯中外矣。然未必生用。若經妙焙。但有健脾之

能而無祛淫之力矣。

古今錄驗橘皮湯金匱 治寒邪傷肺欬嗽吐血。

麻黃湯換肉桂加橘皮當歸紫苑黃芩。

麻杏甘石湯玉函 治發汗後汗出而喘無大熱者。

麻黃湯去桂枝加石膏半兩。

此麻黃湯去桂而兼越脾之意。而祛上焦淫熱痰氣與苓

桂朮甘湯互發。彼藉苓朮專祛心下之支飲。此藉石膏專

祛膈上之淫熱也。

麻黃杏仁薤白甘草湯玉函 治風淫一身盡痛發熱日晡

所刺者

麻黃湯去桂枝加薤白半兩

杏子湯 治風水虛脈浮發其汗即已

麻黃湯去桂枝又易杏仁為用

甘草麻黃湯金匱 亦治裏水

麻黃湯去桂枝杏仁方用甘草二錢麻黃四錢

葛根湯玉函 治太陽陽明合病自利或發熱無汗喘滿不食

麻黃湯去杏仁增桂枝一錢加葛根四錢芍藥二錢生薑三片大棗三枚

此即麻黃桂枝二湯合用於中但去杏仁增葛根為陽明經證之專藥以其能輔麻黃大開肌肉也去杏仁者既開

醫通卷十六

麻黃

七

思得堂藏

肌肉於外不當復泄肺氣於內也聖人立法一方一味各有斟酌非刻意研求焉能測識其微而為倉生司命哉

三拗湯局方 治風寒傷肺而欬候行欬肺而壅嗽喘急

麻黃湯去桂枝用麻黃不去甘草杏仁連皮等分更加桔梗荆芥名加味三拗湯

麻黃附子細辛湯玉函 治少陰病脈沉發熱及水腫喘欬

麻黃湯去桂枝杏仁甘草加附子一錢細辛半錢

附子散千金 治中風子臂不仁口面喎僻

麻黃附子細辛湯加乾薑桂心人參防風芍藥羚羊角

為散水煎加竹瀝日服一劑効

倉公當歸湯 治賊風口喎角弓反張成瘕

麻黃附子細辛湯加當歸防風獨活木酒和煎口不開

者格口內湯一服當蘇二服小汗三服大汗

麻黃附子甘草湯玉函金匱名 治少陰病脈沉發熱二三日無裏證及水腫脈沉

麻黃湯去桂枝杏仁加附子一錢

千金大棗湯 治歷節疼痛

麻黃附子甘草湯加黃耆薑棗日三服汗之

發表重劑莫如麻黃溫經散藥首推附子表裏神瀉功用

天淵仲景於少陰病脈沉發熱二味合用單刀直破堅壁

而建補天浴日之功在一二日間勢難叵測則用細辛以助其銳二三日無裏證則用甘草以緩其治各有溫度金匱於水腫治例亦用二湯喘嗽則兼細辛以開肺氣之壅

脈沉則兼甘草以緩腎氣之逆與初起防變二三日無裏

醫通卷十六

麻黃

八

思得堂藏

證互發而倉公乃於麻附細辛方中加當歸防獨以療賊風口喎發瘕千金復以麻附甘草湯內加黃耆薑棗以治歷節疼痛總賴麻黃附子輒外輒內迅掃其邪果日當陽何有陰靈之患乎

麻黃升麻湯玉函 治冬溫誤行汗下下部脈不至咽喉不利唾膿血

利唾膿血

麻黃湯去杏仁用麻黃二錢桂枝甘草各八分加升麻

當歸各一錢知母黃芩各二錢天門冬芍藥乾薑

白朮茯苓石膏各八分

此方專主陽熱陷於厥陰經脈為邪氣所遏故下部脈不至而證見咽喉不利唾膿血也邪遏經脈非兼麻黃桂枝之制不能開發肌表以泄外熱非取白虎越脾之法不能

清潤脾胃以化寒熱。更以芍藥甘草湯。寒因寒用。謂之應敵。甘草乾薑湯。合腎者湯。熱因熱用。謂之留導。以病氣屬肺。不得不以逆順藥治也。

華蓋散局方

治肺受風寒。欬嗽聲重。煩滿昏眩。脈浮數。

麻黃湯去桂枝。方用麻黃杏仁各一錢。甘草五分。加蘇子赤茯苓。橘紅桑白皮各一錢。生薑二片。紅棗一枚。

九寶湯

治經年久嗽不愈。脈浮起於外感者。

麻黃湯加紫蘇薄荷橘紅桑白皮大腹皮等分。生薑三片。烏梅肉半箇。

麻黃連翹赤小豆湯

治濕熱發黃。

麻黃湯去桂枝減麻黃一錢。加連翹即連二錢。赤小豆一合。生梓白皮一兩。生薑三片。大棗四枚。水煎分溫三

麻黃湯

服。半日服盡。

越脾湯

金匱。治風水惡寒。一身悉腫。脈浮不渴。續自汗出。無大熱者。

越脾湯

麻黃湯去桂枝杏仁。倍麻黃。加石膏八錢。生薑三片。大

棗五枚。水煎溫分三服。

越脾者。發越溼土之邪氣也。水溼之氣。因風流播中外。兩

相激搏。勢難分解。不得不藉麻黃祛之。從表而越。石膏清

之從裏而化。內經開鬼門法也。木方加味。以助發理。開汗

大泄。於加木方中更加附子。以治脚痺惡風。開中寓開。信

手合微。其大背龍小續命麻杏甘石湯。或加桂枝以和營。

或加參附以鼓氣。或加杏仁以泄滿。總以此方為樞局也。

或問表無大熱。何得輕用麻黃。內無煩渴。何得輕用石膏。

蓋惡寒身腫自汗。渾是溼氣鬱著。非風以播之。不能解散。麻黃在寒傷營劑中。則為正治。在開痺溼門中。則為導引。石膏在白虎湯中。則為正治。在越脾青龍續命方中。則為導引。不可以此廢彼也。

越脾加木湯

金匱。治內極熱。則身體津脫。腠理開。汗大泄。

屈風氣。下焦脚弱。

越脾湯加白朮四錢。

越脾加木附湯

金匱。治脚痺惡風。

越脾湯加白朮四錢。附子一錢。

越脾加半夏湯

金匱。治肺脹欬而上氣。

越脾湯加半夏半兩。

大青龍湯

玉函。治營衛俱傷。脈浮緊。汗不得出而煩躁。

越脾湯

金匱。治吐後渴飲不止。脈緊頭痛。

文蛤湯

金匱。治吐後渴飲不止。脈緊頭痛。

越脾湯麻黃減半。加文蛤半兩。杏仁十五枚。

續命湯

金匱。治中風。身不能自收。并治但伏不得臥。欬逆上氣。面目浮腫。

麻黃

桂枝千金局方。當歸。

人參

石菖蒲。乾薑。

甘草

三錢。芍藥一錢。杏仁三十枚。干。

右九味水煎溫服。當薄覆背。惡風。汗出則愈。不汗更服。

無所禁。勿當風。○千金續命湯。無人參。有防風黃芩芍藥。

○續命風引湯。多防已。防風獨活附子。治中風。癱瘓。不知。

人。狂言舌腫出。○千金枝源續命湯。多白朮茯苓大棗。為。

十二味

小續命湯千金 治中風外頭六經形證。

續命湯去石膏加芍藥防風黃芩各一錢四分防已一錢

錢附子七分生薑五片大棗一枚崔氏外臺不

無汗惡寒倍麻黃杏仁有汗惡風倍桂枝芍藥無汗身熱

不惡寒去附子倍甘草加石膏知母有汗身熱不惡風倍

桂枝黃芩加葛根無汗身涼脈沉細倍附子加乾薑有汗

無熱畏寒脈沉倍桂枝附子甘草肢節痠痛麻木不仁脈

緩加羌活連翹加減法

張景岳曰按歷代相傳治中風之方皆以續命等湯為主

考其所自則始於金匱要略附方中有古今錄驗續命湯

然此必宋時校正之所增而非仲景本方也此自隋唐以

醫通卷十六

續命

十一

思得堂藏

來則孫氏千金方乃有小續命大續命西州續命排風等

湯故後世宗之無不以此為中風主治矣夫續命湯以麻

黃為君而與薑桂並用本發散外邪之方至小續命大續

命西州續命等湯則復加黃芩以兼桂附雖曰相制而水

火冰炭道本不同即有神妙終非余之心服者其他無論

獨怪乎河間東垣丹溪三子者既於中風門皆言此病非

風矣何於本門並首列小續命湯而附以加減之法又何

前後之言不相應耶

大續命湯千金

治中風肥盛多痰多渴肢體不遂

續命湯去人參加黃芩荆瀝一作竹瀝

西州續命湯千金

治中風邪身不能自收口不能言冒

眩不識人拘急不能轉側

大續命湯去荆瀝

八風續命湯千金 治卒中半身不遂手足拘急

續命湯去麻黃芍藥加獨活黃芩水煎溫服覆汗不得

汗倍麻黃

排風湯千金 治中風肢體煩疼皮膚不仁

續命湯去人參石膏乾薑加防風芍藥白朮茯苓獨活

白鮮皮生薑

升麻湯一名升麻

治陽明經邪發熱及痘疹初起

升麻一錢

葛根

白芍各錢半

甘草炙八分

右四味水煎溫服

升葛為陽明經之嚮導陽明專主肌肉恐開泄太過即以

醫通卷十六

升麻

十一

思得堂藏

白芍欲護營血甘草調和中氣所以解利本經邪熱及時

行痘疹皆為專藥然在起服後禁用

秦艽升麻湯 治中風口日喎斜

升麻湯加秦艽人參桂枝白芷防風葛白

升陽散火湯 治胃虛過食寒物抑遏陽氣於脾土中畏寒

發熱火鬱則發之也

升麻湯加羌活獨活人參柴胡防風用生甘草

火鬱湯 治火鬱不舒瘰癧惡寒不止

升麻湯用生甘草加柴胡防風葛白

按此即升陽散火湯去羌活獨活人參加葛白內經所謂

惡寒非寒火鬱則發之也

沖和順氣湯 治內傷脾胃氣惡寒發熱食少便溏

升麻湯加人參羌活防風蒼朮白朮薑棗。

升陽補氣湯 治胃氣不足脾氣下陷氣短無力不時發熱。

早飯後煩悶須要眠睡五心煩熱。

升麻湯去葛根加羌活獨活防風柴胡厚朴澤瀉薑棗。

和解湯 治痘三日前後起發遲。

升麻湯加人參川芎羌活防風。

連翹升麻湯 治痘發太多涼內解毒。

升麻湯加連翹精梗牛旁木通薄荷燈心竹葉。

小柴胡湯 玉函千金 治少陽受邪往來寒熱脈弦脇痛而嘔。

柴胡三錢

甘草一錢

黃芩

半夏二錢

人參

生薑五片

醫通卷十六

柴胡

十三

思得堂藏

大棗四枚

水煎去滓溫服。

治傷寒有五法曰汗曰吐曰下曰溫曰和皆一定之法而

少陽例中小柴和湯專一和解表裏少陽為陰陽交界邪

傳至此已漸向裏故用柴胡升發其邪使從外解即以入

參擋截於中不令內犯更以半夏黃芩清解在裏之熱痰

生薑大棗併祛在表之邪氣又須甘草協轉參柴共表臣

正辟邪之功真不易之法無容擬議者也其方後加減乃

法中之法定而不移至於邪氣犯本脾胃受病而加龍骨

牡蠣丸藥誤下而加芒硝屢下不解引邪入裏心下惡鬱

鬱微煩而用大柴胡為法外之法變通無定不可思議者

也獨怪世醫用小柴胡一藥除去人參且必加枳桔耗氣

之品此非法之法習俗相承墮於橫議者也何惟乎道衰

日卑風斯日下哉

柴胡加龍骨牡蠣湯 玉函 治少陽經邪誤下犯本胸滿驚

煩。

小柴胡湯去黃芩甘草加桂枝茯苓龍骨牡蠣鉛丹大

柴胡加芒硝湯 玉函 治少陽過經不解。

小柴胡湯加芒硝三錢。

大柴胡湯 玉函 治寒熱便秘。

小柴胡湯去人參甘草加芍藥枳實各一錢大黃二錢。

四逆散 玉函 治熱邪傳入少陰厥逆。

小柴胡湯去人參半夏黃芩薑棗加枳實芍藥等分為

醫通卷十六

柴胡

十四

思得堂藏

散飲服方寸匕日三服。

凡病各有真假真者易見假者難辨差之毫釐迥乎冰炭

試以傷寒之厥逆辨之其始病便見者為直中寒厥五六

日熱除而見者為傳經熱厥寒厥真而熱厥假也熱厥之

治惟四逆散得之細推其邪從陽入陰必由少陽而達亦

無不由太陰克入少陰之理故首推柴胡為來路之引經

亦藉以為去路之嚮導用枳實者掃除中道以修整正氣

復回之路也夫陰為陽後陽被陰埋舍和別無良法故又

需芍藥以和其營甘草以和其胃胃氣和而真陽散布假

證愈而厥逆自除但方後加減紛亂寒熱互用非斷證而

推逆順之機難以語此如悸加牡枝小便不利加茯苓池

利下重加薤白皆陰為陽援隨其攸利而開泄之效利加

五味乾薑。腹痛加附子。是陽被陰埋。急須煥發以克復之。與厥陰例中。當歸四逆加吳茱萸同法。須知真證正治。假證間取。總不出此方之模範也。至若二經熱邪亢極而厥。自有大承氣下奪之法。又非四逆散當歸四逆之和法可例治也。

柴胡去半夏加栝實湯 全原 治瘧多渴。

小柴胡湯去半夏加栝實根。

柴胡桂枝乾薑湯 玉函金匱 治瘧寒多微有熱。

小柴胡湯去人參半夏薑棗加桂枝乾薑栝實牡蠣。

柴胡桂枝湯 玉函 治太陽少陽併病合病。寒熱及瘧。

小柴胡湯加桂枝芍藥 即小柴胡湯

醫通卷十六 柴胡 十五 思得堂藏

柴胡四物湯 治婦人經行感冒。熱入血室。

小柴胡湯合四物湯。

柴胡枳桔湯 一名枳桔 治少陽寒熱痞滿。

小柴胡湯加枳殼桔梗。

增損柴胡湯 治少陽血虛寒熱不止。

小柴胡湯去黃芩加川芎芍藥陳皮。

柴胡清肝散 治怒火憎寒發熱。肝膽風熱瘡瘍。

小柴胡湯去半夏薑棗加山梔川芎連翹桔梗。

人參敗毒散局方 治時疫初起發熱。及感冒發散後熱不止。

小柴胡湯去半夏黃芩大棗加茯苓羌活獨活前胡川芎枳殼桔梗。

問時疫初起。用人參敗毒得助邪為虐之患乎。又何以治非時寒疫。汗後熱不止。詳此二者。一為全盛之毒。一為未盡之邪。胡一方可混治耶。蓋時疫之發。或值歲氣併臨。或當水土殊路。種種不侔。然必入傷中土。土主百骸。無分經絡。毒氣流行。隨處輒陷。最難回測。乘邪氣未陷時。儘力峻攻。庶克有濟。其立方之妙。全在人參一味。力致開闢。始則鼓舞羌獨柴芩。各走其經。而與熱毒分解之門。繼而調禦津精血氣。各守其鄉。以斷邪氣復入之路。與桂枝湯中芍藥護營之意不殊。知桂枝人參湯。小柴胡湯。參蘇飲。未嘗不用人參以協濟表藥成功也。但其所主。惟天行大頭。乃為合轍。加荆防牛旁薄荷。各刑防敗毒。為捻頸瘟。咽喉腫痛之專藥。即上二證。在熱毒既陷已後。及北方黑骨

醫通卷十六 柴胡 十六 思得堂藏

溫等總與此方無預也。至若傷寒傳變之邪伏氣鬱發之證。淫瀉微分。略無交涉。而先哲嘗借以治寒疫汗後餘熱。往往獲効者。以非時之邪。混同經中。屢行疎表不應。邪伏幽隱不出。非藉人參之大力。不能載之外泄也。逮至疫痢。皆熱口噤。亦宜此方加陳倉米引領入胃。則毒隨藥化。得非人參輔佐之力歟。獨怪近世醫流。偏謂人參助長邪氣。除去不用。專行羣隊攻發。鼓激壯火飛騰。不至竭絕真陰不已。茲緣同學質問。因述述以政。

荆防敗毒散 治大頭蝦蟇瘟證。

含藥湯 治疫痢發熱。

人參敗毒散加荆芥防風薄荷牛旁子。

清脾飲 治食滯脈實溺亦便秘

小柴胡湯去人參加白朮青皮厚朴枳實

按清脾飲清理脾家痰氣宿滯及蘊積少陽經中風熱之邪乃於小柴胡中除去人參益入青皮白朮厚朴枳實一派剋削之味在藜蘆之人固為相宜若膏粱參養柔脆者即有留滯亦難勝此用者審之

星香湯 治中風痰涎潮塞不省人事服熱不得者

南星三錢 木香半錢 生薑十片

水煎服無時

省風湯局方 治卒中口噤不能言口眼喎斜筋脈抽掣風痰壅盛

星香湯去木香用陳膽星一錢五分加防風一錢生牛

醫通卷十六 星香 十七 思得堂藏

夏黃芩生甘草各七分半

大省風湯局方 治卒中痰逆嘔泄脈沉厥冷

星香湯去木香用陳膽星二錢加防風獨活生附子各一錢全蠍生甘草各五分

按此即省風湯去半夏黃芩加獨活附子全蠍二湯雖分寒熱主治並用生薑十片以開發風痰不可改也

三生飲局方 治中風卒倒口眼喎斜半身不遂寒閉不省人事痰氣上壅

星香湯本方用生南星一兩木香三錢半加生川烏生附子各五錢搗羅為散每服五錢同生薑十片煎服氣虛卒倒另加人參兩許為助之

三生飲中風門中破的之方雖本星香而實得大省風之

妙用與續命湯相為特角專門草鼎各有專功貴在先聲

奪氣無容庸師擬議

木附湯 治寒濕體痛自汗身寒

白朮一兩 附子半兩

右二味水煎去滓放涼分三服

參附湯 治脾腎陽虛厥逆自汗

木附湯去木加入參一兩

耆附湯 治元陽衰弱虛風自汗

木附湯去木加黃耆一兩

三因治自汗用耆附木附參附三方皆用附子五錢餘俱一兩分三服服之其衛外之陽不固則用耆附脾中之陽不固則用木附腎藏之陽不固則用參附凡屬陽虛自汗

醫通卷十六 木附 十八 思得堂藏

不能舍此三方而耆附可以治虛風木附可以治寒濕參附可以壯元神三方亦相因為用祇用二物不雜他味取

力銳以擅專功也其外麻附桂附薑附椒附星附及大黃附子等法度森森分治九域各得其宜曰天之神妙用豈尋常可擬議乎

桂枝附子湯 治風濕身重不能轉側

木附湯去木加桂枝一兩二錢甘草六錢生薑一兩六錢

白朮附子湯 治風濕身重不能轉側

得風伸近之則效或身微腫

木附湯本方

一兩。大棗十二枚。分溫三服。

甘草附子湯 玉函 治風溼大便秘。小便自利。

木附湯本方用木附各六錢。加桂枝一兩二錢。甘草六錢。分溫三服。

桂枝附子。白朮附子。甘草附子。三方皆本木附湯方而立。一加桂枝。甘草。以治身重煩疼。不能轉側。其病全在軀殼。無關於裏。故於本方除去白朮。使桂枝專行軀殼。而振驅風逐溼之功。用甘草以緩桂枝之性。不使其汗大泄。汗大泄。則風去而溼不去也。風在表。法在緩攻。故用生薑之辛以散之。大棗之甘以緩之。則營衛之開闔有權。風溼無復入之虞矣。○一加甘草。以治骨節煩疼。等證。澤是溼流關節之患。故於本方但加甘草。以緩木附。

醫通卷十六

宋附

思得堂

之性。薑棗以司開闔之機。風之見證本輕。故無藉於桂枝也。○一加桂枝。甘草。以治風溼大便秘。小便自利。以病氣聚於內。故於本方加桂枝助附子。以杜內賊之風溼。加甘草助白朮。以和二便之偏滲。故大便雖堅。法無下奪之理。

附子湯 玉函 治少陰病始得之。背惡寒。脈沉身體骨節痛。

木附湯加茯苓白芍各一兩。人參六錢。

真武湯 玉函 治少陰下利腹痛。或欬嘔。小便不利。

木附湯本方白朮六錢。附子一枚。炮。加茯苓芍藥生薑各一兩。○欬者加五味子細辛乾薑。小便利者去茯苓。下利去芍藥。加乾薑。嘔者去附子加生薑。

詳附子湯與真武湯二方止差一味。一治少陰病始得之。

便背惡寒。口中和。知其入與陽素虧。故用人參以助附子之雄。茯苓以行白朮之滯。又恐生附性悍。傷犯真陰。故用芍藥以緩持營血。營血得安。而真陰受蔭矣。○一以少陰病二三日不已。至四五日腹痛自利。四肢沉重。或欬或嘔。其人內外皆是水氣。故用生薑茯苓。本附以行水。為務。水去則真陽自復。當知此證皆由水氣鬱遏其陽。陽氣原不大虛。所以方中未附。僅用附子湯之半。又恐辛燥。有傷其陰。因以芍藥。保其營血。與附子湯之立法不殊。即過汗傷經。振振欲擗地者。亦不出是方也。

附子散 治陰瘕。

木附湯水方二味各用一兩。加桂心川芎獨活各半兩。為散。每服三四錢。薑棗湯而服。

醫通卷十六

宋附

思得堂

四逆湯 玉函 治陰寒脈沉。四肢厥冷。嘔吐泄瀉。

附子 生用 乾薑 五錢 甘草 六錢

右三味。水煎分溫再服。強人可服大附子一枚。乾薑一兩。

四逆加人參湯 玉函 治惡寒脈微而利。

四逆湯加人參三錢至一兩。

茯苓四逆湯 玉函 治發汗若下之。病仍不解。煩躁。

四逆湯加人參三錢至一兩。茯苓六錢。

通脈四逆湯 玉函 治少陰病下利清穀。裏寒外熱。

四逆湯倍用乾薑。

通脈四逆加豬膽汁湯 玉函 治吐已下斷。四肢拘急不解。脈微欲絕者。

四逆湯倍乾薑加豬膽汁。

白通湯玉函 治少陰病下利脈微

四逆湯去甘草 本方豈附各三錢加葱白四莖

白通加豬膽汁湯玉函 治少陰病下利脈微無脈乾嘔而

煩

四逆湯去甘草 本方豈附各用三錢加葱白四莖人尿

五合豬膽汁一合

乾薑附子湯玉函一名 治少陰病晝日煩躁

四逆湯去甘草

四逆湯用豈附之辛熱恢復其陽即用甘草以緩其性使

之徐行以達四末尋為始病便見脈逆脈沉不發熱者而

設即太陰自利腹痛厥陰下利拘急總不出此以厥陰之

邪無不由少陰而人也非但三陰俱可取用并太陽之頭

痛發熱脈沉亦須用此先救其裏然後解表方為合戰而

少陰病晝日煩躁用乾薑附子湯即四逆湯中除去甘草

專用二味以迅掃陰寒與白通立法無異以意逆之四逆

一方太陽尚所做賴白通二例與厥陰獨無干預耶雖厥

陰經中但有通脈而無白通詳二方止互更一味通脈有

甘草而無葱白白通有葱白而無甘草一取甘緩以徐復

欲絕之脈一去甘草以急追將脫之陽皆用豬膽以除假

熱白通專用葱白以通真陽又恐葱白性升引領豈附上

儼故以人尿折而下之其通脈本方雖無葱白方後便有

面赤加葱之例葱白既可加用人尿獨不可加用手況

陰內藏風水得無面赤微陽可用葱白之治乎上法皆

流之境無問直中沉寒微熱煩疾寒氣至此轉運云

此連虛非始病便見脈沉發熱之比縱兩感勢劇尚有

黃附子細辛湯儘力可救與前太陽例中先後救裏解

之法互加揮發辨治之微惟在頭之痛與不痛為確據也

精義至此盡精剖微後世界不加察妄立兩感之方總未

達長沙萬一耳

回陽返本湯 治陽虛躁渴面赤戴陽欲坐卧泥水中脈來無力欲絕者

四逆湯加人參麥門冬五味子厥茶陳皮

面赤者下虛也加葱七莖黃連少許用泥漿水澄清煎服

入白蜜五匙冷服取汗

此以白通合生脈治陰極似陽最為神妙加用厥茶漿水

等味當矣但陳皮一味似屬不必當知人參既合豈附其

勢欲張矣藉陳皮發揚之力哉

羌活附子散 治胃冷呃逆

四逆湯去甘草 本方用附子半兩乾薑二錢加羌活

香各半兩木香一錢為散每服二錢入鹽一茶匙水煎微

溫服

木香散 治虛寒滑泄不止

四逆湯本方用甘草乾薑各二兩附子一兩加丁香木

香肉豆蔻廣藿香訶子肉赤石脂各一兩為散每服三

錢陳米湯下

冷香飲子 治中暑內熱生冷飲食腹痛渴利

四逆湯去乾薑本方甘草附子各一錢加草果仁橘紅

各一錢生薑五片浸冷服之

漿水散 治中暑泄瀉多汗脈弱

四逆湯本方三味各用五錢加肉桂五錢良薑半夏各

二錢五分二味俱漿水煎去滓令服

按漿水乃秫米和麴釀成如醋而淡今人點牛乳作餅用之或用真粉作內萊豆者尤佳

茵陳四逆湯 治陰黃脈沉細肢體逆冷腰以上自汗

四逆湯本方用炮薑一錢五分附子甘草各一錢加茵陳蒿一錢五分

茵陳附子乾薑湯 治陰黃脈沉細

四逆湯去甘草用熟附三錢炮薑二錢加白朮二錢豆蔻枳實半夏茯苓澤瀉橘紅各八分茵陳蒿一錢生薑五片

醫通卷十六

四逆

廿三 思得堂藏

理中湯九玉函全照 治胸痺心胸痞氣霍亂吐瀉不渴一

切脾胃虛寒嘔吐清水飲食不化完穀不化

乾薑炮半錢至一錢 人參三錢至一錢 白朮炒焦一錢至二錢

甘草炙半錢至一錢

右四味水煎去滓溫服。陽胃虛脫完穀不化者煉白蜜

九彈子大沸湯研和滓日三夜二服名理中丸

子理中湯 治下焦虛寒火不生土泄瀉嘔逆

理中湯加熟附子

按方中用參三錢僅可用附一錢若峻用溫補用參一兩

方可加附三錢如尋常小劑用參一錢止可用附三分設

不審此而附過於參下咽之後壯火食氣反招竭澤之殃

製劑不可不識

桂枝人參湯玉函 治扶熱利不止心下痞軟

理中湯加桂枝

枳實理中湯 治胃虛扶食及諸胸木虛不能受攻

理中湯加枳實茯苓。千金加半夏厚朴。治胸中悶亦可用陳米飲或茶。以丸服。

治中湯 治冷食結滯

理中湯加青皮陳皮

連理湯 治胃虛挾食痞滿發熱

理中湯加黃連茯苓

理苓湯 治胃虛食滯喘脹浮腫小便不利

理中湯合五苓散

乾薑人參半夏丸金匱 治妊娠胃寒嘔吐不止

醫通卷十六

理中

廿四 思得堂藏

理中湯去白朮甘草本方乾薑人參各一兩加半夏一兩

兩薑汁糊丸梧子大飲服十九日三服

甘草乾薑湯玉函 治胃中陽虛嘔乾煩躁吐逆

理中湯去人參白朮

三物大建中湯金匱 治胸中大寒嘔吐不能食及少腹冷

積作痛

理中湯去白朮甘草本方乾薑用四錢人參用三錢加

蜀椒合去明目者水煎去滓內膠飴半杯微火再

溫服。炊頃少飲稀粥一升後更服當一日食糜

之

桂枝湯本湯金匱一作 治腰以下重著而痛

理中湯去人參加茯苓

腎者者腎受溼者而重痛故以燥溼為務非腎虛腰痛可
澤用也

滲溼湯局方 治溼滯經絡腰下重著而痛

理中湯去人參加蒼朮茯苓橘紅丁香薑棗
大順散局方 治暑熱引飲過多霍亂吐瀉

理中湯去人參白朮本方甘草乾薑各半兩加肉桂香
仁去及 各三錢先將甘草同白砂炒次入乾薑却下香
仁炒過篩去砂合桂為散每服三錢沸湯調服

烏梅丸玉函 治蛇厥

理中湯去白朮甘草加烏梅黃連黃蘗附子蜀椒桂枝
細辛當歸以苦酒漬烏梅一宿蒸之五升米下飯熟去
核搗成泥與蜜杵丸先食飲服十九日三服稍加至二

醫通卷十六 理中 廿五 思得堂藏

十九禁生冷滑物臭食等。千金治久痢諸藥不效本
方去細辛附子人參黃蘗桂枝換桂心

半夏瀉心湯玉函 治心下痞滿不痛

半夏五錢 乾薑炮 甘草炙

人參 黃芩各三錢 黃連一錢

大棗四枚

右七味水煎溫分三服

生薑瀉心湯玉函 治心下痞硬下利腹鳴

半夏瀉心湯減乾薑二錢加生薑四錢

甘草瀉心湯玉函 治胃虛痞滿誤下利不止

半夏瀉心湯去人參加用甘草一錢

黃連湯玉函 治胃中寒熱不和心下痞滿

黃連湯玉函 治胃中寒熱不和心下痞滿

黃連湯玉函 治胃中寒熱不和心下痞滿

黃連湯玉函 治胃中寒熱不和心下痞滿

黃連湯玉函 治胃中寒熱不和心下痞滿

黃連湯玉函 治胃中寒熱不和心下痞滿

黃連湯玉函 治胃中寒熱不和心下痞滿

黃連湯玉函 治胃中寒熱不和心下痞滿

黃連湯玉函 治胃中寒熱不和心下痞滿

黃連湯玉函 治胃中寒熱不和心下痞滿

半夏瀉心湯去黃芩減人參一錢加桂枝三錢
乾薑黃芩黃連人參湯玉函 治胃虛客熱痞滿

半夏瀉心湯去半夏甘草大棗加川黃連二錢

七氣湯局方 治七情鬱結於中胸腹絞痛服寬胸破氣藥
轉劇者投此即効

人參三錢半至 甘草一錢 肉桂一錢至

半夏一錢至 生薑七片

右五味水煎空心服。千金加吳茱萸各奔氣湯

深師七氣湯 治七氣為患氣寒血熱嘔渴痞滿

七氣湯加乾薑吳茱萸枳實橘皮桔梗芍藥乾地黃黃
芩

三因七氣湯 治七氣致病嘔逆痞悶腹脇脹痛

醫通卷十六 七氣 廿六 思得堂藏

七氣湯加厚朴白芍茯苓橘皮蘇葉大棗

指迷七氣湯 治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻衝
作痛

七氣湯去人參易觀桂加香附青皮陳皮桔梗蓬朮
香薷智仁大棗

大七氣湯 治積滯癥瘕結聚腹中上下心腹疔痛小腹脹
滿二便不利

指迷七氣湯去半夏薑棗加山稜

橘皮乾薑湯 治乾嘔吐逆吐涎沫而氣

七氣湯去半夏加乾薑橘皮通草

蘇子降氣湯局方千金本 治脚弱上氣月夜涎壅盛肺滿
喘嗽服之氣降即安

蘇子降氣湯局方千金本 治脚弱上氣月夜涎壅盛肺滿
喘嗽服之氣降即安

蘇子降氣湯局方千金本 治脚弱上氣月夜涎壅盛肺滿
喘嗽服之氣降即安

蘇子降氣湯局方千金本 治脚弱上氣月夜涎壅盛肺滿
喘嗽服之氣降即安

蘇子降氣湯局方千金本 治脚弱上氣月夜涎壅盛肺滿
喘嗽服之氣降即安

蘇子降氣湯局方千金本 治脚弱上氣月夜涎壅盛肺滿
喘嗽服之氣降即安

蘇子降氣湯局方千金本 治脚弱上氣月夜涎壅盛肺滿
喘嗽服之氣降即安

蘇子降氣湯局方千金本 治脚弱上氣月夜涎壅盛肺滿
喘嗽服之氣降即安

蘇子降氣湯局方千金本 治脚弱上氣月夜涎壅盛肺滿
喘嗽服之氣降即安

蘇子降氣湯局方千金本 治脚弱上氣月夜涎壅盛肺滿
喘嗽服之氣降即安

七氣湯去入參加蘇子三錢橘紅一錢當歸前胡厚朴各五分太棗一枚

溫肺湯 治肺胃虛寒喘嗽嘔逆大便不實

七氣湯加橘紅乾薑本香鍾乳。局方去入參木香鍾乳加細辛杏仁芍藥五味子

半夏溫肺湯 治寒痰咳嗽心下汪浮胃氣虛寒者

七氣湯加橘紅赤茯苓細辛桔梗旋復花白芍

參蘇溫肺湯 治肺受寒而喘嗽
七氣湯加橘紅木香桑白皮紫蘇茯苓白朮五味子冬月更加不去節麻黃三分

崔氏八味丸 金匱 治腎藏真陽不足火不靖源

熟地黃 八兩 山茱萸肉 乾山藥 微焙各四兩

醫通卷十六 八味 廿七 思得堂藏

牡丹皮 白茯苓 去皮 白澤瀉 去毛各三兩

附子 童便浸炙 肉桂 去粗皮勿見火各一兩

右八味爲末煉白蜜丸梧子大每服五七十丸空心淡鹽湯臨卧時溫酒下以美饌壓之

腎氣丸 金匱

八味丸肉桂易桂枝

錢氏六味丸 一名六味 治腎水真陰不足

八味丸去桂附方中熟地黃用縮砂蜜八錢製

按金匱八味腎氣地黃本無縮砂之製以中有附子之雄

肉桂之氣也錢氏裁去二味治小兒解頤等證雖曰素

腎虛而純陽未動地黃不製可也後世借治真陰不足乃

用縮砂製地黃不特無減食作瀉之虞服後連噉數聲氣

轉食運脾腎安和其陽生陰長之妙世都莫知茲特表而出之

加減六味丸 治陰虛咳嗽吐血骨蒸及童勞肺熱消瘦等證

六味丸去山茱萸加歲龜四兩亦可作膏

河車六味丸 治泉質素虛將欲成勞

六味丸本方用紫河車熬膏丸服

都燕丸 治腎水不固咳嗽精滑

八味丸去桂附加五味子一兩

七味丸 治腎虛火不靖源遊散在上在外

八味丸去附子一兩

加減八味丸 治腎虛火不靖源開熱效嗽

醫通卷十六 八味 廿八 思得堂藏

八味丸去附子加五味子一兩

濟生腎氣丸 治腎氣不化小便滲數

八味丸本方用茯苓三兩熟地四兩山藥山萸丹皮澤瀉肉桂各一兩附子五錢加牛膝車前各一兩

此本金匱腎氣方中諸藥各減過半惟桂苓二味仍照原

方爲宜布五陽開發陰邪之端藥更加牛膝車前爲太陽

厥陰之嚮導以肝爲風木之藏凡走是經之藥性皆上升

獨牛膝通津利氣下走至陰車前雖行津液之府而不傷

犯正氣故濟生方用之許金匱腎氣用桂枝而不用肉桂

者陰氣固結於內勢必分解於外則腎氣得以流布周身

而此既用牛膝引入至陰又藉生牛膝助三焦不寒淡瀉

不耗膀胱亦得以化所以倍用肉桂暗藏桂苓丸之妙用

愈於五苓十倍矣。但方中牛膝滑精氣不固者勿用。

清金壯水丸 治腎藏水虧火旺。蒸熱欬嗽。

八味丸去桂附。加麥門冬三兩。五味子一兩。

納氣丸 治脾腎皆虛。蒸熱欬嗽。倦怠少食。

八味丸去桂附。加沉香一兩。砂仁二兩。如泄瀉少食者。

用乾山藥末調糊代蜜為丸。

香茸八味丸 治腎與督脈皆虛。頭旋眼黑。

八味丸去桂附。加沉香一兩。鹿茸一具。

十補丸 治稟賦陽虛。下體無力。小兒解額。腰軟膝蓋不生。

八味丸加鹿茸一具。五味子一兩。

枳木湯 金匱 治水腫心下如盤。邊如旋盤。

枳實十枚 白朮二兩

醫通卷十六

枳木

廿九 思得堂錄

右二味水煎溫分三服。腹中軟。即當散也。

枳木丸 治脾不健運。飲食不化。

枳木湯用枳實一兩。白朮二兩。荷葉裹米燒飯為丸。米

湯下七八十九。

海藏曰。東垣枳木丸。本仲景枳木湯。至晚年道進。用荷葉

燒飯為丸。取留滓於胃也。太無曰。金匱治水腫心下如盤。

故用湯以湯滌之。東垣治脾不健運。故用丸以緩消之一

方各有深意。不可移易。

香砂枳木丸 治氣滯宿食不消。

枳木丸加木香砂仁各半兩。

橘半枳木丸 治痰食兼併不化。

枳木丸加橘皮半夏各半兩。

深師消飲丸 治停飲胸滿嘔逆腹中水聲不思飲食。

枳木丸加茯苓一兩。炮薑半兩。薑汁調。神麴煮浮糊丸。

梧子大。淡薑湯或沸湯米湯任下三四十丸。

按此即腎著湯去甘草之緩中。易枳實以導滯也。

平胃散 局方 治胃中宿食不化。藜蘆人宜之。

蒼朮 治沒去皮及麻油 甘草 炙各 厚朴 去皮薑 汁炒

陳皮 治去 甘草 炙各

右四味為散。每服四五錢。加生薑三片。水煎溫服。

香連平胃散 治食積發熱。腹痛作瀉。

平胃散加薑汁炒川連二兩。木香一兩。

不換金正氣散 局方 治時氣不正。感冒夾食。

平胃散加藜蘆香半夏。時氣加香豉。

醫通卷十六

平胃

三十一 思得堂錄

霍香正氣散 局方 治水土不服。感冒時氣夾食。

平胃散換白朮。加藜蘆紫蘇半夏茯苓白芷桔梗大腹

皮 治 古本無大腹 皮有紫朮

人參養胃湯 局方 治食滯痞滿。寒熱痞痛。

平胃散加藜蘆香半夏人參茯苓草果薑棗烏梅。

參苓平胃散 治脾虛飲食不化。大便不實。

平胃散加人參茯苓。

白鳳膏 治少年氣血不足。因飲食微飽所傷。致成虛損。形

體羸弱。日晡潮熱。腹脹氣急。脈來弦數者。

平胃散四兩。加麥冬各一兩。京棗四兩。六核。逐一填入

前藥入鳥嘴白鴨腹內。男雌女雄。製法如烏雞丸。

此葛可久方。丸以蒸餅取緩帶胃脘。調和中氣之傷也。蓋

參苓平胃。原非補益腎水之藥。予嘗借此以治飲食內傷。中氣不和。發熱羸瘦之證。往往獲効。詳方名曰鳳者。以見字下几字。加於鳥字之上也。且九以膏名取脂膏之義。藏按法也。

厚朴湯 治脾胃虛寒。作脹。腹中時痛時止。

除溼湯 治溼熱痞滿不食。

升陽除溼湯 治脾胃虛弱。不能飲食。腹鳴泄瀉。

平胃散去厚朴。加羌活防風升麻柴胡豬苓澤瀉麥芽神麴。

五積散局方 治感冒內挾冷食。脾陰受傷。表裏俱病。

醫通卷十六

平胃

一 思得堂藏

平胃散加麻黃桂枝炮薑半夏茯苓枳殼桔梗白芍當歸川芎白芷每服四五錢生薑三片葱白三莖水煎去滓熱服溫覆取微汗。

調中湯 治食積類傷寒及手足四肢發陰斑。

平胃散加枳實白朮乾薑黃連山檳神麴草果水煎去滓。厚朴香調服。

胃苓湯 治飲食停積。浮腫泄瀉。脈證俱實者。

平胃散合五苓散生料煎服。

平胃本平胃氣之嫩草。若因脾土之虛。不能消運。又須稍藉參苓。如養胃之類。然復有土衰不能分利而成腫脹。且氣壅不勝參苓。難合理中者。乃合五苓以健運水土。與正氣散之假蘇。兼以散邪。邪雨不移易之定例也。

參苓九 治食積發黃。

平胃散加皂莢紅棗紅棗肉丸服。

此消痞宿滯之第一峻利方。較平胃之緩急百倍。青翠慎勿因施服後以穀壓之。否則恐其嘔吐也。

枳殼湯 治痘疹誤服參耆。腹脹喘急。

平胃散去蒼朮加枳殼。

二陳湯局方 治脾胃痰滯。

半夏錢半 茯苓錢半

甘草錢一 生薑三片

右六味水煎空心溫服。

燥痰減半夏生薑加麥門冬竹瀝。鬱痰乾效。去半夏用蜜煎。薑加川貝母火痰加黃連竹茹。老痰加蛤粉海石。

醫通卷十六

二陳

一 思得堂藏

按此方本內經半夏湯。及金匱小半夏湯。小半夏加茯苓湯等方而立。加甘草安胃。橘皮行氣。烏梅收津。生薑豁痰。乃理脾胃治痰滯之專劑也。其靈樞半夏湯見不得臥門。

小半夏湯金匱又名生 治痰積膈上喘嗽嘔噦。

二陳湯去陳皮甘草茯苓烏梅用半夏一兩。泡去生薑汁平合。

半夏湯千金 治膽府實熱。

二陳湯去陳皮甘草烏梅。生薑易宿薑。加黃芩生地黃。秫米遠志酸棗仁。以流水煮秫米去滓煎服。

小半夏加茯苓湯金匱 治痰飲多汗小便不利。

二陳湯去陳皮甘草烏梅用半夏一兩。生薑汁平合。茯苓三錢。

大半夏湯 治胃反嘔吐

二陳湯去陳皮甘草茯苓烏梅加入參三錢以水煎至揚之二百四十過煮藥溫服。千金有橘皮治氣滯腹脹。又千金大半夏湯本方更加附子當歸桂心蜀椒厚朴枳實茯苓甘草大棗治胃中虛冷腹滿氣塞。

半夏乾薑湯 治乾嘔吐涎沫

二陳湯去茯苓陳皮甘草烏梅生薑加乾薑等分爲散取方寸匕漿水煎服。

橘皮湯 治乾嘔嘔手足厥

二陳湯去半夏茯苓甘草烏梅用橘皮四錢生薑一兩橘皮半夏湯 治積氣痰痞飲食嘔吐不止

二陳湯去茯苓甘草烏梅用半夏橘皮各半兩生薑汁

醫通卷十六

二陳

三

思得堂藏

半合

橘皮枳實生薑湯 金匱

治胸痺短氣

二陳湯去半夏茯苓甘草烏梅用橘皮一兩生薑半兩加枳實三錢

橘皮竹茹湯 金匱

治胃虛噦逆

二陳湯去半夏茯苓烏梅用橘皮三錢甘草一錢生薑半兩加竹茹三錢人參一錢大棗三枚

半夏厚朴湯 金匱

治氣結成痰狀如破絮或如梅核在咽喉咯不化噤不下中脘痞滿氣鬱不舒惡心嘔逆切鬱證初起屬實者

二陳湯去橘皮甘草烏梅加紫蘇厚朴一方有

加味四七湯 治心氣鬱滯

四七湯加茯苓遠志菖蒲甘草

指迷茯苓丸 治中脘留伏痰飲脅痛難舉手足不能轉移背上寒凜惡寒

二陳湯去陳皮甘草烏梅本方用半夏麴二兩茯苓一兩加枳殼風化硝各半兩薑汁調神麴糊丸梧子大每服三五十九空心淡薑湯下

厚朴生薑甘草半夏入參湯 玉函

治胃虛嘔逆痞滿不食

二陳湯去茯苓陳皮烏梅加入參厚朴

一朮二陳湯 治脾虛痰食不運

二陳湯加生白朮 薑汁 茅朮 麻油 拌炒

分氣紫蘇飲 治胎前氣喘

二陳湯去半夏加紫蘇桑皮大腹皮枳椇五味子食鹽

醫通卷十六

二陳

四

思得堂藏

寧嗽化痰湯 治客邪傷肺久嗽不止

二陳湯加紫蘇葛根枳殼桔梗胡麻黃杏仁桑皮

導痰湯 治淫痰內外壅盛

二陳湯加南星枳實

加味導痰湯 治淫熱痰飲眩暈痰壅

導痰湯加入人參白朮黃芩黃連括蕁霜桔梗大棗竹瀝薑汁

十味導痰湯 治痰淫上盛頭目不清

導痰湯加羌活天麻蝎尾歸服入雄黃末少許

祛風導痰湯 治類中風筋脉顛掉

導痰湯加羌活防風白朮薑汁竹瀝

滌痰湯 治類中風痰迷心竅

一導痰湯加菖蒲人參竹茹

溫膽湯千金 治心膽虛怯。觸事易驚。多汗不寐。短氣乏力。

皆由寒涎沃膽所致。

二陳湯用橘紅加枳實竹茹紅棗。

參胡溫膽湯 治往來寒熱。嘔而痞悶。

溫膽湯去竹茹紅棗加入參柴胡。

十味溫膽湯 治寒涎沃膽。膽寒肝熱。心悸不眠。短氣惡心。

耳鳴目眩。四肢浮腫。

溫膽湯去竹茹加入參熟地棗仁遠志五味子。

膽之不溫。由於胃熱不清。停滯痰涎。沃於清淨之府。所以

陽氣不能發揚。而失溫和之性。故用二陳之辛溫以溫膽。

滌涎。涎聚則熱鬱。故加枳實竹茹以化胃熱也。若寒熱嘔

三陳

三陳

三陳

逆。胃氣不振也。去枳實之消滯。紅棗之滯胃。加柴胡以疏

肝。人參以扶胃。乃六君子之變法也。更加熟地棗仁遠志

五味。又為導脾湯法派耳。

消暑九局方 治肥人傷暑。眩暈嘔逆。

二陳湯去陳皮用醋炒半夏二倍。生薑自然汁為丸。略

漿水或烏梅湯淡醋湯下七八十九。

千解湯 治風痰喘急。脈證俱實者。

二陳湯去茯苓橘皮烏梅。本方用半夏七枚甘草一寸。

生薑指大。切加皂莢子蘇炙淨末半兩水煎溫服。一

方無甘草。但用半夏一兩皂莢末半兩生薑七片。同入

紗袋中。以手揉取清汁作三服。

溫中丸 治黃胖而腹足腫。是脾虛不能健運。雖有積聚。不

可下之。

二陳湯本方橘半茯苓各一兩。炙甘草五錢。加黃連香

附苦參鐵砂醋炒各五錢。白朮二兩。神麴一兩。醋水各

半。泛丸。梧子大。每服七八十九。用白朮六錢。陳皮一錢。

生薑三片。煎湯送下。虛加入參一錢。病輕者服此藥六

七兩。小便即長。病甚者服一觔。小便始長。積聚去淨。然

後六君子之類調補之。

四君子湯局方 治胃氣虛弱。飲食不思。倦怠少食。

人參一錢至三錢。白朮炒黃一錢。茯苓一錢至三錢。

甘草炙六分至一錢。

右四味水煎。空心溫服。

按四君子乃胃家氣分之前藥。胃氣虛而用之。功效立見。

醫通卷十六

四君

此六

即血虛用四物。亦必兼此。故八珍之主治。不獨氣血兩虛

也。即血虛者亦須兼用。但補氣則偏於四君。補血則偏於

四物。若純用血藥。不得陽生之力。陰無由以化也。方中白

朮。若治脾胃虛衰。大便不實。或嘔惡不食。合用炒焦。方有

健運之力。如脾胃虛燥。咳嗽失血。須用陳米飯上蒸過十

餘次者。則轉濁為清。轉燥為潤。是以異功散八珍湯及婦

科道遙等方內。並宜蒸者。即陰虛乾熱。欲吐白血。無妨

礙。更加白蜜拌蒸。猶為合宜。其於輕重炮製之間。全在甲

者之活法。權變舉此。可以類推。三隅矣。

異功散 治脾胃氣虛。稀痰喘嗽。

四君子湯加橘皮白朮為散。每服三四錢。加生薑一片。

水煎去滓服。

六君子湯 治胃虛少食痰嗽嘔吐

四君子湯加橘皮半夏生薑

香砂六君子湯 治氣虛痰食氣滯

六君子湯加木香砂仁烏梅

烏梅六君子湯 治小兒慢脾風內釣

六君子湯加川烏蠟尾神麴糊丸服

溫脾散 治小兒心脾虧損并舌及虛腹乳食不進

四君子湯加黃耆藿香訶子肉橘皮枳椇木香為散每服三四錢加薑棗煎服

茯苓飲外臺 治胸中停痰宿水吐後虛滿不食

四君子湯去甘草加枳實橘皮生薑

理中散局方 治小兒傷寒發熱咳嗽

醫通卷十六

四君

世七

思得堂藏

四君子湯加桔梗細辛羌活一作花柳等分為散每服一二錢加薄荷五葉水煎熱服取微汗愈不愈再作加葱白香豉

四獸飲 治瘧疾胃虛中挾痰食

四君子湯加半夏橘皮草果為散每服四五錢加生薑七片烏梅肉一箇水煎清晨熱服

八味順氣散 治類中風虛脹喘逆

四君子湯加青皮橘皮白芷烏藥為散每服四五錢水煎溫服

參苓白朮散局方一名 治胃虛喘嗽大便不實

四君子湯加山藥藕豆蓮肉枳椇薏苡砂仁為散每服四五錢加薑棗煎服

七味白朮散即錢氏白朮散 治胃虛津氣不行而渴

四君子湯加藿香木香煨葛根為散每服三四錢水煎日三服

八珍散 治胃虛痰中見血及紛紅痰

四君子湯加黃耆山藥粟米藕豆抄布

九味資生丸 治老人食難克運

四君子湯本方參朮各三兩茯苓一兩半炙甘草半兩加橘紅棗肉真神麴各二兩川黃連白豆蔻各三錢半煉白蜜丸服古方止此九味後人更加枳椇藿香各半兩澤瀉三錢半藕豆蓮肉各一兩慧苡三兩山藥麥芽芡實各一兩半醉飽後細嚼彈子大一丸淡薑湯下則酒食易化健脾開胃消食止瀉調和藏府滋養營衛

饑時服之即飽飽後食之即饑藥雖繁簡不同而功效不異因兩存之

八珍湯 治婦人胎產崩漏氣血俱虛者

四君子湯合四物湯

八物湯 治營衛俱虛畏寒發熱

八珍湯去人參加黃耆

按八珍八物切用懸珠以人參專補藏府元氣黃耆惟司營衛開闢也世人每謂黃耆代人參恆用八物補益藏府之氣大為噴飯

人參胃風湯局方 治風入胃中能食便血

四君子湯去甘草加當歸白芍川芎桂枝粟米一方多木香

醫通卷十六

四君

世八

思得堂藏

按風入胃中何以反能食蓋風為陽邪其性善行久而化熱即內經所謂痙成爲消中者是也方中但用桂枝去風而不主熱者以熱必隨風外解不必加治耳

益氣養骨湯 治痙瘲結核流注一切鬱熱毒氣

八珍湯加黃耆桂枝貝母香附橘皮生薑

大防風湯 治邪襲足三陰腿膝疼痛及痢後腰膝痛

鶴膝風附骨疽證但赤熱癰腫者禁用

四君子湯去茯苓加肉桂附子黃耆牛膝杜仲熟地白芍川芎羌活防風

四物湯 局方

治營血虛熱

熟地黃二錢

當歸身一錢

白芍藥錢五

川芎錢八分

右四味水煎溫服肥盛多淫痰及嘔逆少食便溏者禁用

增損四物湯 局方 治血虛發熱食少便溏

四物湯去地黃加人參甘草炮薑

加減四物湯 治停經血滯少腹結痛

四物湯換赤芍加三稜蓬朮肉桂乾漆灰

四烏湯 治血中氣滯小腹急痛

四物湯加烏藥香附甘草

四神散 治產後血虛或瘀血腹痛

四物湯去地黃加炮薑爲散溫酒服方寸七

當歸芍藥散 金匱 治腹中諸痛

三 四物湯去地黃加白朮茯苓澤瀉爲散酒服方寸七日

當歸散 治妊娠胎氣不安

四物湯去地黃加黃芩白朮爲散飲服方寸七日三

芎藭湯 千金 治產後崩漏下血不止

四物湯換乾地黃加黃耆甘草乾薑吳茱萸若夏戶經後有赤白不止除地黃加杜仲人參

三黃補血湯 治血虛至夜發熱自汗

四物湯加生地黃黃耆升麻柴胡丹皮

四物二連湯 治重陽無陰晝夜發熱

四物湯加宜黃連胡黃連

按此本爲重陽無陰晝夜發熱而立必其人時火亢極於陰分乃爲相宜以陽邪暴虐故曰重陽陰欲消亡是即無陰非真陰補虛之謂蓋陽全陰半陽得以統陰所以晝夜

醫通卷十六

四物

四十 思得堂藏

皆熱若陰氣自病斷無上午陽分發熱之理每見時師用以治虛勞蒸熱及血虛發熱之疾服之未有不嘔瀉奪食者甚知方下原治發熱未嘗言蒸熱也夫熱發於外雖滯於陰實爲客邪熱蒸於內陰不濟陽證屬久虛可不辨而混治乎其陰虛蒸熱自有六味地黃血虛發熱自有當歸補血亦何藉於此哉

大秦九湯 治中風外無六經形證內無便溺阻滯宜此養

血營筋血行風自滅矣

四物湯加秦九生地黃羌活獨活防風細辛茯苓白朮

白芷黃芩石膏甘草

張景岳曰大秦九湯在機要發明俱云治中風外無六經之形證內無便溺之阻滯如是血弱不能養筋宜養血而

筋自榮以大秦凡湯羌活愈風湯王之大秦凡湯雖有補血之藥而寒散之劑居其半矣夫既無六經之外邪而用散何為也既無阻隔之大邪而用寒何為也寒散既多又果可養血氣而壯筋骨乎秦凡湯且不可愈風湯則尤其不可者也吾不知用此法者果出何意

獨活寄生湯千金 治風痺腰脚疼痛

四物湯加獨活桑寄生杜仲牛膝細辛秦凡茯苓桂心防風人參甘草。古今錄驗無寄生有續斷。肘後無寄生人參甘草當歸有附子。產後腹痛不得轉動及腰脚疼痛不得屈伸痺弱者宜服此湯。

十味劉散 治淫痺周身疼痛

四物湯加白朮附子防風茯苓黃耆肉桂

附通卷十六

四物

思得堂藏

此即十全大補去人參甘草之甘緩補氣而加附子防風以通達外內也。

玉燭散 治血熱大便秘結

四物湯換生地黃加生甘草酒大黃玄明粉生薑萬全方無大黃明粉易青皮枳殼。

艾湯 治胎經下血孕婦胎漏不止

四物湯用乾地黃加阿膠甘草艾清酒和水各半煎服。

一方多千金無地黃芍藥。

丁香膠艾湯 治經漏兼白帶

四物湯加丁香阿膠艾。

加味香附丸 治倒經白汗胎漏下血

四物湯木方用熟地八兩。端為各四兩。芍藥三兩。加四

製香附一觔澤蘭葉烏賊骨各六兩為末用浮麥麴酒醋水調糊為丸如菰豆大每服百丸早暮各一服溫酒湯送下。

艾煎丸局方

治婦人崩傷淋瀝帶下赤白小腹疼痛

四物湯本方歸地芍各二兩川芎一兩加人參石菖蒲炒吳茱萸用酒各一兩為末用新艾四兩酒煎濃汁入糯米糊為丸梧子大每服百丸醇酒下更加肉桂熟附子各一兩香附四兩名艾附丸。

溫經湯金匱 治經水不調崩帶及唇口乾燥并治經阻不通咳嗽便血此肺移熱於大腸也

四物湯去地黃加阿膠甘草人參肉桂吳茱萸牡丹皮麥門冬半見生薑更加白朮名大溫經湯

附通卷十六

四物

思得堂藏

此方本膠艾湯而立以虛火上炎唇口乾燥故用麥冬潤淫下添不時帶下故用半夏若無二證不必拘執成方也

芎歸湯及散 治妊娠胎不轉運

四物湯去地黃芍藥湯則煎服散則酒調服之以驗胎息若是真胎服之即動勿輕火炒乃効

佛手散 治產婦胎不得下

四物湯去地黃芍藥等分炒研為散紅酒調服

加味佛手散 治產婦交骨不開

四物湯去地黃芍藥本方端用三錢芎用一錢加土蘇人參三五錢去血過多加至二兩臨服童便半盞續進之質壯氣實者但加童便人參不用可也

紫蘇飲 治妊娠臨月浮腫喘脹

四物湯去地黃加紫蘇陳皮大腹皮人參甘草生薑葱白。感冒風寒去腹皮加香豉胎動不安加黃芩白朮

胎不運動加木香砂仁肥盛氣滯加半夏厚朴虛羸少氣加白朮倍人參

連生散 治紅崩九個月後服數劑則易產

紫蘇飲去川芎加白朮黃楊腦三枚

芎歸煎甲飲 治勞瘵久不止或暫止復來

四物湯去地黃加茯苓半夏橘皮紫甲薑棗烏梅寒多加草果熱多加柴胡胃虛少食加入人參白朮汗多加黃

香甘草一方多

續命散 治風虛昏倒自汗手足蕪痲

四物湯加入人參甘草桂心遠志防風獨活細辛葛根荆

醫通卷十六

四物

思得堂藏

芥半夏為散每服二兩加生薑三片水煎通口服多汗

去葛根加牡蠣

生地黃黃連湯 治失血後燥熱癢服黃連者

四物湯換生地赤芍加黃連黃芩山柈防風

滋燥養營湯 治血燥皮膚癢搗薊牛朴

四物湯去川芎加生地黃秦艽防風黃連甘草

大補地黃丸 治精血枯槁燥熱

四物湯去川芎加生地黑參黃蘗知母乾山藥山茱萸

枸杞肉蓯蓉蜜丸每服六七十丸空心鹽湯臨卧溫酒下

切勞散局方

治肺癆咳嗽痰中有紅絲盜汗發熱熱過即

四物湯去川芎加入人參黃耆甘草阿膠五味子半夏為散每服三四錢加薑棗煎空心服

加味四物湯 治血虛發熱

四物湯加白朮茯苓柴胡丹皮

解毒湯 治痘疹血氣弱乾焦黑陷

四物湯換生地加入人參連翹黃連甘草陳皮木通竹葉

寬中散 治痘疹誤用辛熱秘結

四物湯去川芎換生地加枳殼赤茯苓甘草為散每服

方寸七水煎去滓服

麥門冬湯 治痘疹便實而渴

四物湯去川芎換生地加麥門冬

保元湯 治骨節氣血不足

醫通卷十六

保元

思得堂藏

黃耆錢三錢至六錢 人參三錢至六錢

水煎空心服

獨參湯 治氣虛不能統血驟然脫血血崩不止

人參三錢至六兩大虛暴脫者一兩至三兩胃虛少食

加橘皮肺虛喘嗽加橘紅血脫加童便半杯薑汁三七

一方多京

歸脾湯 治心脾虛結經閉不調

保元湯加白朮茯苓酸棗仁遠志肉苁蓉身桂圓肉木

香生薑紅棗

加味歸脾湯 治心脾虛結經閉發熱

歸脾湯加柴胡山柈仁

聖愈湯 治失血過多久不復原

保元湯去甘草加生地黃熟地黃川芎當歸

十全大補湯局方 治腎衛氣血俱虛

保元湯加白朮茯苓熟地當歸川芎白芍肉桂薑朮一按和劑十全大補雖本保元而實四君四物黃耆建中三方合成因飲食勞倦而致煩熱肌肉消瘦者宜之若房勞傷精思慮傷神陰虛火旺咳嗽失血者誤用反致陰火上炎轉增其劇也又古方十全大補無黃耆肉桂多沉香木香此則專開脾胃之鬱劑

人參養營湯局方 治心脾虛寒

保元湯加白朮茯苓橘皮熟地當歸芍藥肉桂遠志肉五味子

按方中諸品皆心脾二經之藥而方下舊註云補肺虛謬

醫通卷十六 保元 四十五 思得堂藏

矣夫養營正當補養心脾原無藉於肺氣也

大建中湯局方 治腎衛俱虛上熱下寒

十全大補湯加附子肉桂茯苓半夏麥門冬

人參安胃散 治小兒心脾虛極弄舌

保元湯加黃連茯苓白芍生甘草

人參實衛湯 治瀉自汗不止

保元湯加白朮芍藥初發加桂枝久癢加烏梅

六一湯局方 治衛虛自汗晝日煩熱

保元湯去參用黃耆六錢甘草一錢加棗一枚

當歸補血湯 治血虛至夜發熱煩渴引飲其脈洪大而虛

重按全無者

保元湯去人參甘草用黃耆六錢加當歸二錢

玉屏風散 治衛虛白汗易感風邪用此補脾實衛

保元湯去人參甘草用黃耆六兩加防風二兩白朮四兩為散每服四五錢加薑棗煎服

上三方並屬保元去參而黃耆六一則藉本方甘草協助黃耆以實脾氣故晝日多汗煩擾者宜之當歸補血專用當歸引氣黃耆以護營血故失血至夜發熱者宜之玉屏風散則加白朮防風以祛衛濕故理珠易感風邪者宜之三方雖同以黃耆為君而上氣主血主肉各隨佐使功用迥乎不侔也

益氣聰明湯 治氣虛目暗生翳耳聾耳鳴

保元湯加升麻葛根蔓荊芍藥酒黃連

此保元湯合升麻湯加蔓荊子以治其上黃藥以治其下

醫通卷十六 保元 四十六 思得堂藏

也

神功黃耆湯 治氣虛耳目不明

保元湯用黃耆二錢人參甘草各一錢加白芍一錢蔓荊子二分橘皮五分

耳目之患氣虛而陰火上乘者宜益氣聰明湯無陰火者

宜神功黃耆湯用者審之

千金托裏散 治氣血虛寒潰瘍不收

保元湯加川芎當歸肉桂白芷防風桔梗白芍天冬連翹惡冬生薑

參耆內托散

治潰瘍感胃風邪痘疹癰癤伏匿及癰疽久不潰

不潰

保元湯加川芎當歸肉桂白芷防風桔梗木香厚朴

本方去木香名十宜散治痘癰

托裏消毒散 治癰疽痘疹毒盛不能起發

保元湯加當歸芍藥茯苓白朮冬白芷連翹

內補黃耆湯 治潰瘍膿水出多虛熱不寐盜汗

保元湯加白朮茯苓五味子

人參固肌湯 治痘毒表虛斑爛不能收斂

保元湯加當歸白朮茯苓白朮冬冬連翹

補中益氣湯 治內傷中氣下陷下元虛者禁用

保元湯本方參耆甘草減半加白朮一錢當歸橘皮柴

胡各八分升麻五分勞力感寒加羌活黃耆冬加桂枝

春加香豉葱白

調中益氣湯 治身軀沉重百節煩疼胸滿知氣心煩耳鳴

醫通卷十六

保元

思得堂藏

目熱如火口中沫沫飲食失味嗜臥溺赤

補中益氣湯加白芍藥五味子

升陽益胃湯 治脾胃受傷邪熱內陷外反惡風厥冷脈沉

大小便秘瀉不可誤認陰寒而用熱藥又不可誤認實火

而用涼藥宜此湯升舉微汗則愈

補中益氣湯去升麻當歸加羌活獨活白芍防風半夏

茯苓澤瀉酒黃連薑黃服藥後忌食一二時戒酒

麪生冷薄滋味以養胃氣稍食美食以助藥力更宜小

役形體使胃氣與藥轉運升發慎勿大勞以傷脾胃生

發之氣

升陽順氣湯 治飲食不節勞役所傷腹脹滿悶短氣遇者

則口淡無味遇夏雖熱猶有畏寒微則常如飽不宜飲食

補中益氣湯去白朮加半夏草豆蔻神麴黃藥生薑

瀉陰火升陽湯 治火鬱發熱

補中益氣湯去白朮當歸橘皮加羌活蒼朮黃耆黃連

石膏早飯後大溫服服後宜禁一加升陽益胃湯如見

火旺及腎任衛三脈盛用酒炒黃藥知母少許不可久

服恐助陰氣為害也

沖和養胃湯 治風虛目患空中有黑花神水變淡綠色次

變淡白漸成內障

補中益氣湯去橘皮加羌活防風黃連白芍五味生薑

通氣防風湯 治太陽氣鬱肩背不可回顧

補中益氣湯去白朮當歸加防風羌活藥本黃藥白豆

蔻青橘皮

醫通卷十六

思得堂藏

清暑益氣湯 治暑傷無形之氣口燥頭痛發熱溺赤

補中益氣湯去柴胡加麥門冬五味子蒼朮葛根澤瀉

黃藥神麴青皮

此以保元生脈為主而兼開腠利水消痞之味

清燥湯 治夏秋溼熱傷氣

補中益氣湯加生地黃黃連豬苓茯苓麥門冬五味子

蒼朮黃藥澤瀉神麴

節卷升陽散火湯 治熱乘脾金氣虛不能主持袖衣撮空

小便利者可治不利者不可治

補中益氣湯去升麻黃耆加麥冬夜神黃耆白芍薑黃

有痰加薑汁炒半夏大便燥實誤語發渴加大黃泄利

加升麻倍白朮

托裏散 治痘毒虛不能散

補中益氣湯去升麻加熟地茯苓芍藥

生脈散 治熱傷脾胃虛熱喘嗽服虛無力

人參三錢 麥門冬二錢 五味子一錢

水煎不時熱服

門冬清肺飲 治火乘肺胃喘嗽吐血衄血

生脈散加黃芩甘草紫苑白芍當歸

此生脈保元合用。以滋金水化源。其紫苑佐黃芩而兼調
管衛。深得清肺之旨。其餘芍藥酸收。當歸辛散。且走血而

不定氣。頗非所宜。不若竟用生脈保元清肺最妙。先哲有

保元生脈合用。氣力從足。痰湧出。以黃耆實胃。五味欬津

皆下焦之專藥耳

醫通卷十六

生脈

四九 思得堂藏

宜明門冬飲 治心移熱於肺傳為瀰消

生脈散加茯神甘草生地黃栝樓根煨葛根知母竹葉

易老門冬飲 治老人津虧大渴

生脈散加茯神甘草枸杞生薑

二方並本生脈而易老差勝。蓋明之重在旺氣。易老專滋

血氣。治得其本矣。

天王補心丹 治心腎虛耗怔忡不寧

生脈散加熟地茯苓茯神遠志菖蒲黑參丹參柏子仁

酸棗仁天門冬百部當歸杜仲枳椇甘草蜜丸硃砂為

衣。空心龍眼紅棗湯下二三錢

清心蓮子飲 局方

生脈散加黃芩地骨皮。前代茯苓黃耆蓮子。

此用生脈散合黃芩清肺而兼導赤之製。其旨在於心包

火炎。上灼於肺。熱傷津化。不能生水。故用生脈救肺之燥

以滋上源。則知肺本無熱。皆緣受火之淫。而致熱傷氣化

安可復用黃芩以伐其肺乎。易不竟用生脈合導赤全方

豈不源流同濟。理明辭暢乎。即或不然。不妨割去木通。仍

用茯苓蓮子以存清心之意。至於同方又以保元為主。乃

去五味加入甘草。益失滋肺上源之旨矣。

三冬膏 治肺胃燥熱痰滿欬嗽

天門冬 去心 麥門冬 等分

右二味熬膏。煉白蜜收。不時嚼熱嚥之。

固本丸 治老人津血俱虧致通便秘

二冬膏加生熟地黃。與本方二冬各八兩。人參四兩。蜜

醫通卷十六

三冬

十一 思得堂藏

丸酒下。四錢。熬膏尤宜。食少便消。禁用。

固本丸雖主扶陰抑陽。然四味純陰之性。僅用少許。人參

已覺味勝於氣矣。而世本此方二冬二地各用八兩。人參

二兩。幾幾乎羣陰剝陽之象。況復舉世醫流。往往割去人

參。盡知陰柔之味。不得陽和之力。每致奪食作瀉。內經所

謂無陽則陰無以化。安望其有補益之驗歟。

或問近世病家。吝惜多金。醫家迎合。鄙性。往往用參湯服

瓦。此法可否。曰此曲突徙薪之法也。鄙夫但知人參珍貴

以爲入口便補。不知配合之妙。全在佐使得宜。若用參湯

送丸。則參力先行。至九化時。參力相去已遠。非若膏劑之

用參湯調服。仍得併力奏功也。

集靈膏 治久嗽氣血俱虛不能送痰而出

固本丸中二冬二地各十兩。人參六兩。加枸杞六兩。骨
膏。收。如血虛便難。加喘身。脾弱便澀。加白朮。以糖
代蜜。收之。

三才丸 治氣血俱虛。精神不固。元陽失合者宜之。

二冬膏 去麥門冬。加人參。熟地。等分。蜜丸。服之。加黃

甘草砂仁。名三才封髓丹。

甘露飲 局方 治胃中客熱煩躁。口鼻咽喉。牙宣口鼻。

二冬膏加生地黃。熟地黃。茵陳。枳殼。黃芩。石斛。甘草。和
杷葉。

桔梗湯 玉函 治冬時伏邪發於少陰。咽痛不。及風熱。時
氣不清。喘嗽喉中介介。如梗狀。肺痿肺癰。初起並得服之。

甘草 各三

通卷十六 思得堂藏

右二味水煎。緩服之。

利金湯 治肺燥。清不利而欬。

桔梗湯加貝母。橘紅。枳殼。茯苓。生薑。白蜜。

枳殼散 治欬引脇下痛。

桔梗湯加枳殼。細辛。川芎。防風。葛根。生薑。紅棗。

清肺湯 治痘疹肺熱。喘嗽吐痰。

桔梗湯加麥門冬。款冬花。杏仁。貝母。牛蒡子。

生地黃散 治痘疹肺熱。喘嗽吐血。

桔梗湯加麥冬。生地。款冬。杏仁。為散。煎服二錢。

無杏仁多橘皮。

生薑散 治痘出不快。溺赤。欬痰。

桔梗湯加黃芩。枳殼。水通。為散。煎服二錢。

十六味桔梗湯 治肺壅。實熱。咳嗽。

桔梗湯加薏苡。貝母。當歸。桑皮。括萎。仁。百合。枳殼。葶藶。

五味地骨皮。知母。防己。黃耆。杏仁。

葶藶薏苡瀉肺湯 治肺癰。初潰。吐血。

桔梗湯。本方甘草。用節。加薏苡。貝母。橘紅。黃耆。忍冬。白

及葶藶。生薑。初起去黃耆。加防風。潰後膿血去。多加人

參。漬久不飲。加合歡皮。

排膿湯 金匱 治內癰。膿從咽出。

桔梗湯加生薑。大棗。水煎。日二服。

排膿散 金匱 治內癰。膿從便出。

桔梗湯去甘草。加枳實。芍藥。為散。取雞子黃一枚。以藥

與雞子黃相等。揉和。飲和服之。日一服。

醫通卷十六 防己黃耆 五十二 思得堂藏

防己黃耆湯 金匱 治風溼。相搏。客在皮膚。關節疼痛。腰已

下。疼痛。脈浮。自汗。惡風。

防己酒洗 黃耆各錢 白朮一錢

甘草炙八 生薑四片 大棗二枚

右六味。水煎。熱服。後當如蟲行。皮中。腰已下。如冰。後坐律

上。又以一被。連腰下。溫令微汗差。

喘加麻黃。胃氣不和。加芍藥。氣上衝。加桂枝。下有陳氣。加

細辛。陳氣久積。

防己茯苓湯 金匱 治皮水。四肢腫。皮膚滿。諸動。

防己黃耆湯去白朮。薑。本方中防己黃耆各三錢。甘

草一錢。加肉桂三錢。茯苓六錢。水煎。溫分三服。

防己湯 千金 治風節。四肢痛。如錐刺。

防已黃耆湯去黃耆人輩本方中防已白朮生薑各四錢甘草三錢加桂心茯苓各四錢烏頭一枚去皮人參二錢以苦酒和水煮日三夜一服當覺熱熱忽然而

煩懊懣不得眠反覆顛倒附起不安者
梔子豉湯玉函 治汗下不解虛邪留於膈上心下結痛虛

梔子十四枚桴 香豉四合

右二味水煎分二服溫進一服得快吐止後服

按仲景太陽例中用梔子豉湯有三皆主汗下後虛邪不解之證其梔子必取肥者生用一吐而膈上之邪與火俱散也若其時行疫癘頭痛發熱此湯加葱白最捷多有服之不吐者胃氣強也加薑汁服之或以雞翎探之或借用

醫通卷十六

梔子豉

五十三 思得堂藏

以清解膈上鬱結之火不欲其吐又須山梔炒黑用之便屈曲下行小便矣如衛氣素虛人感冒客邪自汗多者此方中香豉須炒熟用之至於少氣為胃氣之虛則加甘草以緩調之嘔為痰飲之逆則加生薑以開豁之下後心煩腹滿明是濁氣內陷乃於本方除去香豉表藥加枳朴以湧泄之丸藥大下後身熱不去微煩明是虛火外擾本方亦不用香豉而加乾薑以溫順之其有身黃發熱明是滯邪鬱發亦於本方去香豉而加礬皮以苦燥之下後勞復食復明是正不勝邪本方加枳實以清理其內用清漿水煮取味微酸使之下行而不土越也若有宿食則加大黃如博菴子大五六枚同一梔子豉法功用之妙神化莫測非庸俗所能擬議也

梔子甘草豉湯玉函 治下後少氣

梔子豉湯加甘草

梔子生薑豉湯玉函 治下後嘔吐

梔子豉湯加生薑

梔子厚朴湯玉函 治下後心煩腹滿

梔子豉湯去豉加枳實厚朴

梔子乾薑湯玉函 治九藥大下後身熱不去微煩

梔子豉湯去豉加乾薑上四方服法如梔子豉湯

梔子藥皮湯玉函 治太陽證身黃發熱

梔子豉湯去豉加藥皮甘草水煎分溫再服

枳實梔子豉湯玉函 治勞復食復

梔子豉湯倍香豉加枳實三枚用清漿水七升空煮取

醫通卷十六

梔子豉

五十四 思得堂藏

四年內枳實梔子者取三升下豉更煮五六沸去滓分溫再服腹中微似汗有食加大黃如博菴子大五六枚

大黃湯 治酒痺心中懊懣或欬嘔

梔子豉湯加枳實大黃

清肺飲 治渴而小便不利

梔子豉湯去豉用炒黑山梔加黃芩等分熱服探吐之

不應加香豉一振

方妙用全在探吐以提其上則肺氣立清若服而不可

特綿延不能克應縱或小差其苦寒之性則薄於內大

傷氣氣之氣得不為之預慮乎

仁湯 治小便不通煩悶腹脹

子豉湯去豉加甘草茅根梔子

小承氣湯 玉函 治少陽陽明府證

大黃 四錢 厚朴 六錢 枳實 三枚

初服湯當更衣。不爾者。盡飲之。若更衣勿服之。
經云。尤則害。承通制。專取大黃以制尤極之害也。承氣湯
證有二。太陽之邪初傳陽明之府。用調胃承氣。藉甘草之
緩。冀留確黃。以祛胃中力張之邪。邪熱尤極於胃。用大承
氣之確黃枳朴併攻全盛之邪。故無庸於甘草。邪氣厥
聚。欲犯少陽之界。斯時熱已向裏。但須枳朴助大黃以擊
陷。喘之邪。故無取於芒硝之峻銳也。其桃核承氣則又主
太陽犯本之證。以桃仁桂枝血藥。引調胃承氣三味以破
胸臍畜血。與陽明之府畧無交涉。

調胃承氣湯 玉函 治太陽陽明府證
醫通卷十六 承氣 五十五 思得堂藏

小承氣湯去厚朴枳實。方中大黃酒浸。加芒硝三合。甘
草二錢。

大承氣湯 玉函 治正陽陽明府證

小承氣湯本方大黃酒洗倍用。厚朴半兩。枳實五枚。加
芒硝三合。

桃核承氣湯 玉函即桃 治熱結胸臍如狂

小承氣湯去厚朴枳實。加芒硝甘草桃仁桂枝。

厚朴大黃湯 金匱 治支飲胸滿

小承氣湯倍大黃。

厚朴三物湯 金匱 治腹滿痛閉

小承氣湯倍厚朴用枳實五枚。

厚朴七物湯 金匱 治腹滿發熱飲食如故

小承氣湯加甘草桂枝枳實

此本小承氣合桂枝湯。中間裁去芍之酸收。不致引邪
入犯營血。雖同用桂枝甘草。與桂枝湯證消微分。其厚朴
獨倍他藥。正以泄氣之濁逆耳。

大黃甘遂湯 金匱 治婦人血結少腹如瘕
小承氣湯去枳實厚朴。本方大黃用四錢。加甘遂阿膠
各二錢。頓服之。

大黃甘草湯 金匱 治食已即吐

小承氣湯去枳實厚朴。用大黃一兩。加甘草三錢。

大黃牡丹湯 金匱即後 治大腸癰

小承氣湯去枳實厚朴。加芒硝桃仁牡丹皮瓜子。

大黃附子湯 金匱 治脇下寒飲偏痛
醫通卷十六 承氣 五十六 思得堂藏

小承氣湯去枳實厚朴。本方用大黃一兩。加附子六錢。
細辛二錢。水煎分溫三服。如人行四五里進一服。

按此即瀉心湯去芩連之苦燥。湯裏加細辛之辛溫走表。
以治腸下寒積。兩不移易之定法也。

黃龍湯 治失下循衣振空虛極熱盛。不下必死者。

小承氣湯本方用大黃三錢。厚朴錢半。枳實一錢。加芒
硝二錢。甘草一錢。人參麥冬太黃減半。當歸二錢。生薑五

片。大棗一枚。如腸鳴去芒硝。加半夏茯苓。血秘去甘草。

加桃仁泥生地黃汁。氣秘去當歸。加木香。風秘去大棗。

加羌活。年老氣虛去芒硝。

湯頭黃龍命名。專攻中央燥土。土既燥竭。雖三承氣。萃集
一方。不得奏效。故謂胃氣烏能與其致兩。或者以爲因虛

用參殊不知參在奉行劑中則迅掃之威愈極安望其有補益之力歟千金又以小柴胡易名黃龍湯意在培土以安風木殊非此方寓補於瀉之義

三化湯 治類中風外無六經形證內有便溺阻隔

小承氣湯加羌活

羌活導滯湯 治大便秘結

小承氣湯去厚朴加羌活獨活防已當歸甘草

此方較三化湯藥味稍異而功用不殊與枳實導滯丸則溼瀉各別彼雖亦水承氣而兼枳朮三黃因緣之傷飲食門此不復列

紫草承氣湯 治痘瘡乾紫便秘喘滿

小承氣湯加紫草

醫通卷十六

抵當

五十七 思得堂藏

抵當湯 玉函 治畜血少腹鞭滿小便自利

水蛭 熬黑如無以酸醃

去蟲 去蟲足熱

大黃 酒浸 枳實 三十枚

右四味水煎去滓取三升溫服一升不下再服

按此與承氣不同承氣用枳實厚朮以利氣此用水蛭蟲桃仁以破血也

抵當丸 玉函 治畜血小便自利服湯不應服此丸

抵當湯本方用水蛭二十枚蟲蟲二十五枚餘同湯方杵細入蜜分爲四丸以水一升煮一丸取七合服之時常下血若不下者更服

變通抵當丸

抵當丸去水蛭加蟲蟲二十個雞血拌瓦上焙乾餘如

本方如欲殺攻臨臥時酒服五九至十丸下止後藥下瘀血湯金匱 治婦人產後腹痛有乾血者臍下

抵當湯去水蛭蟲蟲加蟲蟲二十枚

代抵當湯丸 治虛人畜血宜此緩攻

抵當湯去水蛭蟲蟲本方大黃用四兩酒桃仁用二十枚加芒硝連木穿山甲犀尾生地黃各一兩肉桂三錢

爲末蜜丸畜血在上部者丸如芥子黃皆去枕仰臥以津嚥之令得藥以搜逐瘀積在下部食遠下部空心俱

丸如梧子百勞水煎湯下之用歸地者引諸藥入血分也如血老成積攻之不動去地倍連朮肉桂

涼膈散 局方 治溫熱時行表裏實熱及心火亢盛日赤便

秘胃熱發斑

醫通卷十六

涼膈

五十八 思得堂藏

大黃 酒浸

芒硝 一兩

甘草 炙六錢

連翹 一兩

黃芩 一兩

山梔 八錢

薄荷 七錢

爲散每服四五錢加竹葉十五片水煎溫日三夜二服得

下熱退爲度世本無竹葉有薑一

稍黃得根朴之重者則下熱承之而順下得苓梔翹薄之

輕揚則上熱抑之而下清此承氣涼膈之所攸分也用甘草者即調胃承氣之義也局方專主溫熱時行故用竹葉若治感冒之證從世本用葱白薑黃可也

清心散 治溫熱時行壯熱神昏不語便溺閉澀

涼膈散加黃連一兩爲散每服四五錢加竹葉一把白蜜少許煎服頭痛加川芎防風石膏不應加麻黃

轉舌丸 治類中風舌強不語神識不清

涼膈散加石膏蒲葦遠志肉各一兩蜜丸硃砂為衣薄荷湯化下

潤燥湯 治痘疹過用丁桂熱藥咽痛煩躁秘結

涼膈散去蒲葦加當歸白芍生地荆芥鼠粘子

通聖散 治西北卒中內外熱極

涼膈散去竹葉加麻黃石膏滑石生白朮防風荆芥桔

梗川芎當歸芍藥生薑

雙解散 治溫熱時行內外熱極

通聖散倍滑石用生甘草

備急丸 金匱 治心腹卒痛如錐刺宿食停積腹滿

巴豆去皮心膜乾薑生二錢大黃三錢

將通卷十六

備急

五十九 思得堂藏

右三味為末煉白蜜丸如小豆大溫水送下二三十九丸

誤禁用

按備急丸治寒實結積之峻藥凡傷寒熱傳胃府舌胎黃

黑刺刺唇口亦燥者誤用必死以巴豆大熱傷陰故也其

白散白餅子消積神保酒癥等方皆然不可不慎○其神

保丸酒癥丸見傷飲食門楊氣丸下茲不復見

白散 玉函 治寒實結胸

備急丸去乾薑大黃用巴霜一錢加桔梗盧貝母各

錢為散白飲和服半錢贏者減之

雷氏千金丸 治胸腹冷積作痛

備急丸加煇硝桂心

白餅子 治小兒腹中積積飲乳即嘔而吐痰涎

備急丸去乾薑大黃用巴豆二十粒取霜加滑石鹽粉半夏兩星各一錢共杵為末糯米飲丸葶豆大檢作餅子每服二三餅葱白湯下

消積丸 治小兒食積發熱大便酸臭

備急丸去乾薑大黃用巴豆二十粒取霜加丁香九粒

縮砂仁十二粒共杵為末以爛烏梅肉三枚糊丸黍米

大每服三五丸溫水下

伊尹三黃湯金匱名方大黃湯治三焦實熱煩躁便秘

黃連酒煮黃芩酒炒大黃酒浸

麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服麻沸湯者白水

空煎鼎沸如麻也古方惟降火藥用之

三黃丸 治諸實熱不解

將通卷十六

三黃

六十一 思得堂藏

三黃湯為末煉白蜜丸梧子大每服五十九空心麻沸湯下

金花湯 治熱毒內蘊

三黃湯去大黃加黃蘗三味等分煎服更加梔子各梳

子金花湯

三補丸 治陰火亢極不解

金花湯為末蜜丸服

黃連解毒湯 治熱邪內外俱盛

三黃湯去大黃加黃蘗山梔等分煎服

金花丸 治積熱不解

黃連解毒湯為末蜜丸服之

大金花丸 治中滿熱極淋瀝瀉血

三黃丸加黃藥等分滴水為丸小豆大新汲水下三十丸。

按金花湯止等連藥三味作丸則名三補金花丸。較湯多山施作湯名為解毒。更加大黃則名大金丸。湯丸雖異功用不殊。但取急攻則用湯。緩祛則用丸。微有區別耳。

大黃黃連湯心湯玉函即黃連湯治熱邪內陷腸下痞滿。

三黃湯去黃藥玉函即黃連湯治熱邪內陷腸下痞滿。

附子瀉心湯玉函治寒熱不和腸下痞結。

三黃湯另煎熟附子汁攪勻服之。

三黃梔子散湯治熱病時疫頭痛壯熱。

三黃湯合梔子散湯千金法治熱病時疫頭痛壯熱。

當歸大黃湯治營血虛熱盜汗。

醫通卷十六

三黃

六十一思得堂藏

三黃湯去大黃加黃藥黃耆生地黃熟地黃當歸汪石山主

清心丸治心熱神昏驚悸不寧。

三黃湯去大黃用黃連三錢黃芩二錢加西牛黃半錢。

燈金錢半。豬心血為丸。黍米大。硃砂為衣。燈心湯下一錢兒三十九。

既濟解毒湯治上熱下寒大便秘。

三黃湯加甘草桔梗柴胡升麻連翹當歸。

人中黃丸治溫疫諸熱毒。

三黃湯本方用大黃三兩等連各一兩加入中黃耆木桔梗滑石各二兩入參一兩防風香附一兩五錢神麝。

酒丸清熱解毒湯送下二三錢見自虎湯下

此方專以伊尹三黃大解淫熱疫癘之邪其奧妙全在人中黃一味以清穢之味同氣相求直清中上污穢熱毒。合滑石益元之製則兼清滲道用若木香附者宜其六氣之鬱也。用桔梗者清其膈上之氣也。用防風者開其肌腠之熱也。十味祛邪散毒藥不得入參黃其勢無以逞迅掃之力也。用神麝為丸者取其留中而易化也。更需清熱解毒下之即人參白虎合升麻葛根湯去粳米加羌活等連生地。總解內外之熱畧取生薑之辛以行諸藥之性。散諸經之毒耳。

三黃石膏湯治熱病時行內外大熱。

三黃湯去大黃加黃藥山梔石膏麻黃香豉生薑葱白。

用清漿水煎服半日許不得汗再服便秘去麻黃香豉。

醫通卷十六

三黃

六十二思得堂藏

加大黃芒硝節庵法加芽茶一撮。

按此即解毒湯兼通聖散。梔子散湯之製。而加麻黃石膏葱豉。以散外內熱毒也。如脈數實便秘上氣喘急舌卷囊縮則去麻黃而易硝黃。又全用伊尹三黃矣。

普濟消毒飲治大頭瘡頭疽等證。

三黃湯去大黃加柴胡黑參連翹鼠粘升麻白芷甘草。

桔梗馬勃僵蠶板藍根半用永煎半用蜜丸。黃化氣虛脈弱加入參五七分。大便秘加酒大黃錢許微下之。

本方去升麻黑參鼠粘僵蠶板藍根馬勃加荆芥防風羌活。

枳殼川芎射干名等連消毒湯。

當歸龍薈丸治肝經積熱時疫驚悸抽搐神志不寧頭目昏眩咽不利腸胃燥結。瘰癧。疔。越等證。

三黃湯加當歸龍膽蘆薈梔子青黛木香麝香蜜丸
薑湯送二三十九丸

神芎丸 治水腫外內俱實者

三黃湯本方用大黃黃芩各二兩黃連半兩加滑石牽牛頭末各四兩川芎薄荷各半兩酒水為丸每服五七丸至十五丸臥溫水服熱熱腰腫滿加甘遂一兩通身走注疼痛加白芥子一兩久毒熱腫腹痛加芒硝一兩關節不利加羌活一兩腸胃結滯加郁李仁一兩腰腿沉重加商陸一兩本方去黃連川芎薄荷各導水丸

戴人取伊尹三黃丸變為神芎丸每令病人至夜先服百餘粒繼以滑川散投之五更當下種種病出投下少許再

醫通卷十六

三黃

六三 思得堂藏

以和腸藥服之以利為度有五日一下者三日一下者病輕者一二服止重者五六度方愈是擒縱緩急之妙臨病製宜非可言論自非老年諸練有大負者焉敢效諸行事耶○詳方後云每服五七丸至十五丸乃峻藥緩攻之成法此言每令病人先服百餘丸急聚元氣未滿為之迅掃各有至理不可以此藥彼也

滑川散 治水腫脹急大便不通大實大滿證

三黃丸去苓連用大黃一兩加牽牛頭末郁李仁各一兩芒硝甘遂各半兩木香三錢為散每服二錢入生薑自然汁和如稀糊服

按此乃下水積之峻藥火熱沸騰水液不能流通停滯而生溼熱在腸不去則化氣而為脹在陰不去則化積而成

形世俗不省內經留者攻之但執補燥之劑轉轉加而病愈甚也戴人曰養生與攻病本自不同今人以補藥治病宜乎不効也

十棗湯 玉函 治懸飲內痛脇下有水氣脈弦數

芫花熬 甘遂 大戟炮去骨

右三味搗篩以水一升五合先煮大戟肥者十枚棗取不合去滓內藥末強人服一錢七羸人服半錢七平旦溫服若下少病不除者明日更服加半錢七得快下利後糜粥自養神和丸 治腸水腫脹大小便秘

神和丸 治腸水腫脹大小便秘

十棗湯本方各一兩加大黃二兩黑牽牛頭末四兩輕粉一錢煮紅棗肉為丸初服五七丸日三服漸加快利

醫通卷十六

十棗

六十四 思得堂藏

為度

按此方守真本仲景十棗湯加牽牛大黃輕粉三味較十棗倍峻然作丸緩進則威而不猛其法最良其於神和丸中加青皮陳皮木香檳榔各半兩名舟車神和已屬蛇足更於舟車丸中加入乳香沒藥名除溼丹風斯愈下殊不足法

控涎丹 治脇下痰積作痛

十棗湯去芫花大戟加白芥子等分為末麴糊丸服十五丸至二十九丸驚痰加硃砂全蠍酒痰加雄黃全蠍驚氣成塊者加穿山甲鹽甲延胡索蓬朮骨痛加桂枝薑黃痰嗽加風化硝寒痰加丁香肉桂胡椒

甘遂直達涎結之裏大戟能攻胸脇之涎白芥子能破支

結之飲。此攻痰涎之峻劑也。凡形盛色蒼。氣壯脈實。人有上證。但服此藥數服。其病如失。後以六君子調補。若氣破白。大便不實。小便清利者。誤服。不旋踵而告發矣。

五苓散

玉函 治傷寒表裏未解。渴而小便不利。

白朮生

茯苓

猪苓各二錢

澤瀉三錢

桂一錢

右五味為散。白飲和服。方寸七。日三服。或生科煎服。溫覆取微似汗。

按五苓散。本治太陽經邪犯本。渴而小便不利。飲水即吐之水逆。故用二苓澤朮利水生津。又需桂以蒸動其津。則渴者自不渴矣。後人不達此義。每用五苓治陰虛泉竭之證。重澗其水。發熱發渴。勢必轉加。豈方之咎歟。況有去桂

醫通卷十六

五苓

李士恩得堂藏

而用四苓者。曷知此方。全賴桂之辛溫。則水不至壅滯。用方者常須識此。無愧聖賢一脈。

猪苓湯

玉函 治渴欲飲水。小便不利。及少陰病下利。如而

嘔渴。心煩不得眠。

五苓散去朮桂。加滑石阿膠等分。水煎去滓溫服。日一

按此太陽少陰藥也。五苓散用朮以導水逐氣。即兼桂之

辛溫以蒸動其津氣。此用滑石之清熱利水。即兼阿膠之

甘潤以保護其血液。汗乃血之液。故汗出多而渴者。禁用

猪苓散

金匱 治嘔吐思水

五苓散去澤瀉桂。為散。飲服方寸七。日三服。

澤瀉湯

金匱 治支飲眩冒

五苓散去猪苓茯苓桂。

茯苓澤瀉湯 金匱 治胃反吐而渴欲飲水。

五苓散去猪苓。加甘草生薑。家秘加。

茯苓戎鹽湯 金匱 治胞中精枯。血滯小便不利。

五苓散去猪苓澤瀉桂。加戎鹽。即青。

桂苓丸 治腎氣上逆水泛為痰。通衝膈上。及冒暑煩渴。飲

水過多。腹脹小便不利。

五苓散去猪苓澤瀉白朮。用桂一兩。茯苓二兩。蜜丸沸

湯下之。一錢。日三服。桂苓散。

桂苓甘露飲 治溫熱病小便不通。煩渴引飲。

五苓散加真寒水石石膏滑石。

四苓散 治小便赤澀腹痛。及濕熱時行煩渴。

五苓散去桂。

醫通卷十六

五苓

李士恩得堂藏

茵陳五苓散 金匱 治黃疸小便不利。

五苓散加茵陳蒿。

春澤湯 治氣虛傷溼。小便不利。

五苓散加入人參。

葶藶木香散 治陽水腹脹。大小便秘。

五苓散加葶藶木香木通滑石甘草。

益元散 一名天水散 治暑月小便不利。

滑石六兩。甘草炙六錢。生四錢。

為散。清水調服。二三錢。發散溫病熱病。加葱白五七。香

薤四合。水煎溫服。老人虛人及病後傷津。小便不利。禁中

此方加葱豉煎服。則兼散表邪。加吳茱萸則治白痢。加紅

麴則治血痢。加炮薑則兼消飲食。加神砂則兼退心火。加

青黛則散肝火。加薄荷則清肺熱。加石膏則除胃熱。其入通聖雙解解毒等方。隨證配合。未遑枚舉。

辰砂六一散 治暑月驚悸多汗。小便澀痛。

益元散 一料。加辰砂一錢。

蒲灰散 金匱 治皮水小便不利而渴。

益元散去甘草。用滑石三分。加蒲灰七分。為散。飲服方寸匕。七日三服。

滑石白魚散 金匱 治消渴小便不利。小腹脹痛有瘀血。

益元散去甘草。加亂髮燒白魚炙等分。為散。飲服方寸匕。七日三服。

白虎湯 玉函 治熱病壯熱煩渴。及中暍煩熱而渴。

石膏八錢 知母三錢 甘草一錢 用碎 炙

醫通卷十六 益元 白虎 六十七 思得堂藏

粳米 半合

水煎溫分三服。一日盡飲之。

人參白虎湯 玉函即白虎 治熱病舌乾。大渴發熱有寒。

白虎湯加人參

桂枝白虎湯 治溫病感冒客邪而渴。及溫瘧先熱後寒。

白虎湯加桂枝

蒼朮白虎湯 治溼溫身熱足冷。

白虎湯加蒼朮

竹葉石膏湯 玉函 治大病後煩熱作渴。

白虎湯去知母。加竹葉人參半夏麥門冬。

既濟湯 治上熱下寒。

竹葉石膏湯加熟附子三五分。

解毒湯 治時疫入熱。

白虎湯去粳米。加入人參羌活升麻葛根白芍黃芩。

生地黃生薑。

葛根湯 治風溫無大熱而渴。

白虎湯去知母粳米。加入人參栝蒌根葛根防風。

此湯治風溫無大熱而渴。夫既無大熱。則不當渴矣。既渴。必非無大熱也。緣風溫之熱邪內蘊。故借白虎加入人參。

湯。裁去知母。粳米。加栝蒌根以清熱解渴。葛根以布胃行津。防風以開表散邪。人參甘草佐石膏栝蒌以化熱性雖甘溫。當無助長伏邪之虞。

大青湯 治斑子熱毒。

白虎湯去粳米。加大青黑參木通生地黃荆芥竹葉。

玉露散 治小兒傷熱吐瀉色黃。

白虎湯去知母粳米。加寒水石。如無寒水石。為散。每服半錢。七至一錢。沸湯調日三服。

薛立齋云。若飲食如常。作渴飲冷。宜用此藥。若食少體倦。喜飲熱湯。此脾氣虛陷。宜六君子湯加升柴。此方切禁。

蘭香飲子 治消中能食而瘦。大渴便秘。

白虎湯去粳米。加入人參生甘草蘭香。俗名防風升麻。枳梗連翹半夏白豆蔻。

按消中為脾胃積熱。故東垣本入人參白虎而立蘭香飲子。內經所謂治之以蘭。除陳氣也。但方中防風半夏豆蔻升麻。未免過於辛燥。易去此。加入麥冬五味以滋化源。佐白虎以化胃熱。蘭香以除陳氣。與歸脾湯中用木香之意。

醫通卷十六 白虎 六十八 思得堂藏

不殊。或於竹葉石膏湯中。加知母。蘭香尤安。

生津甘露飲 治上焦熱渴。

蘭香飲子去防風半夏。加當歸麥冬。山梔黃連黃蘗。香木香。

駐車丸 千金 治陰虛下痢發熱。膿血稠粘。及休息痢。

阿膠 三兩 黃連 炒黑 當歸 各兩

乾薑 炮一

右四味搗篩。瑞煮阿膠爲丸。梧子大。每服四五十丸。晝夜三服。米飲下。

三車運精氣神。分治三焦。以調適陰陽。此因陽熱過旺。陰精受傷。故用黃連以駐鹿車之驟。乾薑以策牛車之疲。阿膠以轡羊車之陷。當歸以和精氣神之散亂也。

醫通卷十六 駐車 六九 醫得堂藏

阿膠丸 治冷熱不調。傷犯三陰。腹痛下膿血。

駐車丸 本方膠連各二兩。端薑各一兩。加木香黃芩赤石脂。木香 龍骨 木香 各一兩。厚朴 薑半兩。米飲丸梧子大。每服三十丸。晝二夜一服。米飲下。

歸連丸 治陰虛下痢五色。及孕婦噤口赤痢。

駐車丸 去乾薑。本方用阿膠二兩。端連各一兩。加黃芩黃蘗。炒各半兩。蘗艾兩半。右除膠艾爲細末。以醋一升煮艾至一升。去滓入膠烱化爲丸。菴豆大。每服六七十九。晝夜三服。米飲下。

阿膠梅連丸 治陰虛下痢五色。至夜發熱。

駐車丸 本方用膠連各三兩。當歸一兩五錢。炮薑一兩。加黃蘗。炒亦芍藥。赤茯苓。烏梅肉。各一兩五錢。醋煮。

阿膠爲丸。梧子大。每服三五十丸。晝夜三服。米飲下。

黃連湯 千金 治赤白痢。

駐車丸 本方用阿膠三錢。黃連當歸各錢半。炮薑一錢。加黃蘗。炒。甘草。各一錢。酸石榴皮錢半。右除阿膠。水煎去滓。內膠烱化。溫分三服。

佐金丸 治肝經鬱熱。吐酸。綠黃水。

川黃連 六兩 吳茱萸 煨去閉口者。取淨

爲細末。米飲糊丸。梧子大。每服四五十丸。空心白木陳皮湯。或加味逍遙散。作湯送下。

抑胃丸 治肝火脇下急痛。

佐金丸 二味等分。製法如前。製過揀去吳茱萸。取黃連焙燥。一味爲末。滴水爲丸。每服四五十丸。空心沸湯送下。

醫通卷十六 佐金 七十一 醫得堂藏

得陳酒送下。

酒煮黃連丸 治心火亢盛。外內俱熱。及伏暑發熱。嘔吐。

佐金丸 去吳茱萸。用黃連一味。酒煮焙燥。爲末。滴水爲丸。每服四五十丸。空心沸湯下。

香連丸 局方 治下痢赤白相兼。白多於赤者。

佐金丸 如前製過。去吳茱萸。加木香一兩。醋糊丸。每服五十丸。米湯砂仁湯任下。

戊己丸 局方 治溼熱泄痢。腹痛不止。

佐金丸 加白芍六兩。神麴糊丸。空心米湯砂仁湯。蘗艾湯任下。

大補丸 治陰火亢極。足脛疼痛。不能久立。及婦人火鬱發熱。

厚黃藥 酒并陳米飯上蒸每蒸

煉白蜜丸 梧子大每服二錢空心醇酒下如服之不應每

勸加厚肉桂一兩

滑行散 治淫熱足膝腫痛

大補丸 治陰虛火旺煩熱易傷足膝疼痛

大補丸 治陰虛火旺煩熱易傷足膝疼痛

和蜜丸 梧子大空心煎湯下五十九

滋腎丸 治陰虛大渴小便滴痛熱起足心

大補丸 十分加知母七分肉桂一分滴水為丸食前沸

湯下七八十九

凡熱在足心直衝股內而入腹者謂之陰火起於湧泉之

下雖熱而不發渴為熱在膀胱此方主之

虎潛丸 治下體痿弱

大補丸 三兩加龜版熟地各三兩知母牛膝各二兩白

芍藥瑣陽虎脰骨當歸身各一兩五錢炮薑半兩醇酒

為丸侵晨淡鹽湯下三錢痿而厥冷加熟附子半枚

虎體陰性剛而好動故欲其潛使補陰藥咸隨其性潛伏

不動得以振剛勁之力則下體受陰矣其膝脰乃筋骨結

聚功力最優若用掌骨各隨患之前後左右取用不必拘

於左前為善也

加味虎潛丸 治痿痺而厥

虎潛丸 去知母加人參黃耆山藥枸杞各二兩五味子

一兩

二妙散 治身半已下淫熱來重而腫

大補丸 製散用酒加茅山蒼朮油并炒等分為散薑

汁調每日空心溫酒送下二錢

本方加肉桂名三妙散

金液丹 治陰極發躁厥冷厥伏

小便不通陰結畏寒大便秘

明淨硫黃五兩研細水飛入場盛罐內水調赤石脂末

封固鹽泥通身同濟候乾三足釘釘於地將罐放釘上

漫火燒養七晝夜再加頂火用炭十筋為度候冷取出

研細每末一兩用蒸餅一兩打糊為丸梧子大每服二

三十九溫白湯送下陰極冷甚者服百丸

靈砂丹 治上盛下虛痰涎壅盛最能鎮降虛火升降

陰陽和五臟助鼻元

水銀四兩 硫黃二兩

右二味新銕內炒成砂子入水火內煨煉為末糯米糊丸

如麻子大每服三九空心煎湯米湯并花水入參湯任下

量病輕重可增至五七九忌豬羊血菜豆粉冷滑之物

又法入場盛罐內赤石脂封口鹽泥固濟三足釘釘打火

蓋內置水勿令乾候三炷香足為度

二氣丹 治伏暑傷冷二氣交錯中脫痞結或渴或吐

硝石 硫黃等分

右為細末銀石器內炒黃色再研細糯米糊丸梧子大每

服五七九新汲井花水下不應更服

玉真丸 治腎厥頭痛四肢逆冷

硝石 硫黃 一味同製 石膏生

半夏湯泡七次等分

為朱薑汁和神麴丸。食後薑湯下。二三十九。虛寒甚者加鍾乳粉。

半硫丸 局方 治高年冷秘虛秘及痼癖冷氣。

硫黃 醋煨 柳木 半夏 湯泡七次等分

右二味等分用生薑自然汁調然餅糊。杵數百下。丸如梧子大。每服十五丸至二十丸。空心無灰酒。或生薑湯任下。婦人醋湯下。

養正丹 局方 治上盛下虛。氣不升降。元陽虧損。氣短身羸。及中風痰盛。涎潮不省人事。傷寒陰盛自汗。唇青。婦人血海久冷。

醫通卷十六 金液 七十三 思得堂藏

水銀 黑錫 與水銀結 硫黃 研

硃砂 水飛各一兩淨

用鐵銚銚化黑錫。入水銀。將柳木槌攪。次下硃砂。攪令不見星子。下少時。方入硫黃末。急攪成汁。和勻。如有稍以醋澆之。候冷取出。研細。煮糯米糊。九菴豆大。每服十五丸。至三十九。鹽湯或棗湯。人參湯任下。或丸如芡實。團服。服下。得睡勿驚覺。

來復丹 局方 治上盛下虛。裏寒外熱。及伏暑泄瀉如水。

硝石

硫黃 同硝石為末。銀銚內浸火炒。太陰元精石 水飛 貴皮 去穢

陳皮 去白各一兩 五靈脂 酒飛去砂。乾二兩

為朱古法以醋和丸。米飲下。因醋易發。發令飲用。未飲熱

九如梧子大。每服三十九。空心醋湯下。

黑錫丹 局方 治真元虧憊。陽氣不固。陰氣逆衝。三焦不和。令氣刺痛。腰背沉重。男子精冷滑泄。婦人白帶清冷。及陰證陰毒。四肢厥冷。不省人事。急吞百丸。即便回陽。大能升降陰陽。降痰定喘。

沉香 陽起石 煨飛

附子 炮 補骨脂 胡蘆巴 酒浸

肉豆蔻 煨 金鈴子 酒蒸去 補上茴香

肉桂 半兩 黑錫 銚去 木香 各一

右用黑錫入鐵銚內銚化。入硫黃如常法製。結成砂子。地上出火毒。研令極細。餘藥並細末。和勻。自朝至暮。研至黑。先色為度。酒麴糊丸。如梧子大。陰乾。藏鉛罐內。每服四五

醫通卷十六 金液 七十四 思得堂藏

十九。空心鹽湯或棗湯薑湯任下。婦人艾湯下。急證可投百丸。

三和丹 治一切陰寒。諸藥不効者。

養正丹 十九。來復丹 二十九。黑錫丹 三十九。鹽湯棗湯

薑湯人參湯任下。

附張介賓八畧總論

補畧

一補方之制。補其虛也。凡氣虛者宜補其上。人參黃耆之屬是也。精虛者宜補其下。熟地枸杞之屬是也。陽虛者宜補而兼煖。桂附乾薑之屬是也。陰虛者宜補而兼清。門冬芍地之屬是也。此因陰陽之治辨也。其有氣因精而虛者。自當補精以化氣。精因氣而虛者。自當補氣以生精。又有陽失陰而離

者不補陰何以收散亡之氣水失火而敗者不補火何以繼垂絕之陰此又陰陽相濟之妙用也故善補陽者必於陰中求陽則陽得陰助而生化無窮善補陰者必於陽中求陰則陰得陽升而泉源不涸余故曰以精氣分陰陽則陰陽不可離以寒熱分陰陽則陰陽不可混此又陰陽邪正之離合也故凡陽虛多寒者宜補以甘溫而清潤之品非所宜陰虛多熱者宜補以甘涼而辛燥之類不可用知宜知逆則不惟用補而八方之制皆可得而貫通矣

和畧

一和方之制和其不和者也凡病兼虛者補而和之兼滯者行而和之兼寒者溫而和之兼熱者涼而和之之為義廣矣亦猶土兼四氣其於補瀉溫涼之用無所不及務在調平

元氣不失中和之為貴也故凡陰虛於下而精血虧損者忌利小便如四苓通草湯之屬是也陰虛於上而肺熱乾者忌用辛燥如半夏杏仁細辛香附芎歸白朮之屬是也陽虛於上者忌消耗如陳皮砂仁木香檳榔之屬是也陽虛於下者忌沉寒如黃蘗知母梔子木通之屬是也大便滯泄者忌滑利如二冬牛膝茯苓當歸柴胡童便之屬是也表邪未解者忌收斂如五味桑仁地榆文蛤之屬是也氣滯者忌閉塞如黃耆白朮山藥甘草之屬是也經滯者忌寒凝如門冬生地石斛麥連之屬是也凡邪火在上者不宜升火得升而愈熾矣沉寒在下者不宜降陰被降而愈亡矣諸動者不宜再動如來動者忌溫熱血動者忌辛香汗動者忌燥散神動者忌耗傷凡性味之不靜者皆所當慎其於剛暴更甚者則又

在不言可知也諸靜者不宜再靜如沉微細弱者脈之靜也神昏氣怯者陽之靜也肌微清寒者表之靜也口腹畏寒者裏之靜也凡性味之陰柔者皆所當慎其於沉寒更甚者又在不言可知也夫陽主動以動清動火上添油也不焦爛乎陰主靜以靜益靜雪上加霜也不寂滅乎凡前所論論其畧耳而書不盡言言不盡意能因類而廣之則存乎其人矣不知此義又何和劑之足云

攻畧

一攻方之制攻其實也凡攻氣者攻其聚聚可散也攻血者攻其瘀瘀可通也攻積者攻其堅在緩者可破可培在經者可鍼可灸也攻痰者攻其急壯實者暫宜解標多虛者只宜求本也但諸病之實有微甚用攻之法分重輕大實者攻之

未及可以再加微實者攻之太過每因致害凡病在陽者不可攻陰在陰者不可攻陽若此者邪必乘虛內陷所謂引賊入寇也病在陰者勿攻其陽病在裏者勿攻其表若此者病必因誤而甚所謂自撤藩籬也大都治宜用攻必其邪之甚者也其若實邪果甚自與攻藥相宜不必難之補劑蓋實不攻若但畧加甘滯便相牽制虛不難補若但畧加消耗偏虛相妨所以寒實者最不宜消熱實者最不宜燥然實而誤補不過增病病增者可解虛而誤攻必先脫元元脫者無治矣是皆攻法之要也其或虛中有實實中有虛此又當酌其機宜不在忌宜攻等宜補者之例雖然凡用攻之法所以除邪為急也亦猶亂世之兵必不得已而用之若或有不獲勿輕試蓋攻雖去邪迫則傷氣受益者四受

損者六。故攻之一法。先哲最為詳審。正恐其成之難敗之。耳。倘任意不思。此其人可知矣。

散暑 蓋麻黃為太陽之本藥。至不可移易。或一節不項。則色。

一散方之制。散表證也。觀仲景太陽證用麻黃湯。陽明證用葛根湯。少陽證用小柴胡湯。此散表之準繩也。後世宗之。復不能用之。在不得其意耳。蓋麻黃為太陽之本藥。陽明證亦多用之。觀陽明經證治例。其義可見。按麻黃苦溫。專肺氣。仲景借以開發太陽經邪。為解表之重劑。若非多月正傷寒。原無藉此。即陽明之葛根湯。未嘗不用麻黃。未嘗不走太陽也。豈謂某經某藥。必不可移易哉。但用散之法。當知性力緩急。及氣味溫寒之辨。用得其宜。諸經無不應也。如麻黃桂枝。峻散者也。防風。荆芥。紫蘇。平散者也。細辛。白芷。生薑。溫

醫通卷十六

六

三七 思得堂藏

散者也。升麻。川芎。能舉陷。上行而散者也。第邪淺者忌峻利之屬。氣弱者忌雄悍之屬。熱多者忌溫散之屬。寒多者忌清涼之屬。凡渴而煩燥者。喜乾葛。而嘔惡忌之。寒熱往來者。宜柴胡。而泄瀉者忌之。寒邪在上者。宜升麻。川芎。而內熱火升者忌之。此性用之宜忌。所當辨也。至於相配之法。則尤當知要。凡以平兼清。自宜涼散。以平兼緩。亦可溫經。宜太溫者。以熱清熱。宜太涼者。以寒濟寒。此其運用之權。則毫釐進退。自有伸縮之妙。又何必膠柱刻舟。以限無窮之病變哉。此無他。在不知仲景之意耳。

寒暑

一寒方之制。為清火也。為除熱也。夫火有陰陽。熱分上下。方方書。咸謂黃連清心。黃芩清肺。石斛芍藥清脾。龍膽清肝。

黃柏清腎。今之用者。多守此法。亦是膠柱法也。大凡寒涼

物。皆能瀉火。豈有涼此而不涼彼者。但當分其輕清重濁。力微甚。用得其宜。則善矣。夫輕清者。宜以清上。如黃芩。石斛。連翹。天花粉之屬也。重濁者。宜於清下。如梔子。黃蘗。龍膽。滑石之屬也。性力之厚者。能清大熱。如石膏。黃連。蘆薈。苦參。山豆根之屬也。性力之緩者。能清微熱。如地骨皮。玄參。貝母。鮮薑。便之屬也。以攻而用者。去實鬱之熱。如大黃。芒硝之屬也。以利而用者。去壅閉之熱。如木通。肉桂。豬苓。澤瀉之屬也。以補而用者。去陰虛枯燥之熱。如生地。二冬。芍藥。梨。梨。細甘草之屬也。方書之分經用藥者。意正在此。但不能明言其意耳。然火之甚者。在上。亦宜重瀉。火之微者。在下。亦可輕清。夫宜涼之熱。皆實熱也。實熱在下。自宜清利。實熱在上。不可升

醫通卷十六

六

三七 思得堂藏

提。蓋火本屬陽。宜從陰治。從陰治者。宜降。升則反從其陽矣。經曰。高者抑之。義可知也。外如東垣有升陽散火之法。此以表邪生熱者。設不得與伏火內炎者並論。表邪生熱。當作

熱暑

一熱方之制。為除寒也。夫寒之為病。有寒邪犯於肌表者。生冷傷於脾胃者。有陰寒中於臟府者。此皆外來之寒。去之從來。則其治也。是皆人所易知者。至於本來之寒。生於無。無響之間。初無所感。莫測其因。人之病此者最多。知此者。少。果何謂哉。觀丹溪曰。氣有餘便是火。余續之曰。氣不足。是寒。夫今人之氣有餘者。能十中之幾。其有或因稟受。或因發敗。以致陽氣不足者。多見寒從中生。而陽衰之病。無不致。第其由來者。漸。形見者。微。當其未覺也。孰為之意。及

其也。始知難治。明唐醫多有不識。每以假熱為真火。因復斃於無形無覺者。又不知其幾許也。故惟高明見道之士。常以陽衰根本為憂。此熱方之不可不豫也。凡用熱之法。如乾薑能溫中。亦能散表。嘔惡無汗者。宜之。肉桂能行血。善達四肢。血滯多痛者。宜之。吳茱萸善緩下焦。腹痛泄瀉者。極妙。肉豆蔻可溫脾胃。殺泄滑利者。最奇。胡椒溫胃和中。其類近於華撥。丁香止嘔行氣。其緩過於豆蔻。補骨脂性降而善閉。故能納氣定喘。止帶濁泄瀉。製附子性行如酒。故無處不到。能救急回陽。至若半夏南星細辛烏藥良薑香附木香茴香仙茅巴戟之屬。皆性溫之當辨者。然用熱之法。尚有其要。以散兼溫者。散寒邪也。以行兼溫者。行寒滯也。以補兼溫者。補虛寒也。第多汗者忌薑。薑能散也。失血者忌桂。桂動血也。氣短氣怯者忌附脂。附脂降氣也。大凡氣香者。皆不利於氣虛證。味辛者。多不利於見血證。是用熱之藥也。至於附子之辨。凡今之川者。必待勢不可為。不得已然後用之。不知回陽之功。當於陽氣將去之際。便當漸用以望挽回。若用於既去之後。死灰不可復燃。尚何益於事哉。但附子性悍。獨任為難。必得大計之品。如人參熟地炙甘草之類。皆足以制其剛而濟其勇。以補培之。無往不利矣。此亞天中大將軍也。可置之無用之地。手但知之真而用之善。斯足稱將將之手矣。

醫通卷十六

六界

李氏 恩得堂藏

固界

一固方之制。固其泄也。如久嗽為喘而氣泄於上者。宜固其肺。久遺成淋而精脫於下者。宜固其腎。小水不禁者。宜固其膀胱。大便不禁者。宜固其腸。汗泄不止者。宜固其皮毛。血

洩不止者。宜固其骨。凡因寒而泄者。當固之以熱。因熱而泄者。當固之以寒。總之在上者在表者。皆宜固氣。氣主在肺也。在下者在裏者。皆宜固精。精主在腎也。然虛者可固。實者不可固。久者可固。暴者不可固。當固不固。則治海亦將竭。不當固而固。則閉門延寇也。二者俱當詳酌之。

因界

一因方之制。因其可因者也。凡病有相同者。皆可按證而用之。是謂因方。如癰毒之起。腫可散也。蛇蟲之患。毒可解也。湯火傷其肌膚。熱可散也。跌撲傷其筋骨。斷可續也。凡此之類。皆因證而可藥者也。然因中有不可因者。又在乎證同而因不同耳。蓋人之虛實寒熱。各有不齊。表裏陰陽。治當分類。故有宜乎此而不宜乎彼者。有同於表而不同於裏者。所以病雖相類。而但涉內傷者。便當於血氣中酌其可否之因。不可謂因方之類。盡可因之而用也。因之為用。有因標者。有因本者。勿因此因字。而誤認因方之義。

兼界 石頑桑補

一兼方之制。用間法也。與師旅之間謀無異。舉世但知以寒治熱。以熱治寒。局知病勢之危殆。錯難難分。况多假脈假證。非洞達玉函金匱之奧。難以語此。如表證用麻黃。此正治也。越脾大青龍。則兼石骨以化熱。麻附細辛湯。麻附甘草湯。則兼附子以救寒。此變法也。陰寒用附子。此正治也。真武湯。則兼生薑以散水氣。白通湯。則兼蔥白以通陽。豬膽汁以收陰。此變法也。府實用大黃。此正治也。大黃附子湯。附子湯心湯。則兼附子以破結。黃龍湯。則兼人參以助力。足補南陽之

醫通卷十六

六界

李氏 恩得堂藏

未建此變法也。陽邪陷陰欲轉陽分。用芍藥甘草湯持營氣。此正治也。四逆散則兼柴胡以通中道。官喘四逆則兼桂枝以通接壤。使陰從陽化。此變法中之定法也。妊娠胎息不安。用茯苓芍藥湯持陰血。此正治也。附子湯則兼附子以治子藏。開少腹如扇。桂心茯苓丸則兼桂心以治宿有積病。胎動下血。始知桂附反有固胎之用。是皆病證之變端。不能守尋常繩墨也。然必察其生氣未艾。方可特出奇兵以擊之。若服證俱殆。慎勿貪功以招壞金之謗也。

讀景岳先生入畧。至末條因畧。各無深意。而獨不及兼制之法。今不自揣。贅入此。以補其不足。其因畧原文。不敢擅裁。仍兩存之。石頑老人漫述。

張氏醫通十六卷 浙江巡撫 採進本

國朝張璐撰。璐字路玉。號石頑。吳江人。是編取歷代名家方論彙次成編。門類先後。悉依王肯堂證治準繩。方藥主治。多本薛己醫案。張介賓景岳全書。而以己意參定之。凡古來相傳之說。稍有晦滯者。皆削不錄。其辭氣未暢者。皆潤色發揮。務闡其意。康熙乙酉。

聖祖仁皇帝南巡。璐子以柔以璐所著本經逢原診宗二昧傷寒續緒論。及此書彙輯。恭進得。

旨留覽。考璐自序。是書初名醫歸未及刊行。佚其目科痘疹二冊。晚年命其子以倬重輯。目科治例以柔重輯。痘疹心傳補成完帙。改題此名。時韓氏醫通已久行於世。璐書名與相複。自序謂元氏集名長慶。白氏集亦名長慶。未嘗混也。今刊本題張氏醫通。蓋亦以別於韓氏云。